



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>





Y 24.

TAYLOR INSTITUTION  
—  
BEQUEATHED  
TO THE UNIVERS  
BY  
ROBERT FINCH, M.  
OF BALLIOL COLLEGE.


1601 E. 88

Y 24.

TAYLOR INSTITUTION.  
—  
BEQUEATHED  
TO THE UNIVERSITY  
BY  
ROBERT FINCH, M. A.  
OF BALLIOL COLLEGE.

1601 E. 88

C





600030004D





Al. Mol. Uomo Sig. Roberto Fin  
In attesa di profonda stima  
l'autore

Handwritten text, likely a signature or name, appearing in a cursive script. The text is heavily obscured by noise and artifacts, making it illegible.





ELEMENTI  
DI CHIRURGIA  
DI FILIPPO LEONARDI

CHIRURGO PRIMARIO, E LETTORE DI ANATOMIA  
E CHIRURGIA NELL' ARCHIOSPEDALE DEL SS.  
SALVATORE AD SANCTA SANCTORUM.

TOMO PRIMO  
CHIRURGIA MEDICA  
SEZIONE PRIMA  
MALATTIE GENERALI;



IN ROMA MDCCCXIV.

Presso Crispino Puccinelli Stampatore in Via  
della Valle num. 53.

---

*Col permesso de' Superiori,*



ALLA SANTITA' DI N. S.

512

**P A P A P I O V I I .**

FELICEMENTE REGNANTE

BEATISSIMO PADRE.

**C**oncorrono i più sacri titoli di riconoscenza, e di dovere a rendere non solamente scusabile il mio ardirmento, ma necessario ancora, nell'offerire, che fo alla SANTITA' VOSTRA questo mio tenue lavoro, men-

## APPROVAZIONI.

**I**n ossequio delli Ordini ricevuti ho letto, ed attentamente esaminato l'Opera intitolata *Chirurgia Medica*, che è divisa in due parti, cioè in Chirurgia Medica, ed in Chirurgia Operativa, compilata dall'Illustre Sig. Filippo Leonardi Chirurgo Primario, e Lettore nel Venerabile Archiospedale del Santissimo Salvatore in S. Giovanni in Laterano, il quale con indefessa fatica, ordine, e precisione, in detta opera ha riunito le antiche cognizioni, e le più recenti scoperte Chirurgiche; per cui sono di parere essere la sudetta opera utile alla facoltà Chirurgica, e massime alli Giovani Studenti, che si dedicano ad apprendere questo ramo dell'Arte salutare. E però parmi confacente a comun vantaggio la pubblicazione con la stampa di detta opera, nella quale non vi è nulla che offenda la Santa Religione Cattolica, nè i buoni costumi. In fede &c. Roma 2. Agosto 1814.

*Giovanni della Rocca Chirurgo Primario, e  
Lettore nel Venerabile, ed Apostolico Archiospedale di Santo Spirito in Sassia.*

**A**verendo di commissione attentamente percorso il primo Tomo dell'Opera del Sig. Filippo Leonardi, che ha per titolo *Chirurgia Medica*, e nulla avendo ritrovato, che si opponga alla S. Fede, al buon costume, e al rispetto dovuto a Principi, altronde sembrandomi utilissimo ai Studenti di Chirurgia, cui l'Autore deve istruire nel Ven. Archiospedale del Santissimo Salvatore in San Giovanni in Laterano, perchè così avendo le Istituzioni stampate, e le avranno più copiose, e non saranno soggetti a tanti errori, in cui cader sogliono simili persone nei scritti, che abbiano sotto la dettatura; e finalmente avranno agio maggiore ad occupare più utilmente il tempo della Scuola in conferenze, o spiegazioni più estese, atimo che meriti esser dato alla pubblica luce colla stampa, e che come sarà per ridondare in pubblico vantaggio, così ne acquisterà del credito l'Autore, e col render conti i suoi talenti, e col significare l'impegno, che ha di eseguire più puntualmente, e con maggior profitto l'impiego, che sostiene di Lettore in tal materia nel sudetto Archiospedale.

Roma questo dì 14. Agosto 1814.

*Raffaele Canonico Bonomi Censore emerito  
dell'Accademia Teologica in Sapienza, e  
Lettore del medesimo Archiginnasio.*

## INTRODUZIONE. <sup>VII</sup>

---

Benchè in mezzo a tanta luce, dopo molte ingegnose ricerche, ed utilissime scoperte, per le quali chiarissimi Autori hanno donato alla Repubblica Medica Opere di Chirurgia, che per l'acutezza, facilità, ed ordine degne sono di somma lode, sembrar potesse infruttuosa, e superflua la stampa di questi miei Elementi; pur nondimeno l'esatto adempimento dell'onorifico incarico affidatomi d'instruire nella teorica, e nella pratica della Chirurgia i Giovani studenti nel Ven. Archiospedale del SS. Salvatore *ad Sancta Sanctorum*, mi ha per se solo, non senza grave ragione, stimolato a darli alla luce, onde compiere nel breve spazio di tre anni l'intero, e metodico corso di questa sì necessaria facoltà, e lucrare così il tempo inutile, e tedioso destinato allo scrivere, impiegandolo con miglior consiglio in ispiegazioni più diffuse, ed in vantaggiose ripetizioni.

I comandi altresì, e le paterne sollecitudini, e premure dell'E<sup>mo</sup>, e R<sup>mo</sup> Sig. Card. Pignatelli vigilantissimo nostro Protettore tante volte dimostratemi, ed in ispecial modo poco prima della



## VIII

di lui gloriosa deportazione da questa Città, sono per me un nuovo, e nobile impulso a far comparire al pubblico questa mia qualunque siasi produzione, ( in ossequiosa riconoscenza de' tanti beneficj dalla prelodata E. S. benignamente compartitimi ) il di cui vanto deesi intieramente all' influenza del suo valido patrocinio .

Prima di esporre il piano da me seguito in questa compendiosa Opera ragion vuole, che almen di volo, si parli di quest'Arte salutare, e dei requisiti richiesti in coloro, che ad essa voglionsi dedicare .

Questa parte adunque della Medicina, cui noi imprendiamo a trattare, che conoscesi col nome di Chirurgia, reca tanto grandi, e sicuri vantaggi all'umanità, quanto palpabili, ed evidenti sono i suoi effetti; tutte le malattie sono soggette all'ispezione oculare, chiari sono i metodi usati nelle medesime, e ciascuno è in grado di giudicare dell'effetto, ed efficacia dei rimedj, non meno che della cura praticata nel sanarle. E' sempre chiamato il Cerusico ne' casi, in cui gli sforzi della natura sono insufficienti, o inutili affatto a guarire l'infermità; quindi è che abbandonandosi a se stessa, o se ne ritarderebbe il bramato esito, o se ne impedirebbe del tutto la guarigione. Vanta finalmente la Chirurgia a preferenza degli altri rami della Medicina il singolar vantaggio di riconoscere assai sovente la vera cagione delle malattie, per lo che il Professore

è in istato di porvi il sicuro , ed opportuno riparo .

Per bene apprendere questa nobilissim' Arte, e conseguire la gloria , che si brama , volendo anche aspirare alla meta di essa , sono necessarie alcune qualità scientifiche , e debbonsi godere eziandio certe doti del corpo , e dell' animo . Le prime consistono nell'acquistar con diligenza la teorica , e pratica dell' arte stessa dopo avere appreso tutte le cognizioni preliminari , che si richieggono indispensabilmente . L' Anatomia , la Fisiologia , la Medicina teorica e pratica sono di necessità al Chirurgo , e distinguono il Professore dal Cerretano , e dall' ignorante .

Le doti del corpo , che sono propriamente doni della natura , senza di cui non si può esercitare questa professione , sono una vista chiara , ed acuta , ed una mano ferma , esigendosi l' operazione manuale . Quelle dell' animo debbono assolutamente essere una sagace prontezza , ed un coraggio tale , che sia capace a riflettere sul momento , onde prendere il più adattato , e conveniente partito ne' casi ardui , e dubbiosi , e quindi eseguire a sangue freddo , e con precisione le più grandi , e difficili operazioni , non praticandole senza una evidente necessità , giacchè l' abilità del Professore non si desume dal numero delle Operazioni , ch' eseguisce , ma bensì da quelle che ha bene eseguite , determinandovisi ne' casi

convenienti non ignorando le risorse della natura .

Che poi il posseder bene l' Anatomia pratica sia cosa necessaria al Chirurgo , si conosce assai chiaro dal riflettere , che quest' Arte è stata sempre nella sua infanzia , finchè non si è conosciuta l' Anatomia , che sù i Bruti soltanto , e fino a tanto che alcuni celebri Scrittori non hanno illustrato la mirabile struttura del corpo umano esaminandone minutamente le complicate sue parti . Ed infatti quanto vantaggio non ha recato lo sviluppo dell' Anatomia unito alle fisiologiche cognizioni all' Ostetricia , alle malattie degli Occhi , della Vescica , ed in somma a tutte quelle della grande Chirurgia ?

Quest' Opera è divisa in *Chirurgia Medica* , ed in *Operatoria* . La prima parte della *Chirurgia Medica* comprende le malattie generali , che indistintamente possono attaccare tutte le parti del corpo umano , e sono l' Infiammazioni , e loro conseguenze , cioè Suppurazioni , e Cancrene , i Tumori di tutte specie , le soluzioni di continuità , vale a dire Ulceri , Ferite , e Fratture ; finalmente le mutazioni di sito , come le Lussazioni , e le malattie dell' ossa , dell' articolazioni , e tutto questo conterrà il primo Tomo .

La seconda parte della *Chirurgia Medica* consiste in tutte le malattie locali , e queste verranno trattate secondo le regioni , che desse occupa-



no : si principierà dal capo , passando in seguito al collo , quindi ai mali del petto , ed addome , e in fine a quegli degli articoli : che è quanto racchiuderà il secondo Tomo .

L'ultima divisione di queste Istituzioni appartiene , come si è detto , all' *Operatoria* . Si parlerà adunque delle Operazioni secondo l'ordine delle regioni , nelle quali si praticano , servendomi dello stesso metodo usato nelle malattie locali . Tralascio in questo ultimo Tomo parlando delle operazioni sull' addome , di descrivere , e trattare di quelle , che appartengono alla Ostetricia , rimettendo gli studenti alla lettura di varie pregiatissime Opere sù tal ramo di quest' Arte utilissima .

Ho procurato riunire in quest' Opera tutti i più recenti , ed accreditati metodi di medicare , e le manualità più sperimentate , e sicure dirette da lume anatomico , per operare senza pericolo , e con felice successo .

[illegible][illegible]

**I M P R I M A T U R .**

**Candidus Maria Frattini Archiep. Philipp. Vicesg.**

F

PARTE PRIMA  
CHIRURGIA MEDICA

---

SEZIONE I.  
MALATTIE GENERALI.

CAPO I.

INFIAMMAZIONE.

**L** infiammazione è quella malattia, nella quale una parte del corpo umano esaltata nelle sue proprietà vitali diviene più o meno tumefatta, ed accompagnata da un certo sviluppo di calore, da un ravvivamento di colore, che forma un rosso a seconda del grado dell'infiammazione medesima, e finalmente da dolore, che qualche volta può dirsi piuttosto sensazione penosa. Questa locale alterazione di vitalità acquista diversi nomi secondo i varj luoghi, che occupa, denominandosi *Oftalmia* quella dell'occhio, *angina* quella della gola, *glossitide* quella della lingua etc.

La diversa sede, che prende l'infiammazione esterna, o chirurgica è una patente cagione per farla distinguere sotto questo rapporto in *erisipelacea*, *flemmonosa*, o *catarrale*. L'infiammazione erisipelacea limitasi soltanto alla superficie della cute, la flemmonosa arriva fino al tessuto cellulare, e la catarrale attacca le membrane mucose. Fassi un al-

tra divisione della infiammazione cioè in acuta e cronica, vera, o falsa, o come dicono i moderni stenica ed astenica. Il corso dell' acuta è ordinariamente più sollecito, ed i sintomi quantunque gravi sono meno allarmanti, ma la seconda rendesi di più lunga durata, i sintomi sebbene miti in apparenza producono effetti più terribili, ed il suo termine è spesso infelice. Noi non facciamo qui menzione di molte altre specie d'infiammazioni riconosciute da molti Autori p.e. la *metastatica*, la *gastrica*, la *biliosa* prodotte da una determinazione di un umore sopra di una data parte, da una saburra gastrica, o finalmente da un affezione del sistema bilioso. Queste infiammazioni o non esistono o possono ridursi alle divisioni già esposte. Le infiammazioni idiopatiche, e simpatiche, dette anche specifiche soltanto meritano di essere accennate rapporto alla cura che esigono. Noi vediamo l' infiammazione venerea persistere ad onta, che si siano esauriti tutt' i mezzi in genere adottati per l' infiammazione se non si amministrano degli antidoti necessarij contro la malattia generale, e lo stesso diciamo dell' erpetica, vajolosa, vaccinale &c.

Le cagioni dell' infiammazione possono essere distinte in remote, occasionali, e prossime. Tra le prime annoverasi il temperamento pletorico, la stagione fredda etc. Le cagioni occasionali poi sono molte. Vengono esse generalmente a ridursi ad una irritazione locale sia essa prodotta da una sostanza particolare applicata per un certo tempo sul nostro corpo, sia l' effetto di una violenza esterna, sia un disordine nelle sei cose non naturali da cui può risultare un accresciuta irritazione in una parte, che in tale stato appellasi infiammazione. La cagione prossima poi sembra dipendere da un grado maggiore di eccitamento della machina, o di una parte di essa



prodotto dall' azione più forte delle potenze stimolanti . Questo stimolo agisce sensibilmente sul sistema sanguigno osservandosi , che il corso del sangue è molto più attivo , e rapido non potendosi d' altronde ripetere il rossore , che è un sintoma quasi costante dell' infiammazione . Non infrequentemente per altro osservasi , che in alcune infiammazioni può essere ritardato il movimento circolatorio come accade in quelle prodotte da cagioni esterne , ed immediate . Non è però così facile secondo noi l' assegnare una cagione prossima generale , la quale convenga tanto alle infiammazioni dipendenti da vigore , quanto da quelle prodotte da debolezza , se pur non vogliamo dire essere lo stimolo quello , che nel primo caso produce l' afflusso del sangue nella data parte , ed al contrario l' atonia de' vasi esserne la cagione nel secondo . Il danno degl' attonanti locali nelle infiammazioni steniche , ed il vantaggio di essi in quelle procedenti da debolezza aggiunge peso a quest' opinione .

Il prognostico di questa malattia si desume non solo dall' età , e temperamento del malato , ma eziandio dalla specie , e grado della medesima , ed in forza ancora degl' altri sintomi più gravi , che possono alle volte associare , come dolor di capo , sete , aridezza di bocca , febbre , e convulsioni .

L' infiammazioni ordinariamente terminano in quattro modi . La risoluzione , che consiste nella sua totale dissipazione è uno de' più frequenti , e felici successi , che in essa possa accadere . La suppurazione , o l' indurazione sono anch' esse sovente l' effetto di una infiammazione , e finalmente una cancrena generasi qualche volta in sequela della medesima , che può dirsi con ragione essere il più infelice termine della malattia . Molti ne aggiungono a queste anche due altre terminazioni , cioè la re-

troceSSIONE, e la metastasi. La risoluzione è la cessazione intiera dell' infiammazione senza, che ve ne rimanga alcuna traccia, eccetto che una debolezza locale. La suppurazione accade quando nel luogo infiammato formasi un nuovo umore morbososo detto marcia, o pus, il quale ha delle qualità affatto diverse da quelle degli altri umori animali, l' indurazione dicesi allorchè la parte infiammata diviene dura, e più densa, che non era antecedentemente. Le glandole infiammate per la loro delicata struttura sono soggette a quest' induramento per lo più in grazia della prematura applicazione dei ripercussivi, i quali favoriscono il coagulo di una parte degli umori per l' esilità de' vasi ripiegati su loro stessi, e formano un nucleo per lo scirro, che deve per altro distinguersi dalla natura del medesimo. Finalmente la cancrena consiste nella mortificazione di una parte molle del corpo umano, in cui ha cessato ogni principio di vita. La ritroceSSIONE, o delitescenza è la scomparsa rapida dell' infiammazione, la quale intanto differisce dalla risoluzione, in quanto che questa non porta seco alcuna cattiva conseguenza, mentre nella ritroceSSIONE facilmente ne siegue lo sviluppo della malattia sopra un' altra parte. Questo trasporto è quello, che dicesi comunemente dagli scrittori metastasi. Parleremo in appresso delle più interessanti di queste terminazioni dell' infiammazione più in dettaglio per mantenersi nel sistema adattato ad istituzioni Chirurgiche, che ci siamo prefissi, quindi passiamo al presente ad accennare qualche cosa in generale sulla cura di questa malattia.

A quest' oggetto è assolutamente necessario il conoscere la natura della infiammazione, e segnatamente osservare se dessa è idiopatica, o sintomatica, se sia acuta, o cronica. Le infiammazioni sin-



tomatiche, che sono prodotte da cagioni irritanti locali, come sarebbe p. e. la presenza de' corpi estranei possono curarsi facilmente togliendo la cagione, che le produsse. Per quello poi riguarda la cura dell' altre infiammazioni dovrà sempre tentarsi la risoluzione. Qui però deve avvertirsi, che molte infiammazioni non sono suscettibili di risoluzione, ma debbono necessariamente suppurare. Noi vedremo parlando del flemmone, e del furuncolo, che queste due infiammazioni sono quasi sempre seguite da un andamento regolare de' sintomi, che le dichiarano di tal natura, e per conseguenza in simili casi deve il Cerusico promuoverne la suppurazione con i rimedi emollienti, i quali ajutino la formazione del pus.

Nell' altre infiammazioni poi, le quali sono suscettibili di risolversi deesi prima di tutto osservare se desse siano acute, o croniche, cioè se siano prodotte da accresciuto vigore delle parti, o da indebolimento delle medesime. I rimedi generali di una infiammazione acuta consistono nel sistema antiflogistico, come la dieta, i salassi, le bevande diluenti, i calmanti, gli emollienti locali applicati sotto tutte le forme possibili di lozioni, semicupj, fomentazioni, cataplasmi etc. Il salasso è sicuramente il rimedio più energico di cui possa farsi uso in questa malattia. Esso può essere o generale, o locale. Il primo ordinariamente deve farsi nel principio della cura, ed indi procurare una deplezione locale per mezzo delle sanguisughe. E necessario anche qui riflettere alle varie specie di cagioni, le quali possono aver prodotto queste infiammazioni, p. e. una infiammazione cagionata da una deposizione di un umore qualunque, come una deposizione lattea difficilmente cederà al metodo antiflogistico, e siccome terminano queste infiamma-



zioni per ordinario con la suppurazione quindi è, che sarà prudente consiglio procurarla dal bel principio cogl' adattati emollienti.

Le infiammazioni croniche, che sono ordinariamente di natura opposta alle acute, e riconoscono per loro cagione una debolezza, o atonia locale, e naturale richieggono un metodo affatto opposto al precedente, cioè il metodo corroborante. Non è possibile qui determinare i varj metodi corroboranti, che possono competere a questa specie d' infiammazione dipendendo essi non poco dalla parte, ch' è affetta dalla medesima, e dagl' umori viziati della macchina, che l' han prodotta, da quali riconoscono ordinariamente la loro origine, e durata. In generale convengono in queste infiammazioni gli astringenti, ed i ripercussivi; le preparazioni metalliche, la canfora, i rubefacienti etc. sono di questo numero. Non possono escludersi talvolta anche in questa specie d' infiammazione gli emollienti locali, e generali antiflogistici, poichè non convengono i sudetti astringenti, e ripercussivi ad una parte molto irritata senza favorire una susseguente suppurazione, o un indurimento se dessa è glandolare. Queste sono le regole generali per la cura d' ogni infiammazione. Non è qui necessario l'avvertire, che molti rimedi divengono poi antiflogistici, o calmanti secondo le circostanze particolari, così p. e. l' opio, il vetriolo, ed altri simili rimedi stimolanti possono divenire calmanti nelle infiammazioni croniche, e l' operazione di ridurre un ernia incarcerata col taglio sarà un rimedio contro l' infiammazione dell' intestino.

## SUPPURAZIONE.

Abbiamo detto parlando dell' infiammazione, che la suppurazione era una delle sue terminazioni, e che dessa consisteva in una separazione di pus nella parte antecedentemente infiammata. La raccolta di quest' umore dicesi *ascesso*. I segni, i quali indicano la suppurazione sono la mutazione di carattere della febbre, che prima era di natura infiammatoria, e continua, e diviene alquanto remittente nella sua esacerbazione, è accompagnata da brividi di freddo, e nella sua remissione da sudore, il polso è meno duro di quello fosse nello stato infiammatorio, il tumore infiammato diviene più limitato, più elevato, acuminato, e se la suppurazione non sia molto profonda sentesi la fluttuazione della materia. In questo stato cede la febbre, ed il dolore, e termina ordinariamente con l' aprirsi il tumore da se stesso, e dar esito alla marcia racchiusa allorchè questa esista nel tessuto cellulare subcutaneo.

Varie specie di ascessi vengono riconosciute dai Pratici cioè i idiopatici suddivisi in caldi, e in freddi, e sintomatici. Noi non accenneremo qui, che l' ascesso per congestione o altrimenti detto sintomatico prodotto come credeano gli antichi da una materia indigesta. Questo è freddo, poco doloroso, e senza infiammazione acuta. L' ascesso cistico è quello, in cui il pus viene rinchiuso in una cisti particolare formata dal tessuto cellulare; ovvero è formata dalla membrana, che riveste il viscere stesso, che è stato distrutto, e come fuso dalla suppurazione. Non sono rari gli esempj di questa sorte di ascessi ne' visceri parenchimatosi,



come il polmone, il fegato etc. Finalmente l' ascesso critico è quello prodotto dalla deposizione della malattia sopra una parte qualunque del corpo, e secondo che forma una crisi completa, o incompleta produce la guarigione della malattia, o la morte del malato. Convien porre attenzione al luogo, in cui formasi l' ascesso, al tempo nel quale si genera, ed alle alterazioni, che esso produce nella machina. L' ascessi delle parotidi p. e. sono per lo più di questa sorta ben frequenti nelle febbri nervose etc.

La formazione della marcia negli ascessi ripetesi da alcuni da una specie di disorganizzazione della parte, che è quanto dire dall' essere diventata locale una malattia, che nello stato di infiammazione era ancora generale; altri poi sostengono, che la suppurazione non è che un grado maggiore d' infiammazione, ed in sostanza riguardasi come una degenerazione del sangue, il quale ha preso una nuova forma. Qualunque sia realmente la cagione della suppurazione, egli è interessante il decidere quando essa realmente esista. I segni, i quali noi abbiamo accennati danno molto lume sulla suppurazione esistente; ma è necessario ancora esaminare la qualità dell' umore separato. Non esiste suppurazione senza secrezione di pus, quindi tutto l' oggetto è di fissare i caratteri di questo umore. Nelle suppurazioni esterne egli è ben facile il distinguere il pus, ma non lo è così nelle interne. Molti chimici si sono applicati a determinare i caratteri del pus, ed il criterio per distinguerlo dal muco; ma oltre che l' esperienze dei prelodati Chimici non sono le più sicure, non servono esse, che a far distinguere il pus dal muco, e non mai dalla così detta materia purulenta, che ha molto più analogia col pus, e che nasce non da una sup-

purazione, ma da una viziata secrezione di qualche parte. Lo stesso possiamo dire delle esperienze microscopiche, colle quali alcuni recenti Scrittori hanno preteso poter determinare dei caratteri distintivi della marcia, esperienze le quali sono troppo poco decisive, onde poterne formare un criterio adattato.

In genere la cura degli ascessi consiste nel favorire l'accrescimento delle marce, fondendo quanto havvi di duro, e d'infiammato coi rimedi adattati alla specie dell'ascesso, e nel procurare l'esito del pus racchiuso. Questo può ottenersi o naturalmente, o artificialmente. Molti Autori preferiscono il lasciare, che l'ascesso si apra da se stesso, venendosi ad ottenere con questo mezzo varj vantaggi, giacchè il foro si fa sicuramente a tempo debito, cioè quando la suppurazione è giunta al suo giusto grado da richiedere l'apertura, ed inoltre questa si forma nel centro della suppurazione, si dà esito alla materia graduatamente, e si dà tempo alle pareti della cavità di approssimarsi a misura, che vuotasi l'ascesso; devesi per altro riflettere, come esporremo in seguito, che molte volte la natura delle parti adjacenti, o la difficoltà, che prova l'ascesso d'aprirsi da se medesimo, non permette di attendere, che ciò accada. Per ottenere queste aperture naturali dopo aver procurato una buona suppurazione, o cogli emollienti, come fomenti, cataplasmi, ceroti emollienti, e simili, o cogli irritanti come le cipolle cotte, il lievito, il sapone, la gomma ammoniacca, ed altri, quali ultimi medicamenti sono i più adattati nella specie di ascessi di cui parliamo, deesi facilitare la perforazione della pelle continuando l'uso di necessarj topici, aggiungendovi, se fia di bisogno i ceroti diachilon, di altea, emol-



lienti etc. Questo metodo di lasciare gli ascessi aprirsi da se stessi per alcuni riguardi non è praticabile, come si è detto, in molti casi. Non deve attendersi l'apertura spontanea dell'ascesso, quando esso può per mezzo della materia, che contiene produrre del disordine nelle parti vicine, quindi debbono aprirsi con sollecitudine gli ascessi posti profondamente nel petto; nella regione lombare, o nel basso ventre, potendosi ragionevolmente temere, che l'ascesso si rompa internamente, e formi uno stravaso nella cavità. Deesi parimenti aprire sollecitamente un'ascesso, il quale resti situato vicino qualche parte, che possa essere offesa dalla marcia, come sono p. e. quelli posti vicino l'orbita, la spina, un aponeurosi, qualche articolazione, o se trovasi nelle tonsille, nella prostata, nelle quali circostanze è facile, che la marcia minacci soffocamento, produca la soppressione delle urine, la distruzione dei ligamenti, del peristio, non che la carie dell'ossa, se per mezzo dell'incisione non se ne procura l'esito. Lo stesso dicasi degli ascessi, i quali contengono del pus di cattiva indole, come quelli prodotti dalla deposizione di umori di natura acre, e corrosiva.

Dovendosi dunque dal Cerusico in tali casi venire all'apertura dell'ascesso, tre sono i metodi particolari adoperati dai pratici per tale oggetto, e sono il caustico, il setone, e l'incisione. Qualunque però sia il metodo, che vogliasi praticare, dev'essere accompagnato da molte cantele in alcuni ascessi, atteso che mancano, o sono equivoci quei segni necessari, come la fluttuazione, e ciò appunto accade nelle raccolte di marcia situate sotto de' muscoli molto grossi, o sotto qualche aponeurosi, nelli quali non riconoscesi il gonfiore con la vista, nè la fluttuazione col tatto. Quindi il Pro-

fessore deve essere ben cauto in tale circostanza onde potere aprire l' ascesso nel luogo precisamente dove è radunata la maggior quantità di materia.

Il metodo del caustico quantunque venga sovente preferito dai malati, che temono l' incisione è di molto più lungo, e doloroso, e per conseguenza il Cerusico non dovrà scieglirlo che ne' casi, ne' quali l' incisione non sia sufficiente a produrre gli effetti, che si desiderano. Siccome il caustico stimola le parti, e produce alle volte una nuova infiammazione sarà molto utile in quegli ascessi, in cui per debolezza la suppurazione sia troppo lenta. Il caustico più comunemente usato si è la pietra caustica, o la calce viva impastata col sapone. Il metodo del setone è parimenti doloroso, e non conviene generalmente eccetto che sia necessario mantenere una lunga suppurazione.

L' apertura col ferro è preferibile nel maggior numero degl' ascessi perchè va destituta dalla lentezza, e da molto dolore, da cui sono accompagnati gli altri metodi, ma essa presenta delle notabili difficoltà. Siccome non vi è parte del corpo umano, dove non possa formarsi un ascesso, quindi è che l' apertura del medesimo richiede le più grandi cognizioni anatomiche, e siccome agli ascessi può competere un diverso metodo secondo le diverse parti, nelle quali sono situati, perciò non possono qui darsi che de' principj generali. L' ascesso va aperto nel luogo dove è più prominente, dove la fluttuazione è più sensibile, e nel punto più declive; con questi mezzi si viene a facilitare lo scolo della marcia sì perchè apresi nel sito indicato dalla natura medesima, sì ancora perchè il peso stesso della marcia tende a scorrere nella parte inferiore. La direzione da darsi al taglio deve essere longitudinale, ossia secondo la direzione delle fibre carno-



te, onde ne restino recise meno, che sia possibile. Qui nasce la questione, se nell'apertura degli ascessi sia da preferirsi una grande incisione ad una piccola. Noi siamo di sentimento, che le grandi incisioni siano dannose, perchè dando accesso all'aria esterna impediscono, che le pareti della cavità si riavvicinino frà loro, e così le suppurazioni sono sempre abbondanti, e la marcia di cattiva qualità; per lo contrario le picciole incisioni dando esito alla materia a gradi, procurano anche graduatamente la riunione, e coll' impedire l'accesso dell'aria esterna non disturbasi l'azione della natura nella separazione del pus. Per queste ragioni consigliano molti Pratici di sostituire al bisturi un grosso troicart e ci sembra questo metodo preferibile, eccettuato ne' casi dove la marcia sia molto densa, che difficilmente esce da una picciola apertura, ovvero il tumore sia di natura fredda, linfatica, e cronica, ne' quali casi le pareti della cavità hanno perduto quella forza, che richiedesi acciò possano riunirsi e meritano anzi, completa, che apparisca la suppurazione, un'apertura a perdita di sostanza, vale a dire formata coll'applicazione del caustico, ed in fine se l'azione organica della parte è illanguidita, saranno eziandio giovevoli l'iniezioni risolventi.

Un fenomeno, che ordinariamente ha luogo dopo l'apertura di ascessi molto estesi si è la formazione di seni profondi, i quali separano del pus. Se l'ascesso dia maggior quantità di marcia, che sembri poter contenere secondo la sua estensione, se comprimendone la circonferenza osservisi uscire la medesima si potrà esser sicuri dell'esistenza de' seni, la direzione, e situazione de' quali scoprirassi con la tantola. La compressione, o il taglio sono i rimedi per tali seni.

Gli ascessi cistici richiedono necessariamente una incisione estesa, giacchè in essi oltre l'esito del pus è necessario incidere la cisti, e procurarne la totale fusione, e separazione. Un setone è spesso utile per ottenere questi effetti.

Aperto l'ascesso, e dato esito alla marcia, si riempirà l'apertura fatta con proporzionata quantità di morbide sfilà, affine di riparare quel poco sangue, che scaturisce, impedire la cicatrizzazione de' lembi recisi, e favorire la salutevol secondaria suppurazione, indi si coprirà l'apertura con delle compresse sostenute da una fasciatura, si medicerà in seguito il malato applicando sull'apertura fatta una faldella di sfilà con unguento rosato, od altro, e continuando l'uso di un empiastro emolliente, se la parte si è resa sensibile segnatamente se vi esista qualche durezza, altrimenti il solo bagno di ossicrato, rinnovando la medicatura più o meno frequentemente secondo la quantità di pus, che si separa, onde ottenerne la guarigione. Non accade egualmente in quegli' ascessi, in cui per varie cagioni viene impedita la cicatrizzazione, cioè o per la troppo gran debolezza del malato, oppure per qualche vizio della macchina, o de' solidi, che mantenga una continua sorgente di marcia. Il vitto corroborante, il vino, la china etc. saranno utilissimi per prevenire, o rimediare alla prima. Nel secondo caso poi converrà attaccare direttamente quelle cagioni, che hanno formato gli umori di genere morboso, o vizj de' solidi, senza la qual precauzione tutte le cure locali riuscirebbero inutili,



**L**a *cancrena* è la mortificazione di una parte molle del corpo umano, nella quale ha cessato ogni azione organica, che è quanto dire l'estinzione delle proprietà vitali. Se questa mortificazione si estenda profondamente al di là delle parti molli, e arrivi fino all'osso dicesi *sfacelo*. In questo è mortificato l'intero articolo, o membro. La *cancrena* distinguesi dalla maggior parte degli Scrittori in umida, e secca. La *cancrena* umida consiste in un ingorgamento della cute, che perde al poco a poco la sua consistenza, sensibilità, e calore diviene livida, e ricuopresi di flitteni, che vanno aprendosi esalando un odor fetido. La parte passa così in putrefazione, essa comunicasi ai fluidi, che ivi scorrono, e questi poi ne infettano tutto il corpo. Nella *cancrena* secca all'opposto non osservasi nè putrefazione, nè ingorgamento, ma la parte diviene secca, nera, fredda, insensibile, e nasce la disorganizzazione, come vedesi in un membro assiderato.

Le cagioni delle *cancrene* sono varie, la miglior distinzione che possa farsi di esse è in esteriori, ed interiori. Le interne consistono spesso in una cattiva qualità di umori, onde vediamo in tali soggetti una ben piccola infiammazione passare subitamente in *cancrena*. Le cagioni esteriori sono tutte quelle, le quali agiscono irritando una data parte, e segnatamente se producono un impedimento nella circolazione degli umori. Il fuoco, il freddo, i caustici, le contusioni, gli strozzamenti delle intestina le legature &c. possono essere tutte cagioni della *cancrena*.

Prima di passare alla prognosi, e cura di que-

sta malattia è necessario esporre varie specie di cancrena, le quali meritano una particolare attenzione pel rapporto che hanno con le principali cagioni capaci di produrle, e pel lume, che possono darci su di queste. Una delle più ordinarie cause della cancrena si è l'infiammazione, ed allora la cancrena viene prodotta o dal troppo stimolo, che ha luogo nella parte infiammata, o da una disorganizzazione cagionata dall'infiammazione stessa, o dalle sue conseguenze. Una specie di putrefazione degli umori può eziandio esser cagione della cancrena, la quale in questo caso è secondo molti Autori d' indole gastrica. Può eziandio la debolezza di tutto il sistema, e segnatamente de' nervi esser cagione di cancrena, e finalmente non è raro, che i vizj organici producano una cancrena. Tutte le malattie, le quali debilitano la macchina possono eziandio generarla, quindi nelle febbri di Ospedale, nello scorbuti, nei decubiti è assai frequente il veder nascere delle cancrene prodotte appunto dalla debolezza di tutto il sistema. Il freddo può anche per la stessa ragione annoverarsi fra le cagioni della cancrena, ed a questa classe di malattia appartengono i geloni così detti. Il fuoco è capace ugualmente di produrla suscitando una violenta infiammazione nella parte. Finalmente una cancrena, che merita particolare attenzione, sebbene sia ristretta soltanto ad alcuni luoghi, è quella prodotta dal grano speronato, e questa principia ordinariamente dalle dita delle mani, o de' piedi.

La prognosi di questa malattia, di qualunque specie essa sia, è sempre pericolosa, e spesso mortale; questo prognostico però v'è modificato secondo la cagione della medesima, e secondo le parti, che essa affetta. La cancrena è una malattia, la quale sia per l'umore stesso acre, e corrosivo separato, sia per la debolezza, che dessa induce in tutta la



machina comunicasi facilmente da una parte all'altra, ed i suoi progressi sono sovente molto rapidi; però in molti casi osserviamo, che la natura impedisce non solo questa comunicazione, ma procura eziandio la separazione della parte cangrenata. Ciò osservasi spesso negli articoli, ed in simili casi la cagione principale è, che più non agisce quella forza, che ha prodotto la cancrena. La maniera, con la quale accade questa naturale separazione della parte malata dalla sana consiste in una infiammazione circolare, che produce una suppurazione per mezzo della quale separansi le parti cangrenate dalle sane, e riducesi il tutto ad una piaga semplice con perdita di sostanza proporzionata alle parti attaccate dalla cancrena. In simili casi l'arte deve aiutare la natura, e questo per mezzo di rimedj emollienti, o stimolanti secondo che la parte è infiammata o dolorosa, o pallida, ed indolente, onde così procurare una buona infiammazione, e suppurazione.

La cura della cangrena è di varie sorti secondo la specie di essa, e particolarmente secondo le cagioni, le quali l'hanno prodotta, e secondo la parte affetta. Da questo vedesi, che è ben difficile il dare delle regole generali per la cura di questa malattia; ma conviene esaminare se la cagione è locale, ed allora spesso il togliere una compressione, che impedisce il circolo degli umori, il dar esito ad un fluido racchiuso, e simili possono essere i soli mezzi adattati a ristabilire una parte cangrenata, mezzi i quali non possono esporsi in dettaglio, ma il Cerusico deve sul momento porli in opera secondo il caso particolare. Se la cangrena dipende, come non di raro accade, da vizio umorale, cioè scorbutico, venereo &c. è chiaro, che senza attaccare direttamente queste cagioni con i me-

todi adattati, non sarà mai possibile ottenere la perfetta cura della malattia. Può finalmente la cancrena dipendere da cagione generale, o da vizio di tutto il sistema, e segnatamente de' solidi senza riconoscere alcuno de' vizj accennati, ed in questo caso la debolezza è la causa principale, allora l'indicazione è chiara, e tutto consiste a dar tono al sistema, ed allontanare le cagioni debilitanti onde restituire alla machina l'energia necessaria.

La cura della cancrena deve essere generale, e locale. La generale va diretta secondo le cagioni della malattia; siccome ordinariamente la debolezza è unita ad essa, e ne è spesso la cagione, quindi tutti gli sforzi debbono esser diretti a togliere la medesima. Il vitto nutriente, e l'uso interno degli stimolanti, e corroboranti costituirà la base della cura. Fra i rimedj di questo genere ha il primo luogo la china, questo rimedio produce mirabili effetti nelle cancrene tanto dando tono a tutto il sistema, quando servendo di antisettico, ed arrestando così i progressi, che suol fare nella machina l'umore cancrenoso riassorbito. La china sarà eziandio molto giovevole, se uniscasi con la canfora, valeriana, serpentaria, e simili altri rimedj stimolanti. Non è però, che questa regola non soffra una qualche eccezione, giacchè esistono delle cancrene le quali non solo non cedono all'azione della china, ma anzi si inaspriscono sotto l'uso della medesima. La cancrena secca di Pott, che suol sopraggiungere alle dita de' piedi è di questo genere. In simili casi trovasi maggior vantaggio dall'uso dell'opio.

Questo è quello, che appartiene alla cura generale della malattia, richiede però essa eziandio alcuni ajuti locali tanto per separare la parte già mortificata, quanto per impedire, che la malattia non faccia ulteriori progressi. Nella cancrena umida è



necessario dare esito all'umore cancrenoso contenuto nelle vescichette, le quali formansi sulla superficie della parte cangrenata, richiedesi inoltre di astergere continuamente la parte con delle lozioni toniche, ed antisettiche, e segnatamente con la decozione di china e simili. Si procurerà inoltre, che si formi intorno la parte cangrenata quel cerchio infiammatorio, che abbiamo detto produrre spesso una buona suppurazione per mezzo della quale separasi la cangrenata dalle parti sane. Questo si ottiene col mezzo degli stimolanti locali, de' quali si farà uso particolarmente allor quando troverassi la circonferenza della cancrena poco, o niente infiammata, e di color pallido. La China, le piante aromatiche secche sono le polveri adattate a tal oggetto, senza omettere le incisioni nelle profondità dell'escare cancrenose. Quando però la parte fosse di molto infiammata, ed accompagnata da durezza, si rende in tal caso molto opportuno l'uso degli emollienti, onde ottenerne una pronta, e facile separazione nei soggetti specialmente di pletorico temperamento. I rimedj poi, i quali servono ad impedire l'avanzamento della malattia, sono il caustico potenziale, ed attuale. L'ultimo rimedio finalmente sarà l'amputazione della parte. Qui conviene riflettere, che l'amputazione è di esito assai incerto ne' casi, ne' quali la cancrena dipenda da un vizio generale della machina, sì perchè separando la parte cangrenata non si impedisce, che dessa non si manifesti in altre parti, come ancora perchè ordinariamente in questi casi la cancrena è molto più estesa nell'interno, e più in alto, di quello sia nell'esterno, quindi anche amputando la parte si corre rischio di lasciare intatte delle porzioni cancrenate.

Riguardo alle specie particolari di cancrena, delle quali abbiamo di sopra parlato, ognuna anderà

curata secondo le regole generali accennate, dirette però secondo le sue cagioni particolari. Si darà quindi esito agli umori di cattiva indole, si rinnoverà l'aria ne' casi di cancrena prodotta da aria corrotta, si restituirà a gradi il calore in quelle cagionate dal freddo, e finalmente si porrà in opera una cura palliativa in quelle, che hanno la loro origine da vizj organici de' vasi grossi, le quali non sono affatto curabili per l'impossibilità, che ci è di togliere la cagione, che le ha prodotte.

## C A P O IV.

## DEI TUMORI INFLAMMATORJ.

I tumori, di cui parleremo in questo capitolo sono quelli, i quali riconoscono per loro origine una infiammazione locale, ed i principali fra essi sono l'erisipela, il flemmone, l'antrace, il panarice, ed il furuncolo.

L'erisipela definiscesi da migliori Pratici una infiammazione della superficie della pelle di un rosso vivo lucente un poco giallastro con leggerissima tumefazione, che occupa una grande estensione senza aver limiti ben determinati, essa cangia di luogo stendendosi nelle parti vicine, e produce un calore urente, e pruriginoso, con la pressione del dito sparisce il rossore; ma ritorna quando cessa di premersi sulla cute.

La divisione dell'erisipela è in primo luogo di erisipela semplice, o complicata, idiopatica, o sintomatica, distinguesi eziandio secondo le cause, quindi abbiamo la gastrica, la biliosa, e quella prodotta da cagioni locali.

Comunemente distinguono i Pratici tre gradi nell'erisipela, il primo, che è il più mite è quel-



lo, che consiste in un semplice sentimento di svogliaatezza nel corpo, di mancanza di sonno etc. Questi leggieri sintomi svaniscono al comparire dell'esantema. Il secondo grado di erisipela è più violento, i sintomi sono più gravi, la malattia è accompagnata da febbre. Nel terzo grado finalmente la malattia produce la febbre più forte con dolore di testa, delirio, vomito etc., e la desquamazione, che accade nel 11., o 14. giorno è accompagnata ordinariamente da una crisi.

Per quello riguarda le cagioni dell'erisipela sono varie le opinioni degli Scrittori. Alcuni hanno preteso ridurle tutte alla bile, o vizj delle prime vie, allo stato infiammatorio della machina, e finalmente alle cagioni locali; sembra però, che esistano molte specie di erisipela dipendenti da altre cause, e segnatamente dalla traspirazione impedita; può essere anche l'erisipela prodotta dal trasudamento di un umore irritante, come spesso osservasi nelle estremità inferiori degli idropici, e finalmente una debolezza qualunque; quindi non è raro di osservarsi l'erisipela nelle persone di età avanzata, e di temperamento cachetico.

La prognosi dell'erisipela è varia. I fondamenti principali di essa debbono desumersi dalla natura della febbre, che spesso accompagna questa malattia. La febbre infiammatoria ordinariamente dimostra la malattia di carattere benigno, come anche la febbre gastrica, o biliosa, la quale riconosce la sua origine nelle prime vie; l'erisipela poi accompagnata da febbre nervosa, e maligna è spesso pericolosa, e molte volte passa in cancrena. Ma oltre questi indizj presi dalla natura della febbre, altri possono prendersene dalle complicazioni della malattia, e dalle parti, che essa occupa. Riguardo alle complicazioni sarà pericolosa l'erisipela,

DEI TUMORI INFLAMMATORJ. 21

che sopraggiunge all'edema, o al flemmone, non essendo lontano il pericolo di cancrena, come osservasi nelle erisipele, che sopraggiungono ai leucostemmatici. Riguardo poi al luogo, che occupa sarà più pericolosa l'erisipela a misura che la parte affetta sarà più nobile, o prossima a qualche viscere interessante, su di cui facilmente trasportasi l'erisipela, ed allora ha luogo ciò, che dicesi metastasi della medesima.

La metastasi è molto frequente nella erisipela, ed è pericolosa a tenore delle parti, nelle quali si manifesta. Se dessa accade nel cervello, o nel petto, gli accidenti, che ne risultano sono molto pericolosi, ed alle volte anche mortali. La metastasi dell'erisipela dunque è da temersi molto in quelle della testa, ed in quelle delle parti esterne del petto.

La cura di questa malattia dee essere generale, e locale. La cura generale vada diretta secondo la natura della medesima, la quale desumesi, come abbiamo detto, dalla specie della febbre, da cui essa è accompagnata. Se la febbre sia di carattere infiammatorio dovrà porsi in opera il regime così detto antiflogistico, o debilitante. Ordinariamente l'erisipela infiammatoria presenta un carattere benigno, ed allora sarà sufficiente di usare i più miti diaforetici, p. e. il nitro, e lo spirito di Minde-  
rero, una dieta tenue, e l'astinenza da ogni cosa irritante; ma se poi la malattia sia di un carattere infiammatorio più deciso, la febbre più risentita, il dolore acuto etc. sarà necessario il ricorrere ai salassi ripetuti secondo la violenza della malattia, ed il temperamento del paziente, si farà uso degli adattati purganti, come la manna, il tamarindo, la cassia etc. e si terminerà la cura colle bibite antiflogistiche, e diluenti. Il sistema debili-



tante nella dieta ha molto più luogo nel caso di erisipela forte infiammatoria.

Si è detto, che spesso l'*erisipela* riconosce per sua cagione primaria un vizio esistente negli organi biliarij, o nelle prime vie. Ciò supposto la cura sarà diversa, essendo il primo oggetto quello di togliere la cagione della malattia. Il metodo evacuante otterrà i massimi effetti, quindi i purganti sono utilissimi, e segnatamente i salini come il cremor di Tartaro, il sal di Glaubero etc. Il tartaro emetico sarà eziandio molto vantaggioso.

Finalmente nelle erisipele procedenti da una debolezza di tutto il sistema, ed accompagnate da febbre di carattere nervoso avranno luogo i rimedj stimolanti. In generale la cura in questi casi dovrà esser piuttosto diretta alla malattia universale ossia alla febbre, avvertendo soltanto d'impedire, che l'infiammazione locale passi in cancrena, lo che ha segnatamente luogo allor quando l'*erisipela* occupa delle parti, che sono soggette al decubito, come il gran trocantere, la tuberosità ischiatica, l'osso sacro etc. Non appartiene alla Chirurgia il dare i precetti, coi quali debbesi diriggere la cura della febbre nervosa o putrida, quindi passiamo ai rimedj locali, che convengono nell'*erisipela*.

Il sentimento comune si è, che i rimedj locali poco luogo possano avere nella cura di questa malattia, giacchè la maggior parte di essi possono agire come ripercussivi, e quindi esser cagione della ritrocezione della malattia, e della metastasi della medesima. Pure siccome alle volte il dolore, e prurito della parte sono insopportabili è necessario applicare de' topici blandi, onde diminuire questi incomodi. I migliori consistono nelle pezze bagnate nell'infusione tepida di fiori di malva, o di meliloto, le quali saranno eziandio giovevoli, in quan-

to che impediscono il contatto dell'aria fredda molto dannoso nell'erisipela. Converrà poi assolutamente astenersi da ogni sorte di tonici forti, e stimolanti locali, i quali sono tutti astringenti, e per conseguenza ripercussivi, e producono facilmente la retrocessione di questa malattia infiammatoria, che è più di ogni altra soggetta a cangiar di luogo. E' anche necessario avvertire, che i topici di qualunque specie, e segnatamente gli emollienti non hanno luogo quando sia da temere la suppurazione.

Per l'erisipela prodotta da pura località la cura principale dovrà consistere ne' rimedj topici adattati all'indole della malattia, quindi saranno indicati i cataplasmi emollienti, o i rimedj leggermente irritanti secondo che dessa sia prodotta da uno stimolo locale, o piuttosto da una atonia della parte. Sarà eziandio molto vantaggioso procurare l'esito dell'umore spesse volte contenuto nelle picciole vescichette, che accompagnano sovente queste specie di erisipela. Una però delle principali indicazioni: che avrà particolarmente luogo nella cura dell'erisipela locali, sarà quella di togliere la cagione che l'ha prodotta, e quindi conviene diriggere il piano di cura, secondo le principali circostanze, che possono variare all'infinito, e per le quali senza deviare dal metodo, che ci siamo proposti non possono darsi delle regole generali.

Una erisipela, di cui tutti gli Autori ne formano una specie particolare, è il così detto *Fuoco sacro*, o *Zona*, e che molti confondono anche col *Pemfigo*. Questa malattia ha ricevuto varj nomi, si è chiamata *Erisipela Miliare*, *Erisipela Pastolosa*, *Erpete Miliare*, *Erpete Cenchrias*, *Cintura di fuoco etc. etc.* L'indole della malattia ha molti caratteri, i quali la distinguono dall'*Erisipela*. In primo luogo non sono ad essa soggetti che gli



adulti, e mai i bambini, ed in secondo luogo la malattia attacca sempre il petto, o il basso ventre, e conserva una direzione circolare. I sintomi prodromi della medesima sono l'ansietà, mancanza di sonno, febbre, nausea etc. la malattia si manifesta al luogo dove deve accadere l'eruzione con un senso di prurito, e qualche volta accompagnato da calore urente. Dopo pochi giorni accade l'eruzione. Essa succede ordinariamente nel petto, o nell'addome in forma di piccole vescichette ripiene di un umore sieroso. Queste si riuniscono via via, e formano una cintura sul corpo della larghezza di 4. o 5. dita, la quale non descrive mai un cerchio intiero, ma si estende dallo sterno, o dalla linea alba fino alla vertebre da un lato, o dall'altro. La cute è infiammata, e presenta l'aspetto di una erisipela vescicolare. Le piccole pustole si aprono, e formano delle croste, le quali cadono disseccandosi.

Qualche Autore pretende che questa malattia sia di indole gastrica; ma dagli effetti che si ottengono dalla cura evacuante sembra, che questo gastricismo non sempre abbia luogo. Qualunque però ne sia la cagione egli è certo, che dessa è molto più grave dell'*erisipela* ordinaria. Quando l'eruzione è mite, ed il malato è di temperamento sano, e robusto, la malattia quantunque non abbia conseguenze pericolose, lascia sempre de'dolori muscolari, i quali poi sono diuturni, ed ostinati nelle persone di età avanzata. Alcuni Autori asseriscono di averla osservata anche ne' bambini, non solo grave, ma alle volte mortale.

Per quello che appartiene alla cura di questa specie di *Erisipela* sarà molto utile principiarla con de' purganti, e qualche volta ancora con un emetico. In tutto il tempo poi dell'eruzione consiste-

rà la cura nel far uso di bevande diluenti, ed antistogistiche, continuando sempre l'indicazione di tenere il ventre libero o co' leggieri minorativi, o co' clisteri emollienti. Nello stadio dell'essiccazione delle pustole, e della caduta delle croste, se continueranno i dolori nella parte affetta sarà utile porre l'infermo all'uso del latte, e de' bagni. Non è poi necessario quì il ripetere che essendo questa malattia della natura dell'*Erisipela* è egualmente da temersi la retrocessione, quindi sarà sommarmente indicato l'astenersi da ogni sorte di rimedj stimolanti locali e ripercussivi.

Il *Flemmone* è un tumore infiammatorio circoscritto, duro, accompagnato da dolore, rossore, e febbre, la sede di esso è nella cute, e tessuto cellulare. Le cagioni di questa malattia sono per ordinario le medesime, che abbiamo detto essere dell'infiammazione, ma soltanto esistono alcuni casi particolari di *flemmone*, i quali possono riconoscere diversa origine. Il *flemmone*, che sopravviene al braccio in occasione di salasso è appunto di questa specie, alcuni credono, che desso dipenda dalla puntura del tendine, altri da quella del nervo, ed alcuni altri finalmente dall'ingresso dell'aria nella vena aperta.

Questa malattia è molto più grave dell'*erisipela* terminandosi rare volte per risoluzione, ma passando più comunemente in suppurazione, la quale talora è anche seguita dalla cancrena. Questa spesso tien dietro alle vaste, e profonde suppurazioni prodotte dal *flemmone*. Quando si stabilisce la suppurazione, il tumore principia ad ammolirsi, il colore della cute diviene più pallido, si assottiglia la medesima, e si sente manifestamente la fluttuazione. In questo stato si è formato del pus, dalla buona, o cattiva qualità del quale dipende la na-



tura della suppurazione, ed il felice, o infelice esito della malattia.

Egli è certo, che il flemmone suol terminare per lo più colla suppurazione, ma pure è possibile, che il suo fine sia la risoluzione, esito felice, che potrà sperarsi con qualche fondamento, se il Cerusico può dal principio della malattia ordinare una dieta rigorosa, ripetere il salasso a seconda de' precetti generali, amministrare de' miti purganti, accompagnando il tutto coi topici emollienti.

Sotto questi riguardi se il flemmone tende alla suppurazione, la cura consisterà nel sollecitarla procurando insieme la formazione del pus di buona qualità, in seguito dare esito al medesimo, ed in terzo luogo favorire la detersione dell'ulcere, che gli dà origine, e finalmente ottenere la cicatrice. Molte delle cose, che noi abbiamo accennate parlando degl'ascessi hanno luogo eziandio nel flemmone.

Per sollecitare la suppurazione, e nello stesso tempo procurare, che il pus sia di buona qualità è necessario porre in opera il sistema antiflogistico, e debilitante come abbiamo accennato per la risoluzione, e questo anderà adattato al temperamento del paziente, all'età del medesimo, ed al grado dell'inflammazione locale. Ne' soggetti giovani, robusti, di temperamento pletorico l'inflammazione è ordinariamente violenta, la febbre risentita, e la suppurazione accade sollecitamente, per conseguenza il metodo antiflogistico dee porsi in opera con la massima energia. Per lo contrario ne' soggetti deboli, avanzati in età, e di cachetico temperamento l'inflammazione sarà più lenta, piccolo il dolore, quasi nulla la febbre, e la suppurazione sopraggiungerà molto più tardi. In tal caso il metodo debilitante anderà usato con cautela, che anzi sarà alle volte necessario ricorrere a qualche

medicamento topico leggermente irritante onde supplire alle forze mancanti per accelerarne la suppurazione. I rimedj generali antiflogistici come abbiamo veduto consistono principalmente ne' salassi, bibite diluenti, purganti, e segnatamente nell'astinenza da qualunque cosa irritante; ma oltre questi rimedj generali si richiedono eziandio de' rimedj topici consistenti per la maggior parte in cataplasmi emollienti, come sarebbero p. e. quelli di malva, e mollica di pane, e latte, o cose simili. Ne' casi, ne' quali abbiamo detto venga il tumore indolente, duro, e poco infiammato converranno gli empiastri irritanti, i gommosi etc. Riguardo la parte poi dovrà aversi ancora molta attenzione alla sua situazione, onde essa non resti danneggiata dalla compressione, si procurerà quindi, che quelle parti dove la pelle è più sottile, e delicata restino meno compresse, e che si varj la posizione onde non resti il malato sempre appoggiato sulla medesima parte. Questo è per quello riguarda la cura del primo stadio del flemmone in generale, esistono però molte volte dei flemmoni prodotti da cagioni locali, e che richiedono la cura locale particolare. Noi abbiamo di già osservato di sopra, che la puntura di un tendine, di un nervo etc. possono essere altrettante cagioni locali di questa malattia, quindi conviene diriggere la cura secondo le medesime cause. Nelle punture de' tendini consigliano i Pratici oltre la cura antiflogistica generale, e locale d'incidere la parte, e scoprendo il tendine offeso di vedere tutte le fibre aponeurotiche infiammate, la quale operazione produce ordinariamente l'alleviamento de' sintomi. Nel caso poi di ferita di nervo, siccome i gravi accidenti, i quali sopraggiungono nascono dall'essere il nervo stato soltanto punto, o reciso in parte, si faranno cessare facil-



mente con la totale recisione del nervo offeso, la quale non riuscirà difficile scoprendolo antecedentemente. Molti Autori consigliano in simili casi di usare il caustico, che alle volte è sufficiente mezzo per calmare gli allarmanti sintomi.

Ottenuta la suppurazione converrà dar esito alla materia contenuta. Riguardo a questo può tanto ottenersi lasciandone la cura alle sole forze della natura, quanto aprendo il tumore col ferro. Avendo noi già parlato di questi due metodi in occasione che abbiamo trattato degli ascessi è inutile, che ripetiamo le ragioni, che obbligano a dare la preferenza ad un metodo piuttosto, che ad un altro. Abbiamo ivi similmente parlato del metodo da seguirsi nell'apertura del tumore preferendo quasi sempre una picciola apertura ad una grande.

Dato esito alla materia si è accennato essere necessario di procurare l'astersione del fondo del tumore. Se il paziente sia di robusto temperamento, se sia di buona costituzione, l'astersione dell'ulcere, o del fondo del tumore accade per sola opera della natura senza altri ajuti per parte del Cerusico, che leggiere, e superficiali medicature procurando nello stesso tempo di tenere aperto il foro, onde dar esito al pus, che si va formando. Delle stuella di sfilà secche, o ricoperte di un leggiero digestivo saranno sufficienti in simili casi. Se poi il soggetto sia debole, o abbia qualche vizio nella macchina, il pus sarà di cattiva qualità, e si formerà una piaga sordida, nella quale lenti, e tardi saranno i progressi verso la cicatrizzazione. In questi casi sarà necessario di corroborare la macchina, onde elevare il sistema generale delle forze dall'abbattimento in cui sono cadute, e correggere in seguito i vizj degli umori con gli adattati metodi.

Con queste precauzioni otterrassi la cicatrice.

Questa principia dal fondo dell' ascesso, il quale si va lentamente ricoprendo di una nuova carne di color rosso, vascolare, sensibile in forma di bottoni, i quali unendosi a poco a poco vengono formando come una nuova sostanza, che a gradi va crescendo fino che riempie la cavità, ed arriva a livello della cute. Il tessuto cellulare di questa parte diviene sempre più serrato, onde alla fine la cicatrice presenta una specie di sostanza più compatta, e non gode di quella estensibilità, di cui è fornito nello stato naturale, e che è il proprio carattere del tessuto cellulare.

Un tumore appartenente similmente a quelli dei quali parliamo è il furuncolo. Questa malattia definiscesi comunemente da Pratici un tumore infiammatorio doloroso, duro, di figura circolare elevato nel mezzo, non maggiore della grossezza di un uovo di piccione, ma spesso più piccolo, che ha la sua sede nella cute, e tessuto cellulare. Questo tumore di raro viene solo, ma spesso ne nascono varj, e si succedono l' uno all' altro. Un' accresciuto vigore della machina sembra essere la causa della malattia, trovandosi essa aver luogo per lo più nelle persone robuste, e di pletorico temperamento, in quelle segnatamente dedite all' uso di bevande forti, e liquori spiritosi, e la medesima è molto più frequente nelle stagioni, nelle quali dominano le malattie infiammatorie, e principalmente nella primavera.

La terminazione ordinaria del furuncolo è quella della suppurazione, anzi questo non è affatto capace di risoluzione. Allora la punta del tumore forma una specie di pustola, la quale aprendosi da esito ad un pus sanguinolento. Esce in seguito una porzione di tessuto cellulare biancastro, denso, granuloso, il quale è come il nucleo del furuncolo.



stilenziale, riportando a questa seconda specie il *Favo*, e la *Pustola maligna*, o *Mal-vat*.

L'*Antrace benigno*, e semplice non è contagioso, e nasce generalmente nelle persone di buon temperamento senza alcuna causa nota. Esso ha molta analogia col furuncolo, seppure non si distingue da esso per essere i sintomi alquanto più forti, essendo il tumore flemmonoso più grande, che nel furuncolo, e più doloroso. Il tumore occupa la cute, ed il tessuto cellulare. La sua punta diviene fin dal bel principio negra, livida, all'intorno infiammata, e cancrenosa, indi si apre, e da esito ad un pus sanguinolento, ed ivi formasi un ulcere profonda, ed accompagnata da febbre risentita sul principio, ma che va graduatamente diminuendo, e percorre generalmente il periodo del suo corso con molta sollecitudine. Il calore urente, che accompagna questa malattia gli ha fatto dare il nome di *Carbunchio*.

L'*Antrace maligno*, o *pestilenziale* distinguesi dal benigno pel suo colore più oscuro, e cancrenoso con un dolore molto più acuto. Esso ha nella sua punta una vescichetta, la quale rompendosi forma un'escara negra. I sintomi, i quali accompagnano l'*Antrace maligno* sono molto più forti, di quelli, che unisconsi al benigno, ed a differenza di questo ha di particolare di essere di sua natura contagioso, e di non costituire una malattia idiopatica, ma di essere il sintoma di un'altra malattia di tutto il sistema, e che riconosce per causa il contagio, e manifestasi a preferenza ne' luoghi malsani, e nelle persone deboli, o che si esercitano in lavori insalubri i quali producono delle putride esalazioni. La malattia essendo al sommo contagiosa fa de' progressi molto rapidi, e comunicasi principalmente per mezzo del contatto delle

ne sta molto meno grave di esso. Il *Favo* non propriamente parlare, che un tumore infiammatorio cancerenoso della natura del *Carbonchio*, ma largo, ed esteso, il quale viene a preferenza nuca, o al dorso. I suoi progressi sono sul principio molto rapidi, e formasi l'escara, da cui gemendo un'umore di cattiva natura, e che risce la sua origine da una cancrena della cellula, e della cute, onde sovente al separarsi di rimangono scoperti i muscoli. Il nome di questa malattia ha preso origine dall'aspetto, che essa presenta molto simile a quella di un alveare, essendo tutta la superficie forata da molti buchi.

Finalmente può anche riguardarsi come una varietà dell'*Antrace* la così detta pustola, o *Mal-vat*, quale al dire di alcuni Scrittori, è proprio di i paesi della Francia, e non così spesso osservata in altri luoghi. Questa malattia principia con un piccolo rossore simile alla puntura di un insetto, che passa poi in una piccola vescichetta, e ingrossandosi diviene prontamente cancerenoso. Questa malattia è accompagnata da sintomi spesso asseveranti.

sistema, e che per ordinario è d' indole maligna, e contagiosa, ed in fatti le febbri pestilenziali sono sempre accompagnate dall' *Antrace maligno*. Non è però, che non possa dipendere anche l' *Antrace* da un vizio della macchina stessa, come p. e. da un umore qualunque maligno, che si determini verso una data parte, e ciò ha dato luogo a molti di credere all' esistenza di un *Antrace critico*. Che poi questa determinazione di umori possa realmente essere la causa dell' antrace osservasi chiaramente nel Favo, che non di raro dipende dalla determinazione di un umore morboso su di una data parte, e che sovente è prodotto da una qualche irritazione locale nella medesima.

La prognosi dell' antrace è quasi sempre pericolosa, terminando sovente con la cangrena, e con la morte. Varia però a seconda delle diverse specie, che abbiamo riportato della malattia. L' antrace benigno, quantunque produca sempre molto disordine nelle parti, ed insieme molta perdita di sostanza, rare volte è pericoloso; ma non è però così del *Carbonchio maligno*, o *pestilenziale*. In alcuni soggetti il suo corso è tanto rapido, che molti ne muojono in 48. ore, ed altri in tempo più lungo. Esso è spessissimo mortale, e se non ha tal termine, produce una perdita di sostanza, che lascia delle deformità irreparabili. Il Favo, che noi abbiamo detto essere una varietà dell' *Antrace maligno*, è anche pericoloso, ma in proporzione meno dell' *Antrace*, ed il suo corso è più lungo, ed alle volte li malati se non muojono nell' acuto della malattia, o nel periodo della cangrena, muojono nel cronico dopo che essa è terminata, e periscono per la debolezza. Finalmente la *Pustola maligna*, o il *Mal-vat* è anche esso ugualmente pericoloso, e se la debolezza sia grande la cangrena fa de' grandi



progressi, ed il malato perisce in pochi giorni. Se però reggano le forze, e si formi intorno al tumore un cerchio infiammatorio, che produce per mezzo della suppurazione una separazione della gangrena, cade l'escara, ed il malato guarisce.

Osservasi da tutto questo, che la cura principale dell' *Antrace* di qualunque specie esso sia consistere deve primieramente nell' arrestare i progressi della gangrena, e secondariamente nel mantenere le forze del malato, e per conseguenza la cura dee incominciarsi dall' uso degli emollienti, se siano necessarj, del caustico, e ben anche del fuoco. Queste sono le basi principali, sulle quali è fondata la cura dell' *Antrace*, e che fa ora di mestieri di sviluppare.

L' *Antrace benigno* richiede ordinariamente una cura non molto attiva, bastando li semplici emollienti locali sotto forma di empîastri, aggiugnendovi qualche leggero stimolante qualora osservasi che la malattia faccia un corso troppo lento. La cura interna consisterà ugualmente nel metodo debilitante, vale a dire purganti, e bevande diluenti, ed anche in qualche salasso se la malattia presenti una forte diatesi infiammatoria. Subito che l'infiammazione sia diminuita, il tumore sia ammolito, e presenti una specie di fluttuazione sarà necessario l' aprirlo, e questa incisione sarà bene, che sia di una certa grandezza, onde dar esito al fluido contenuto, e segnatamente alla cellulare corrotta; quindi molti autori consigliano di farla cruciforme, lo che rende anche più facile l' applicazione de' rimedj necessarj, onde impedire la gangrena, fra i quali annoverasi principalmente la China, che in queste occasioni è di sommo vantaggio.

Nell' *Antrace maligno* come più pericoloso, e

più rapido nel suo corso, la cura debbe essere più energica tanto per quello riguarda tutto il sistema, quanto per quello appartiene alla malattia locale. Dall'indole della malattia stessa comprendesi che la cura esser dee tutta diretta ad impedire la debolezza, quindi nella cura interna si avrà in primo luogo in mira la natura della febbre, che suole con esso essere accompagnata, e che essendo di natura nervosa richiede una cura attiva stimolante. Un emetico sull'invasione della malattia sarà utilissimo, come adattato ad eliminare il miasma contagioso, che è la cagione della medesima. Il resto della cura interna consisterà nell'uso del vino, e della China. I vescicanti, l'alcali volatile, e la canfora saranno molto giovevoli, adattandoli alla circostanza, e segnatamente alle forze del malato, alla violenza della malattia, ed alla natura dell'epidemia regnante. E' poi inutile il dire, che i purganti, ed i salassi non potranno che essere dannosi in una malattia, nella quale l'estrema debolezza del paziente induce con somma facilità una cancrena mortale. Questo è quello riguarda la cura interna dell'*Antrace maligno*. Per quello poi, che appartiene alla cura esterna i migliori Pratici consigliano per arrestare i progressi della cancrena l'uso del fuoco. Con questo mezzo si ottiene di rianimare l'azione della parte, e di rinvigorire la forza vitale di essa. Altri consigliano l'uso del caustico come p. e. la pietra caustica, ed altri finalmente le scarificazioni. Il metodo del fuoco sarà sicuramente preferibile a tutti; ma qualunque si adopri degli accennati dovrà indi farsi uso de' stimolanti locali, come p. e. dell'unguento basilico, della terebintina &c. Non é poi qui necessario l'avvertire che qualunque metodo si usi anderà più volte ripetuto il contatto del caustico, del fuoco, o



DEI TUMORI INFLAMMATORI. 37

delle scarificazioni fino che la piaga prenda un aspetto benigno, e si impediscano i progressi della cancrena.

Il sistema di cura conveniente all' altre due specie di malattie da noi riportate all' *Antrace*, cioè il *Favo*, ed il *Mal-vat* poco differisce da quello abbiamo accennato per l' *Antrace maligno* secondo gli antichi in particolare; il *Favo* però dipendendo spesso come si è di sopra detto da una determinazione, o metastasi di umore maligno sarà prima di tutto necessario correggere la qualità di detto umore con i rimedj adattati generali, e contemporaneamente trattare il locale con gli empiastri emollienti, e mai stimolarlo con attonanti, nè aprirlo con ferro, o fuoco, ma solo dai naturali favi procurare in ogni medicatura a fare uscire la marcia.

Nel mal-vat poi conviene adoperare la cura conveniente alle malattie contagiose, e per la cura locale oltre gli stimolanti topici, fra i quali viene dai recenti Scrittori raccomandata la china, l' aceto, il sale ammoniaco etc. sarà eziandio necessario l' uso del caustico. Un acido forte, o qualunque altro caustico, e meglio poi di tutti il ferro rovente sono i mezzi migliori per indurre una locale irritazione, che oltre l' impedire i progressi della cancrena, produce una infiammazione locale, ed una suppurazione, il di cui effetto è la separazione delle parti mortificate. Molti adoperano delle tastre, o altro corpo estraneo ricoperto di qualche polvere caustica.

Per terminare il trattato de' tumori infiammatori restaci a trattare del *Panarice*. Questa malattia consiste in una infiammazione flemmonosa, che sopraggiunge nell' estremità delle dita. Gli autori recenti distinguono 4. specie di *Panereccio* a seconda delle parti, che esso occupa. La prima spe-



cie ha la sua sede sulla faccia palmare del dito, la seconda resta nel dorso di esso, e sotto l'unghia, la terza nella vagina de' tendini, e finalmente la quarta nel periostio delle falangi, mentre le due prime sembrano occupare soltanto la cellulare di dette parti. I sintomi ordinarj della malattia sono il tumore, o piuttosto il gonfiore dell'estremità di un dito accompagnato da rossore, calore vivo, e dolore lancinante, il quale si estende sovente a tutto il braccio, producendo eziandio la tumefazione del medesimo, non che delle ghiandole dell'ascella. Se la sede della malattia sia nella vagina de' tendini, o nel periostio delle falangi, i sintomi saranno molto più gravi, essendo in questi casi molto risentita la febbre, ed aggiungendosi ad essa il delirio, e le convulsioni.

Le cagioni della malattia possono essere locali, o generali. Fra le cause locali si annovera qualunque genere di irritazione locale, come sarebbe le punture delle dita, e segnatamente quelle trascurate, o che abbiano luogo in una machina, nella quale domini un vizio qualunque di umori, e così ancora le punture, dalle quali siasi introdotto in essa qualche umore venefico. Le contusioni, le morsicature di animali velenosi, i corpi estranei introdotti &c. sono tutte cause adatte a produrre questa malattia. Per quello poi, che riguarda le cagioni interne di essa possono esse ridursi alla inalzata eccitabilità della machina, che produce questa infiammazione flemmonosa locale, come appunto vediamo, che sotto circostanze analoghe generansi spesso delle altre infiammazioni locali. I vizj interni, i quali alle volte cagionano il *Panereccio* possono essere eziandio considerati come cagioni generali della malattia; ma conviene a questo riguardo esser cauti di non prendere un sintoma

di una malattia generale esistente nella machina per una malattia particolare.

Per quello, che riguarda il pronostico del *Panereccio* qualora esso sia semplice, ed attacchi soltanto la cellulare, non sarà di molta conseguenza ma cederà facilmente all'uso degli emollienti, e si otterrà una buona suppurazione qualora si adoperino i mezzi a questo oggetto indicati. Non può però dirsi lo stesso, qualora la malattia abbia la sua sede nella vagina de' tendini, o nel periostio, e segnatamente qualora si rincontri questa malattia in una machina infetta di qualche vizio di umori, come p. e. venereo, scorbutico, o scrofoloso. Se la malattia abbia la sua sede nelle vagine de' tendini, l'infiammazione non si limita alle sole dita, ma si estende alla mano, all'antibraccio, e fino anche all'ascella, i dolori sono fortissimi, e la suppurazione è molto estesa, la di cui conseguenza è spesso la distruzione de' tendini flessori, e quindi lo storpiamento, la perdita di qualche falange, la cancrena, e puranche la morte. Il *Panereccio* che ha la sua sede nel periostio produce facilmente la carie, e quindi richiede molte volte l'amputazione se non è sufficiente l'esfoliazione, e la sortita della porzione di falange cariata per ottenerne la cicatrice. Non di raro poi accade, che la malattia occupa tanto la vagina de' tendini flessori, quanto il periostio, ed allora il pericolo cresce necessariamente a proporzione della maggior quantità delle parti interessate.

La cura del *Panereccio* è analoga a quella delle altre infiammazioni, vale a dire di tentare primieramente la risoluzione col metodo antiflogistico passando in seguito qualora essa non possa ottenersi a procurare una buona suppurazione dando in appresso esito alla materia, che si è formata. Il metodo dunque, che devesi usare nel principio del-



la malattia sarà quello debilitante, e dovrassi particolarmente ricorrere al salasso ripetuto secondo la violenza della febbre, la forza de' dolori, ed il temperamento del malato. Molti consigliano anche i salassi locali, e questi per mezzo delle mignatte; le fomentazioni, i bagni, ed i cataplasmi emollienti saranno in questa malattia utilissimi, come nelle altre infiammazioni flemmonose tanto per procurarne la risoluzione, quanto per calmare i dolori. Occupando questa malattia i nervi appartenenti all'organo del tatto, non è alcuna maraviglia se i dolori siano a proporzione assai più forti, che in qualunque altra infiammazione flemmonosa, e quindi gli anodini, e calmanti saranno oltremodo necessari. L'opio sul principio della malattia produce sovente mirabili effetti. La violenza de' dolori in questa malattia obbliga il più delle volte a incidere il tumore senza che per ancor siasi ben stabilita la suppurazione. Il taglio dovrà esser profondo fino alla sede della malattia, e con questo prevengonsi ordinariamente molte funeste conseguenze; conviene però anche avvertire, che ad onta di tutti questi mezzi non si arriva spesso ad impedire la carie dell'osso, e lo storpiamento. Incidendosi il periostio l'osso rimane spesso allo scoperto, e ne siegue la carie, che se abbia luogo nell'ultima falange produce la caduta di essa, e così poi incidendosi la vagina de' tendini flessori, e rimanendo il tendine allo scoperto ne siegue l'esfoliazione, e lo storpiamento ne è la conseguenza inevitabile. Ad onta però della facilità di tutti questi successi è necessario di aprire il tumore sollecitamente sì per i violenti dolori, come anche per impedire, che il pus si faccia strada lungo la vagina tendinosa, ed attacchi una maggior estensione dell'articolo. Avendo molti Autori creduto, che la pressione del li-



gamento annulare del carpo potesse essere la cagione del grave dolore hanno proposto di reciderlo. Questo però non è necessario, e se pur qualche volta ci si deve ricorrere, ciò accade piuttosto per dare un esito libero alla materia, ed impedire, che la suppurazione si faccia strada lungo l'articolo, di quello sia per togliere la pressione di esso ligamento.

Sono poi divisi gli Autori circa la preferenza del ferro, o del caustico in tali circostanze. Il vantaggio, che ritrovasi dall' incisione è molto più sollecito, che quello che ottiensi dal caustico, ed inoltre il sangue, che esce in maggior copia per mezzo dell' incisione produce l'effetto di un salasso locale. Il caustico all' opposto produce una più grande apertura, che facilita molto il pronto esito della materia; ma si può ottenere lo stesso effetto facendo un taglio cruciforme. Il metodo dell' incisione va sempre preferito al caustico tanto perchè questo produce un effetto più sollecito, quanto perchè è meno doloroso, cosa, che è molto valutabile in questa malattia, nella quale i dolori sono assai vivi, e vengono accresciuti da ogni minima causa.

Inciso il tumore, e dato esito alla materia dovrà continuarsi la medicatura con gli emollienti locali. Sarà necessario l' astenersi da tutti i rimedj irritanti, che vengono da molti prescritti, e così anche deve prescriversi l' uso delle tastre, e turnande di sfilà, onde tenere aperto lo scolo alle materie; giacchè oltre che desse sono difficili a tenersi nel sito adattato sono insopportabili pel dolori che recano. Se dopo praticata l' incisione l' infiammazione sia violenta, ed i dolori assai forti potrasse ricorrere al salasso, piuttosto che all' uso dell' opio applicato localmente come da qualcuno si commenda. Di quest' opio ne sarà soltanto lo-

devole l'amministrazione interna per riparare alle vigilie notturne ceduto che sia lo stadio infiammatorio.

## C A P O V.

## DEI TUMORI SIEROSI.

L'equilibrio fra l'azione de'vasi esalanti nella membrana cellulare, ed in tutte le cavità del corpo umano, e quella de vasi assorbenti è la causa per la quale il fluido separato viene ugualmente riassorbito, e non si raduna mai in alcuna delle parti accennate; ma se questo equilibrio poi più non esiste, se i vasi esalanti ne separino in troppa quantità, ovvero i vasi inalanti non possano riassorbire la quantità, che se ne separa, disturbasi l'equilibrio fra queste due specie di vasi, e l'umore viene a radunarsi nella cellulare, o in qualche cavità. Un tal raduno di questo fluido sieroso viene da noi detto *Tumore sieroso*, il quale riceve diversi nomi a seconda delle parti, le quali egli occupa. Molti Scrittori annoverano in questa classe l'*Edema*, la *Leucoflemmazia*, l'*Anasarca*, l'*Idrope*, e le *Idatidi*, ma rigorosamente parlando non è, che il primo appartenente a questa classe, comprendendo noi sotto il nome di *Edema* eziandio la *Leucoflemmazia*. Le altre malattie nominate non possono chiamarsi propriamente tumori sierosi essendo il siero raccolto in una cavità, e molte volte non formando alcuna elevazione all'esterno.

Per *Edema* intenesi in Chirurgia quell'accumulamento di umore sieroso radunato nel tessuto cellulare subcutaneo. Questo tumore è il più delle volte molto esteso, e non è così esattamente circoscritto come gli altri tumori. La cute è del color naturale, anzi spesso più bianca, il calore è minore



essendo molte volte la parte fredda. La pressione del dito produce una fossa, la quale resta anche dopo fatta la pressione, e non svanisce, che a gradi. Questo tumore spesso s'infiamma, ed una tale infiammazione è di natura erisipelacea, ed alle volte anche si rompe dando esito al fluido contenuto. Un carattere dell'*Edema* è di portarsi facilmente da un luogo all'altro, come ancora di crescere, o diminuire secondo le diverse posizioni della macchina, lo che ha segnatamente luogo nell'*Edema* dell'estremità inferiori.

Parlando di questa malattia è necessario fare due distinzioni. La prima riguarda le parti, che essa occupa, e la seconda riguarda la natura della malattia. Le diverse parti, che occupa l'*Edema* fanno, che esso riceva diversi nomi, quindi dicesi *Anasarca* se occupa tutto il corpo, *Edema* se restringasi alle estremità, *Idrocele* esterno quando l'umore è stravasato nella cellulare dello scroto, ed interno, o vero quando detto umore è nella vaginale del testicolo etc. La natura poi dell'*Edema* può essere idiopatica, o sintomatica, può essere acuta, o cronica, e finalmente può essere l'effetto di un' atonia di tutto il sistema, segnatamente del linfatico, ovvero dipendere da causa opposta, e può finalmente essere il prodotto di cagioni locali.

L'esame dunque il più interessante nella cura dell'*Edema* si è quello delle cagioni, le quali sono molto varie, ma possono commodamente ridursi a tre punti principali, considerandole cioè come cagioni irritanti, come cagioni debilitanti, o finalmente come cagioni locali, ed indipendenti da vizio di tutto il sistema, alle quali possono eziandio ridursi gli edemi sintomatici. Le malattie infiammatorie possono esser cagione di edema, accrescendo l'azione de vasi sanguigni, e per conseguenza spin-



molte volte la parte fredda. La pressione produce una fossa, la quale resta anche tutta la pressione, e non svanisce, che a questo tumore spesso s'infiamma, ed una tumefazione è di natura erisipelacea, ed alle volte si rompe dando esito al fluido contenuto. Il carattere dell'*Edema* è di portarsi facilmente da un luogo all'altro, come ancora di crederlo diminuire secondo le diverse posizioni del corpo, lo che ha segnatamente luogo nell'*Edema* delle estremità inferiori.

Quando di questa malattia è necessario fare le distinzioni. La prima riguarda le parti, che occupa, e la seconda riguarda la natura della malattia. Le diverse parti, che occupa l'*Edema* fanno che esso riceva diversi nomi, quindi dicesi *Anasarca* quando occupa tutto il corpo, *Edema* se restringasi a una parte, *Idrocele* esterno quando l'umore è nella cellulare dello scroto, ed interno, quando detto umore è nella vaginale del testicolo. La natura poi dell'*Edema* può essere idiopatica, può essere acuta, o cronicamente può essere l'effetto di un' atonia del sistema, segnatamente del linfatico, o derivare da causa opposta, e può finalmente essere prodotto di cagioni locali.

La prima dunque il più interessante nella cura è quella che si è quello delle cagioni, le quali sono varie, ma possono commodamente ridursi a tre principali, considerandole cioè come cagioni generali, come cagioni debilitanti, o finalmente cagioni locali, ed indipendenti da vizio del sistema, alle quali possono eziandio riferirsi gli edemi sintomatici. Le malattie infiammatorie possono esser cagione di edema, accrescendo i vasi sanguigni, e per conseguenza spin-

che o dall'apertura del tumore qualora esso esista all' esterno, o dalla sezione del cadavere.

Per quello poi appartiene alla cura delle idatidi essa è delle più difficili. In questi casi è necessario distinguere se queste idatidi siano realmente animali della classe de' vermi, ne' quali casi molti propongono degli antelmintici, e segnatamente il mercurio. Dobbiamo però confessare, che questo metodo spesso riesce infruttuoso. Il mezzo migliore si è quello di incidere il tumore qualora esso sia accessibile, e quindi dopo dato esito alle idatidi contenute distruggere la cisti o per mezzo del caustico, o per mezzo di un topico stimolante.

## CAPO VI.

### DE' TUMORI SANGUIGNI.

**L**e malattie, delle quali parliamo in questo capitolo consistono in una raccolta di sangue, che formasi in una data parte del corpo umano sia essa prodotta o da una dilatazione de' vasi sanguigni, ovvero dalla rottura de' medesimi, lo che da origine allo stravasamento del sangue in una cavità, o da una infiltrazione del medesimo nel tessuto cellulare. Parlando nel secondo volume di questi elementi di Chirurgia delle malattie particolari di ogni parte del corpo umano avremo occasione di trattare delle varie raccolte di sangue, che formansi in diversi luoghi di esso, e che secondo le diverse regioni, che occupano ricevono diverso nome, presentano una prognosi diversa, e richiegono un vario metodo di cura. Le malattie, delle quali al presente parliamo sono gli *Ascessi sanguigni*, l'*Ecchimosi*, la *Varice*, e l'*Aneurisma*.

L'*Ascesso sanguigno* è una malattia poco fre-



quente, e per conseguenza poco nota, Varj Scrittori recenti hanno pubblicato delle osservazioni sopra alcune specie di questa malattia, specie, le quali sono incurabili, e nelle quali altro rimedio non si è trovato, che l'amputazione del membro. Il carattere di questi tumori è di essere duri, indolenti, e contenenti del sangue molto degenerato. Essi hanno la loro sede molte volte nelle glandole, ma spesso negl' articoli. Il corso di questa malattia è ordinariamente lungo, e se venga ad estirparsi il tumore col taglio ne nasce ordinariamente una emorragia irreparabile, che produce la morte del malato. L'apertura del tumore è accompagnata dallo stesso effetto, giacchè se non ne siegue l'emorragia mortale ha luogo una cancrena, che inevitabilmente priva di vita il paziente. Questi tumori hanno ordinariamente un colore livido, e per solito la parte passa in cancrena, o i tegumenti si rompono, e producono l'emorragia mortale. Nella sezione della parte trovasi la carie, e se la malattia abbia fatto dei progressi le ossa sono distrutte. Questo fenomeno è analogo a quello, che osservasi negli altri tumori sanguigni, e segnatamente negli aneurismi, nelle quali malattie se siano di lunga durata osservasi costantemente la distruzione delle ossa.

La diagnosi di questi tumori non è così facile; ma potranno dar molto lume il temperamento del malato, la causa della malattia, ed i sintomi di essa. Il tumore è ordinariamente tardo nel suo corso a differenza dei tumori di altra specie, e non presenta alcun carattere infiammatorio, nè partecipa dell' indole di alcuna altra specie di tumori. Ordinariamente osservansi nella circonferenza degli ascessi sanguigni delle vene gonfie, e livide, e molte volte si rincontra nel mezzo di essi una specie di fluttuazione affatto diversa da quella, che sentesi col



tatto negli ascessi, e segnatamente varia se si rifletta al corso precedente della malattia.

La prognosi di questi tumori è sempre infastita; per quello poi che appartiene alla cura i migliori pratici non riconoscono alcun altro mezzo che l'amputazione del membro. L'estirpazione del tumore è seguita come si è detto da emorragie mortali, e quindi è piuttosto dannosa, che utile. Di questo ne siegue, che qualora il tumore esista in luoghi tali, che non ammettano l'amputazione la malattia sarà incurabile, e non ammetterà, che la cura palliativa. Per questo metodo di cura saranno indicati gli attonanti locali, ed anche l'apertura del tumore per mezzo del troicart. Quest'apertura dovrà farsi nel luogo indicato dalla natura stessa, cioè dove la cute è più sottile, e quasi trasparente, si procurerà che l'apertura sia più piccola che sia possibile, onde poterla chiudere al momento, che si veggia, che sovrasti un'emorragia pericolosa. Questo metodo però non guarisce mai radicalmente la malattia, ma non fa, che ritardarne i progressi.

L'*Ecchimosi* è un tumore prodotto dal sangue stravasato sotto la cute, e cagionato dalla rottura di vasi sanguigni. Questo tumore è spesso leggero, superficiale, e consistente in una semplice macchia della cute, qualche volta però lo stravaso considerabile, il tumore molto elevato, e la malattia degenera in un ascesso sanguigno.

Ancora Alcuni Moderni distinguono l'*ecchimosi* in diffusa, e circoscritta. Intendono essi col nome di *ecchimosi diffusa* quella formata dallo stravaso del sangue nella cellulare quando esso infiltrasi nelle cellule di essa, chiamando poi *ecchimosi circoscritta* quella prodotta dall'accumulamento del medesimo in una sola cavità. Nell'*ecchimosi diffusa* la gonfiezza è molto simile a quella, che osservasi nel

## DE' TUMORI SANGUIGNI      § I

a, quando l'acqua è infiltrata nella cellulare e nell'ecchimosi circoscritta la malattia ha preso l'apparenza di un tumore.

Le cause di questa malattia possono essere o esterne, o interne. L'esterne sono le percosse sulla pelle, le contusioni, e le ferite de' vasi succubili. Alle cagioni interne poi appartengono tutte le depravazioni degli umori, e segnatamente del sangue. Osservansi per conseguenza dell'ecchimosi molte malattie di questo genere, come p. e. nel morbo putrido, nel tifo. L'ecchimosi di questa seconda specie potrebbe chiamarsi piuttosto sintomatica, appartenendo la cura della medesima a quella della malattia generale noi non intendiamo qui parlare che della prima specie, che vien prodotta dalle cause esterne, e che potrebbe dirsi idiopatica o locale.

Il primo oggetto principale in questa malattia è quello di procurare il riassorbimento del sangue extravasato, quindi è, che quando lo stravasato è piccolo il tumore poco, o nulla elevato, la parimente esso esiste non sia vicina a degli organi importanti, e finalmente la causa sia esterna, e di conseguenza, la guarigione della malattia sarà facilmente ottenersi. Se poi all'opposto il sangue extravasato sia in abbondanza, il tumore molto elevato, sia situato in vicinanza di parti interessanti, finalmente se la causa, che l'ha prodotto sia interna, o dipenda da una depravazione di umori, l'agnosi della malattia non sarà così certa, possono nascere molte volte delle suppurazioni pericolose, la carie delle ossa, e simili pericoli accidentali.

Tutto l'oggetto principale della cura dell'ecchimosi idiopatica, o locale consiste nel procurare il riassorbimento del sangue stravasato. Quando lo



stravaso è leggiero spesso le sole forze della natura sono sufficienti ad ottenere l'intento non riconoscendo la malattia in questo caso, che una cagione puramente locale. Non sarà però inutile in queste circostanze l'ajutare la natura per mezzo di attonanti, ed astringenti localmente applicati, i quali accrescendo l'azione de' vasi assorbenti facilitano il riassorbimento dell'umore stravasato. I bagni freddi, lo spirito di vino, il sale ammoniaco, l'erbe aromatiche sono i rimedj, i quali soddisfano principalmente all'accennate indicazioni.

Ma questi rimedj sono spesso insufficienti ne' casi, ne quali l'ecchimosi è più grande, e forma un tumore elevato. In questi casi la parte è per ordinario molto dolente, ed i rimedj spiritosi, ed irritanti non fanno che accrescere il dolore senza facilitare il riassorbimento del sangue stravasato, che anzi sono d'impedimento al medesimo coartando maggiormente i vasi, e cagionando una infiammazione; allora è necessario l'uso degli emollienti sul principio quando vi è ancora timore di una infiammazione; ma passato il primo periodo è necessario ricorrere all'uso dei discuzienti, e risolventi più energici avendo in questi casi il sangue acquistato una maggior densità. Il sale ammoniaco, il sapone, la farina di seme di lino, e simili sono i rimedj adattati all'oggetto. Spesso però questi rimedj operano lentamente, e non impediscono punto, che il tumore suppurì, o che produca la carie dell'osso sottoposto. In tali circostanze è necessario prevenire questo disordine, e l'unico mezzo è l'apertura del tumore. Quest'apertura deve esser meno grande, che sia possibile, e sufficiente soltanto a dare esito all'umore contenuto senza dar adito all'aria, o a qualunque corpo estraneo. Evacuato il sangue, e poste le parti a mutuo con-



tatto per mezzo dei locali attonanti si arriva a procurare una locale infiammazione, che produce l'adesione delle parti, e si riunisce la cavità.

I tumori di questa natura formansi spesso alle parti genitali muliebri, e sotto la cute del cranio. Questi secondi si osservano sovente nei bambini, e segnatamente ne' neonati. I tumori formati nelle labbra delle pudende muliebri richiedono frequentemente l'apertura, ma quelli, che formansi sulla testa dei bambini cedono spesso all'uso degli attonanti locali; se però il riassorbimento sia troppo tardo è necessario ricorrere all'apertura onde impedire la corrosione dell'osso sottoposto.

La varice è un tumore sanguigno formato dalla dilatazione preternaturale, e permanente delle vene, e sue ramificazioni. Questa malattia può aver luogo in molte parti del corpo, ma segnatamente nelle estremità inferiori, ed in esse particolarmente formano le vene de' tumori molli, nodosi, indolenti, e di color bleu, e questi tumori diminuiscono tenendo l'articolo nella posizione orizzontale, mentre crescono tenendolo verticalmente. Molte volte però le varici sono del color naturale della cute quando la vena sia alquanto profonda, e così poi possono esser dolorose, dure &c. Secondo le varie parti, nelle quali esistono questi tumori ricevono essi diverse denominazioni, chiamansi quindi emorroidi se esistono all'ano, circoccele quelli dello scroto, e cordone spermatico, e finalmente varici propriamente dette quelle delle estremità inferiori.

La cagione ordinaria di questa malattia consiste in un impedimento qualunque al ritorno del sangue, dal quale nasce una congestione nella vena. Fra queste cagioni hanno luogo la pletora locale di una parte, la debolezza de' vasi venosi, la soppressione di una evacuazione sanguigna, e fi-

nalmente qualunque compressione sulle vene, la quale impedisca il ritorno del sangue al cuore. I tumori, l'ostruzioni de' visceri del basso ventre possono quindi esser cause di varici; ma una delle più frequenti è la gravidanza, nel qual caso la compressione dell'utero sulle iliache impedisce il ritorno del sangue dalle estremità inferiori, e quindi produce delle varici all'ano, ed alle cosce, e gambe. Oltre le cagioni locali meccaniche delle varici possono venir esse prodotte anche dalla situazione delle membra continuata per lungo tempo, e quindi sono soggette alle varici le persone, che stanno spesso in piedi, o cavalcano per lungo tempo.

Al principio le varici sono piccole, e circoscritte, ma in appresso crescono, diventando oblunghe, e condensandosi il sangue divengono eziandio dure. Fintanto che desse sono piccole, e molli poco incomodo arrecano, ma cresciute poi che siano diventano dolorose, e spesso s'infiammano. Ci sono delle varici, che si aprono di tanto in tanto da se medesime, ovvero in occasione di qualche compressione o puntura esterna. L'emorragia, che ne siegue produce sempre un alleviamento de' sintomi, ma spesso diviene troppo violenta, ond'è necessario reprimerla. Cessata l'emorragia o naturalmente, o artificialmente si riproduce per solito nuovamente la varice con i medesimi incomodi antecedenti.

La cura della malattia consiste nell'allontanare le cagioni di essa, e nel rimediare al loro effetto. Se la cagione sia permanente come la gravidanza, uno scirro di qualche viscere dell'addome, o altra qualunque di simil natura, ognun vede, che poco, o nulla potrà sperarsi dall'arte Chirurgica. Ma se la varice dipenda da cagioni estrinseche, come da compressioni esterne, o da un genere



DEI TUMORI SANGUIGNI. 55

di vita particolare, sarà facile la guarigione. Per rimediare poi alla dilatazione della vena se dessa sia recente, non di gran volume, e non accompagnata da sintomi gravi si otterrà la diminuzione del tumore, o almeno s'impedirà l'avanzamento di esso per mezzo della compressione, e degli astringenti. La compressione dovrà essere metodica, uniforme, e permanente. Riguardo poi ai topici astringenti consisteranno essi nell'uso dell'acqua fredda, nella decozione di china, vallonea, spirito di vino, allume, preparazioni saturnine &c.

Qualora però la malattia sia antica, sarà ben difficile, anzi impossibile ottenerne la cura radicale, e tutto quello che potrà farsi sarà di impedirne l'avanzamento, giacchè in questi casi essendo le pareti delle vene troppo dilatate hanno esse perduto la loro elasticità, nè possono ritornare allo stato naturale, quindi la malattia è incurabile, con tutto ciò sarà necessario il praticare i mezzi testè accennati, giacchè se dessi non guariscono la malattia, oltre l'arrestarne i progressi, impediranno ancora, che la parte s'infiammi; che suppurì e si rompa, lo che da spesso origine a delle ulcere varicose, le quali non sono difficili a passare in cancrena. Si dovrà quindi attendere in questi casi di prevenire l'emorragie per mezzo de salassi, del regime di vita, e della situazione adattata della parte, se poi l'emorragia succeda dovrà arrestarsi coi mezzi già indicati. Gli antichi scrittori di Chirurgia propongono tre metodi per la cura delle varici consistenti nell'apertura del tumore, nell'incisione di esso, estraendo i grumi di sangue contenuti, e finalmente nella legatura della vena al di sopra, e al di sotto del tumore varicoso. Questi metodi però sono al presente rigettati dai migliori



pratici, perchè dolorosi, ed inutili, ottenendosi lo stesso effetto dalle compressioni.

L'*Aneurisma* consiste propriamente in una dilatazione dell'arteria, ma siccome sotto il nome di aneurisma si comprendono alcune malattie non dipendenti da una dilatazione dell'arteria, ma bensì da un'apertura delle pareti della medesima, qualunque ne sia stata la cagione, quindi è, che i più recenti scrittori di Chirurgia definiscono l'aneurisma un tumore sanguigno, arterioso, con pulsazioni isomere a quelle del cuore.

La divisione più comunemente ammessa di questa malattia si è di distinguerla in aneurisma *terre*, aneurisma *spurio*, ed in aneurisma *varicoso*. L'aneurisma vero è quello, che viene formato propriamente dalla dilatazione delle tonache dell'arteria. Nell'aneurisma spurio, o falso l'arteria non è dilatata, ma è rotta, ed il tumore viene formato dal sangue, che si stravaa nella cellulare vicina. Questo aneurisma falso si è distinto in aneurisma falso primitivo, ed in consecutivo. Il primitivo è quello, nel quale dopo l'apertura di un'arteria cagionata da un violento sforzo di un membro, o contusione non vi sia alcuna esteriore lesione, da cui possa uscire il sangue, infiltrasi esso nella cellulare vicina, e forma un tumore pulsatile nella parte stessa. Questa specie di Aneurisma può essere poi o circoscritto, o diffuso, perchè il sangue infiltrandosi nella cellulare graduatamente a seconda del calibro del vaso, e dell'apertura, o può formare un sacco distendendo la stessa cellulare, e rendersi circoscritto, e per lo contrario inoltrandosi questo fluido per le cellule dell'adipe succutaneo, va ad acquistar il tumor maggior circonferenza non che alle volte occupa quasi tutto l'articolo con alcune ineguaglianze, ed in allora le si dà il nome di diffuso. L'aneurisma poi fal-

DEI TUMORI SANGUIGNI. 57

consecutivo è quello, il quale nasce, o in conseguenza del vero per la rottura delle tonache dell'arteria, che da qualche Scrittore è chiamato *Aneurisma*, o in seguito di un' aneurisma spurio la riapertura dell'arteria già cicatrizzata, ed in questo il sangue si strava di sovente in picciola quantità sotto i tegumenti, e forma un tumore, rotondo, circoscritto, con pulsazione senza cangiar colore alla pelle. L' aneurisma vero è poi quando è ferita la vena da una parte, e l'altra, ed indi è ferita anche l'arteria sotto. Questo aneurisma partecipa della varice, e l' aneurisma consistendo propriamente in una dilatazione della vena prodotta dal sangue arteriale, il quale ha un continuo passaggio nella medesima. Per questa ragione è stato anche denominato varice aneurismatica, o aneurisma per anastomosi. In questo aneurisma si cicatrizza l'apertura esterna della vena restando aperta l'interna, nella corrispondente all'arteria.

Molti Scrittori ammettono anche altre specie d'aneurisma, p. e. l' *Aneurisma misto*, e l' *Ernia aneurismatica*. L' aneurisma misto accade secondariamente quando trovasi riunita la rottura, e la dilatazione dell'arteria, come abbiamo già detto, lo può accadere allor quando nell' aneurisma venoso essersi molto dilatata l'arteria viene essa rompersi o per la troppa distensione, o per violenza interno della macchina, o per una qualche causa esterna. L'ernia poi aneurismatica è stata da alcuni riconosciuta nella ferita delle membrane esterne dell'arteria restando illesa l'interna. Non può essa sola resistere allo sforzo del sangue dee necessariamente cedere ad esso, e formare una specie di sacco, o d'ernia, d'onde ha ricevuto il suo nome. Questa specie però seppure esiste è sicuramente



la ferita stessa. L'aneurisma spurio consecutivo si forma dopo qualche tempo dall'apertura dell'arteria già chiusa, e viene prodotto dalla riapertura della stessa ferita, come ancora può nascere dalla rottura del sacco aneurismatico nell'aneurisma vero. Finalmente la causa dell'aneurisma varicoso consiste come abbiamo già accennato nella ferita dell'arteria corrispondente a quella della vena, che la ricuopre.

La prognosi degli aneurismi è varia secondo il luogo occupato dalla malattia. Se l'aneurisma sia interno è ordinariamente incurabile, molto più che i rimedj, i quali potrebbero essere utili in questa malattia non possono venire applicati che negli ultimi stadij della medesima essendone nei primi periodi difficile la diagnosi, onde essi terminano o con la morte improvvisa del malato per la rottura dell'aneurisma stesso, o con l'idrope parziale o generale. L'aneurisma esterno è molte volte curabile, ed abbiamo degli esempi di aneurismi guariti, anzi molti di essi guariscono spontaneamente. In questi casi accade il coagulo del sangue, il quale impedisce la maggior dilatazione dell'arteria, o del sacco aneurismatico se l'aneurisma sia spurio. Nel caso di aneurisma vero resta ordinariamente abolito il diametro dell'arteria, e si fa la circolazione del sangue per mezzo de' vasi laterali; se poi l'aneurisma sia spurio, si forma il grumo di sangue nel sacco, ed il sangue può seguitare a scorrere per l'arteria stessa. Questi casi però di guarigioni spontanee di aneurismi non sono la terminazione ordinaria della malattia. Per solito l'aneurisma de' sempre a crescere in volume, e così produce morte del malato o inducendo la cancrena della te, o la carie delle ossa, o finalmente rompe e producendo così una emorragia mortale.



# DEI TUMORI SANGUIGNI. 61

Le indicazioni da aversi nella cura degli aneurismi in generale sono 1. di diminuire l'impeto del sangue, che tende sempre a dilatare il tumore, 2. di rimediare alla causa del tumore stesso sia essa la dilatazione dell'arteria come nell'aneurisma vero, sia l'apertura della medesima come nell'aneurisma spurio. Egli è necessario di esporre primieramente alcuni principj generali per la cura di questa malattia per passare poi agli ajuti, i quali convengono ad ognuna delle specie in particolare.

I rimedj generali, con i quali si diminuisce l'impeto del sangue consistono ne' debilitanti. Fra di essi ha il primo luogo il salasso, indi la dieta rigorosa, e la quiete. Una compressione locale sarà di molto giovamento per ottenere lo stesso intento. Gli astringenti da molti raccomandati sono al presente riconosciuti di poco, o niun vantaggio, e quindi poco uso si fa de' medesimi. I mezzi presentemente più usati sono la compressione, e l'allacciatura, i quali però debbono essere diversamente impiegati secondo la varia natura della malattia.

L'aneurisma vero ammette l'uno, e l'altro di questi metodi. La legatura può farsi o legando l'arteria al di sopra del tumore impedendo così il passaggio del sangue nel medesimo, ovvero legando l'arteria al di sopra, ed al di sotto del tumore, indi aprendolo per dar esito al sangue contenuto. La stessa distinzione ha luogo nell'altro metodo, che adoperasi per la cura dell'aneurisma vero, ossia nella compressione, potendosi essa praticare tanto immediatamente sul tumore, quanto sull'arteria al di sopra del medesimo. La compressione è ordinariamente dolorosa, e quindi rare volte si ottiene con questo mezzo l'effetto desiderato, molto più che una compressione debole non è di grande effet-

te utile nell' aneurisma spurio, giacchè qualora esso non sia molto recente il sangue stravasato, ed aggrumato nel sacco aneurismatico impedisce, che la compressione agisca direttamente sulla ferita, al contrario essa comprimendo il sangue aggrumato produce la rottura de' grumi, e dà luogo a nuove emorragie, ed alla cancrena. In questo caso il miglior metodo è quello dell' allacciatura.

L' aneurisma varicoso finalmente ch' è la terza specie di aneurisma, che abbiamo esposto, non ammette la compressione, non potendo essa procurare, che la cicatrizzazione della ferita della vena senza che possa poi ottenersene quella dell' arteria corrispondente nella vena medesima. Siccome gl' incomodi di questa malattia non sono grandi, e non cresce molto di volume, nè impedisce i moti del braccio, che è il luogo dove esso più frequentemente si forma, così i più recenti Pratici usano di lasciare la malattia alla natura senza tentare nè la compressione, nè l' allacciatura. Alcuni propongono la compressione, ed asseriscono aver da essa ottenuto la cura radicata della malattia, ma siccome abbiamo degli esempj di persone, le quali hanno vissuto molti anni con questo incomodo senza risentirne alcun danno, e sappiamo d' altronde, che la compressione è spesso riuscita infruttuosa sarà miglior consiglio l' abbandonare la malattia a se stessa.

Prima di lasciare di parlare degli aneurismi è necessario dir qualche cosa in particolare sopra le due specie di aneurismi più frequenti ad occorrere in pratica, cioè quello del braccio, e quello del polso. L' aneurisma del braccio è per ordinario prodotto dalla puntura dell' arteria brachiale in occasione salasso. Questa specie di aneurisma è spurio, può essere o primitivo, o consecutivo. In ques



aneurisma se la compressione sia fatta sul momento stesso, ch'è punta l'arteria, essa è spesso sufficiente per guarire la malattia, e l'arteria viene ad obbliterarsi. Uno de' principali riguardi, che dee aver-si in questa compressione si è quello di procurare, che essa venga fatta su di un solo punto, e precisamente sulla ferita dell'arteria, e non circolarmente sul braccio tanto per lasciare ai vasi laterali la libertà di supplire al corso del sangue intercetto nell'arteria ferita, quanto per non comprimere i nervi, e produrre dolori acuti nel braccio. Acciò però questa compressione produca il fine desiderato si richiede ordinarmente un lungo tratto di tempo. Qualora peraltro si osservi, che dessa non produca effetto alcuno, e che il tumore si formi di nuovo togliendo l'apparecchio, in somma che l'aneurisma sia divenuto più voluminoso, o sia diffuso è segno manifesto, che la compressione è insufficiente per la guarigione della malattia, e debbesi per conseguenza ricorrere al più presto possibile all'allacciatura dell'arteria, la quale sebbene si renda di qualche difficoltà nel ritrovare precisamente il luogo dell'apertura, nulladimeno abbiamo degli esempj essere stata con felice successo eseguita quando siansi adoperate le necessarie cautele.

L'aneurisma del poplite è parimenti più sovente spurio, che vero, e nasce per ordinario da una violenta distensione dell'articolazione del ginocchio. Se questo aneurisma sia circoscritto è spesso curabile con la compressione, o almeno non produce grande incomodo se il malato resti in riposo, ma se sia diffuso, o il malato faccia del moto richiede spesso l'amputazione a motivo della minaccia di cancrena. Se poi l'aneurisma sia vero, fermandosi con lentezza è curabile facilmente per mezzo della compressione. Essa dee farsi sul tu-



more stesso, e se è moderata potrà esser di vantaggio senza produrre gran dolore. Qualora poi la compressione non sia sufficiente è necessaria l'allacciatura, i di cui metodi saranno da noi esposti quando tratteremo delle operazioni Chirurgiche,

## C A P O VII.

## DE' TUMORI AEREI.

**E***nfisema* chiamasi quel tumore formato dall'infiltrazione dell'aria in qualche parte del corpo, la quale aria può esser di natura diversa secondo le varie cagioni che hanno dato luogo al tumore, giacchè se desso abbia origine da una comunicazione esistente fra il tumore, e le vie della respirazione, come ancora fra il tumore, e l'aria atmosferica, l'aria contenuta non sarà che pura aria atmosferica, se poi il fluido aeriforme, che costituisce l'enfisema abbia la sua origine o dal gas contenuto nelle intestina, o da quello prodotto dalla decomposizione di una parte, o di un umore qualunque, sarà d'indole diversa secondo la varia cagione produttrice della malattia.

Il tumore enfisematico è indolente, teso, del color naturale, elastico. Si può distinguere l'enfisema secondo la sua sede. Quando l'aria viene contenuta nel tessuto cellulare succutaneo, chiamasi propriamente enfisema, se poi il fluido aeriforme contengasi in una cavità, come p. e. in quella del basso ventre, lo che è il caso più frequente dicesi *Timpanitide*. Nel basso ventre può formarsi un raduno d'aria in due modi, cioè o nella cavità stessa dell'addome, o in quella delle intestina; può anche aver luogo nella cellulare delli muscoli dell'addome; ma questo non appartiene propriamente alla tim-

panitide. Oltre queste distinzioni riconosconsi ancora in Chirurgia molte altre malattie particolari di questa specie, le quali vengono chiamate con diverse denominazioni, come p. e. l'ernia formata da una raccolta d'aria dicesi *pneumatocele*, e *bruncocoele* il gonfiore della glandola tiroidea dipendente spesso dall'aria contenuta etc.

Per quello, che appartiene alla Chirurgia, dessa considera principalmente l'enfisema propriamente detto, o sia la raccolta d'aria nel tessuto cellulare. Varie cagioni possono produrre questa malattia, la quale può dipendere come abbiamo accennato o da una comunicazione del tumore con le cavità destinate a contenere dell'aria, ovvero dalla decomposizione di umori in una data parte. Tutte le cagioni, le quali producono una comunicazione degli integumenti con le vie del respiro possono produrre l'enfisema, fra esse sono le principali le ferite degli organi della respirazione, cioè della laringe, e trachea, del petto, e de' polmoni, lo che ha luogo eziandio nelle fratture delle coste senza ferita esterna. Può ancora nascere l'enfisema dalle ferite delle prime vie, o qualunque altra soluzione di continuità in dette parti. Le cagioni le quali possono formare questa raccolta d'aria delle prime vie sono moltissime, ma l'ernia è una delle principali. Per quello poi riguarda lo sviluppo dell'aria procedente da decomposizione di qualche umore, ciò ha luogo particolarmente per la debolezza generale, o locale, osserviamo quindi questa specie di enfisemi molto frequente nelle malattie putride, nella cancrena, e simili.

L'enfisema non è per se stesso una malattia pericolosa, essendo quasi sempre sintoma di un'altra quindi secondo la malattia primaria dee giudicarsi la gravezza dell'enfisema. Se esso sia genera-



le, o occupi una notabile estensione può divenir doloroso, e cagionare anche de' gravi incomodi. Tutto il pericolo della malattia per se stessa consiste nel suo volume, il quale può comprimere parti vicine, e così disturbare le funzioni di qualche organo interessante. Oltre di queste regole generali possono aver luogo molte considerazioni particolari riguardo alla parte affetta, p. e. ne' polmoni se abbia luogo l'enfisema sarà imperfetto il processo della respirazione, avendo l'aria atmosferica esito per altra parte, e lo stesso dicasi degli altri casi di enfisema.

Da quello che abbiamo finora accennato si comprende, che, stante la diversità dell'enfisema, se esso è idiopatico, e costituisce una malattia per se stesso, ovvero se è sintomatico, cioè effetto di un'altra malattia, diverso debbe essere il metodo di cura del medesimo. Le due indicazioni principali a seguirsi nella cura dell'enfisema sono d'impedire il passaggio continuo dell'aria nel tumore enfisematoso, e di togliere, o dar esito all'aria contenuta in esso. Riguardo alla prima indicazione dee essa dirigersi secondo la cagione, la quale ha prodotta la malattia. Qualora dessa consista in un'atonia della parte è chiaro, che gli attonanti debbono costituire la base della cura, onde produrre il coartamento delle parti, le quali danno passaggio all'aria. Se una ferita sia quella, che dia adito all'aria, rare volte richiedesi l'uso de' rimedi, giacchè quando la ferita s'infiamma viene da se medesimo a coartarsi il tessuto cellulare, e quindi resta impedito ogni accesso all'aria, venga questa dall'esterno, o dai condotti aerei interni, co' quali comunica la ferita. I casi di lesioni locali, come ferite, o fratture sono molto frequentemente seguiti da enfisema. Nelle ferite della trachea se si chiuda troppo



la ferita degl' integumenti l'aria si infiltra cellulare, e produce l'enfisema. E' quindi necessario di mantenere aperta questa ferita esterna, e di dilatarla, onde possa liberamente sortire. Un' altro caso, del quale avremo occasione di parlare in seguito si è quello della frattura delle coste. I pezzi d'osso fratturati forano spesso la pleura, ed il polmone, e sonò cagione di enfisema. In questo caso spesso basta una forte compressione, la quale impedendo la dilatazione del tessuto cellulare viene ad inibire l'ulteriore accumulo dell'aria nella cavità del tumore; molto però si richiede l'apertura di esso. Talora siasi impedito il nuovo accumulamento dell'aria nella cavità dell'enfisema spesso è questo ajuto sufficiente alla cura della malattia, poichè la contenuta viene a dissiparsi da se stessa, ed per mezzo della sua unione co' fluidi della medesima; siccome però questa dissipazione molte volte non può accadere per la sola forza della natura, è necessario, che il Cerasico adoperti de' mezzi onde ottenere l'intento. Due se ne cominciano da pratici i quali usansi comunemente a questo oggetto, vale a dire gli attonanti locali, e generali. I primi agiscono dando una certa azione diretta, e facilitando in questa maniera la deflazione, ed assorbimento dell'aria, che forma l'enfisema. I migliori attonanti proposti sono l'aceto in vapori, lo spirito di vino, lo spirito di camomilla, i quali rimedi agiscono piuttosto per la loro azione meccanica, ossia col dar tono ai tessuti delle parti tutte, di quello che per mezzo della loro azione chimica, ossia decomponendo l'aria. Il metodo di usare questi attonanti è di applicarli sulla parte bagnando delle compresse nei liquori, e contenendoli con una forte fasciatura,

ovvero di strépiciare con de panni imbevuti di queste sostanze spiritose tutta la periferia dell' Enfisema. In questo caso deesi molto anche attribuire all' azione stessa meccanica della confricazione.

Se poi il tumore enfisematico sia di un volume troppo grande, e se non cede ai rimedi accennati sarà necessario ricorrere all' apertura del medesimo per dar esito all' aria contenuta. Supposta l' apertura già esistente, come accade in occasione di ferita, che abbia prodotto l' enfisema, sarà sufficiente la compressione sul medesimo fatta gradatamente, e procurando di far scorrere l' aria verso l' apertura stessa, la quale dee essere anche ingrandita, se infruttuosamente ciò siasi eseguito; se poi la ferita non ammetta dilatazione, ovvero l' enfisema dipenda da altra cagione, nè esista apertura all' esterno, come p. e. nell' enfisema prodotto dalla frattura delle coste, dovranno fare delle punture con la lancetta per tutta l' estensione del tumore osservando di farle penetrare sino al tessuto cellulare, giacchè allora queste piccole aperture non mancheranno di dar esito all' aria contenuta, segnatamente se siano ajutate da una pressione locale; ed indi si ricorrerà a qualche topico spiritoso, se la debolezza della parte lo richieda.

L' enfisema più esteso, e quello particolarmente, nel quale l' aria è rinchiusa in una cavità, come p. e. del petto, o del basso ventre può anche essere alle volte suscettibile di apertura. Si hanno esempj di enfisema del petto curati felicemente colla paracentesi, ma ciò è stato molto più proposto nella timpanitide quantunque un tal metodo non sia stato coronato da esito felice. I rimedj interni di questa malattia, i quali consistono ordinariamente ne' tonici, appartengono totalmente alla medicina. È stata proposta come si è detto la paracentesi, ma



siccome la malattia ha luogo il più delle volte non nella cavità dell'addome, ma bensì nelle intestina, ognun vede quali inconvenienti possa portar seco il forare le medesime per quanto vogliasi far sottile l'apertura, quindi è, che al presente i migliori pratici hanno rinunciato a questa operazione contentandosi de' soli rimedj interni. Un'altra difficoltà poi, che ha fatto rinunziare presentemente alla punzione nel caso di timpanitide, si è l'impossibilità di distinguere la timpanitide addominale dall'intestinale, e quindi il pericolo di praticare una operazione, che riuscirebbe forse tanto utile nel primo caso, altrettanto pericolosa nel secondo. L'altro metodo consigliato da qualcuno di estrarre l'aria dall'intestino retto per mezzo di una canna da lavativo, non è stato susseguito dal desiderato fine, e quindi è al presente anche esso abbandonato come di niun vantaggio, non riuscendo, che appena ad evacuare l'aria contenuta nell'intestino retto, e ciò ancora soltanto nel caso di timpanitide intestinale.

## C A P O V I I I .

## DEI TUMORI CISTICI.

I tumori cistici sono generalmente indolenti, o almeno poco dolorosi, circoscritti, di poca durezza, e molte volte accompagnati da fluttuazione, la loro sede è nel tessuto succutaneo, il colore è naturale. Quello, che distingue questi tumori dagli altri si è che vengono internamente formati da una cisti, o sacco preternaturale prodotto dalla dilatazione di un follicolo mucoso, o dalla sola cellulare, il quale contiene una materia di varia consistenza, e di natura diversa.



Secondo la diversità della materia contenuta nella cisti hanno questi tumori ricevuto differenti nomi. Noi abbiamo già altrove parlato degli ascessi cistici, e de' tumori cistici acquosi, segnatamente di quelli, che costituiscono le idatidi, resta qui ora a parlare degli altri, i quali sono conosciuti da molti Autori sotto il nome generico di *lupie*.

Questa specie di tumori comprende le *Meliceridi*, gli *Ateromi*, ed i *Steatomi*. *Meliceridi* diconsi quei tumori cistici, i quali contengono una materia simile al mele pel colore, e la consistenza. *Ateromi* si chiamano i tumori, che contengono una materia di natura pultacea, e più densa di quella contenuta nelle *Meliceridi*, e finalmente gli *Steatomi* sono composti di una materia molto più dura simile al sego, e di natura albuminosa. Oltre queste specie di tumori possono eziandio annoverarsi fra i tumori cistici i *Lipomi*, e le *Natte*, i primi composti internamente di adipe, e gli altri detti ancora *Talpe*, o *Testuggini* tanto per la loro figura, quanto pel corso, che tengono, sono quella specie di tumori cistici, i quali vengano nella parte capillata del capo, e partecipano della natura dell'Ateroma, e del Meliceride.

In generale la sede de' tumori cistici è il tessuto cellulare succutaneo, come il più adattato alla formazione della cisti, non è però, che anche altre parti non siano soggette a questa specie di malattia, come p. e. le membrane, e segnatamente la pleura, il peritoneo etc. Alcuni Autori sostengono, che gli steatomi siano a differenza degli altri tumori cistici i più frequenti a rincontrarsi nelle parti interne, e più profonde.

Per quello appartiene al corso di questi tumori, desso è vario secondo la diversa specie dei medesimi, giacchè ora sono essi indolenti, ora accom-

pagnati da dolore, ora sono di figura rotonda, ora irregolare, così differiscono eziandio riguardo alla durezza, essendo molli, qualora la materia contenuta sia fluida. Egli è vero però, che per quanto i tumori cistici siano molli, sempre presentano una maggior resistenza, che gli ascessi, ed i tumori acquosi, atteso che il fluido contenuto nei medesimi essendo racchiuso in un sacco, o cisti particolare, non viene a cedere così facilmente alla pressione locale, che anzi si sente tutto il tumore per così dire separato dalle parti adiacenti, e formante come un corpo isolato. Uno de' fenomeni poi da osservarsi in questa specie di tumori si è la varietà del volume, che prendono, essendovene di quelli; i quali sono piccolissimi come p. e. nelle palpebre; ed altri poi, i quali pervengono ad un volume straordinario, lo che ha luogo segnatamente negli steatomi.

Egli non è così facile il render ragione della maniera, con la quale si forma quella cisti, o sacco particolare, che costituisce la natura propria di questi tumori. La spiegazione la più plausibile di questo fenomeno si è quella di ammettere una infiammazione locale, di cui per altro non abbiamo segni esterni essendo essa insensibile al paziente stesso. Questa produce una qualche aderenza nel tessuto cellulare, dal che deve necessariamente nascere l'ostruzione di alcune cellule del detto tessuto, e quindi essere impedita la comunicazione delle cellule medesime fra loro. Queste ostruzioni, o adesioni crescendo a poco a poco vengono a formare quella cavità, o cisti, che viene a rendere il tumore isolato, e non comunicante con le altre parti del tessuto cellulare. L'ostruzione de' dotti escretori delle ghiandole, o follicoli sebacei può ammettersi eziandio come cagione della formazione di questa



cisti; ma qualunque ne sia l'immediata è necessario il supporre una infiammazione locale sia d'essa prodotta da cagione interna, o esterna.

Le conseguenze, che portano questi tumori sono varie secondo la diversa natura de' medesimi, e secondo le varie cagioni, che l'hanno prodotti. Molte volte sono essi di pochissima conseguenza, e non arrecando alcun incomodo possono i malati soffrirli senza applicarci alcun rimedio. Ma non sempre sono essi così innocenti, giacchè possono portare dei danni tanto pel loro volume, e peso, quanto per la suppurazione, e distruzione conseguente delle parti contigue. I danni i quali vengono prodotti dal volume straordinario di questi tumori, oltre il peso grande può anche essere l'impedimento delle funzioni delle parti adjacenti, p. e. dell'occhio, lingua, articolazioni etc.; quello però che è ancora più da temersi, si è il danno da essi prodotto qualora vengano ad infiammarsi, e passino in suppurazione. In questo caso oltre il guasto, che d'essi generano nelle parti molli vicine possono anche cagionare la carie delle ossa, e produrre quindi una malattia pericolosa, e mortale. Se dopo la cura di uno di questi tumori se ne formino degli altri in varie parti del corpo, è chiaro, che la malattia dipende da un vizio generale di tutta la macchina, e quindi in simili casi ogni cura locale riesce insufficiente; ma è necessario di esaminare la cagione generale della malattia, e secondo la medesima formare la prognosi, e diriggere il piano di cura. La terminazione di questi tumori può anche variare secondo la particolare indole de' medesimi. Saranno essi di più facile cura se la cisti sarà semplice, e recente, nei quali casi alle volte è d'essa così sottile, che si rompe da se medesima sotto la cute, e spandendosi la sostanza contenutavi sot-



la medesima viene a riassorbirsi, e si forma una specie di risoluzione. Se poi la cisti sia antica, dura, divisa in molte cellule, la cura ne sarà molto più lunga, il riassorbimento difficile, e la distruzione della cisti quasi impossibile.

I metodi, che usansi comunemente per ottenere la cura de' tumori cistici sono l'estirpazione, legatura, il setone, ed il caustico, la scelta poi di questi dipende dalle circostanze particolari della malattia, vale a dire dalla mollezza, o durezza del tumore, dal tempo, che esso ha avuto luogo, dal lume, dalla forma, e dalla situazione, e finalmente dalla cagione che l'ha prodotto, la quale è quella, che deve più di tutto diriggere il Chirurgo nell'intraprenderne il piano di cura. I rimedj da molti proposti per risolvere questi tumori sono al presente abbandonati presso che intieramente, essendo essi di poca, o niuna efficacia, ed essendo spesso che impossibile ad ottenerne la risoluzione. I rimedj di questa natura sono composti de' più forti stimolanti, cioè o alcalini, o acidi, o preparazioni metalliche, e segnatamente saturnine, e mercuriali. Molte volte coll'uso di questi, o analoghi medj si procura l'infiammazione del tumore, o spesso ancora sopraggiunge essa da se medesima. La suppurazione è per ordinario la conseguenza di una tale infiammazione, e questa non è una delle più felici terminazioni della malattia, giacchè dessa non fa che produrre una piaga, che prende un aspetto sordido, e dopo una lunga suppurazione degenera in cancro, o produce una cancrena, attaccando inoltre le parti, delle quali cagiona la carie. In questo caso è necessario ricorrere prontamente all'estirpazione.

Da questi principj si vede chiaramente, che poco, o nulla essendovi da sperare dalla risoluzione, o suppurazione di questi tumori deve il Ce-

rusico per tempo ricorrere ad uno dei metocennati di sopra. Il primo fra essi è l'estirpazione. Questa consiste nel tagliare la pelle, che cuopre il tumore, e separare il medesimo dalle aderenze. Acciò questa operazione possa avere pieno effetto si richiede, che il tumore sia mobile, non molto voluminoso, e presenti nello stesso tempo una certa resistenza, e solidità, onde possa esser distaccato dalle sue aderenze senza che i vasi si rompa, lo che ne renderebbe molto più difficile l'operazione. Il metodo più comune, che si fa uso per queste operazioni, si è quello di incidere i comuni tegumenti longitudinalmente, e dopo estratto il tumore distaccandolo dalle sue aderenze, riunire i labbri della ferita come una ferita semplice. Questo taglio longitudinale però non è sufficiente se il tumore è molto voluminoso, ed allora invece di un semplice taglio è necessario farne due, i quali vanno a formare un'incisione cruciforme, o a forma di T. Alcune volte la cute essendo troppo assottigliata, è difficile riunire i labbri della ferita dopo l'operazione, e quindi si costuma di portare una porzione de' comuni tegumenti, lasciandone sempre una quantità sufficiente per ricoprire la piaga. In questi casi potrà praticarsi un'incisione di forma ovale. Qualunque sia la forma del taglio, dopo estratto il tumore è necessario prima di chiudere la ferita di dare un esito al sangue, che esce dai vasi recisi, giacchè nel caso contrario esso si renderebbe più tarda la cicatrice. Quest'operazione non rendesi necessaria quando la ferita si fa sopra un corpo duro, come p. e. l'osso del cranio, nel qual caso per mezzo di una adattata compressione si può impedire l'emorragia.

Il secondo metodo proposto per la cura d



sta specie di tumori si è la legatura. Per porre in opera questo metodo s' incide circolarmente la cute, e si lega indi la base del tumore. Questo metodo però presenta tali inconvenienti, che è poche volte usato, ed infatti oltre il non poter esser posto in pratica che ne' tumori di base molto stretta, e forniti come di un peduncolo, si rende la legatura impraticabile nella maggior parte de' casi, ed inoltre il dolore eccessivo, che per ordinario cagiona la medesima obbliga il Cirusico a preferire quasi del continuo l'estirpazione, operazione molto più sollecita, e meno dolorosa, e non si adopera la legatura, che nei casi, ne' quali l'estirpazione sia difficile perchè il tumore è inaccessibile, ovvero perchè sia da temersi una emorragia.

Il setone è stato eziandio proposto da alcuni per la cura de' tumori cistici. Questo metodo consiste nel passare un setone pel tumore, ed introdurre con tal mezzo nel medesimo un qualche rimedio, che ne promuova la suppurazione, ed anche qualche forte irritante, che distrugga intieramente il tumore. Questo metodo però oltre l'esser doloroso ha l'inconveniente, che se la cisti sia antica, e per conseguenza grossa, e dura non si ottiene spesso volte, che la fusione della sostanza racchiusa nella medesima per mezzo della suppurazione, senza che venga distrutta la cisti, motivo per cui dopo fatto uso per qualche tempo del setone, si richiede necessariamente l'estirpazione.

Restaci finalmente a far menzione del quarto metodo, ossia del caustico. Questo consiste nella pietra caustica, butirro d'antimonio, e simili, i quali però non sono usati, che per distruggere il resto di una cisti, che non si è potuta completamente estrarre col taglio. Non è però, che non possano anco adoperarsi per aprire un tumore ci-



curare di togliere la congestione dell'umore noviale raccolto nella cisti. I metodi a questo fatto proposti sono varj, e sono la risoluzione, compressione, la lacerazione della cisti, e l'epiazione. La risoluzione si procura per mezzo forti stimolanti, come sono p. e. le preparazioni mercuriali, le preparazioni alcaline, e simili. Non consigliano ancora della belladonna o in decotti, o applicando le foglie contuse, e può forse essere utile ancora lo spirito di sapone. Quasi però che è certo, si è che questa specie di tumori è difficilissima a risolversi, ed appena i primi incipienti, e di piccol volume cedono ai rimedj usati per quanto forti, ed attivi essi esser sogliono. Il metodo della compressione è forse il più sicuro della risoluzione. La compressione si fa con una lamina di piombo, la quale sarà bene ricoprire con dell'unguento mercuriale, ovvero con un risolvente, o ammolliente secondo che richieda la sensibilità della parte. Questa lamina di piombo deve esser mantenuta sul tumore stesso per mezzo di una fasciatura alquanto compressiva, la quale riuscirà poi ancora più vantaggiosa, se ci si unirà una fasciatura, che comprimerà l'articolo stesso.

Molto più sicuro poi è il metodo della lacerazione, o apertura della cisti. La maniera di praticarla è di percuotere il tumore con un corpo duro, ovvero comprimendolo fortemente col dito, o con un corpo del quale si sia posta p. e. una moneta, o altro corpo resistente.

Quest'urto, o compressione fa rompere la cisti, e l'umore contenuto nella medesima si viene a spargere nella cellulare, e quindi ne siegue facilmente l'aderenza delle pareti del tumore, e la guarigione; ma per ottenere questo effetto è ne-

sario di formare una compressione metodica sul tumore, la quale produca l'aderenza delle pareti del medesimo. Sarà molto vantaggioso l'adoperare nello stesso tempo qualche bagnolo leggermente attonante, come di spirito di vino, o una soluzione di sale ammoniaco, estratto di Saturno etc. Questo metodo però non può riuscire, che nel caso il tumore sia situato sopra un'osso, il quale presenti una certa resistenza alla compressione. Se questo metodo non sia applicabile si può ugualmente aprire il sacco, o la cisti per mezzo dell'incisione, o del caustico, ma siccome la sola apertura della cisti non esenta il tumore dalla recidiva, è necessario introdurre nella cavità di esso delle sfilas, onde si produca una infiammazione, che renda più facile l'adesione delle pareti del tumore. L'unic'avvertenza necessaria in questi casi si è di impedire l'introduzione dell'aria nella ferita, giacchè trattandosi di vagina tendinosa rimasta allo scoperto potrebbe produrre dolori violenti, infiammazioni forti, ed altri gravi sintomi. A questo si ovvia col fare la ferita della minor grandezza possibile. Evacuato l'umore saranno anche in questo caso utili la compressione, ed i leggieri astringenti.

Per quello poi riguarda l'estirpazione quantunque sia essa stata proposta da molti, presenta essa difficoltà tali, che oltre l'esser rare volte praticabile, quasi mai può produrre la cura totale della malattia. Ciò non ostante quando la cisti sia dura, e resistente potrà tentarsi questa operazione nella stessa maniera, che abbiamo accennato parlando de' tumori cistici in generale. Siccome però alla base del tumore resta il tendine, e la sua vagina, è necessario usare somma cautela nel distaccare il tumore dalla parte inferiore, onde evitare l'offesa delle dette parti, la quale porterebbe seco gravi ac-



cidenti , e segnatamente la febbre , dolore , e convulsioni . A quest' oggetto oltre la cautela impedire l'accesso dell' aria sarà bene di non praticare l'estirpazione del ganglio se non nel caso in cui il tumore sia mobile , e di procurare , che la ferita sia meno grande , che si può , e se è possibile evitare la suppurazione . Estirpato il tumore i rimedj adattati saranno la compressione , ed i leggeri astringenti , come già si è accennato parlando degl' altri metodi di curare questa malattia ,

## C A P O IX.

## DE' TUMORI LINFATICI.

**A**bbiamo già di sopra nel Cap. V. parlato de' tumori sierosi formati da uno stravasamento di siero nel tessuto cellulare , o sia dell' edema . I tumori , de' quali parliamo al presente sono formati da una congestione di un umore linfatico ; ma essi differiscono dall' edema per le seguenti proprietà . I tumori linfatici formano lentamente , senza infiammazione , e senza mutazione di colore della cute , essi sono duri , circoscritti , e la principal differenza dall' edema è , che non conservano come il medesimo l'impressione del dito . Invece di essere formati dal siero è la parte albuminosa del sangue , che ne costituisce la natura , e dessa assume diversi caratteri venendo alcune volte dura , e concreta , come lo scirro , ed il cancro , altre volte rimanendo fluida ed essendo contenuta in una cisti particolare , e talora poi essa ha la sua sede nel tessuto cellulare , o nei muscoli , o finalmente nelle articolazioni . Questi tumori sono sempre d' esito incerto , e pericolosi e ciò ha segnatamente luogo quando essi attaccano le articolazioni , e sono situati sul periostio e



# DE' TUMORI LINFATICI. 83

amento del medesimo . La difficoltà di guarirli  
te nell'essere essi molto resistenti alla risolu-  
, e perchè non possono estirparsi , che quan-  
no piccoli , situati nella superficie del corpo ,  
no una cisti alquanto resistente . Per quello  
spartiene all' indole varia di questi tumori è  
, che quelli prodotti da cagioni interne , o  
a particolare indole di umore venereo , scro-  
, e reumatico , non cederanno alla cura lo-  
e non si unirà alla medesima una cura inter-  
ualmente efficace .

Abbiamo negli Autori recenti di Chirurgia de-  
sempj di tumori linfatici arrivati ad un volu-  
traordinario ; la maggior parte però prodotti  
iaj interni , e segnatamente da quelli , che at-  
ano particolarmente il sistema linfatico . Si pos-  
questi tumori formare ancora all' interno , e  
durre danni grandi alle parti contenute nelle ca-  
, nelle quali essi si formano . Essi hanno luo-  
ordinariamente nella cavità del petto , e dell'ad-  
me , e secondo il luogo , che essi occupano , e  
ondo i visceri , a cui sono vicini , come ancora  
proporzione del loro volume producono varj sin-  
omi , de' quali è ben difficile nel tempo , che vive  
malato , conoscere la precisa cagione , non poten-  
osi per ordinario decidere , che dopo la morte del  
medesimo . Questa specie di tumori è come ognun  
ede affatto incurabile . Quelli situati all' esterno so-  
o spesso possibili a risolversi ; questa risoluzione  
si ottiene con l' uso delle acque termali prese in  
forma sì di bagni , che di doccia . Se poi siano situa-  
ti nelle articolazioni , ed interessino il periostio ,  
legamenti , le capsule etc. rare volte sono cura-  
ili ; ma la sola amputazione è il rimedio conve-  
niente in questi casi , e che può salvare la vita al  
malato .

Alcuni Autori recenti parlano di una specie di questa malattia delle estremità inferiori, la quale attacca principalmente quest' estremità, ed è ben differente dall'edema, che osservasi in dette parti. Questa malattia non è molto ordinaria ne' nostri climi, ma lo è molto più ne' climi caldi, e segnatamente nelle Indie Orientali, e dessa consiste secondo alcuni nella congestione del succo gelatinoso, ed adiposo accumulati sotto il tessuto cellulare suc cutaneo. Essa non cede ordinariamente ai rimedj i più efficaci. I metodi proposti che sono alcune volte stati coronati da esito felice sono gli stimolanti locali, ed i drastici forti, ma spesso questi riescono di niuna efficacia.

Per quello appartiene poi alle congestioni linfatiche in generale segnatamente se siano esse formate sopra le articolazioni, siccome la conseguenza ne sarebbe la carie, o l'anchilosi, è necessario intraprendere per tempo una cura attiva. Oltre i rimedj generali, e particolarmente quelli adattati alla cagione interna della malattia, qualora essa dipenda da un vizio umorale è necessario far uso di rimedj locali. Per ottenere la risoluzione ogni qualvolta sia dessa possibile saranno vantaggiosi i topici leggermente stimolanti, come per esempio una soluzione di opio nello spirito di vino rettificato alla dose di due grani per oncia, le sanguisughe, il ceroto vescicante etc. e per sino la moxa. Ma se da questi rimedj non si ottenga la guarigione è necessario ricorrere all'apertura. Questa qualora si eseguisca col troicart porta seco meno gravi conseguenze di quella eseguita col bistourì, perchè minor accesso permette all'aria, però siccome l'umore contenuto è spesso di tal densità, che non può uscire per una piccola apertura, molti preferiscono il setone. Questo metodo è spesso suf-



## DE' TUMORI LINFATICI. 85

iente ad ottenere la cicatrice, e la guarigione del  
tore; ma siccome spesso la cura è troppo tar-  
ta, la suppurazione abbondante produce la carie  
dell'osso, ed obbliga il Professore a ricorrere all'am-  
putazione, in specie se la malattia riconosca per  
origine un vizio interno.

## C A P O X.

### DELL' O SCIRRO.

Lo scirro viene comunemente definito un tumo-  
dureo, indolente, non risolubile secondo alcu-  
se è inveterato, la di cui sede è ordinariamente  
in una parte glandolare; ma che può anche nasce-  
re nelle parti fornite di tessuto cellulare. Questa  
malattia termina spesso in cancro, quindi possono  
confondersi queste due malattie in una non essendo il  
cancro per ordinario, che la conseguenza dello scirro.  
Non conoscendosi esattamente la natura, e le ca-  
zioni prossime della malattia, di cui parliamo, è  
ben difficile determinare quali siano i segni carat-  
teristici di essa, onde poterla distinguere da quel-  
le malattie, con le quali ha molta analogia. I mo-  
derni Scrittori di Chirurgia riconoscono lo scirro  
i caratteri seguenti. In primo luogo il tumore scir-  
roso è duro molto più che gli altri tumori, i qua-  
li sopraggiungono nelle medesime parti, differisce  
oltre lo scirro dai predetti nell'esito, giacchè co-  
me quelli cedono facilmente all'uso de' rimedi, ed  
in un determinato tempo o si risolvono, o sup-  
purano, così questo non termina in alcuni di que-  
sti due modi massime quando non è incipiente, non  
avendo altra tendenza, che quella di passare dopo  
qualche tempo in cancro. Lo scirro è alle volte  
doloroso, segnatamente quando sia prossimo a pas-



sare in cancro , e questi dolori sono lancinanti distinguonsi da quelli , i quali accompagnano gli altri tumori per non essere l' effetto dell' infiammazione , o altra cagione apparente . Qualora quindi si osservino questi dolori è segno , che lo scirro va a passare in cancro . Finalmente le cagioni della malattia potranno dar molto lume per distinguere lo scirro dalle altre malattie , con le quali potrebbe confondersi . Tutti questi segni però non sono sufficienti molte volte per la diagnosi della malattia , trovandosi molti tumori , i quali presentano presso che i medesimi caratteri dello scirro senza essere altrimenti scirrosi , e viceversa rincontrando de' tumori , o affezioni scirrosee , le quali non presentano molti de' caratteri accennati , e propri dello scirro .

Una delle ragioni , per le quali è difficile il pronunciare un esatto giudizio su questa malattia è che sono al sommo ristrette le cognizioni , che abbiamo sulla cagione della medesima . La causa prossima dello scirro viene dai più recenti Professori di Chirurgia attribuita alla concrezione della stanza albuminosa , la quale si depone lentamente tessuto di un organo glandoloso producendo l' ingorgamento del medesimo , ma siamo poi molto oscuro per quello riguarda la cagione , che produce questa concrezione , o ingorgamento . Nulla quasi nulla sappiamo sulle cagioni interne , e che è noto sull' esterne si è , che le contusioni producono spesso questa malattia . Tutte le cagioni per le quali possono formare quest' ingorgamenti non nascono lo scirro , e queste possono ridursi a capi , cioè 1. le passioni d' animo . 2. la soppressione delle evacuazioni . 3. I vizi delle macchine come p. e. un umore erpetico , scrofoloso &c. , esantema ritrocesso , e simili cagioni .

...arleremo trattando del cancro. Deve  
proposito osservarsi, che la tenden-  
o a passare in cancro non è la mede-  
scirro, ma varia secondo la sede del-  
temperamento del paziente &c. e spes-  
ondo la cagione, che l'ha prodotto.  
maggiore dello scirro, il senso di pru-  
pnture nel medesimo, la tumefazio-  
ne prossime sono come si è detto se-  
saggio dello scirro in cancro.

a dello scirro inoltrato in particolare  
all'estirpazione, giacchè i rimedi topici  
utili, o dannosi, poichè quelli, i quali  
risolutivi non fanno, che irritare lo scir-  
derlo doloroso. S' intende già, che que-  
zione non può aver luogo che nello scir-  
immediatamente sotto la cute; giacchè  
no dello scirro delle viscere, o di qualun-  
interna non essendo il medesimo sogget-  
irpazione, deve essere necessariamente in-  
Quando l'estirpazione sia possibile deve  
il presto, molto più che facendola solle-

le l'operazione medesima, giacchè quanto più lo scirro è distrutto con sollecitudine, il tumore è di volume più piccolo, e più mobile, e la cute è sana. L'estirpazione del tumore scirroso si fa incidendo i tegumenti, e separando il tumore dalle sue aderenze se ne esistono. Alcune volte è necessario di portar via una porzione della cute come aderente al tumore, ed allora si avrà una perdita di sostanza ne' comuni integumenti; questo deve evitarsi per quanto è possibile, ma qualora ciò non si possa è necessario di conservare la maggior quantità di cute, che si può, altrimenti rendesi difficile la cicatrice.

Questo è in generale il metodo da usarsi nella cura di questa malattia, ancorchè molti credono, che i rimedi interni possano spesso essere sufficienti per la cura di essa. Noi riferiremo qui alcuni dei più accreditati in questo genere. I più attivi si sono presi dal regno minerale, e segnatamente dai metalli, fra i quali l'antimonio, ed il mercurio. Il Kermes minerale, l'antimonio crudo, il tartaro emetico sono le preparazioni antimoniali proposte per la cura dello scirro, ed il mercurio dolce, il sublimato, l'etiope antimoniale, &c. sono le preparazioni mercuriali proposte per lo stesso oggetto. I rimedj vegetabili vantati per la cura dello scirro consistono nelle piante narcotiche, come la belladonna, l'aconito, la cicuta &c. Molti pratici hanno ancora aggiunto a questi rimedj la gomma ammoniaca, l'alcali volatile, e simili attivi rimedj, dai quali a dire il vero poco, o niun vantaggio si ottiene nella cura dello scirro massime se è inoltrato.

Quantunque però generalmente si creda poco utile la cura interna dello scirro, che anzi non faccia essa, che ritardare il momento dell'operazione,



faccia così perdere il tempo favorevole di estirparlo, conviene però riflettere, che molte volte dipendendo lo scirro da cagioni interne, come p. e. dalla soppressione di qualche evacrazione, o dalla retrocessione di una eruzione, o finalmente da un izio degli umori, non è totalmente impossibile di tenere la cura radicata del medesimo per mezzo di rimedi internamente, o localmente amministrati, e specialmente diretti contro la cagione stessa della malattia, ed allor quando essa non sia molto avanzata, che è quanto dire che il tumore non sia duro, grosso, ed aderente, e sia molto lontano il timore, che esso passi in cancro. Debbesi però usar molta cautela nell' uso de' rimedi proposti per la cura dello scirro, giacchè essendo essi molto stimolanti non è difficile che producano una grande irritazione dello scirro, e promuovano la sua degenerazione in cancro. Molti Autori riportano dei casi, ne' quali lo scirro si è risoluto spontaneamente; ma questi casi sono troppo rari, onde potersi fondare sulle forze della natura per ottenere la cura di questa malattia.

Queste osservazioni possono dirigge il Professore nell' intraprendere la cura interna dello scirro, per quello poi riguarda l' operazione debbesi osservare se sia possibile di estirpare intieramente il tumore, giacchè nel caso, che ciò non possa eseguirsi non deesi in alcun conto venire all' operazione. Se il tumore scirroso sia molto aderente sarà difficile l' estirparlo, ovvero se oltre lo stesso tumore ne esistano degli altri in altre parti sarà inutile l' operazione, dipendendo la malattia da cagione intrinseca. A quest' oggetto una delle particolari osservazioni da farsi nell' estirpare un tumore scirroso si è quella di estirparlo intieramente, e di estirpare insieme tutti gli altri tumori scirrosi, i

quali potessero ritrovarsi nelle altre parti, onde non lasciare indietro alcuna traccia dell' antica malattia. L' arresto dell' emorragia, chè è uno de' sintomi i più pericolosi di questa operazione verrà da noi esposto quando tratteremo delle operazioni in particolare.

## CAPO XI.

## DEL CANCRO.

Questa malattia è difficile a definirsi, giacchè è molto vario il suo corso secondo le diverse parti, che affetta, e perchè i varj sintomi, i quali essa presenta esistono ancora in altre malattie molto dalla medesima differenti. Dassi ordinariamente il nome di cancro occulto a quel tumore duro con il colore della pelle più, o meno alterato, con i vasi vicini turgidi, o varicosi, accompagnato da una sensazione dolorosa, oppure di calore accresciuto, ed altre volte da continue trafitture. Questa completa disorganizzazione del tessuto della parte, che forma il tumore, vi determina l' infiammazione, s' ammolisce in qualche punto dalla liquefazione cancerosa, si fa maggiormente dolente, e formasi quindi un' ulcere, la quale ha delle carni dure, e disuguali, o fungose, e molli, la sua base è grossa, e dura, le labbra sono rovesciate all' infuori, la materia, che getta ha un odore proprio, e particolare, e finalmente è accompagnato da dolori divenuti lancinanti, e da frequenti emorragie. Questo stato si distingue col nome di cancro manifesto. Un carattere del cancro si è quello di non cedere ai rimedj applicati; ma di fare il suo corso, e di peggiorare sempre più qualunque sia il metodo di cura adoperato. e c



giungere alla fine la morte. Si è cercato di esaminare quali fossero le variazioni, che il cancro produce nella parte affetta, e si è rinvenuto, che la sostanza della medesima diviene di consistenza lardacea, di color grigio, e perde affatto la sua organizzazione, non si distinguono più le diverse sue parti, e questi effetti sono tanto costanti, che i più moderni asseriscono, che una massa cancerosa non sia più distinguibile a qual parte del corpo umano appartenga.

La sede ordinaria del cancro è nelle ghiandole conglobate, ma attacca molte volte senza eccezione anche delle altre parti, e secondo le medesime presenta sintomi diversi. Nella mammella principia il cancro ordinariamente con un tumore scirroso, o con un ingorgamento linfatico del petto, e qualunque ne sia il principio dopo qualche tempo si forma un cancro manifesto, generandosi un'ulcera sordida fetida, con degli orli callosi, e che produce delle abbondanti emorragie, le ghiandole vicine s'ingorgano, e segnatamente quelle dell'ascella, le coste si cariano, e succede l'affezione degli organi contenuti nella cavità del torace, quindi nasce la tosse, la difficoltà di respirazione &c. Nel cancro del testicolo i dolori lancinanti, che l'accompagnano si estendono lungo il cordone spermatico, ed alle volte giungono fino ai lombi. Quando il cancro del testicolo riconosce per cagione lo scirro di detta parte, come per ordinario accade, il volume resta nello stato naturale, ed all'opposto nel cancro detto fungoso il testicolo aumenta di volume. Il cancro dell'occhio è di natura fungosa, vale a dire doloroso, molle, tumefatto, rossastro, e che versa del sangue al toccarsi, che si fa con la mano. A questo cancro sono soggetti i bambini, come gli adulti, ed è facile.



I dolori ch'accompagnano la malattia vengono accresciuti dall' introduzione della sciringa .

Le glandole linfatichè più ordinariamente affette dal cancro sono quelle dell' ascella , e dell'inguini , queste ultime però divengono per ordinario cancerose in conseguenza dei buboni venerei prece-  
ceduti . Finalmente i cancri , i quali hanno la loro sede nella cute esistono ordinariamente nella faccia , e particolarmente al naso , alle gote , alle palpebre etc. Il loro principio è vario , altri principia-  
no con un tubercolo bruno , o giallastro , che a poco a poco diviene un ulcere , alcuni sono la con-  
seguenza di una specie di verruca di color rosso-  
stro , il quale parimenti dopo molto tempo si esul-  
cera . Altri finalmente vengono prodotti da un tu-  
more linfatico , scirroso , che aprendosi degenera in  
un cancro , Oltre le parti della faccia già accenna-  
te possono i cancri della cute esistere sebbene più  
di raro in altre parti del corpo umano , come in  
lombi , nelle estremità etc.

Per quello appartiene alle cagioni del cancro  
consistono esse ordinariamente nelle contusioni ,  
gorgamenti dell' umore separato da una glandola  
soppressione delle evacuazioni , come p. e. de' m-  
strui , la quale produce frequentemente il cancro d-  
utero , le passioni d' animo , e finalmente un v-  
generale della machina . Da tutto questo si ve-  
difficoltà di conoscerne esattamente la vera cag-  
e per conseguenza di formare una giusta prog-  
e metodo di cura , segnatamente per conoscere qu-  
do sia applicabile l' operazione , la quale sarà s-  
tanto utile allorchè la malattia sia puramente loc-  
le .

Qualora il cancro sia già confermato , è b-  
difficile ottenerne la cura per mezzo de' medicame-  
ti , ma non tutti i cancri presentano la medesim-

difficoltà; quelli del petto sono i più incurabili, mentre poi quelli della faccia cedono più facilmente ai rimedj. I metodi usati nella cura di questa malattia sono due, cioè radicativo, o palliativo. Il metodo radicativo, che deve esser preferito ogni qual volta sia possibile consiste principalmente nell'operazione, la quale però deve esser eseguita sollecitamente, e prima, che la malattia abbia fatto progressi. I tanti rimedj raccomandati sono presso che tutti di poca utilità, e ritardando l'operazione sono piuttosto dannosi. Non sarà però inutile l'uso de medesimi dopo praticata l'operazione potendo essi servire o ad impedirne la recidiva, o ad diminuire la diatesi cancerosa. I rimedj commendati per la cura del cancro sono presso a poco simili a quelli indicati per lo scirro; cioè o interni, o esterni, e li seguenti sono i più attivi, e segnatamente quelli presi dal regno minerale, come l'antimonio, ed il mercurio, p. e. il Kermes minerale, il tartaro emetico, il sublimato etc. Fra i rimedi vegetabili sono molto raccomandati dai Pratici le piante narcotiche, come p. e. la cicuta, l'aconito, e finalmente la belladonna, e da quest'ultima particolarmente si raccontano degli effetti vantaggiosi.

Presso che i medesimi rimedj sono quelli, i quali debbono usarsi esternamente nella cura del cancro; ma uno de rimedj esterni più accreditati, e dal quale si ottengono i migliori effetti nella cura del medesimo sotto alcune particolari circostanze, è sicuramente l'arsenico, il quale è un rimedio assai raccomandato segnatamente nel cancro della faccia. In qualunque caso però è necessario alla cura esterna unire anche l'interna, onde combattere la diatesi generale, e sarà molto vantaggioso, se all'uso degli indicati rimedi anticancerosi si unisca-



no de' fonticoli, e l'amministrazione della China. Qualora poi nè dall'operazione, nè dai rimedi generali, o locali siavi nulla da sperare per la cura del cancro, è necessario ristringersi al metodo palliativo, che consiste nel rimediare ai sintomi più urgenti. Il tener pulita l'ulcere con degli astersivi, il mitigare i dolori con l'opio, e finalmente l'arrestare l'emorragie con la legatura, o col caustico, sono gli oggetti principali da considerarsi. Devesi poi particolarmente aver cura delle forze del malato per mezzo di un vitto nutriente, e piuttosto vegetabile, e far uso della China internamente, e del latte. Molti consigliano ancora l'uso de' leggieri evacuanti, onde impedire la costipazione del basso ventre, che produce cattive conseguenze,

## C A P O XII.

## DE' TUMORI FUNGOSI, CARNOSI, ED ADIPOSI.

**S**otto uno stesso Capitolo vengono da noi riunite queste tre specie di tumori essendo esse molto analoghe fra loro. Consistono questi tumori in una escrescenza del tessuto cellulare, il quale però viene a soffrire una specie di degenerazione. I nomi, i quali hanno ricevuto queste diverse malattie variano secondo la natura, e sede delle medesime. *Polipi* chiamansi le escrescenze carnose situate sulle membrane, che rivestono alcune cavità interne. *Fungo* chiamasi una escrescenza di carne di cattiva qualità, che ritrovasi sulla superficie di un ulcero ordinariamente molle, e di color rossastro, co-ancora diconsi funghi i tumori, che ritrovansi: tessuto cellulare, e sopra alcune membrane, con il periostio, e la dura madre. Se questi tumori si-



no semplici, e non dipendenti da vizio alcuno generale diconsi *Ipersarcosi*.

I tumori sarcomatosi, o carnosì detti ancora *Sarconi* sono più duri, ora dolenti, ora nò, ed il loro tessuto è quasi carnosò, della qual natura sono molti polipi. I tumori *Adiposi* poi sono più molli de' precedenti, ed ordinariamente la loro massa è come divisa in più parti.

La cura di questa specie di tumori qualunque natura essi abbiano consiste nell'estirpazione, si faccia d'essa col ferro, col caustico, o con la legatura. Siccome però ognuno di essi può soffrire alcune variazioni nel metodo curativo a seconda della sede, e della cagione della malattia, quindi è che crediamo necessario di esaminare le varie specie di essi in particolare.

*Tumori fungosi sanguigni* diconsi varie escrescenze formate da un radunamento di sangue, o ne' vasi, o nella cellulare. I *nei* sono di questa classe come ancora i tumori di color violetto, o rosso scuro, i quali riconoscono la loro sede nel tessuto cutaneo come i precedenti. Quelli tumori sanguigni poi, i quali hanno la loro sede nel tessuto cellulare succutaneo si accrescono fino ad un volume enorme, e se vengono incisi producono delle emorragie sovente mortali, se al contrario si lascino far de' progressi producono la cancrena della parte. La cura conveniente in questi casi è quella di estirpare il tumore completamente nella sua base qualora non sia di una estensione tale, che ne risulti una piaga molto vasta, e che per conseguenza difficilmente cicatrizza. Questa operazione però spesso volte è seguita da un esito infelice se il tumore non sia ben piccolo.

Il peristio è parimenti soggetto a tumefarsi, e divenire fungoso, e ciò ha ordinariamente luogo

in conseguenza di contusioni , ma alcune volte crescono questi tumori anche spontaneamente , e senza causa alcuna esterna . Il loro corso è lungo , giacchè restano molto tempo piccoli , duri , e circoscritti , ma poi all' improvviso crescono di volume rapidamente , divengono molli , e producono la corrosione dell' osso sottoposto . Questa malattia è di diagnosi molto difficile , e non ammette rimedio altro fuorchè l' amputazione supposto che il tumore esista in una parte , la quale sia suscettibile di questa operazione . Se il tumore sia recente , e poco luminoso , ed inoltre la diagnosi siasi fatta giustamente , il ferro , o il caustico attuale potranno secondo alcuni pratici esser di qualche vantaggio .

Questa specie di tumori può aver luogo eziandio nella dura madre . Essi formansi nella superficie esterna di detta membrana dove essa è aderente all' osso , e la conseguenza della malattia è la distruzione delle tavole ossee del cranio , che sensibilmente viene ad essere perforato , e così sorte fuori il fungo della dura madre , il quale forma un tumore all' esterno . Siccome il foro del cranio è all' intorno circondato da punte ossee , le quali penetrano nella sostanza del tumore a proporzione che esso si aumenta , ne viene che questa malattia porti seco de' dolori acutissimi . Le cagioni di questa medesima sono varie , e principalmente i vizj interni della macchina , può però essere eziandio prodotta da colpi violenti sul capo , contusioni , o un contro colpo . Qualunque ne sia la cagione essa è ordinariamente incurabile , richiedendosi la riunione di molte circostanze favorevoli , onde poter ottenere un qualche vantaggio dall' estirpazione , e dalla trapanazione , che sono i due mezzi necessarij , e da cui soltanto riuniti può sperarsi



guarigione ne' casi semplici, e sul principio della malattia.

Questi tumori fungosi possonsi tuttavia ritrovare in molte altre parti del corpo, come nella caruncola lagrimale, nelle gengive dove forma la così detta *Epulide*, nei seni mascellari, nell'orecchia, nella vescica, e nelle parti genitali muliebri esterne, e segnatamente poi nel naso, fauci, ed utero ne' quali casi diconsi *polipi*, di cui ci restringiamo a parlare brevemente.

Il *polipo* del naso ha origine nella membrana pituitaria ove dessa naturalmente è più densa, ed ha per lo più una base stretta in forma di peduncolo. Può per altro esso crescere ad un gran volume, e sollevare perfino le ossa nasali. Gli autori distinguono varie specie di questa malattia, e sono il polipo mucoso, vascolare, scirroso, e sarcomatoso, secondo cioè la sua durezza, colore, e sostanza etc. Il mucoso è il più molle, e rare volte è solo, e ne è difficile l'estirpazione, e ripulirla con facilità. Il polipo vascolare è più duro, l'estirpazione del medesimo produce delle emorragie, e degenera facilmente in carcinoma. Quello scirroso è di durezza quasi cartilaginea, ed ordinariamente è incurabile. Finalmente il polipo sarcomatoso ha di particolare, che rincontrasi quasi sempre nella narice posteriore. La cognizione di queste diverse specie, e dell'attaccamento del polipo è molto interessante pel buon' esito dell'operazione, onde dovrà il Professore assicurarsene per mezzo di uno specillo, o di una sciringa da donna, ed anche portando le dita nelle fauci, se il caso lo richiederà. Per quello, che riguarda la cura della malattia molti sono li metodi proposti, essi consistono o nel procurare di distruggere il tumore per mezzo di caustici, e del setone, e



sti sintomi si aumentano di molto rendendo anche atrofica la gamba, ed arrivano fino a produrre la carie dell'osso la quale cagiona la morte del paziente.

Le cause de' tumori bianchi sono poco conosciute dipendendo da cagioni interne, o esterne. Quello che sembra più probabile si è, che questi agiscano producendo l'infiammazione delli legamenti, e parti adjacenti, sieno desse poi esterne, o interne. Questa infiammazione ha luogo principalmente nel ligamento capsulare, e suole essa passare in suppurazione, dalla quale non solo viene il legamento stesso alterato nella sua sostanza, e tessitura, ma viene eziandio cariato l'osso. Da questo ben chiaro, che l'esito di tali tumori non può essere che infelice, e che quindi l'unica speranza sarà riposta nell'amputazione. Non è però, che questa prognosi non soffra varie modificazioni a seconda della cagione della malattia, e della sede essa. Se la malattia riconosca per origine un'azione scrofolosa come ordinariamente accade ne' ragazzi, e se attacchi una grossa articolazione sempre più pericolosa; per lo contrario se la malattia sia prodotta da cagioni esterne, o da una semplice affezione reumatica, se l'articolazione sì delle più piccole, vi sarà maggior speranza di ottenere la guarigione senza ricorrere all'amputazione della parte, ma per mezzo di una cura ben diretta e segnatamente istituita a tempo.

La cura della malattia dee consistere nel procurare di risolvere l'infiammazione, ed impedire che non passi in suppurazione. A questo oggetto sarà necessario adoperare il metodo così detto antiflogistico prescrivendo il riposo più assoluto dell'articolazione affetta, sebbene questo abbia più tosto luogo nelle estremità superiori, che nelle i

feriori, giacchè in queste resta molto difficile atteso, che l'articolo tende sempre alla flessione, e se si tenga esteso forzatamente, ne siegue l'anchilosi; saranno quindi necessari i salassi generali, e locali, gli emollienti, i minorativi, e la dieta. Gli emuntorj posti nelle parti vicine al tumore, saranno eziandio di molto vantaggio. Potrà passarsi in seguito ai risolventi, fra i quali sono spesso utili i mercuriali, ma quelli più vantaggiosi, e propri sono i bagni d'acque minerali, i suffumigj, e la doccia. Questo metodo riesce segnatamente ne' tumori bianchi prodotti da cagioni esterne, ma non è per se solo sufficiente nella stessa malattia cagionata da cause interne, e specialmente da affezione scrofolosa. In simili casi a questa cura è necessario unirvi anche un sistema di cura interna diretta a combattere la cagione della malattia. L'antimonio, la digitale, la poligala, i replicati purganti etc. sono i rimedi, i quali vengono indicati ne' casi accennati.

Siccome però ad onta di tutti questi rimedj spesse volte non si arriva a risolvere l'infiammazione, non può impedirsi, che desso suppurì, ne viene per conseguenza, che la cura dovrà essere diretta a procurare l'esito della materia, onde non si trasferisca all'interno dell'articolazione. Molti Pratici sono di sentimento, che si possa in alcuni casi formare la suppurazione nella sola parte esterna del ligamento capsulare, e che quindi dando esito alla materia si possa impedire, che dessa non si porti a distruggere, e cariare le ossa componenti l'articolazione. I metodi dai medesimi proposti per l'apertura sono varj, ma i più convengono, che il setone sia il miglior metodo per dar esito alla materia senza incorrere negli inconvenienti, che porta seco il ferro tagliente, o il caustico. Convien



però conoscere, che il setone rare volte riesce, quasi nel tempo stesso, che la marcia esce per l'apertura, non lascia di portarsi anche all'interno dell'amputazione; il miglior consiglio sarà quindi di ricorrere all'amputazione, appena si osserva, che non cessi la suppurazione, e segnatamente quando il soggetto sia un adulto, giacchè la cicatrizzazione della materia è più tarda a sopraggiungere. Il qual meno difficilmente guarisce, quando la malattia esista nell' articolazione del setone, e delle dita. Vi sono taluni, che hanno proposto recidere l'estremità dell' ossa corrispondente al punto dell' amputazione di tutto il membro. Ma questo non richiede molte circostanze per essere praticato, e sembra non meno crudele dell'istesso, che l'amputazione medesima.

## CAPO XIV.

## DEGLI ULCERI.

Un'apertura mortua, o ulcera, si chiama di comunemente prodotta da causa locale, cronica, e permanentemente materia, e situata in una parte morta. Sono generalmente tutte accompagnate da una alterazione nella sostanza delle parti vicine, e dall'apertura delle piaghe, o sia ferite, che suppurano, per cui sono di molto più difficile guarigione, e non sono una malattia cronica mantenuta da una affezione interna, mentre la ferita, che suppone di una malattia acuta, che tende continuamente alla cicatrizzazione. Nelle ulcere le marce impediscono non solo la riunione delle parti, ma vi si oppongono sempre più le parti solide adiacenti, di maniera che una cura ben diretta l'ulcera tende



sempre ad estendersi, ed a divenire di cattiva indole. Due altri effetti perniciosi dell' ulcera sono l'evacuazione delle materie, ed il riassorbimento delle medesime. La prima da luogo se sia abbondante ad una debolezza grande della machina, ed insieme ad una emaciazione universale. Il riassorbimento poi del pus corrompe tutta la massa del sangue, e degli umori, e produce una febbre colliquativa, e d' indole putrida.

Attese le diversità infinite, che ci presentano le ulceri nella loro forma, ne' sintomi, che l'accompagnano, e finalmente nelle cause, le quali l' hanno prodotte, e che per conseguenza richieggono un diverso metodo di cura, sono state da pratici stabilite molte specie diverse di ulcera, le quali è necessario conoscere ognuna in particolare. Varie sono le divisioni delle ulceri stabilite dai Pratici, ma ci sembra, che debbono esse considerarsi tanto riguardo la causa principale della malattia, quanto rapporto l' influsso, che ha questa cagione nel metodo curativo delle ulceri. Fra le molte divisioni stabilite dai più recenti Scrittori sembranci degne di particolare menzione le *Ulceri scorbutiche*, *scrofolose*, *veneree*, *erpetiche*. Per quello appartiene alle altre specie di ulceri da molti accennate, come sono le *cancerose*, le *psoriche*, le *tignose* etc. non formando esse una malattia particolare, ma dipendendo piuttosto da una determinazione locale della malattia generale vengono da noi trattate in occasione, che parliamo delle malattie particolari, le quali ad esse danno origine.

Se noi consideriamo le ulceri riguardo ai loro sintomi comuni qualunque possa poi essere la cagione della malattia, osserviamo, che desse possono esistere in qualunque parte del corpo; ma che quelle, le quali hanno la loro sede nelle gambe

sono le più comuni. Esse impediscono la funzione della parte, e sono di danno tanto per la quantità dell'umore separato, quanto per la cattiva qualità di quello, che si riassorbisce.

Dalla divisione, che noi abbiamo data delle ulceri è facile il comprendere, che possono all' infinito variare le cagioni produttrici delle medesime. Comunemente si dividono queste in generali, e locali. Le ulceri prodotte dalle cause della prima specie, sono ulceri sintomatiche, quelle poi per effetto di cagioni locali possono costituire una malattia principale. Egli è in pratica molto difficile il rintracciare la cagione delle ulceri qualora dessa sia generale, e consiste in una affezione di tutto il sistema; ma potrà portar molto lume in queste circostanze il corso della malattia, e gli incomodi del malato sofferti prima dell'apparizione dell'ulcera. Se osservasi un'ulcera, la quale non ceda ai rimedj ordinarij, e si sappia d'altronde, che il malato abbia anteriormente sofferto delle malattie universali, vi sarà ben molto fondamento di credere, che l'ulcere riconosca una causa generale, e che questa sia appunto della stessa natura della malattia precedente. Oltre le malattie, le quali abbiamo accennato come origine di ulceri, cioè lo scorbuto, le scrofole, la lue venerea, e l'erpete, possono le ulceri esser prodotte eziandio da altre malattie universali, come l'artritide, la soppressione de' mestruj, l'emorroidi, e principalmente da tutte le retrocessioni di una qualunque eruzione cutanea. Oltre poi queste cause generali accennate delle ulceri due specie meritano particolare considerazione, e sono primieramente quelle prodotte da malattie precedenti segnatamente esantematiche come p. e. da vajolo, rosalia, scarlattina etc. e quelle, che riconoscono la loro origine da vizj esistenti ne' visceri



il basso ventre, e specialmente del fegato, e della milza.

Per quello poi riguarda le cagioni locali delle ulcere queste consistono principalmente ne' corpi estranei esistenti nelle medesime siano essi stati introdotti dallo stromento, il quale ha prodotto la lesione, come accade principalmente in quelle d'ardore da fuoco, ovvero siano essi cagionati dalla separazione della porzione dell'osso sottoposto prodotta da frattura, carie etc. Questa specie per altro appropriamente parlare non merita essere inclusa nella divisione dell'ulceri, tenendo un carattere acuto, opposto a quello delle medesime.

Secondo la varietà delle cause della malattia, secondo il tempo, che la medesima ha durato deve determinarsi la prognosi delle ulcere. Se la cagione, che l'ha generata sia difficile a conoscersi, e conosciuta con difficoltà possa togliersi, malagevole ne sarà la guarigione. Lo stesso dovrà dirsi delle ulcere antiche, e di cattivo carattere. Esse saranno molto più facili a guarirsi ne' soggetti giovani, e robusti, così ancora saranno di cura più facile quelle, quali attaccano parti meno interessanti, e viceversa.

Prima di entrare a parlare della cura delle ulcere è necessario esaminare una questione, la quale ha occupato i migliori pratici, se cioè debbansi, o no curare le ulcere. Noi crediamo, che una simile questione non possa essere così generalmente decisa senza aver riguardo alla natura particolare delle medesime, ed alle cause, le quali l'hanno prodotta. Per quello appartiene alla natura particolare dell'ulcere, è necessario riflettere se dedita sia antica, o recente, se i progressi dell'ulcera verso la guarigione vengano accompagnati da un disturbo delle altre funzioni della macchina, ovvero se il pa-



però confessare, che il setone rare volte riegiacchè nel tempo stesso, che la marcia esce dall'apertura, non lascia di portarsi anche all'interno dell'articolazione; il miglior consiglio sarà quindi di ricorrere all'amputazione, appena si osserverà che siasi stabilita la suppurazione, e segnatamente quando il soggetto sia un adulto, giacchè le lacerazioni dell'osso, e la morte, che ne siegue pel sorbimento della materia è più tarda a sopraggiungere ne bambini, i quali meno difficilmente guariscono molto più se la malattia esista nell'articolazione del cubito, o delle dita. Vi sono talora casi che hanno proposto recidere l'estremità dell'articolazione senza venire all'amputazione di tutto il membro, ma oltreche essa richiede molte circostanze per potersi preferire, ci sembra non meno crudele ed incerta dell'amputazione medesima.

## CAPO XIV.

## DELLE ULCERI.

**S**otto il nome di ulcera s'intende un'apertura morbosa, o soluzione di continuità prodotta da una causa interna cronica, tramandante materia, e situata in una parte molle. Sono generalmente tutte accompagnate da una alterazione nella sostanza delle parti vicine, e distinguonsi dalle piaghe, o sia ferite, che suppurano per esser di molto più difficile guarigione, e per esser una malattia cronica mantenuta da una affezione interna, mentre la ferita, che suppure è una malattia acuta, che tende continuamente alla cicatrizzazione. Nelle ulcere le marce impediscono non solo la riunione delle parti, ma separano sempre più le parti solide adiacenti, di modo che senza una cura ben diretta l'ulcera tende

sempre ad estendersi, ed a divenire di cattiva indole. Due altri effetti perniciosi dell' ulcera sono l' evacuazione delle materie, ed il riassorbimento delle medesime. La prima da luogo se sia abbondante ad una debolezza grande della machina, ed insieme ad una emaciatazione universale. Il riassorbimento poi del pus corrompe tutta la massa del sangue, e degli umori, e produce una febbre colliquativa, e d' indole putrida.

Attese le diversità infinite, che ci presentano le ulceri nella loro forma, ne' sintomi, che l' accompagnano, e finalmente nelle cause, le quali l' hanno prodotte, e che per conseguenza richieggono un diverso metodo di cura, sono state da pratici stabilite molte specie diverse di ulcera, le quali è necessario conoscere ognuna in particolare. Varie sono le divisioni delle ulceri stabilite dai Pratici, ma ci sembra, che debbono esse considerarsi tanto riguardo la causa principale della malattia, quanto rapporto l' influxo, che ha questa cagione nel metodo curativo delle ulceri. Fra le molte divisioni stabilite dai più recenti Scrittori sembranci degne di particolar menzione le *Ulceri scorbutiche, scrofolose, veneree, erpetiche*. Per quello appartiene alle altre specie di ulceri da molti accennate, come sono le *cancerose, le psoriche, le tignose* etc. non formando esse una malattia particolare, ma dipendendo piuttosto da una determinazione locale della malattia generale vengono da noi trattate in occasione, che parliamo delle malattie particolari, le quali ad esse danno origine.

Se noi consideriamo le ulceri riguardo ai loro sintomi comuni qualunque possa poi essere la cagione della malattia, osserviamo, che desse possono esistere in qualunque parte del corpo; ma che quelle, le quali hanno la loro sede nelle gambe



sono le *ulceri Scrofolose*, *Scorbutiche*, *Venerree*, e *Erpetiche*. Le *ulceri scrofolose* sono ordinariamente la conseguenza dell'estirpazione di tumori scrofolosi, o dell'apertura spontanea dei medesimi, e sono accompagnate da molti sintomi scrofolosi; esse guariscono assai difficilmente, ed attaccando le articolazioni producono la *carie*, o almeno l'*anchilos*. Le ulceri di questa natura essendo sintomi di una malattia universale poco vantaggio possono ricevere da una cura locale, ma è necessario curare predetta coi metodi interni adattati, e che a lei non appartiene di esporre. Rifletteremo soltanto che essa è molte volte impossibile, come p. e. quando le *Scrofole* hanno prodotto, come qualche volta accade, una *Tise polmonare*, l'*Atrofia Mesenterica* etc.

La guarigione dell'*ulceri scrofolose* è molto difficile, ma alle volte il solo avanzarsi dell'una produce la medesima. Dessa per altro può essere più sollecita facendo preservare il malato dall'umidità, e dal freddo, procurare una facile respirazione per mezzo di frizioni secche, sostenere l'energia delle forze della circolazione con vino nutriente, e prescrivergli varie abluzioni, fra quali meritano la preferenza le alcaline. Per quello poi appartiene ai mezzi da prendersi nel caso di *carie* dell'articolazione si restringono essi all'applicazione della parte, come unico, e necessario rimedio.

Le *ulceri scorbutiche*, accompagnate da debolezza universale sono ordinariamente fungose, fetide, producono delle emorragie, ed hanno spesso la loro sede nelle gengive, le quali sono tumefatte, e rammollite, e producono l'alito fetente. I rimedj, i quali hanno luogo per la cura di esse sono gli antiscorbutici internamente p. e. il vino



o elisir antiscorbutici formati colle radici fresche di Rafano rusticano, di Bardana, di foglie di co-  
clearia etc. e gli antiseptici, e stimolanti topica-  
mente, fra i quali segnatamente la China, la tin-  
tura di lacca, l'acido muriatico allungato, e la  
barite, e gli astringenti, onde arrestare l'emor-  
ragia come l'allume, e lo spirito di vino canfora-  
to. Nei bambini passano più di sovente in cancre-  
na, e sono assai pericolose, a cui vi si aggiunge  
la febbre di carattere adinamico, diviene difficile  
la respirazione, cadono in continui deliquj, si svi-  
lupa un' eruzione petecchiale, ed in fine cessano  
di vivere.

Le *Ulceri Veneree* distinguonsi in primitive, ed  
in secondarie, e per conseguenza non si formano  
sempre alle parti genitali, ma hanno luogo eziandio in  
varie parti del corpo. Esse non cedono alla cura lo-  
cale, e segnatamente quelle secondarie, ma è ne-  
cessario distruggere l'infezione venerea, alla qua-  
le deve però unirsi il trattamento locale consisten-  
te nel diminuire l'infiammazione cogli emollienti,  
e ricorrere poi agli stimolanti, ed anche ai causti-  
ci, nel caso siano callose o inveterate. Tutta la cu-  
ra consiste principalmente nel mercurio dato in-  
ternamente, ed applicato ancora localmente, medi-  
camento però, il quale richiede le più grandi cau-  
tele nell'amministrazione, e che troppo a lungo  
continuato può produrre gravi inconvenienti. Di que-  
ste ne crediamo anche meritevole l'uso della cau-  
terizzazione dell'ulcere sifilitica. Molti Scrittori di  
Chirurgia sono di sentimento, che nelle ulcere ve-  
neree primitive sia sufficiente la sola cauterizzazio-  
ne delle medesime, onde distruggere la grossezza  
dei bordi, che forma il principale carattere delle  
medesime, e che non sia necessario l'unirci l'uso  
interno del mercurio. Ciò per altro può avere al

più luogo nelle ulceri primitive incipienti, nelle altre sarà necessaria la cura interna. Nelle *sifilitiche* alle parti genitali saranno molto frizioni mercuriali all'estremità inferiori.

Le *ulceri erpetiche* finalmente sono ulcero-niche, resistenti ai mezzi ordinarij di cura, le quali sono ordinariamente attaccate le più miserabili, e poco pulite. Questa specie d'ulcera è la più difficile a guarirsi di tutte, eccetto l'ulcera cancerosa, e molte volte è ben difficile restarne i progressi, i quali sono non di raro rapidi. In generale però un ulcere erpetico aver corrosi i tegumenti resta per molto tempo nello stesso stato, e continua egualmente la suppurazione, la quale è ben difficile a far cessare, e il più delle volte sarebbe anche pericoloso. Di tutti i rimedj astringenti, e stimolanti sommo pregiudizio potendo produrre la recidiva dell'erpete su qualche parte interna. I rimedj più indicati localmente sono gli emollienti molli, che promuovono la suppurazione, e hanno anche proposto il vescicante sull'ulcere stesso, ma questi medicamenti sono di niun vantaggio, e anche dannosi se all'uso di essi non si unisce la cura interna. Noi non possiamo qui estenderci al metodo interno conveniente per la cura dell'erpete; ma ci contenteremo di accennare, che i bagni caldi, e segnatamente quelli di acque mine-rali sono stati riputati molto efficaci. A questi devono unirsi le piante antiscorbutiche, il siero, i purganti, l'antimonio, e qualora sia l'erpete d'indole venerea si ritrarrà moltissimo vantaggio dall'uso del mercurio.

Prima di terminare il trattato delle ulcere sarà fuori di proposito il dire qualche cosa sulle ulcere artificiali, dalle quali con giusta indicazione



doperare ritrae la Medecina, e la Chirurgia infiniti vantaggi. La Chirurgia aprendo le ulcere artificiali cerca di aprire alla natura una strada per la quale dessa possa scaricarsi degli umori nocivi, e morbosi. La differenza però, che esiste fra queste, e le naturali si è, che le ulcere nate spontaneamente hanno luogo per una separazione degli umori morbosi, i quali poi vengono dalla natura separati dall'ulcere, che dessa forma a quest'oggetto. Per lo contrario le ulcere formate dall'arte essendo prodotte da separazione di questi umori non separano i medesimi insieme co' sani, e non hanno altro fine, che diminuire gli umori senza depurare la massa del sangue come molti pretendono, anzi molte volte dannose per la perdita di umori, producono. Un vantaggio però dell'ulcere artificiali si è quello prodotto dall'irritazione, che esse cagionano, che è alle volte utilissima per operare una parte più interessante della macchina per una determinazione, che può divenire pericolosa, come si è già di sopra più volte osservato. Il setone, il fonticolo, ed il vescicante sono le tre specie di ulcere artificiali, che si praticano dal Chirurgo.

Il setone consiste in una ferita, che si forma in una piega della cute, e per la quale si fa passare un nastro, che si va tirando ogni giorno, onde resti sempre una nuova porzione di esso nella ferita, e così questo corpo estraneo venga a cagionare una suppurazione abbondante nella parte. Il nastro deve essersi di unguento digestivo, onde resti più propenso per l'effetto, che deve produrre. Il setone si applica presso che in tutte le parti del corpo, ma dovrà scegliersi il luogo più adattato all'indicatione prefissa, segnatamente qualora si tratti di operare una determinazione verso una data parte.



fistola . Similmente la carie delle ossa sottop-  
piaga è non di raro cagione della fistola .  
te volte ancora questa malattia aver luogo  
tivo metodo di cura , e segnatamente quan-  
rusico permette , che la materia , che esce d-  
ga resti molto tempo nella medesima , e q-  
cquistando una natura acre , e corrosiva :  
strada all' interno , e così nasca la fistola .

I mezzi per assicurarsi dell' esistenza  
fistola consistono moltissimo nella cognizio-  
cause precedenti . Se si conosce l' esistenza  
cuna delle cagioni accennate , e si osservi ne-  
so tempo , che da una apertura molto stre-  
molto maggior quantità di marcia , di qu-  
può fornirne la piccola superficie della fe-  
si vede , che il pus viene ad uscire in gr-  
allorchè si preme sulle parti prossime all' ul-  
trà concludersi che esista una fistola . Si p-  
ra per assicurarsi dell' esistenza di una fis-  
re il metodo di otturare l' apertura della p-  
così dando tempo alla marcia di radunarsi .  
certa quantità può conoscersi la direzione e  
desima . Questo metodo però ha i suoi inco-  
ti , e non riesce nelle fistole , che penetrano  
to profondamente , nè in quelle , le quali ha-  
apertura corrispondente in una cavità . Il  
metodo quindi è quello dello specillo , ch-  
stra più esattamente la direzione , e la lu-  
del seno , o della fistola . E' necessario pe-  
vertire , che devesi porre il membro in r-  
varie positure , onde poter meglio rintrac-  
vera direzione della fistola stessa .

E' molto varia la prognosi , che deesi  
di questa malattia , dipendendo essa tanto d-  
se , le quali l' hanno prodotta , quanto dal  
che essa occupa . E chiaro p. e. che le fi-

gionate da carie dell' osso sottoposto devono essere accompagnate da massima difficoltà per la guarigione, quale per altro sarà sempre in rapporto colla specie dell' osso cariato, e sua situazione; che quelle le quali penetrano nella cavità del petto saranno di cura molto più difficile, che quelle dell' intestino retto; oltre di questo dobbiamo osservare, che le fistole essendo ulceri, come le altre, delle quali abbiamo parlato, nè essendo da esse diverse, che nella figura, debbono esser soggette alle medesime leggi tutte delle ulceri, e che quindi possono esistere delle fistole di natura scrofolosa, scorbutica, ventrea, erpetica etc. le quali saranno più, o meno curabili secondo la loro natura come abbiamo già di sopra esposto.

Siccome la cagione principale, che si oppone alla cicatrizzazione delle fistole si è la loro figura, ne siegue, che il principale oggetto della cura deve esser quello di cambiare la medesima, onde ridurre alla natura di ulcera semplice. Questa cura deve parimenti esser variata secondo le cagioni, e l' indole della malattia, e quindi alla cura locale sarà necessario unire la cura generale. Noi abbiamo già trattato di questa in altro luogo, quindi ci restringeremo ad esporre solamente la locale, che consiste nell' aprire il seno, o la fistola per tutta la sua lunghezza. I metodi proposti per procurare la guarigione delle fistole sono il caustico, la legatura, ed il taglio. Il caustico è ottimo per togliere la superficie callosa dell' ulcera; ma se la fistola sia molto profonda è poco efficace, ed inoltre è assai dolorosa. La legatura non può aver luogo, che nelle fistole, le quali hanno due aperture, giacchè allora si fa passare per ambedue un cordoncino di refe, o come alcuni consigliano di piombo, e si annoda stringendolo moderatamente ogni



## C A P O XVI.

## DELLE FERITE.

**D**icesi ferita in Chirurgia una soluzione di continuità nelle parti molli, recente con effusione di sangue fatta per mezzo di un istromento incidente, contundente, o perforante. La divisione delle ferite è varia secondo l'aspetto, sotto il quale desse si considerano. I punti principali, che debbonsi avere in mira nell'esame delle ferite sono la qualità della ferita, il pericolo, che essa porta, la parte, che offende, e finalmente il luogo, che dessa occupa. Riguardo alla qualità delle ferite dividonsi queste in semplici, ed in complicate. Le ferite semplici sono quelle, le quali niun altro fenomeno presentano, che la divisione delle parti. Convien peraltro osservare, che questa divisione può essere maggiore di quello, che sarebbe naturalmente quando venga reciso un muscolo attesa la contrazione delle fibre muscolari, oppure leggermente inciso anche l'osso, o che la ferita accompagnata sia da qualche altra indisposizione, lo che ha fatto dare da alcuni il nome di ferite composte a quelle di tal natura. Le ferite complicate poi mostrano non solo la divisione delle parti, ma eziandio un' altro oggetto qualunque da doversi avere in mira nella cura di esse. Questi sintomi, che accompagnano la ferita possono essere o generali come p. e. un vizio di umori, ovvero locali, come l'emorragia, la frattura dell'osso, la contusione, la presenza di un corpo estraneo etc. Variano le ferite ancora riguardo alla prognosi, e sotto questo punto di vista dividonsi le ferite in sanabili, pericolose, e mortali. Questa divisione molto interessante per la Chirurgia forense, e per le denunzie, porta seco molte altre suddivisioni p. e. le ferite sa-



nabili possono essere sanabili assolutamente, con deformità rimanente, e con riserva. Le ferite mortali sono o necessariamente mortali, ovvero mortali per se, o finalmente mortali per accidente etc. Riguardo alle parti offese merita molta attenzione questa divisione secondo la parte ferita, sia dessa cioè un muscolo, un tendine, un nervo, un'arteria, un viscere etc. Possono finalmente distinguersi le ferite riguardo al luogo, che desse occupano, considerando cioè le regioni del corpo umano, come il capo, il collo, il petto, e l'addome, divisione, la quale è la più comoda per un trattato elementare, e che noi adotteremo parlando delle ferite di ciascuna di queste parti, dopo che avremo parlato delle ferite in generale.

I sintomi generali, i quali sogliono accompagnare le ferite sono in primo luogo l'allontanamento delle parti ferite. Questo è maggiore, o minore secondo la direzione della ferita, e segnatamente se sia ferito un muscolo trasversalmente, nel qual caso la forza di contrazione delle fibre muscolari rende, come si è detto, la dilatazione della ferita molto più sensibile. Uno de' fenomeni più costanti delle ferite si è l'esito del sangue maggiore, o minore secondo i vasi offesi. Il sangue diminuisce gradualmente, e si coagula, al sangue succede il trasudamento di un siero sanguinolento, il quale tumefacendo i labbri della ferita viene a degenerare in un vero pus. A questa epoca si stabilisce una non equivoca suppurazione, la quale a poco a poco riproducendo della nuova carne viene ad effettuare la cicatrice. Non tutte però le ferite osservano questo corso, molte, e segnatamente le più semplici guariscono senza suppurazione, nascendo la riunione immediata dei labbri di esse qualora restino a mu-

tuo contatto in forza del succo linfatico emesso fra le labbra della ferita.

Non sempre però le ferite percorrono questi diversi stadj senza presentare de' sintomi pericolosi, i quali meritano l'attenzione del Cerusico riguardo al metodo di cura. Devesi in primo luogo esaminare se esista la contusione delle parti prossime alla ferita, ed allora queste ferite diconsi contuse, fra le quali annoveransi segnatamente quelle fatte da armi da fuoco, delle quali parleremo in appresso particolarmente. Le ferite possono essere ancora accompagnate da lacerazione delle parti, lo che ha luogo in quelle prodotte non tanto da un istromento incidente, e perforante, quanto da una rottura, o distrazione violenta delle parti. Le punture sono pure ferite, ma hanno de' caratteri particolari, che le distinguono da esse, recisamente per l'offesa de' nervi, o parti tendinose, che suole accompagnarle. Molte ferite sono eziandio seguite da perdita di sostanza, altre finalmente dall'introduzione di corpi estranei, segnatamente di palle di piombo, scheggie d'osso, e porzioni dell'istromento, il quale ha prodotto la ferita stessa.

Oltre questi fenomeni soliti ad accadere nelle ferite altri meritano particolare considerazione, e questi sono l'offesa delle parti interessanti, cioè i vasi, i nervi, i tendini etc. L'offesa de' vasi arteriosi segnatamente di un qualche calibro produce l'emorragia, che richiede dei rimedj istantanei, e così l'offesa de' nervi, tendini etc. può produrre il tetano sintoma mortale, e che esige tutta l'attenzione del Cerusico.

Secondo la varia distinzione, che abbiamo accennata delle ferite, secondo il luogo, che esse occupano, ed i sintomi, che l'accompagnano dovrà formarsi la prognosi delle medesime. Noi abbiamo



già di sopra accennato quali siano le distinzioni, che convengono alle ferite riguardo la prognosi, ma essendo tante varie le combinazioni, che possono accadere in questi casi non è possibile il dare delle regole generali su questo punto, dovendosi la prognosi regolare tanto secondo la parte ferita, quanto secondo la qualità della ferita stessa, ed i sintomi, che l'accompagnano. In occasione, che parleremo delle ferite in particolare avremo luogo di dare delle regole per la prognosi esatta di ciascuna di esse.

L'oggetto principale della cura delle ferite si è quello della loro riunione. Questa può succedere in due maniere, o cioè le parti divise si riuniscono immediatamente, e questa dicesi riunione per prima intenzione, e questo accade per la infiammazione delle parti; ovvero le parti divise non si riuniscono immediatamente, ma dopo infiammate suppurano, ed allora si genera della nuova carne, la quale viene a poco a poco a formare delle adesioni, che producono la cicatrizzazione della ferita. Varie sono le opinioni degli Autori sulla maniera, onde nasce la riunione della ferita in ambedue i casi, quello però può dirsi di certo si è, che in tutte le circostanze la riunione di due parti divise viene operata per mezzo di un processo, il quale ha molt' analogia con il processo di nutrizione, e quindi dee accadere una certa decomposizione nelle parti divise sia che la riunione nasca per prima intenzione, sia che dessa abbia luogo per seconda intenzione. E' poi ormai dimostrato, che nella riunione qualunque i vasi non si riuniscono mai insieme, nè si riuniscono nel luogo reciso, e quindi non può sostenersi la riunione di una parte affatto divisa, essendo in questo caso



una delle due porzioni incapaci di formare il processo necessario.

Passiamo ora ad esporre i mezzi, che adopera il Cerusico per ottenere la riunione delle ferite, ed in questa conservarle per entrar dopo a trattare della cura de' più rimarchevoli sintomi, che l'accompagnano, ed il modo di prevenire quelli, che disturbar potrebbero le forze della natura, che tende alla cicatrizzazione. Il primo oggetto, che dee avere il Cerusico nella cura di ogni ferita si è quello di conoscere la sua profondità, e le parti, che dessa interessa, ed in sostanza tutto ciò, che può influire sul metodo di cura da adottarsi. L'esame oculare, e quello del tatto somministrerà facilmente per mezzo delle cognizioni di Anatomia un'idea esatta della qualità della ferita, e delle parti offese; se la ferita è alquanto profonda, la sua direzione sia obliqua, sarà necessario far uso dello specillo per rintracciare la figura della medesima. Lo specillo dee essere di argento piuttosto, che di acciaio, bottonato in cima, e flessibile, deesi poi avvertire nell'introdurlo di tenerlo alquanto lento nella mano, onde possa prendere i movimenti necessarj per adattarsi alla figura della ferita, e non formare delle false strade. Inoltre conviene introdurre lo specillo a poco a poco, e delicatamente per non offendere troppo le parti di recente recise, e non accrescere il dolore al paziente, segnatamente se vi è offesa di nervi, come ancora per non far nascere emorragia forte, cosa facile ad accadere se si urtino troppo violentemente le parti offese,

Qualora la ferita sia semplice, ovvero non presenti sintoma alcuno, il quale meriti una indicazione particolare potrà il Cerusico procurarne la riunione per prima intenzione. Gli oggetti da aversi in mira nella cura con questo metodo sono di te-

per se solo poche volte è sufficiente per la riunione della ferita è utile, anzi necessario unito con de' tre mezzi seguenti, cioè la fasciatura, il cerotto adesivo, o sia la sutura secca, e la sutura cruenta. La fasciatura consiste in una fascia, la quale sta intorno al membro ferito, e dopo si fa passare uno de' capi in un' apertura fatta nell' altro, e così stringendola vengonsi a mantenere in posto i labbri della ferita. Questa fasciatura differisce a differenza di un'altra detta espulsiva, che consiste in una fascia rotolata intorno al membro ferito. Queste fasciature oltre l'essere sole insufficienti a procurare la riunione della ferita, hanno molti inconvenienti, e segnatamente di coprire in modo la ferita, che non possono conservarsi senza togliere la fasciatura, e quindi il mezzo, che ne procura la riunione.

Il cerotto adesivo è il secondo mezzo per tenere unito le parti recise. Questo consiste nell'applicare un poco di ceroto diapalma, diachilon, o simile sopra una pelle, o un pezzo di tela, e di fissare le estremità delle liste più strette nel mezzo, e di applicarle da una parte e dall'altra.

degli inconvenienti, cioè di non potersi adoperare in tutte le parti, come ancora di tenere a contatto soltanto la superficie esterna della ferita, senza procurare la riunione delle parti più profonde. Questo inconveniente, che alle volte può produrre del ristagno di materie nella cavità interna della ferita può prevenirsi ponendo le liste di ceroto in modo, che lascino un piccolo spazio fra i labbri esterni della ferita, pel quale possono passare quelle materie, che se restassero nella cavità interna della ferita ne impedirebbero la riunione.

La sutura cruenta consiste in una cucitura delle parti fatta per mezzo di aghi, e filo, metodo, il quale come doloroso, e causa di irritazione dovrà risparmiarsi per quanto è possibile, nè adoperarlo, che in caso di necessità, e dove non possono le parti recise tenersi a contatto con altro mezzo. La sutura cruenta viene eseguita con l' ago di acciaio curvo, e non solo puntuto, ma tagliente ne' lati. Il filo deve essere di due, o anche più fili insieme, ed incerato, e di figura piatta, e non rotonda. La sutura è di varie specie, le principali di esse sono la nodosa, o intercisa, l' incavigliata, l' attortigliata, quella de' pellicciaj, e quella a filsetta. Siccome avremo occasione di parlarne in dettaglio delle tre ultime trattando delle operazioni, nelle quali esse convengono, descriveremo qui soltanto le prime due, cioè la nodosa, e l' intercisa o incavigliata. La sutura nodosa si fa passando l' ago dal di fuori all' indentro in un labbro della ferita, ed indi nell' altro labbro dal di dentro all' fuori, e stringendo indi i due fili con un nodo. Si daranno tanti di questi punti quanti sono cessarj per la lunghezza della ferita. I punti debbono esser distanti dalla ferita per impedire la cerazione de' suoi bordi, ed inoltre dovrà ajut-



la forza de' punti ponendo delle liste di cerofra i medesimi. La sutura poi incavigliata si fa alla stessa maniera, che la nodosa, con la differenza, che invece di passare un solo filo ad ogni punto se ne passano due, ed invece, che essi venivano annodati sulla ferita si annodano da ogni parte sopra un cilindretto di tela spalmata di ceroto, parallelo alla ferita stessa.

Qualunque di questi mezzi si scelga per tenerla a contatto le parti divise onde ottenere la riunione per prima intenzione è necessario prevenire l'infiammazione coi mezzi adattati, cioè il riposo, la dieta, le bevande, ed anche i salassi se la natura della ferita li richieda, il temperamento del paziente li renda necessarj.

Riguardo al secondo metodo di ottenere la riunione delle ferite, o sia quello detto per seconda intenzione, distinguonsi in esso due periodi, quello cioè dell' infiammazione, e quello della suppurazione. Il Cerusico non ha altro, che fare in questi casi, che secondare l' opera della natura, e toglie gli ostacoli, che potrebbero impedirla. Nel primo periodo quindi dell' infiammazione dee si riempire la ferita con delle sfilas asciutte, o imbrattate d' unguento rosato etc. fasciare la parte, e porla in adatta situazione, e ad una temperatura piuttosto calda specialmente nell' inverno. Si dovrà ancora adoperare il regime antiflogistico, ed una dieta conveniente. Nel secondo periodo poi si medicerà la ferita colle semplici sfilas asciutte per rianimare la facc azione de' solidi, e rinnovandole spesso subito, che si formano le marce, procurando, che resti essa meno, che sia possibile al contatto dell' aria. Se tuttociò non basta per risvegliare la sensibilità della piaga potrossi unire alle sfilas un leggiero irritante. Le forze del malato debbono essere soste-

nute con regime corroborante per animare la necessaria azione del sistema vascolare. In questo metodo si va a poco a poco riempendo di nuova carne, e granellosa, la quale nella vegetazione del reticolo capillare, e tura è puramente cellulosa, per lo che si abbonda, la cicatrice si forma più solida. Se la nuova carne sia di natura cattiva, e fungosa, ed il suo colore dilavato si sarà cogli escarotici. Riguardo ai mezzi di curarsi nella suppurazione, e nel caso, che si forma un'ulcera, e rendersi callosi in una piaga ne abbiamo già trattato parlando della purazione, e dell'ulcera.

Resta ora, che prima di entrare a parlare delle ferite delle diverse parti diciamo qualche cosa sopra alcuni sintomi, i quali accompagnano le ferite, e che richieggono una qualche cura nella cura. Primieramente le ferite non esser contuse. Qualora la ferita sia prodotta da un corpo, il quale non sia soltanto, ma ancora contundente, essa ha all'incirca le parti quasi morte per cagione della pressione. In queste particelle debbono separarsi per la suppurazione. In queste ferite non aver luogo la riunione per prima intenzione è necessario impedire una violenta infiammazione coi metodi già indicati, incidendo anche le mortificate, e segnatamente se vi sia un'arteria ferita, o un osso fratturato, o delle scheggie, o per rialzarlo, essendo così. In generale la suppurazione di queste ferite esser molto abbondante, e quindi esser necessario temere la debolezza del paziente, e stentare di mantenerne le forze coi rimedj.

segnatamente la china, il vino, il vitto nutriente etc.

Le ferite possono esser lacerate, ossia prodotte da una violenza esterna, che stacca subitamente, e totalmente qualche parte del corpo, come p. e. un dito, un braccio, una gamba etc. L'emorragia è alle volte in queste ferite di poco momento, anche ne' vasi di qualche calibro sia per la costrizione in seguela della distrazione, che hanno sofferto, sia per lo spasmo, e compressione de' muscoli lacerati, e contratti, che esercitano sopra di essi. Alcune volte possono accadere delle lesioni di continuità in certe parti senza violenza esterna, come p. e. nel tendine d'Achille, nel ligamento della rotula, e nel tendine degli estensori della gamba etc. quali di sovente sogliono terminare felicemente col solo aiuto della situazione, e fasciatura alquanto compressiva, che si estenda a quasi tutto l'articolo, con cui si obbliga la parte ad avvicinarsi più, o meno nel punto, dove si è separata. Le ferite di cui parliamo, non potendosi medicare per prima intenzione, debbono necessariamente suppurare accadendo una specie di disorganizzazione nelle parti, quindi dovranno esse curarsi per seconda intenzione a tenore dei metodi esposti.

Se le ferite siano profonde, ma con apertura stretta, e prodotte da istromento acuto, e perforante diconsi punture. Qualora queste ferite siano semplici possono curarsi per prima intenzione essendo molti casi di felice riuscita, ma presentano desso più spesso, che le altre de' gravi sintomi, come l'offesa di un nervo, o tendine, della difficoltà dell'esito del sangue, o della esistenza di un corpo estraneo. In questi casi è necessario curare di diminuire l'infiammazione col regime antilogistico, e coll'amministrazione dei sedativi,



e dilatare ancora se sia di bisogno la ferita, ed indi procurarne la suppurazione. In appresso daremo i precetti da osservarsi nell' offesa de' nervi, che spesso accompagna le punture.

Qualora poi la ferita sia accompagnata da perdita di sostanza prodotta da istromento, che stacchi porzione di un membro, o altra parte, le parti staccate difficilmente possono riunirsi se pure non siano ben piccole, e non vengano riposte in sito con molta sollecitudine, non è però tanto difficile la riunione di una parte staccata soltanto in una porzione. Il tutto dipende dalli vasi, che restano intieri, i quali se siano di sufficiente diametro possono mantenere la comunicazione nella parte recisa. Se la parte staccata affatto non possa riunirsi si riuniranno le parti vicine, e se ciò neanche sia possibile si procurerà una buona suppurazione della medesima per mezzo della quale si rigeneri una nuova sostanza, che supplisca a quella perduta. E' qui però da osservarsi, che questa riproduzione non si eseguisce in tutti i punti del corpo umano nella stessa maniera, ed in alcune non si eseguisce affatto.

I corpi estranei, i quali rimangono nelle ferite meritano una particolare attenzione per parte del Cerusico pel dolore, ed irritazione, che producono, e perchè si oppongono alla riunione della ferita. E' quindi necessario di assicurarsi della presenza di questi corpi qualora se ne abbia un qualche sospetto dalla natura de' sintomi, o dalla qualità dell' istromento, che ha prodotto la ferita. Riconosciuta l'esistenza del corpo estraneo, ed assicuratosi il Cerusico del luogo, dove esso esiste è indispensabile il farne l' estrazione per mezzo della pinzeta o altro istromento adattato dilatando ancora la ferita se l' angustia della medesima impedisca di farne commodamente l' estrazione. La positura del

parte è necessario, che sia presso a poco la medesima, che teneva nel momento, che fu ferita, avvertendo però di non irritare troppo la parte offesa, onde accrescerne l'infiammazione, e la suppurazione.

Oltre i fin quì accennati sintomi, i quali possono rendere complicata la natura della ferita, due ne esistono, che meritano somma attenzione; cioè l'offesa de' grossi vasi, e nervi producendo queste l'emorragia, ed il tetano. L'emorragia sia primitiva, o consecutiva va subito arrestata qualora sia violenta. Le emorragie alcune volte fermansi da se medesime, ma qualora ciò non succeda dovrà porsi in opera uno de' mezzi, che ci somministra la Chirurgia, cioè la compressione, gli astringenti, la legatura, ed il caustico. Noi abbiamo già parlato di questi metodi in occasione, che abbiamo trattato dell'aneurisma. e quindi non è necessario molto fermarci su i medesimi. La compressione si pratica per mezzo del tornichetto, ma dessa richiede un punto fisso, su cui appoggi l'arteria, ed inoltre è necessario, che la compressione venga esercitata sulla sola arteria senza comprimere i nervi, ed i vasi laterali, onde non resti impedita la circolazione. Gli astringenti, come l'acqua fredda, l'allume, il vitriolo, l'ammoniaca etc. stimolano i vasi, e ne producono il restringimento. Questi rimedj vanno applicati con delle stuelle di sfilà sulla ferita stessa, ma non sono di utile, che nell'offesa di vasi molto piccoli. Molto più vantaggiosa è poi la legatura, che consiste nel passar l'ago curvo sotto il vaso con un filo, e formando una legatura al di sopra della ferita se il vaso sia intieramente reciso, ovvero due legature una al di sopra, ed una di sotto alla ferita se il vaso sia reciso soltanto in parte. Questa operazione è molto



analoghi a quelli prodotti dallo stravasamento del sangue nella cavità interna del cranio, nulladimeno ne abbiamo alcuni, che possono farla distinguere dal medesimo, cioè nella commozione la respirazione è libera, e facile, e nello stravasamento è profonda, e difficile, e simile all'apoplessia, così ancora il polso si rende molle, ed eguale nel primo caso, ed una ineguaglianza accompagna indispensabilmente lo stravasamento. I sintomi prodotti dallo stravasamento del sangue nella cavità del cranio dipendendo dalla compressione, che questo fluido esercita sul cervello non possono esser guariti secondo alcuni Scrittori, che dando esito al fluido contenuto per mezzo della trapanazione. Una delle grandi difficoltà però, che qui si presenta, si è di conoscere esattamente il luogo, dove esiste lo stravasamento. La paralisi di uno de' lati del corpo, o di una delle estremità indica, che lo stravasamento è dalla parte opposta, ed esistendo questo sintoma potrà sperimentarsi prima di tutto il salasso dalla jugulare del lato opposto a quello affetto da paralisi, e secondo l'effetto prodotto dal primo salasso potrà il Professore regolarsi se debba essere più volte ripetuto. Al salasso potrà anche unirsi l'uso degli emetici, il bagno freddo alla testa, allontanando per quanto si può la trapanazione, che da molti Autori ragionevolmente si esclude nello stravasamento di sangue sotto il cranio per ragioni che in altro luogo esporremo. Le parti interne della testa possono eziandio infiammarsi, e suppurare nel caso di ferite del capo, e questo è un sintoma molto pericoloso. Queste infiammazioni, o suppurazioni possono aver luogo o fra il cranio, e la dura madre, o fra le meningi stesse. La febbre, i polsi duri, il delirio, la paralisi, l'emiplegia, e spesso la morte sono gli effetti di questa infiammazione, e si osserva in tali casi ancora un peggioramento nella fe-



esterna. **P**er la cura di questa infiammazione richiede il metodo antiflogistico proporzionato alla gravità della malattia, ed al temperamento del paziente. Le ferite della testa sogliono spesso essere accompagnate da malattia de' visceri dell' addome, e segnatamente del fegato. Per ispiegare questo consenso sono ricorsi i pratici all' afflusso del sangue nelle parti inferiori prodotto dalla resistenza, che trova nelle parti superiori, ovvero al rapporto esistente fra il cervello, ed il fegato per mezzo de' nervi, e finalmente i più moderni alla commozione, che partecipa anche il fegato nella commozione del cervello, come il viscere più grosso, e più pesante, che gli altri; ma quest' ultima opinione non può essere verisimile che nelle ferite sul capo prodotte da cadute fatte da un'altezza notabile.

Tutti i sintomi fin qui riportati possono accompagnare non solo le ferite del capo, e segnatamente quelle prodotte da istrumento contundente, o da una caduta, nella quale il capo percuota contro un corpo duro; ma ancora le altre offese della testa prodotte parimenti da colpi violenti, o cadute sulla medesima quantunque non accompagnate da ferita; un sintoma però ch'è dipendente dalle ferite della testa esclusivamente si è la ferita del cervello, la quale non è che rare volte curabile, dovendo essere ben superficiale, e non unita ad altri sintomi pericolosi. Abbiamo per altro degli esempi di perdita di una porzione della sostanza del cervello terminata con la guarigione. Siccome nelle ferite del cervello esistono frequentemente de' corpi estranei, e particolarmente de' pezzi d'osso, la cura deve essere di estrarli, altrimenti irritando il cervello producono una suppurazione di mala qualità, ed anche fanno uscire porzione della sostanza corticale del medesimo dall'apertura dell'

osso, e costituire ciò che dicesi tumore del cervello, o *Encefalocele*, il quale recidersi con uno stromento tagliente e in seguito dell'essenze balsamiche, con terebinto, ed una leggiera compressione, deve reprimersi. Deve poi il Cerusiere, che le marce abbiano un esito sufficiente non possano fermarsi nella cavità del cranio.

Oltre le ferite del cranio meritano alcune altre ferite del capo, e segnatamente della faccia. Il primo oggetto in esse è quello di procurare di rendere la cicatrice parente, che sia possibile, ma oltre questo generale meritano rimarco speciale alcune ferite per i sintomi, che producono, per esempio il nervo frontale producono spesso l'amaurosi in queste è miglior partito riunirle, se è possibile per prima intenzione, ed evitare la suppurazione. Le ferite de' seni frontali anche se si è perduta una porzione della lamina ossea esterne non sono difficili a guarirsi segnatamente se non si è lacerata la membrana interna, e si abbia l'avvertenza di strarare tutti i pezzi d'osso, che potreste rimasti. Nelle ferite delle palpebre si deve badare, che la cicatrice produca meno deformità che si può, molto più se la ferita sia stata lacerata onde restino recise le fibre del muscolo bicolare acciò la palpebra rimanga della forma naturale, e questo si ottiene riunendo la ferita per mezzo della sutura, e se è necessario anche della cruenta. Le ferite degli occhi richiedono la pronta riposizione uscite dalla ferita, coprire il globo esatto delle palpebre, e dopo applicare una compressa bevuta in qualche leggiero attonante. Le ferite si riuniscono mediante la sutura.

quale però non deve comprendere la cartilagine . Lo stesso dicasi delle ferite del naso , il quale si riunisce benissimo anche senza sutura , ma nel caso la ferita sia grande sarà d'essa necessaria , avvertendo sempre di comprendere in essa i soli integumenti . Le ferite dei labbri , e della lingua difficilmente guariscono senza sutura cruenta , la quale sarà adattata alla parte ferita .

Fra le ferite del collo sono particolarmente da riguardarsi le ferite de' grossi vasi , quelle de' nervi , le ferite della trachea , e quelle dell' esofago . Le ferite de' grossi vasi del collo sono mortali , ed ordinariamente portano la morte del malato prima , che arrivino a tempo gli ajuti dell' arte , attesa la grave emorragia , che producono . La legatura di questi vasi è molto difficile , ed in oltre l' esito della medesima è molto incerto . Noi abbiamo degli esempj di ferite de' vasi grossi del collo guarite con la compressione . I varj stromenti inventati a quest' effetto sono poco utili , e spesso riescono dannosi , quindi il miglior metodo di praticare la compressione si è quello di comprimere la parte ferita con la mano . Non mancano degli esempj di allacciature dei vasi grossi arteriosi del collo seguite da esito felice .

Le ferite dei nervi del collo sono principalmente quelle dell' intercostale , del par vago , dei ricorrenti , alle quali può aggiungersi ancora l' offesa della midolla spinale . Riguardo alle ferite dell' intercostale , e del par vago essendo questi nervi doppij , e rimanendone uno intatto possono le funzioni de' visceri del petto , e del basso ventre continuare in qualche modo , sebbene la recisione di uno dei due nervi non lasci di portare de' notabili disordini nelle parti dal medesimo dipendenti . I nervi ricorrenti recisi portano la perdita totale , o par-



ziale della voce secondo che ambedue i nervi siano stati tagliati, ovvero uno solo di essi. Molti Autori pretendono, che possano questi nervi riunirsi, come anche il par vago, e ristabilirsi in certo modo le loro funzioni. Se poi la ferita sia nella midolla spinale, o essa venga recisa, ne siegue la morte del malato. Qualora la midolla sia semplicemente punta, oltre l'infiammazione, che ha ordinariamente luogo nasce anche la convulsione, la febbre, il dolore acutissimo, e finalmente la paralisi delle estremità, e di tutte le parti sottoposte al luogo della ferita. Il metodo da usarsi in questi casi consiste nella cura antiflogistica, nel togliere qualunque stimolo possa irritare la parte, e praticando gli antispasmodici.

Le ferite della trachea portano seco la perdita della voce, attesa l'uscita dell'aria a traverso della ferita, se poi la ferita non corrisponda direttamente a quella de' comuni tegumenti ha luogo l'enfisema. Il metodo da usarsi in queste ferite qualora siano semplici, o non siano accompagnate da emorragia, o enfisema è molto semplice, e consiste nel procurarne la riunione per prima intenzione, riunione la quale è più facile quando la trachea è ferita perpendicolarmente, di quello che quando essa è ferita trasversalmente. Se poi vi esista una complicazione, e segnatamente una emorragia, non devesi subito procurare la riunione della ferita, giacchè ne potrebbe nascere l'effusione di sangue nella cavità stessa della trachea, lo che porterebbe seco delle gravi conseguenze, ma devesi invece procurare di arrestare l'emorragia, e lasciare aperta la ferita, acciò il sangue abbia un esito libero. Le ferite della laringe sono poi molto più pericolose di quelle della trachea.

Se la ferita della trachea è semplice si ottiene la riunione di essa con delle liste di ceroto ade-

ivo, procurando però, che per qualche tempo la testa resti inclinata in avanti, al quale oggetto si potrà contenere in questa posizione con un' adattata fasciatura. Essendo la ferita estesa molti Autori consigliano di riunirla per mezzo di alcuni punti di sutura; siccome però questo produce gravi inconvenienti, e non riesce all'oggetto, che si propone il Cerusico, viene al presente poco anzi non usato, ma si contentano i migliori pratici di servirsi della sutura per i comuni tegumenti, la quale molto contribuisce alla riunione della ferita della trachea. Se poi questa sia stata tagliata in tutta la sua circonferenza, per lo che imminente minaccia al malato la soffocazione, oltre i mezzi indicati si potrà usare una cannula elastica, la quale s'introduce dalla laringe per evitare, per quanto si può, la soffocazione mantenendo in rapporto le due estremità della trachea recise. Per rimediare all' enfisema, siccome questo dipende dal non essere le due ferite corrispondenti, cioè quella della trachea, quella de' comuni tegumenti, col dilatare questa seconda, se il bisogno lo richieda, viene per se stesso a diminuire l' enfisema, anzi spesso guarisce da se medesimo.

La peggior conseguenza delle ferite della trachea si è la fistola, che in seguito vi rimane. Quando questa sia semplice se ne può ottenere la guarigione coi mezzi, che si adoperano per la cura delle altre fistole; ma se esiste perdita di sostanza, o denudamento di cartilagine, sarà necessario nel primo caso supplirvi con qualche corpo, che chiuda l'apertura, e nel secondo caso dovrà attendersi l'esfoliazione delle cartilagini, non essendo altrimenti possibile ottenere la cicatrice della fistola.

L' Esofago può esser ferito separatamente, o insieme con la trachea, carotidi primarie, vasi ju-



cioè il sangue è spumoso, ed il malato sputa sangue, o lo rigetta in quantità, e si osserva inoltre l'aria uscire, ed entrare dalla ferita. Nel momento della medesima il malato è sorpreso da sincope, con sudori freddi, ed il polso diventa piccolo, celere, ed irregolare. Dopo qualche tempo la respirazione diviene affannosa, è l'ispirazione più facile, che l'espiazione, ed il malato resta coricato più volentieri dal lato, in cui esiste lo stravasamento, per non impedire la dilatazione della porzione sana del petto, e per poter respirare meglio, è obbligato ancora a curvarsi anteriormente, ed oltre di questo prova un senso di peso, ed un dolore acuto nella parte inferiore dello sterno con tosse violenta. Questi sintomi però possono sussistere anche senza lo stravasamento: ma quello che può dar molto lume in questi casi si è, che quando gli accennati sintomi, e segnatamente la soffocazione è prodotta da infiammazione del polmone, i medesimi si dissipano facilmente sotto l'uso de' salassi, e del regime antinfiammatorio, lo che non accade quando i detti sintomi siano causati dallo stravasamento nella cavità. Di più si può aggiungere all'indicati segni, il rilievo dell'ipocondrio, la dilatazione delle coste, ed il rumore sordo, che sentesi dalla percussione del petto sul lato dello stravasamento. Può ancora questo dipendere dalla ferita dell'arteria intercostale senza che sia offeso il polmone; ma allora i segni sebbene siano molto analoghi a quelli riportati, pure mancando quelli propriamente caratteristici dell'offesa del polmone stesso non sarà difficile la diagnosi. I sintomi della suzione de' polmoni, e dello stravasamento di marcia la cavità del petto non differiscono da quelli stravasamento sanguigno, che nelli segni di suppurazione che sono principalmente la febbre suppuratoria.



viene con freddo, e termina con sudore, un' apparenza di edema etc.

Le ferite del petto penetranti nella cavità sono molto pericolose, e segnatamente quelle, che offendono il polmone stesso, giacchè in questi casi ordinariamente il paziente muore dopo poco tempo, ovvero muore di una suppurazione del polmone. I due pericoli maggiori, che possono aver luogo nelle ferite del petto penetranti sono l'emorragia, e la tisi polmonare. L'emorragia è sempre grave succeda essa all'esterno, ovvero all'interno della cavità. Non mancano però degli esempj di persone guarite felicemente sebbene fosse stato ferito il polmone, ma ciò generalmente osservasi soltanto nelle ferite non molto profonde, e nelle persone giovani, e di buon temperamento, nè soggette ad alcun vizio di macchina. Le ferite penetranti senza offesa del polmone non sono di un tal pericolo ma conviene distinguerle secondo la natura delle parti offese. Le ferite del cuore, e vasi grossi sono assolutamente mortali; abbiamo però qualche caso, nel quale la morte è accaduta alcune ore, ed anche alcuni giorni dopo la riportata ferita, e così ancora mortali saranno le ferite del dotto toracico, e dell'esofago nella cavità del petto. Gli esempj, che vengono da qualche Autore riportati, e che si oppongono a questa opinione, debbono piuttosto considerarsi come casi fortunati, e rarissimi, di quello che come eccezioni alla regola generale.

Il metodo, che conviene alle ferite penetranti del petto è l'ordinario, che abbiamo esposto trattando delle ferite in generale, avuto però sempre riguardo al viscere offeso. In primo luogo deve il medico assicurarsi della qualità della ferita, e delle parti offese, e sintomi, che l'accompagnano. A quest'oggetto adoperasi lo specillo, ma devesi con-

fessare , che questo stromento è insu conoscere la qualità della ferita , ed è spesso pericoloso , giacchè può lo spedere delle parti , che non sono state fe venire arrestato da altre parti , che si nella respirazione , o ne' movimenti della senza che esso arrivi al fondo della fe

Conosciuta dunque dai segni indic ra della ferita dovrà medicarsi con l' che è offesa una parte , che facilmente fiammazione , ed in suppurazione , il devesi per quanto è possibile evitare , e il sistema di cura deve esser diretto a r metodo antiflogistico è quello , che va u renza , quindi i salassi , gli emollienti ta . Questi rimedj anderanno moderati gravezza della ferita , e segnatamente seco ragia . Il riposo , la quiete , e le bibite no mezzi necessarj ad ottenere l'intento lo poi appartiene alla ferita stessa deve carsi al più presto possibile , per impe tto dell' aria , e la medicatura deve e ce , e superficiale con delle compresse ,

Questo è quello appartiene in gene ra delle ferite del petto , ma questa cura variata secondo i sintomi particolari , cl pagnano . Se le ferite del petto siano adopererà il metodo esposto parlando in genere . Se siano penetranti , ma senza parti contenute sarà ancora bastante lo ma adoperando per altro le cautele nece de non abbia ad aver luogo , o l' ingresso nella cavità , o l' ernia del polmone , e to al sangue , o aria , che potesse esser Se poi sarà ferito il polmone richiede l maggiore attenzione . Questa ferita , al

conoscersi in primo luogo dall'osservare, che la ferita è penetrante, e dal vedere uscire il sangue spumoso, mentre che il malato nello stesso tempo spugna il sangue con tosse. Queste ferite non sogliono produrre emorragia forte, eccettuato solamente, che queste sieno molto grandi, ed in questo caso il sangue, che esce dalla bocca è ancora in quantità, l'aria sorte con forza dalla ferita, e può formarvi sì l'enfisema, se l'aria s'insinui nella cellulare. Le ferite dei polmoni sono pericolosissime, giacchè alcuni muojono dopo pochissimo tempo, altri muojono per la suppurazione de' polmoni, se però la ferita sia leggera non mancano degli esempj di un esito felice.

Il primo oggetto d'aversi in mira nella cura delle ferite del polmone si è quella d'impedirne la suppurazione, e quindi tutta la cura deve consistere nel risolvere l'infiammazione, trattando il malato come se fosse attaccato da una peripneumonia. Il metodo quindi adattato sarà l'antiflogistico, consistente ne' salassi, dieta esatta, bibite, e nella somma quiete.

Le ferite penetranti nel petto possono ancora offendere il cuore, ed i vasi grossi. Queste ferite, come abbiamo esposto, sono assolutamente mortali. In esse ordinariamente accade la morte prima che abbia avuto tempo il Professore di applicare alcun rimedio, ma quando anche la malattia è qualche ora, o giorno di tempo poco sarà in opera, salvo che tenere il malato in una dieta, e produrre una tale debolezza di forze, essendo diminuita l'azione del cuore, e le arterie, nè possa più il sangue essere spinto per la ferita, dia luogo a formarsi un grugnigno, che a poco a poco ne renda possibile la cicatrice. Quindi sebbene il malato presen-



ti un grado di debolezza molto grande, non è regola di ajutare le forze con degli attonanti, o cordiali, che altro non farebbero, che accrescere l'impeto del sangue, ed accelerare la morte del paziente.

L'enfisema nasce ordinariamente dal non essere la ferita de' comuni tegumenti parallela, e corrispondente a quella del polmone, ed in questo caso l'aria, che esce dal medesimo ad ogni espirazione, non potendo avere libero egresso per la ferita esterna, s'infiltra nella cellulare, l'enfisema cresce continuamente, e può produrre ancora de' funesti accidenti, se non vi si rimedi a tempo. Il principio da aversi in mira a riguardo di questo sintoma consiste nell'impedire il nuovo ingresso dell'aria nella cellulare, e nel procurare di dar esito a quella, che ci si è introdotta, lo che si ottiene rendendo parallele le due ferite, o sia dilatando la ferita esterna, e nello stesso tempo praticando delle piccole incisioni sulle parti tumefatte, acciò possa avere un'esito libero l'aria contenuta.

Può ancora nelle ferite del petto se siano molto estese escire una porzione del polmone dalla ferita stessa. In questo caso sarà necessario farne subito la reposizione qualora il polmone sia sano, ma se principj a cancrenarsi potrà recidersi la porzione cancrenata, avvertendo però di non prendere per cancrena il color livido del polmone prodotto dallo strozzamento, che è cagionato dalla ferita: succede spesso, che il polmone si gonfia fuori della ferita in modo tale, che non può rientrare nella cavità, allora è necessario dilatare la ferita stessa, onde farne la reposizione.

La ferita dell'arteria intercostale porta seco una abbondante emorragia, e qualora dessa accada nella

cavità del petto può dar luogo ad uno stravaso mortale. L'emorragia prodotta dalla ferita dell'arteria intercostale, distinguesi da quella nata dalla ferita de'vasi del polmone, principalmente perchè nell'emorragia dell'arteria intercostale il sangue scorre senza interruzione, ed ugualmente nell'espiazione, che nella ispirazione, oltre di che non è nè spumoso, nè mescolato con aria. Questa emorragia deve arrestarsi per mezzo della compressione, per lo che è spesso necessario d'ingrandire la ferita esterna. I metodi per ottenere questa compressione sono varj, il più usato consiste nell'applicare delle sfilabagnate anche con qualche astringente, e spirito-so, e contenute in un pezzo di tela sottile, ed introdotte queste per mezzo di una tantola, mantenerle in sito con adattato apparecchio. Questa compressione può per altro anche farsi per mezzo di una lamina d'acciajo piegata, onde possa adattarsi a comprimere l'arteria sulla costa. Introdotta una estremità di questa nella ferita si tiene l'altra estremità fissata al corpo con una conveniente fasciatura, onde formando essa una specie di leva viene a comprimere l'arteria ferita. Oltre il metodo della compressione alcuni consigliano anche di allacciare l'arteria, al qual oggetto sarà necessario spesso dilatare la ferita, quindi poter introdurre il dito, e lo stromento consistente in un ago crunato fornito di refe, con cui si lega l'arteria sulla costa. Ma questo metodo riesce di frequente difficile, e pericoloso per l'offesa delle parti delicate contenute nel petto, che di sovente non si può evitare. Altri consigliano se l'arteria sia soltanto a parte ferita di reciderla intieramente, e questo metodo è riuscito frequentemente utile per fermar l'emorragia.

Nelle ferite del petto può essere ancora offe-



so il diaframma. Le ferite del centro tendinoso di questo muscolo sono mortali assolutamente, ma non lo sono poi quelle della parte muscolare del medesimo. I segni delle ferite accennate sono la difficoltà di respiro accompagnato da dolore acuto, corrispondente al luogo, dove si attacca il diaframma, sentimento di ritrazione de' visceri dell'addome verso la spina, motivo per cui i malati sono obbligati a restare curvati in avanti, vomito, tosse, e singhiozzo, che va continuamente crescendo fino alla morte del malato, che accade in poco tempo. Si hanno degli esempj di guarigioni di tali ferite, ma rimane sempre un'apertura, che da passaggio nel petto ai visceri dell'addome.

Lo stravasato di sangue, o di marcia nel petto è una conseguenza pericolosa delle ferite di detta parte, molto più che la diagnosi non è in questi casi delle più facili. Quando però secondo i segni, che abbiamo di sopra accennati riconoscesi realmente lo stravasato esistere nella cavità, sarà necessario procurare l'esito del fluido contenuto per impedire la soffocazione del malato, che ne seguirebbe necessariamente. Se lo stravasato sia di sangue si procurerà di dargli esito obbligando il malato a giacere sul lato ferito, e dilatando la ferita se sia troppo angusta, come ancora facendo una contro apertura, se la ferita resti nella parte superiore del petto senza venire alla pratica delle sciringhe a tubo ricurvo, le quali non apportano quel vantaggio, che da qualcuno si pretende. Così ancora, ci sembra necessario il riflettere sulle iniezioni tiepide da farsi nel petto in caso di sangue addensato. Ma dato esito al medesimo, e tolta per conseguenza la pressione, che desso esercitava sul polmone viene a rinnovarsi l'emorragia, che è spesso mortale, quindi non deesi evacuare il sangue stravasato



che nel caso, che si abbia il fondamento di credere, essere cessata l' emorragia, non solo dal tempo trascorso dall' epoca della ferita, ma eziandio dal ritorno del calore all' estremità, dal rialzamento del polso, dalla diminuzione del dolore etc. S' introduce poi nella ferita una stuella di sfilà, che si tiene in sito con una compressa. La ferita viene a suppurare, ma ne' primi giorni continua il polmone ad essere in uno stato infiammatorio. Dell' operazione conveniente per dar esito al sangue contenuto nel petto ne parleremo a suo luogo.

I stravasi di marcia possono formarsi o nel mediastino, o fra la pleura, ed i muscoli intercostali, o fra il polmone, e la pleura, o nel cavo del petto. Riconosciuta l' esistenza del pus è necessario far l' evacuazione per mezzo dell' operazione. Se si attenda qualche tempo prima d' istituirla si corre rischio di dar luogo ad una tisi polmonare. Spesso in occasione di raccolta di pus prodotta da ferita del petto, resta una fistola nel luogo dell' offesa, ch' è necessario dilatare.

Le ferite dell' addome presentano come quelle del petto la stessa divisione in penetranti, ed in non penetranti. Le ferite penetranti nel basso ventre possono essere ancora semplicemente penetranti, o complicate con l' offesa de' visceri contenuti.

Le ferite non penetranti non sogliono essere accompagnate da gravi sintomi trattone il caso di offesa della linea alba, o dell' aponeurosi de' muscoli dell' addome, giacchè allora producono dolori forti, febbre, delirio, etc. e tutti i sintomi di forte infiammazione, e richiedono in quel punto il metodo antinflogistico. Inoltre se la ferita sia larga è necessario, che il paziente conservi sempre la situazione data per tenere in rilasciamento i muscoli addominali. La ferita si riunirà per mezzo de' cer-

ti adesivi , e se è necessario ancora con qualche punto di sutura , ed appropriata fascia , indi se ne sostituirà un'altra più adattata dopo la guarigione , per impedire un'ernia nel punto , della ferita , di molto indebolito . Queste ferite se siano semplici guariscono ordinariamente con molta facilità , ma se offendono le parti tendinose , o i nervi possono generare gravi accidenti , e fino anche la morte .

Le ferite penetranti nella cavità senza offesa delle parti interne sono di minor rilievo di queste ultime , meno che da esse sortano le viscera dell' addome . Egli è molto difficile alle volte il conoscere se una ferita sia , o nò penetrante , atteso che poco soccorso si può ricavare dall' uso dello specillo , e delle iniezioni mucilaginose ; anzi desso al presente si è da migliori Pratici abbandonato . L' esito de' fluidi separati da viscere addominali accompagnati dal sangue può togliere ogni equivoco sulla penetrazione della ferita nella cavità , che se poi le materie , che sortono sono la bile , i cibi in parte digeriti , le feccie etc , non resta più alcun dubbio sulla penetrazione nella cavità , e lesione eziandio de' viscere contenuti .

Queste ferite se sono alquanto estese sono spesso accompagnate dall' esito dell' omento , o delle intestina , allora si osservano la nausea , il vomito , il singhiozzo etc . Esse oltre , che cagionano l' esito delle viscere addominali , il quale espone queste al contatto dell' aria , sono pericolose per l' offesa de' vasi , che possono produrre uno stravaso mortale , e per l' infiammazione , che può cagionare l' irritazione delle parti .

La cura delle ferite penetranti , nelle quali non vi sia esito di viscera , addominali sarà assai semplice , giacchè si tratta solo di riunirle per prima intenzione con de' ceroti , ed una fasciatura ritenitiva . Qualora però vi sia stravaso nella cavità sa-

con acqua tiepida , o latte , se sono imbrat-  
fango , od altro . Se questa parte uscita sia  
o , è un cattivo metodo quello di recider-  
non debbesi ciò praticare , che nel caso sia  
to , allacciando in seguito i vasi , che pos-  
sodurre una emorragia . Siccome poi l'angu-  
a ferita può esser di ostacolo alla riduzio-  
so , sarà bene dilatarla con un bistorino bot-  
te coll' ajuto del dito indice , spesso per al-  
fficiente il dare al malato una posizione ,  
stino tutti i muscoli addominali in rilascia-  
Se poi il viscere fuori della cavità sia un  
o , si potrà facilmente ridurre , ancorchè des-  
acquistato maggior volume per il gas rac-  
senza forarlo con lo spillo , o altro stromen-  
tirando soltanto a se il viscere , e così da-  
ior spazio alla materia , che contiene , ed  
latare la ferita col metodo indicato , se inu-  
no i mezzi esposti , indi riporlo al più pre-  
he in caso di sua leggiera alterazione , va-  
eglio il calor naturale , che contengono i flui-  
ali irrorano le viscera del basso ventre , che  
e fomentazione esteriore . Ridotte le parti ,  
va medicata semplicemente per prima in-



vasi, che possono restare offesi. Se sia ferita la chetta del fiele, le ferite sono mortali atteso di bile nella cavità. Il ventre diviene me nella timpanitide, le intestina sono un fluido aeriforme, ed il malato muore ni dopo la ferita.

La cura delle ferite del fegato può di particolare, oltre le regole generali, cadate riguardo alle ferite dell'addome, stringendosi a rimediare all'emorragia, so, ed agli sintomi nervosi. Il metodo è il metodo necessario, quindi fa d'uore li salassi ripetuti se sia di mestieri, ra le fomentazioni emollienti, le bevandistiche, e finalmente la dieta esattissimaita del fegato non termini con la risoluzione fiammazione, e suppurì, questa suppurmortale a meno che il fegato non sia peritoneo, e l'ascesso si manifesti all'est

Può ancora nelle ferite dell'addome csa la milza, e queste ferite sono mortali attaglia, che ne risulta. Il metodo, che c queste ferite è in generale lo stesso in le ferite del fegato. Qualche Autore propopazione della milza, ma questa operazionrà mai da praticarsi, non sapendo noi dseguenza possa esser l'estirpazione di qure. Con più ragione potremo eseguire lma sul rilevato tumore nella parte in basso ventre, prodotto dal sangue straquesto taglio si passa una pezza di lino una parte, la quale fa continuare l'esitgue, e della marcia fino alla guarigione to la permetterà.

Le ferite dei reni si conoscono dal d principia dalla regione lombare, e si es

inguini, ed ai testicoli, i quali sono contratti modicamente dal lato corrispondente al rene offeso. L'orina è sanguigna, ed alle volte esce essa per la ferita. Il malato è affetto da vomito, nausea, agitazione dolorosa dell'addome. L'emorragia, che accompagna le ferite dei reni non si manifesta all'esterno, ma molte volte accade all'interno, e diviene mortale. Può ancora accadere, che le ferite si aggrumino, e venga a chiudere il passaggio dell'orina. Le ferite dei reni sono molto pericolose, e segnatamente qualora sia ferita la pelvi del rene, giacchè allora lo stravasamento dell'orina nella cavità della ferita mortale. Queste ferite sono anche pericolose per l'emorragia, e per l'infiltramento dell'orina nella cellulare, che circonda i reni. Il trattamento sarà in generale la medesima, che si è indicato per le altre ferite dell'addome, che è quanto a' petti salassi, le bibite antiflogistiche, sarà in questo caso necessaria l'evacuazione dell'orina per mezzo della sciringa, qualora ne sia per qualche causa impedito il passaggio. Sarà utile anallargare la ferita esterna ogni qualvolta essa sia chiusa, giacchè in questo modo si verrà ad impedire l'infiltrazione del sangue, e dell'urina nella cavità della ferita. Una delle conseguenze delle ferite dei reni può esser la fistola, o una suppurazione, la quale ordinariamente mortale. Si hanno per altro esempi di queste fistole terminate felicemente, e si può facilmente conoscere il Cerusico se sia ferita la vescica urinaria. I sintomi della vescica ferita sono l'orina mista di sangue, e l'esito dell'orina per la ferita. La regione ipogastrica diventa tumida, dolorosa, il qual dolore si estende ancora al petto. Se la ferita sia nella parte superiore della vescica, e segnatamente vicino al fondo, è molto pericolosa, in specie per la facilità dello

stravasò dell' orina nella cavità del basso ventre, ma qualora la ferita esista vicino il suo orificio, non sarà tanto grave, eccettuando il caso che il vaso di urina nel baccino, sintoma, ch' è comune, giacchè per la situazione stessa della ferita il fluido esce facilmente per la medesima. Quello riguarda la cura delle ferite della vescica, tutto consiste a prevenire, o a calmare l' infiammazione, quindi il salasso, le bibite, la dieta, e il regime debilitante in generale formeranno la base della cura della malattia. Il bagno è spesso utile specialmente per diminuire l' infiammazione dell' addome. Per prevenir poi lo stravasò dell' urina nelle parti contigue, allorchè la ferita esista presso il fondo della vescica, il miglior mezzo sarà di tener continuamente la sciringa nel baccino medesima.

Le altre viscere contenute nell' addome, come l' utero, ed il pancreas non sono così facilmente ferite per la loro profonda situazione. In molte volte restino offese queste parti non senza che intrinsecamente alcuna indicazione particolare si presenti, quelle, che abbiamo proposte, ed il medesimo vale per le ferite del mesenterio, le quali possono divenire pericolose per lo stravasò del sangue nell' addome, se sia o in parte, o in tutto offeso qualche vaso arterioso. L' utero può facilmente essere ferito in caso di gravidanza, ed è la ferita pericolosa, e si decide spesso fiate la morte quantunque non manchino esempj di ferite della stessa natura felicemente guarite, ancorchè sia stato offeso il feto. L' indicazione particolare in simili casi consiste nell' impedire per quanto si può l' emorragia. Difficilmente questa si arresta nelle ferite dell' utero gravido già elevato verso l' esterno, val quanto dire, giunto il conte



allo stato di maturità, ed in allora deesi accelerare il parto, ossia ajutarlo, ed anzi alcuni propongono, in caso di necessità, ricorrere all'operazione Cesare.

Una delle conseguenze ordinarie delle ferite del basso ventre penetranti, sono gli ascessi delle viscere contenute, ed i stravasi di marcia nella cavità, che producono molte volte delle asciti purulente. In questi casi richiedesi il dar esito al fluido stravasato, procurando di formare l'apertura della minore estensione possibile, motivo per cui da alcuni autori si propone l'uso del troicart, che sarà utile segnatamente negli ascessi molto estesi.

Terminata l'esposizione delle ferite delle cavità è necessario dir qualche cosa sulle commozioni, che nascono nelle parti contenute, e particolarmente nelle viscere del petto, e del basso ventre, avendo noi già accennato quelle del cervello. Le commozioni de' visceri del basso ventre, e principalmente dello stomaco, del fegato, delle intestina, e della orinaria producono dei gravi accidenti, che nascono molte volte più pericolosi, che quelli prodotti dalle ferite penetranti nella cavità stessa. Le conseguenze ordinarie di queste commozioni sono le peripee violenti nel tronco siano esse prodotte da una caduta, o da urti violenti portati sulla parte stessa.

I sintomi di queste commozioni se desse intorno il petto sono una specie di sincope, respiro corto, ed affannoso, sudor freddo, polso piccolento, ed alle volte intermittente, ed estremità fredde. Dopo qualche tempo sopraggiunge la febbre, il respiro diviene più difficile, il polso pieno, ed il corpo si riscalda. Se la commozione sia de' visceri dell'addome si aggiunge la nausea, il vomito, ed il singhiozzo, ed il malato sembra quasi moribondo. Questi sintomi cedono dopo poco tempo,

e si osservano disturbate le funzioni dei visceri basso ventre, e segnatamente del fegato. Non raro, che queste commozioni se siano forti, ducano delle rotture, o sfiancamenti de vasi; si, e quindi ne nasce la morte, o una malattia critica irreparabile, ma ordinariamente producono se l'infiammazione di queste parti. Il metodo di cura conveniente in questi casi sarà adattato allo stato del malato. Prima che si sviluppino la febbre che i polsi siano piccoli, ed esistano i sintomi di debolezza richiedesi necessariamente il metodo attonante, saranno per conseguenza indicati i bagni freddi localmente, e potranno ancora usarsi le decozioni di erbe aromatiche. Siccome però po qualche tempo passano i sintomi di debolezza, e principia ad apparire una vera infiammazione, si dee di mestieri prevenire gli effetti della medesima, per mezzo dei salassi, delle bibite diluenti, della dieta rigorosa, de lavativi, fomenti, unzioni oleose, e bagni tiepidi, regolandosi secondo il corso dell'infiammazione, passando cioè in appresso all'uso de' leggeri stimolanti, ed in specie degli antimoniali, opio, canfora, e simili. Non è raro, come si è detto, che tali concussioni producano delle infiammazioni locali, la di cui conseguenza è l'adesione delle viscere infiammate, la suppurazione, e l'ascesso. Noi già abbiamo più sopra indicato qual sia il metodo da adoperarsi in occasione di ascessi interni, o di stravaso di marcia nella cavità. Delle ascessi, che dette violenze esterne possono portare alle ossa, cioè alla spina, coste, e sterno avremo di parlarne in appresso.

## CAPO XVII.

## DELLE FERITE D' ARMI DA FUOCO.

Le ferite d'armi a fuoco, che sono prodotte dai colpi esplosi dalla forza del salnitro possono considerarsi sotto varj aspetti sempre relativi alla velocità del colpo vibrato, cioè 1. la parte può essere stata semplicemente contusa dalla palla, 2. la palla può arrestarsi nella ferita stessa forando i tessuti, ed inoltrandosi nelle parti molli, e perfino nelle ossa, e produrre una ferita senza esito, 3. la palla può entrare da un lato, ed escire dall'altro facendo due aperture, 4. finalmente la palla di cannone può portar via una parte del corpo, o un membro intero.

I sintomi più comuni delle ferite d'armi a fuoco sono la contusione, che rende lividi i bordi della ferita, e la commozione, che si propaga a parti molto lontane dalla medesima, i muscoli, vasi, nervi sono lacerati, quindi ha luogo lo stupore, l'insensibilità della parte, l'emorragia, la cancrena, il tetano, l'esistenza de' corpi estranei nella ferita stessa: la parte percossa dalla palla di fucile è coperta di un'escara negra, ed i lembi di essa sono lividi. L'emorragia generalmente non ha luogo in questa specie di ferite, eccetto che nella lacerazione di qualche gross'arteria. Nel caso che la palla entri profondamente nel corpo, ovvero tra di un membro da parte a parte, le ferite, che risultano sono diverse, essendo costantemente piccola quella, per dove è entrata la palla, ed i bordi depressi, all'opposto più grande è la prodotta dalla sortita della medesima, e questa aggrava l'innalzamento dei bordi. La direzione della ferita non sempre è retta, nè le aperture, se



due ne esistono si corrispondono direttamente, so accade, che la palla incontri nel suo corso delle resistenze per parte delle ossa, tendine, aponeurosi, che l'obbligano a deviare dalla sua strada, e quindi resta molte volte difficile il seguire la direzione della ferita, o la situazione della palla qualora dessa sia rimasta nella parte offesa.

La cura delle ferite d'armi da fuoco si principia principalmente nello scegliere un metodo di cura alla qualità della ferita stessa, giacchè siccome queste specie di ferite sono così varie, e producono effetti tanto diversi, non è possibile stabilire regole generali, che convengano a tutti i casi. Deve prima di ogni cosa il Chirurgo ben conoscere la natura della ferita, desumendola dall'aspetto, ed applicarvi il metodo di cura conveniente.

Qualora la palla non abbia penetrato nella ferita, ma soltanto prodotto una contusione senza lacerazione, sia perchè priva di forza quando ha percosso la parte, che dicesi palla morta, sia perchè la direzione sia stata obliqua, accade qualche volta che la palla abbia prodotto de' gravi disordini nelle parti sottoposte, quantunque nulla si rinvenga all'esterno. In questi casi dovrà il Chirurgo esaminare l'offesa delle parti, e secondo essa scegliere il metodo tanto locale, quanto generale.

Se poi la palla abbia penetrato, varie sono le indicazioni, che si presentano; ma la prima è quella di cavare i corpi estranei che la ferita contiene, siano dèssi la palla stessa, siano pezzi d'abiti, o cose simili, o finalmente pezzi d'osso. Come questi corpi con la loro presenza producono molto dolore, e cagionano una maggiore estensione della lacerazione, è necessario di estrarli al più presto, però molta cautela di non irritare troppo la ferita, e di non produrre una emorragia. I varj s

ti inventati a questo oggetto hanno molti inconvenienti; ma segnatamente quello di non potere per mezzo dei medesimi conoscere con esattezza, se realmente esista, o nò un corpo estraneo, e quale ne sia la posizione, sarà perciò molto preferibile servirsi del dito per quanto è possibile, se non altro come guida dell' istromento. Sarà di mestieri ancora nell' esaminare la situazione de' corpi estranei, e segnatamente delle palle di far porre il malato presso a poco nella medesima situazione, che avea quando fu ferito. E' ancora indispensabile il riflettere, che la palla prende spesso una direzione obliqua, lo che ha luogo come si è detto se passi vicino ossa, tendini etc. e perciò in questi casi bisogna esaminare la ferita in molte direzioni. Se rinvenngasi allora, che la palla abbia percorso una strada assai tortuosa, ed obliqua, onde non sia possibile estrarla per la ferita, si esamineranno le parti vicine, e particolarmente quelle opposte all' apertura esterna giacchè spesso si sente ivi la palla, e non è difficile farla uscire con una controapertura. Se però si trovi molta difficoltà nel rinvenire la palla non si dovrà irritare troppo la parte con ricerche inutili; ma sarà meglio abbandonare ciò alla natura, avendosi molti esempj di palle uscite per mezzo della suppurazione, o rimaste nel corpo per lungo tempo senza produrre danno alcuno. Può la palla penetrare nella sostanza dell' osso, e restar ivi sestrata. Se non sia penetrata molto profondamente una leva sarà un mezzo adattato per estrarla; ma se non si possa con questo mezzo sarà miglior partito attendere la suppurazione, che alle volte ne procura l' esito. Qualora però l' esistenza della medesima produca molto pregiudizio, e nè coltelli, nè con la suppurazione possa otte-

nersene l'esito altro non resta, che ricor-  
trapanazione dell'osso stesso.

Cavato il corpo estraneo se esista  
la ferita è necessario procurare la suppuraz-  
medesima. Noi abbiamo già di sopra accer-  
siano i mezzi per procurare la suppuraz-  
ferite, che non ammettono di esser riunite  
intenzione come sono le ferite contuse  
o con perdita di sostanza, e per consequen-  
so metodo è quello, che conviene nelle fer-  
mi da fuoco. Alcune cose però sono parti-  
te d'avvertirsi in questa specie di lesioni  
tamente quello appartiene alla dilatazione  
desime. Le ferite d'armi da fuoco non  
dinariamente una estensione molto consi-  
ma sono profonde, perciò tanto l'estrazio-  
pi estranei, quanto l'esito delle marce si  
difficile nelle ferite di questa natura. Ma  
però in tutti i casi praticare una dilata-  
soltanto quando rendasi essa necessaria per  
ni sopra indicate, e quando delle partico-  
stanze non ne rendano la pratica pericolosa.  
parti quindi fornite di pochi muscoli,  
cellulare non sarà necessaria la dilatazione  
agevole l'estrazione de' corpi estranei, e  
facile un rigonfiamento di muscoli, che  
ficile l'esito delle marce. Sarà poi perico-  
latazione nelle parti fornite di molti tendi-  
vi, la recisione de' quali porterebbe seco  
ricolose conseguenze. Le incisioni devono  
si al più presto possibile, e nel primo in-  
po riportata la ferita, e queste incisioni  
no per mezzo di un bisturi bottonato con  
guida del dito, regolandosi nel farle ma-  
minori secondo la profondità della ferita  
do la parte, che dessa occupa, tagliando:



quanto è possibile giusta la direzione de' muscoli, e procurando d'evitare l'offesa de' tendini, nervi, e vasi sanguigni. Per mezzo di queste incisioni, si rende la ferita cruenta, si diminuisce la tensione, si facilita l'esito degli umori contenuti, e la caduta dell'escara, e si viene finalmente ad ottenere una migliore suppurazione.

Tirati fuori i corpi estranei, e dilatata la ferita, rimane a procurarne una buona suppurazione, scopo, a cui deve tendere il Cerusico in tutte le ferite contuse, onde l'applicazione di un semplice digestivo, e l'uso delle fomenta risolutive per le prime 24 ore, e quello in seguito degli cataplasmi emollienti favoriranno a sufficienza l'indicazione propostasi. I sintomi, che accompagnano la ferita dovranno decidere il Cerusico sul metodo interno conveniente. I salassi, e gli altri minorativi, ed in particolare un emetico prima che si sviluppi l'infiammazione saranno di molto vantaggio, se la costituzione del malato sia molto robusta, se vi sia minaccia d'infiammazione violenta, e se non vi sia stata una forte commozione. Nel caso opposto converrà far uso di un metodo piuttosto corroborante, e perseverare anche localmente nell'uso dei risolvendi, e dei tonici. In questa occasione saranno indicati l'acqua vulneraria, il sale ammoniaco, lo spirito di vino etc.

La suppurazione delle ferite d'armi da fuoco può esser molto abbondante, e debilitare molto il paziente, e perciò in questi casi richiedesi un metodo corroborante, e segnatamente l'uso della china, che sarà molto utile ancora nel caso di riassorbimento delle marce. L'emorragia può anche rendere la cura di queste ferite complicata, e difficile, in specie qualora sopraggiunga in seguito della suppurazione, e dopo alcuni giorni. I tonici lo-

cali, e gli astringenti saranno i migliori rimedj indicati in questi casi.

Tutti questi principj sono adattabili nelle ferite d'armi da fuoco, che non sono complicate da frattura d'osso, o altri gravi accidenti, e nelle quali non è stato portato via un membro intieramente da una palla di cannone. In tali circostanze spesso siamo obbligati a ricorrere all'amputazione. Se una palla di cannone abbia portato via una porzione di un membro, è necessario fare l'amputazione sul momento, col qual mezzo si viene a ridurre una piaga complicata di lacerazione, frattura etc. in una piaga semplice. Lo stesso deesi praticare nel caso esista frattura comminuta, lacerazione, contusione etc. accidenti tutti, che minacciano la cancrena, che si può prevenire soltanto per mezzo dell'amputazione. La sola commozione in un membro può alle volte essere una ragione sufficiente per porre in opera l'amputazione, giacchè, sebbene in esso non esista frattura, la sola lacerazione delle parti unita alla commozione, ne produce l'insensibilità, e dispone l'arto alla cancrena. Oltre queste circostanze devesi praticare l'amputazione ancora ne' casi, che la suppurazione della ferita sia talmente abbondante, e lunga, che consumi tanto le forze del malato, onde ne venga la febbre etica, ed il malato consunto sia in pericolo di vita; ma in questo caso l'amputazione non si praticherà, che dopo qualche tempo, mentre negli altri accennati sarà sempre meglio farla al più presto possibile. Prima di determinarsi a questa operazione deve il Cerusico riflettere a tutte le circostanze particolari, nelle quali trovasi il ferito, e segnatamente se sia essa di assoluta necessità, nè siavi altro mezzo di salvare la vita al malato, che privandolo di un membro, come ancora deve il Cerusico prevedere se sia più



utile pel paziente il restare senza un articolo , supplendo al medesimo con un membro artefatto , di quello che conservare l' articolo , ma con tale deformità , o malattia , come anchilosi etc. che non possa essere non solo di alcun utile , ma gli arrechi ancora grave incomodo . Molto è stata agitata fra i pratici la questione se nelle ferite d' armi da fuoco , che non possono guarire con altri metodi sia necessaria l' amputazione , giacchè oltre l' incomodo , che reca questa operazione , e la difficoltà di praticarla sul momento ne' casi di battaglie terrestri , o navali , si hanno degli esempj di gravi ferite guarite per se medesime senza ricorrere a questa operazione , ma solo coi mezzi ordinarj . Noi però crediamo insieme coi più recenti Scrittori , che questi casi siano molti rari , e che tutti gli incomodi , e difficoltà , che si presentano nel praticare l' amputazione non siano da porsi in confronto col pericolo quasi sicuro della perdita del paziente quando si ometta la medesima , e quindi stimiamo indispensabile il praticarla sempre ne' casi , in cui sia indicata , e farla al più presto possibile , giacchè la dilazione anche di poche ore la renderebbe molte volte inutile .

Siccome però potrebbe esistere un tale disordine , che rendesse insufficienti i mezzi , che abbiamo di sopra indicati per promuovere una buona guarigione , ma che non richiedesse però indispensabile l' amputazione sebbene esistesse frattura , lacerazione , è necessario indicare il metodo da usarsi in opera in simili circostanze . Oltre le precauzioni già di sopra accennate è necessaria la situazione dell' articolo , e fare uso degli emollienti se violenta infiammazione , la febbre , e lo stato pleorico lo richieda , in caso contrario si farà uso de' stimolanti locali , segnatamente dello spirito di



vino, o acquavite. Si deve applicare una fasciatura compressiva, e che ritenga le parti nel loro stato naturale. Riguardo poi ai rimedj interni i cordiali, e l'emetico saranno molto utili, se non esista diatesi infiammatoria, ma sopraggiungendo la febbre, e l'infiammazione debbesi ricorrere al metodo antistilogistico. Se però ad onta di tutto questo i sintomi si aumentino con minaccia di cancrena, non dovrà perdersi tempo, ma amputare subito la parte.

Resterebbe ora a parlare delle diverse indicazioni, che presentano le ferite d'armi da fuoco secondo le diverse parti, che occupano, e secondo le varie offese, che hanno prodotto; ma avendo noi già di sopra parlato delle ferite delle varie parti del corpo, e de' metodi convenienti nell'offesa dei visceri, e parti contenute nella cavità, de' nervi etc. possiamo dispensarci dal parlare al presente del metodo conveniente ne' varj casi di ferite d'armi da fuoco nelle diverse parti del corpo, richiedendo questi appunto le medesime indicazioni, che convengono alle ferite in generale, applicando però ad ogni caso particolare le regole esposte nel trattamento delle ferite d'armi da fuoco, e modificando secondo le medesime i principj generali da noi accennati.

## CAPO XVIII.

## DELLE CONTUSIONI.

**C**ontusione chiamasi in Chirurgia la lesione cagionata dalla percossa di uno stromento ottuso, che urta con forza sopra una parte del nostro corpo. In questo caso si rompono i vasi sanguigni cutanei, s'indebolisce l'azione della parte, il sangue s'infiltra nel tessuto cellulare, vi si accumula, e forma sulla

...sempre gli presenta; varj sono gli effetti  
contusioni. Se la parte offesa è fornita di os-  
sua quindi presenti una maggior resistenza al cor-  
poreo contundente, la contusione riesce maggiore, ed  
invariabilmente accompagnata da infiammazione.  
Ma oltre gli effetti, che produce la contusione  
sulle parti, che lo stromento percuote immediata-  
mente, agisce ancora essa sulle parti lontane, e pro-  
duce delle lesioni, che nominansi *controcolpi*. Que-  
sti colpi possono causare de' sintomi molto  
simili a come se la parte stessa fosse stata espo-  
sta al corpo contundente. Tali effetti es-  
tremamente varj non è possibile darne delle rego-  
le generali; abbiamo però molti scrittori, che ri-  
cordano delle osservazioni, dalle quali deducesi l'ef-  
fetto possono esser prodotte dal controcolpo.  
degli esempj di contusioni sull' addome,  
che ha cagionato la lacerazione delli vasi, dell'  
arteria e quella dell' intestino ileo. Le contusio-  
ni sono seccate per controcolpo degli aneurismi, rot-  
te, e stravasi di sangue. Quelle delle ar-  
terie producono de' mali molto gravi, come  
emorragie, e lussazioni. La contusione delle

cancrena possono essere la conseguenza della contusione.

Il pericolo maggiore, che sovrasta alle contusioni si è quello dell' infiammazione, che comparire spesso, e produrre delle cattive guenze. Se la macchina sia robusta, e non sia ta da umori cattivi, la contusione non costa che l' effetto locale, che cederà facilmente ai todi ordinarij, e non avrà funeste conseguenze se la contusione accada in un soggetto debole, che sia fornito di umori cattivi, la contusione ch'è leggera produrrà l' esulcerazione, la cancrena e la carie. Così ancora se la contusione sia in un luogo fornito di cellulare, l' umore stravasato si riassorbisce facilmente, mentre se esista in luogo, dove abbondano le parti tendinose, ed aponeurotiche, passa facilmente in ascesso. Se l' osso sia offeso, o sia vicino al luogo contuso, è da temersi la carie, e finalmente dovrà giudicarsi del pericolo, e dell' esito di ogni contusione a seconda delle parti offese, e di quelle adjacenti, come già abbiamo ancora accennato di sopra.

Circa la cura delle contusioni il primo oggetto deve esser quello di procurare il riassorbimento del sangue, o altro umore stravasato nella cellulare, come ancora di prevenire l' infiammazione. Ogni specie poi di contusione richiederà un vario metodo di cura secondo la parte affetta, e gli accidenti, che l' accompagnano. I rimedj locali astringenti, e corroboranti sono quelli indicati nelle contusioni leggere, e non accompagnate da alcun sintoma pericoloso. I stimolanti di questo genere sono l' acqua fredda, l' acqua di calce, lo spirito di vino, le decozioni stimolanti, e segnatamente quella di China. Molte volte è necessario per accelerare la risoluzione di praticare il salasso segna-



il malato sia di temperamento pletorico, sia disposizione all' infiammazione. Il sarà di molto giovamento ne' casi di uno strabondante di fluidi nel tessuto cellulare, ed in questi casi sarà bene ajutare l'azione del medesimo cogli altri minorativi secondo la costituzione, e stato del paziente. I topici stimolanti dovranno essere alquanto più attivi, e quindi potrà porsi in uso la soluzione di sale ammoniaco, l'acqua vulneraria, e simili astringenti, ed attonanti. Ma se poi la contusione sia stata molto violenta, in modo, che l'ecchimosi siasi assai estesa, e per conseguenza impossibile il riassorbimento di tutta la quantità del sangue stravasato, sarà indispensabile il procurarne l'esito per mezzo del taglio, meditando poi la ferita come una ferita contusa. Spesso è tanto grande la quantità del sangue infiltrato nella cellulare, che forma anche de' tumori all'esterno, quantunque gl'integumenti siano nel loro stato d'integrità. Questo ha luogo segnatamente nelle contusioni de' muscoli grossi, come i lombari, i gluzj, ed in questi casi può anche la parte cancrarsi, e presenta allora nel centro del tumore una specie di fluttuazione, che richiede l'apertura, fatta la medesima ne esce un fluido rossastro, e spesso, che è in parte composto dalla porzione de' muscoli disorganizzati.

Queste regole generali hanno luogo presso che tutte le specie di contusioni, ma debbono esser variate a seconda delle parti contuse, e de' sintomi, che presenta la malattia, e segnatamente secondo i fenomeni, che nascono dal controcolpo. Siccome però questi effetti sono tanto varj, non è possibile dare delle regole generali, a questo riguardo, ma è necessario lasciare il tutto alla intelligente cognizione del Cerusico curante, il quale po-

trà adattare ai casi particolari le regole , che mo di sopra esposto . Meritano però una riprese particolare le contusioni , che accadono sulle tebre del dorso , o dei lombi , come ancora le mozioni nate in dette parti a motivo di una ta sulle natiche , o su i piedi giacchè queste sioni producono sovente una malattia mortale caso di contusione , o commozione della spine l' impossibilità di muoversi , il malato soffre lori grandi nella parte senza che nulla compaia all' esterno di offesa , ed osservasi subito la tumescenza delle estremità inferiori , che è il segno più della commozione della spinal midolia . Oltre a talisi delle estremità ha luogo anche quella della vescica , e dell' intestino retto , e quindi l' esito lontario dell' orina , e delle fecce . Molte volte si incontra un ecchimosi estesa nella regione lombare , e segnatamente sull' osso sacro , che spesso sa in cancrena . E' raro , che queste gravi contusioni terminino felicemente , portando esse in seguito l' anchilosi , o la carie delle vertebre , ovvero la commozione generale , e la cancrena porta in brev tempo la morte del malato , o una malattia ben lunga.

I rimedj in questi casi debbono essere energici , e segnatamente i salassi sì generali , che locali accompagnati da rigorosa dieta , e riposi dalla situazione adattata . Sarà necessario ricorrere ad alcuni sintomi particolari p. e. alla ritenzione dell' orina per mezzo della sciringa , l' vescicanti applicati su i lombi , i topici stimolanti altrove applicati , ed i bagni in specie di acque minerali salubri , e i mezzi più convenevoli per restituire le parti inferiori al loro stato di salute , e liberarle dalla commozione .



## DELLE FRATTURE.

Le sole ossa sono quella parte del nostro corpo, che soggette si rendono alle fratture, e ciò dipende dalla solidità del loro tessuto, il quale piuttosto si rompe, che cedere ad una forza qualunque, che agisca sopra di esse. Varie sono le specie delle fratture, poichè oltre la divisione, che risulta dalle medesime secondo la diversità della parte fratturata, una non meno interessante si è quella, che riguarda la qualità stessa della frattura. *Comminute* si dicono in Chirurgia le fratture, nelle quali l'osso è rotto in più pezzi, e così distinguonsi per i nomi secondo i nostri antichi le fratture in *semplici*, *composte*, e *complicate*, le quali possonsi dire *oblique*, o *transversali*, a tenore della diversa direzione, che acquistano nel formarsi. Semplici sono le fratture, in cui altro non osservasi, se non la rottura della continuazione di un'osso senza che dessa sia accompagnata da alcun altro sintomo pericoloso. Composta, o piuttosto *doppia* chiamasi la frattura di due ossa nello stesso membro, come p. e. nella gamba, e nell'antibraccio. Composta finalmente dicesi anche quella frattura, che unita ad altro grave sintoma dipendente dalla stessa, che ha prodotto la frattura, e segna l'offesa delle parti vicine alla medesima. La frattura può essere ancora in sito, o fuori di sito. Nella prima le ossa rotte restano nel loro luogo naturale relativamente alle altre parti; ma nel secondo caso le medesime si sovrappongono attirate dalla forza de' muscoli, e secondo la diversa maniera, nella quale si è rotto l'osso. I sintomi, che presentano le parti fratturate



sono i seguenti. Il malato sente il colpo nell' stesso della frattura dell'osso, e risente come un pito nella parte, dopo il qual colpo, o crepito rende impossibile, o almeno assai difficile, e doloroso il moto della parte fratturata. La medesima offre una gonfiezza circolare nel luogo presso della frattura, la quale però dopo poche ore si tende a tutto il membro. Toccando con la mano il punto della frattura si sente un vuoto nel luogo di essa dipendente ordinariamente dal maggior o minor allontanamento dell' estremità delle ossa fratturate. Ma uno de' segni più certi di questa lattia si è il crepito, che nasce dal far muovere pezzi rotti l' uno sopra l' altro. Questo crepito alle volte esser tale da sentirsi non solo con la mano, ma ancora con l' orecchio. La piegatura forma un' articolo in altro luogo, che nell' articolazione è ancora uno de' segni caratteristici della frattura, ma tanto questo segno, quanto quello crepito possono mancare segnatamente nelle fratture in sito senza che possa per questo giudicarsi senza della frattura. Qualora questa piegatura ben visibile, si osserva la prominenza in una parte, la depressione nell' altra, il membro scortato curvato preternaturalmente. Tutti questi sintomi però quanto sono chiari nelle parti, dove le ossa sono più soggette alla vista del Cerusico, come nelle ossa dell' antibraccio, e della gamba, altrettanto poi sono oscuri in quelle fornite di muscoli grossi, o di abbondante cellulare, come nell' femore, e segnatamente nel suo collo. Può ancora essere assai equivoco il giudizio nelle parti unite di due ossa, come l' antibraccio, e la gamba, qualora sia rotto soltanto uno de' medesimi, che, mantenendo intiero l' altro, mantiene il me-

suo stato naturale , e impedisce , che si osservi la maggior parte de' segni sopra indicati .

Qualunque forza , che agisca sull'osso è capace di produrre la frattura del medesimo sia , che il colpo sia dato direttamente sull'osso , sia che esso ne risenta indirettamente l'azione . Le fratture , le quali accadono nello stesso luogo , dove è stato portato il colpo , sono congiunte generalmente dalla contusione , e la frattura è ordinariamente in un pezzo , il contrario accade nelle altre specie di fratture , e segnatamente in quelle , nelle quali l'osso si è fratturato per una forza applicata all'estremità di esso , onde ne venga come piegato , e quindi fratturato . Il controcolpo è ancora capace di rompere un osso , e finalmente le ossa possono esser rotte dalla sola azione de' muscoli , eccettuate , secondo alcuni le ossa lunghe , lo che può avere principalmente luogo nelle persone , che sono soggette a malattie di queste parti , che rendono le medesime fragili , come p. e. ne' venerei , rachitici , scorbutici etc.

Il pericolo delle fratture varia secondo la qualità dell'osso infranto , e giusta la natura stessa della frattura . Per la prima cagione saranno meno pericolose le fratture delle ossa dell'estremità , che delle altre , la frattura delle quali può portar seco una offesa di qualche viscere sottoposto , e p. e. la frattura delle ossa del cranio , delle etc. Riguardo poi alla specie stessa della frattura , quelle semplici saranno sempre meno pericolose che le composte e le complicate , le quali sebbene molte volte non portino seco pericolo di vivere possono produrre anchilosi , storpiature etc. Noi abbiamo già di sopra veduto , che esistono delle cause le quali rendono le fratture delle ossa molto più pericolose , come p. e. l'età , le malattie generali , o vizii della macchina , cioè scorbuti , rachitide , e simi-

li, e quindi è naturale, che in simili casi sia ancora molto più difficile la consolidazione della fratturata.

La riunione delle fratture si fa per sola forza della natura, generandosi una nuova sostanza fra i pezzi fratturati, e questa nuova sostanza chiamasi *callo*, o *porosarcoide*, e si viene a formarla così dire una cicatrice come si è notato anche nelle ferite delle parti molli, ma in queste si sollecita il processo organico, che in quelle parti dure. Acciò questa operazione della riunione succeda regolarmente senza lasciare alcun vizio di deformità nella parte, fa d'uopo che il Chirurgo presti i necessarij ajuti, onde possa formarsi il callo, ossia riunione perfetta delle ossa. Gli ajuti che deve prestare il Chirurgo consistono principalmente nel riunire la frattura, e per mezzo di fasciatura mantenerla nella giusta situazione, e tenendo in oltre tutti gli ostacoli, che possono opporsi alla riunione. La frattura non richiede sempre la riduzione, ma questa è necessaria solo in quei casi, ne' quali le ossa non siano al loro luogo naturale. Per ottenere la riduzione si fa l'estensione, e la controestensione. L'estensione consiste nel tirare la parte, che trovasi al di sotto della frattura, e la controestensione ha per oggetto di tener ferma la parte superiore alla frattura, affinchè questa non ceda alla forza di estensione. Con per mezzo di queste due operazioni le ossa tornano per ritornare al loro luogo naturale, fa d'uopo che il Chirurgo con le mani faccia una certa pressione sul luogo stesso della frattura, affinchè i pezzi dell'osso più facilmente si avvicinino, e restino precisamente a mutuo contatto, ed è chiamata conformazione.

L'estensione, e la controestensione del



ti devesi esercitare con la massima cautela per non irritare di vantaggio le medesime, e segnatamente i muscoli, i quali venendo stimolati si opporrebbero sempre più alla estensione del membro; a questo oggetto si richiede di porre i muscoli nel maggior rilassamento possibile, e di stabilire le sudette forze estensive in luogo convenevole, come vedremo particolarmente in ogni frattura. Quando con questo metodo si sia ottenuta la riduzione esatta della parte spariranno le ineguaglianze, e prominenze formate dalli pezzi delle ossa, che non erano nel loro sito naturale, e similmente il paziente si troverà libero dai dolori, che soffriva nella parte, o almeno verranno questi molto diminuiti. Questa riduzione deve poi farsi al più presto possibile, giacchè il ritardo non farebbe, che produrre dei gravi sintomi, e rendere più difficile la conformazione.

Quando siasi ridotta esattamente la parte, è necessario mantenerla nella stessa situazione, lo che si otterrà con la quiete, e con l'applicazione dell'apparecchio. Questo è composto di varie parti. La prima sono le fascie, le quali abbracciando circolarmente il membro fratturato non solo mantengono in sito le ossa fratturate, ma tengono ancora i muscoli in una certa situazione, che impedisce, che si contraggano di troppo, e formino ostacolo alla riunione. Le fascie circolari hanno l'inconveniente di non potersi togliere senza muovere il membro, ed esporsi per conseguenza al pericolo di rompere il collo non ancora ben formato. La fascia a 18 capi, siano dessi uniti insieme, siano separati in tante strisce libere è la migliore, e più comoda fasciatura. Sopra le fasce debbonsi porre le stecche, o fascicelle di legno, o di latta, delle quali se ne pon-  
Sono tre, o quattro secondo la specie della frattura, e che devono essere per la loro lunghezza, e

figura adattate alla qualità del membro, che non contenere. Le stecche si mantengono in mezzo di lacci, o legature, e si riempirà spazio, che resta fra esse, ed il membro si per mezzo di cuscineti, o compresse, onde si adattino alla figura del medesimo.

La situazione da darsi al corpo del malato, che dessa possa per quanto è possibile sempre nella medesima situazione senza obbligata a muoversi nelle diverse azioni del

Uno de' principali sintomi, che può sorgere nella cura delle fratture si è quello di un fiore della parte fratturata, lo che rendendoci la giuntura più stretta produce una compressione dolorosa anche con pericolo di cancrena, e quanto in questo caso, quanto nel caso, che la frattura si scomponga ne viene per conseguenza ritardata la cura della frattura, o abbiano luogo gli accidenti pericolosi. A quest'oggetto è necessario, che il Cerusico abbia l'attenzione di vedere di quando in quando l'apparecchio per lo nel caso che venga a rendersi troppo stretto, o troppo lento. Quando sarà passato il tempo necessario, che richiede ogni frattura per consolidarsi, e che varia secondo la qualità dell'osso, si toglierà l'apparecchio, e si esaminerà se la parte sia ben riunita. Secondo la specie di frattura debbono esser varie le precauzioni prendersi prima che il paziente riassuma le sue varie funzioni, e di esse parleremo trattando delle fratture in particolare.

Può molte volte accadere, che dopo il tempo che comunemente richiedesi per la riunione di una frattura essa non sia ancora ben formata sì per difetto del metodo curativo adoperato, sì



costituzione stessa del malato. In tale circostanza non vi sarà altro mezzo, che quello di riapplicare nuovamente l'apparecchio esattamente, adoperando nello stesso tempo quei rimedj interni, che possono aver luogo per correggere i vizj della macchina, se dessi sono la cagione, che ne ritardano la cura. Se poi la frattura fosse riunita, ma non totalmente consolidata è necessario riapplicare parimenti l'apparecchio, e molto più ciò dovrà aver luogo ove sia la frattura riunita malamente, che è quanto dire, che le ossa siano sovrapposte, o siano fuori del loro sito naturale, nel qual caso oltre l'applicazione dell'apparecchio devesi praticare ancora l'estensione, mantenendola anche per lungo tempo se sia d'uopo. Che se poi la frattura sia ben consolidata, ma riunita irregolarmente, e le ossa non restino nella loro situazione naturale alcuni pratici hanno consigliato di romper l'osso di nuovo, e principiare indi un'altra volta la cura. Questa operazione però oltre l'essere in molti casi assai pericolosa, è riuscita quasi sempre inutile a quelli, che l'hanno tentata, essendosi riunita la frattura nello stesso luogo, dove si era consolidata la prima volta, giacchè l'estremità delle porzioni dell'osso, che erano rimaste nella prima frattura sono diventate in tal tempo callose in modo da non potersi riunire.

L'anchilosi, ch'è spesso una della conseguenza della frattura, o piuttosto della situazione, nel quale è obbligato a restare per lungo tempo l'arto, si previene facendo eseguire all'articolazione movimenti appena la frattura si è consolidata, ma conviene avvertire, che questi movimenti sieno piuttosto eseguiti da una forza esterna, di quella dal malato stesso, non essendo difficile, che la contrazione medesima de' muscoli disunisca nuo-



vamente il callo delle ossa non ancora ben

Questo è quello che riguarda general-  
cura delle fratture semplici, ma desse non s-  
pre tali. I principali sintomi, che sogliono  
le complicate sono la contusione, e l'ecchia-  
ferite, la complicazione di altra frattura, la  
zione, l'infiammazione, la cancrena etc. M-  
di contusione avranno luogo i medesimi p-  
che noi abbiamo esposti parlando delle co-  
compresa anche l'evacuazione del sangue  
sia l'ecchimosi considerabile; ma se questa  
da da offesa di arteria prodotta dalle punte  
so fratturato non sarà difficile, che abbia  
ancora un' aneurisma, che richiederà l'alla-  
dell'arteria stessa, e quindi sarà necessario  
la allo scoperto. Le fratture complicate co-  
sono assai gravi, e pericolose segnatamente p-  
cesso dell'aria, a cui si dà luogo per la  
Se l'osso sia fratturato in più pezzi sarà  
rio estrarre primieramente le scheggie del  
mo, che possono ritrovarsi nella ferita, e si  
te recidere con la tenaglia incisiva le punte  
so fratturato, che potrebbero offendere le  
cine, lo che fatto nella miglior maniera po-  
e senza dilatare inutilmente, o irritare la fi-  
riunirà la medesima, e si avrà la massima a-  
ne d'impedire l'accesso dell'aria, e si userà  
i rimedj altrove indicati per diminuire l'in-  
zione, ed ottenere una buona suppurazione  
lora l'osso stesso infranto sia quello, che  
punta abbia cagionato la ferita forando l'  
dal di dentro all'infuori, devesi secondo il  
glio dei migliori pratici procurare di far  
l'osso nella sua naturale situazione, lo che  
rà facendo sul membro una forte estensione  
troestensione. La recisione dell'osso, che

in simili casi deve praticarsi con som-  
ma cautela, e soltanto ne' casi, ne' quali sia privo  
di periosio, o principj a cariarsi.

Egii è vero però, che alcune volte la frattura  
è talmente complicata, e le parti sono così malme-  
nte, che tutte le precauzioni fin qui accennate non  
possono aver luogo, ed è indispensabile l' amputa-  
zione. Tre possono essere i casi, ne' quali le frat-  
ture richieggono questa operazione, e sono la emor-  
ragia, la cancrena, e la suppurazione abbondante.  
Se l'emorragia spesso si riattacci molto tempo do-  
po seguita la frattura, nè possa arrestarsi con  
li metodi ordinarj, non vi è altro rimedio, che  
ricorrere all'amputazione. Lo stesso ha luogo se la  
parte minacci la cancrena, e così ancora se la sup-  
purazione sia troppo abbondante, giacchè in simi-  
li casi le forze del malato si vanno ad esaurire,  
occorre il riassorbimento della materia purulenta, e  
nasce la febbre etica, che seco porta la morte  
del paziente.

Le regole generali, che abbiamo fin qui espote  
mo applicabili a qualunque specie di fratture, ma  
come le conseguenze, che queste malattie portano  
sono varie a seconda dell'osso fratturato, devesi  
andì modificare il metodo curativo giusta la spe-  
cie di frattura. Le fratture della testa sono quelle,  
e presentano maggior difficoltà nella diagnosi, e  
nella cura, e nello stesso tempo sono le più peri-  
colose per le conseguenze. Noi abbiamo già di so-  
ra esposto alcuni principj generali delle offese del  
cervello parlando delle ferite della testa, ma ci re-  
sta ancora alcuni altri punti interessanti da os-  
servare. Le fratture del cranio sono semplici, o com-  
plicate, nelle quali cioè molte fessure osservansi riu-  
nirsi insieme. Le fratture del cranio esistenti in luo-  
go diverso da quello, che ha riportato il colpo di-



consi controffessure, o fratture per contro colpo. supposto l'osso si rompe sempre nella parte presenta meno resistenza. Può ancora nelle frange delle ossa del cranio rompersi solo la lamina interna, o vitrea restando illesa l'esterna.

I sintomi delle fratture del cranio sono equivoci, lo che rende molto difficile la diagnosi medesima. Se esista ferita, e la frattura sia nel medesimo luogo della ferita sarà ben facile il riconoscerla; come ancora se sentasi crepitazione in occasione, che vi sia qualche frammento rotto; ma se per lo contrario manchino questi segni, poco sarà da fidarsi degli altri, che comunemente sono riputati per segni di frattura del cranio. Il risentirsi dal malato un suono nel tempo della percossa è un segno ben equivoco, ancora l'emorragia dal naso, e dalle orecchie, che da tutti questi segni altro non può dedursi se non che il malato ha sofferto una forte percossa nel capo; senza che vi sia ragione di credere che il cranio sia fratturato. Il dolore, che si prova nel masticare può dipendere da una semplice infiammazione de' muscoli temporale, e massetere, o dall'irritazione della mascella, e così finalmente il vomito, l'assopimento, il vomito, e le convulsioni, tutti gli altri sintomi dati come indizj di frattura del cranio possono accompagnare qualunque commozione del cervello, stravasamento nel cranio etc. senza che realmente esista frattura alcuna. Lo stesso può dirsi de' casi del distaccamento del pericranio, che non è per sé un certo segno di frattura, anzi non indica neppure la violenza dell'offesa del capo, o la violenza della percossa.

La prognosi delle fratture del cranio se vengono riguardate isolatamente, e senza aver riguardo alle conseguenze, che seco portano non è infame.



non essendo queste fratture di pericolo, ma siccome le medesime nascono in seguito di violenti percuote sopra il cranio, è molto frequente, che le parti esterne, e segnatamente il cervello abbiano ricevute delle forti scosse, ed altre lesioni, che possono essere ancora molto pericolose. Così eziandio se la lussura sia composta, e vi sia depressione d'osso, ed anche qualche piccolo pezzo sia penetrato nella cavità del cranio, o nel cervello stesso i danieri che ne sieguono possono essere di molta importanza. Uno delli sintomi finalmente più pericolosi, e che rende le fratture del cranio di cattiva seguenza si è lo stravaso nella cavità stessa, e la compressione, che desso arreca sul cervello.

Parlando delle ferite del capo abbiamo noi già indicato molti sintomi delle varie affezioni del medesimo, ed i mezzi di rimediarvi. Resta qui ora di parlare propriamente dell'offesa dell'osso, e del metodo di cura alla medesima appartenente. Le fratture delle ossa del cranio non accompagnate da alcun sintoma pericoloso guariscono facilmente come tutte le altre, e con lo stesso metodo, che abbiamo portato parlando delle fratture in generale unendosi li salassi gli evacuanti, etc., e la riunione della ferita, che ordinariamente l'accompagna. Quando però vi sia o stravaso nella cavità del cranio, o la frattura sia complicata con depressione d'osso, si rende il più delle volte indispensabile la trazione, operazione però, che non devesi eseguire che ne' casi, i quali assolutamente la richiegga, giacchè sappiamo, che moltissime volte guariscono delle fratture del cranio anche con leggera lussione d'osso, e stravaso, senza che sia necessaria la trapanazione, e che tutti i sintomi gravi ceduto all'uso de' bagni, de' vescicanti, e de' lassivi generali, e locali. La depressione dell'

osso, che accompagna la frattura è uno de' casi, ne' quali più di sovente si richiede la trapanazione, che non è all' incontro tanto necessaria per lo stravasato giacchè in questo caso si può essa con qualche ragione escludere, stante che o lo stravasato è nato nell' interno del delicato viscere del cervello, e non ammette la trapanazione, portando seco necessariamente la morte, oppure gode un'altra sede, e non può per la sua gravità specifica cagionarla, quindi vi sarà tutto il fondamento di sperare la dissipazione degli' accidenti in grazia dell' assorbimento di tal fluido stravasato, ed in forza de' prescritti mezzi generali, e locali senza ricorrere alla trapanazione. Noi non istaremo qui a descrivere particolarmente questa operazione riserbandoci ad esporla dettagliatamente nel trattato delle Operazioni, dove si descriverà eziandio particolarmente il metodo da tenersi tanto per sollevare le ossa depresso, quanto per dar esito all' umore stravasato qualora per esso credasi necessario istituirla.

Fra le altre fratture, che osservansi nelle ossa della testa oltre quelle del cranio sono particolarmente da considerarsi quelle delle ossa nasali, dell' arco zigomatico, della mascella superiore, e dell' inferiore. La frattura delle ossa del naso si forma sempre in conseguenza di un colpo immediato sia perchè la parte si porta contro un corpo resistente, sia perchè questo si vibra sopra di essa. Questa malattia è del continuo accompagnata da contusione, quale alle volte impedisce il facile conoscimento della frattura, ma ne resta però più chiara la diagnosi, se unitamente vi sia l' infossamento de' pezzi fratturati.

Il pericolo, che seco porta la frattura dell' ossa nasali è relativo allo scuotimento, che può aver comunicato specialmente nelle persone avanzate in



età non solo alla lamina perpendicolare dell' Etmoidale, onde venga fratturata, e produca della lacerazione nella dura madre, e ne' piccoli vasi, ma eziandio nel cervello medesimo, per lo che può esser unita a tutti i sintomi di commozione del Cerebro o di stravasamento nel cranio, e terminare colla morte.

Se la frattura di queste ossa è semplice altra cura non richiede, che quella di dissipare la contusione. In caso poi, che i pezzi fratturati siano infossati, in allora si debbono riporre in sito naturale, lo che si ottiene coll' ajuto di una sciringa da donna, o di una stretta spatola involtata in un pannolino introdotta nelle narici, per quindi sollevare i pezzi depressi. Deve essere unita a questa manovra del rialzamento de' frammenti d'osso il contatto delle dita dell' altra mano del Professore sulla parte esterna del naso, affinchè si possano con facilità ridurre le parti alla giusta conformazione. Per impedire il nuovo infossamento si deve mettere una piccola cannula elastica nelle narici, per riempir le quali si pongono delle morbide sfile anche imbrattate in qualche oleoso per non irritare la membrana pituitaria.

I sintomi, che possono sopravvenire di stravasamento nella cavità del cranio, o quelli che già esistono di commozione del cervello si curano nel modo, di cui altrove abbiamo parlato, e che ci sembra inutile ripetere.

La frattura dell' arco zigomatico se sia semplice, ch'è quanto dire in un sol luogo, la posizione stessa dell' osso, ch' è fisso immobilmente all' due estremità, è sufficiente per ritenere in sito la frattura, e non si richiede pressochè alcuna forza per tenere le parti nel loro luogo naturale, se però la frattura sia composta in modo, che una porzione dell' osso venga tirata inferiormente si richiederà



di riporre prima l'osso nel suo sito, e mantenerlo per mezzo di un' adattato apparecchio. In questo caso i sintomi ordinarij saranno principalmente il dolore nell'abbassamento della mascella, e qualche volta si è osservato ancora un moto convulsivo nella faccia per la compressione dei nervi, che comunicano col faciale. Il metodo per rialzare la porzione dell'arco zigomatico che si porta inferiormente si è d'introdurre l'osso nella bocca, e con esso premere sotto la porzione depressa verso l'arco zigomatico stesso, e con la mano nella parte esterna aiutare l'azione dell'osso nel suo luogo naturale. Se la forza de' muscoli sia sufficiente, qualche pratico ha adoperato un pezzo di legno posto sopra i denti molari, e con esso premendo chiudere fortemente al malato le labbra, e veniva a diminuire la depressione, e sostituendo continuamente de' legni di maggior grossezza, si è felicemente a collocare l'osso nella sua forma naturale. Se poi ne anche questo metodo non sia sufficiente viene da molti consigliato di fare una incisione nella gengiva onde potere per mezzo di essa agire più facilmente su i pezzi depressi, e portarli al loro luogo naturale.

La frattura della mascella superiore è molto pericolosa sì per le gravi conseguenze, che può naturalmente seco porta, come ancora per la difficoltà, che si presenta nella cura della medesima. Il colpo violento portato sulla mascella superiore può produrre la frattura dell'osso mascellare, e far cadere i denti dal loro luogo naturale. Se i denti non possano rimettersi nel loro alveolo, si dovranno estrarre del tutto, in caso diverso però si dovranno rimetterli in sito, e serviranno a consolidare la frattura legandoli ai denti vicini, e con mastici stabilmente ne' propri alveoli. In que-

è riuscito di tenere in sito le parti fratturate della mascella superiore applicando contro la medesima la mascella inferiore, e tenendovela fortemente appoggiata con un' adattata fasciatura, lo che si può anche rendere più vantaggioso procurando, che la stessa fasciatura tenga in sito ancora le porzioni dell' osso fratturato. Qualunque però sia il metodo, di cui si faccia uso per contenere questa frattura è condizione necessaria di tenere le parti immobili, e quindi si dovrà vietare al malato di nutrirsi di cibi solidi, che richieggono masticazione, o movimento della bocca per essere inghiottiti, e per conseguenza il nutrimento consisterà in soli cibi fluidi, e potrà supplirsi ai medesimi con de' clisteri nutrienti, se la deglutizione sia impedita.

La frattura della mascella inferiore è una malattia non molto commune, e viene prodotta ordinariamente o da cadute sulla parte stessa, o da colpi violenti, come p. e. calci di cavalli, che ne sono le cagioni più frequenti. I sintomi, che sogliono accompagnare questa frattura variano a seconda della sua qualità, potendosi la mascella inferiore rompere o nel mezzo, o ne' lati, o vicino le apofisi, ed in questi due ultimi casi si può ancora fratturare o da un sol lato, o da ambedue, restando i pezzi laterali allora sollevati dalla contrazione de' muscoli. La contusione, e la ferita suole essere ordinariamente unita alla frattura di questa parte, e non di raro è ancora lacerato il nervo mascellare inferiore rompendosi la mascella vicino al forame, per cui esce detto nervo, ed allora i sintomi sogliono essere assai gravi, e ne nascono le convulsioni, sorta, paralisi etc. Le percosse forti, che hanno prodotto la frattura dell' osso siccome agiscono su tutto il capo possono produrre ancora delle commo-  
zioni del cervello, e tutti gli effetti da esse dipen-

denti, quindi in generale queste fratture son pericolose. Non sono poi meno gravi le conseguenze, che seco portano d'infiammazione, suppurazione, e spesso anche la carie. La loro diagnosi è le meno difficili trattandosi di un osso molto articolato nelle due estremità, e quindi malgrado l'integrità del medesimo si vede ad occhio il go della frattura nel muoversi della mascella, di che sono segni chiari della frattura il dolore, e la mutazione della figura.

Per curare la frattura della mascella è necessario prima di ogni altra cosa farne la posizione qualora le ossa fratturate non restino nel loro luogo naturale. Per farne la riposizione si introduce l'indice, e medio nella faccia superiore della mascella, ed abbracciandola col pollice dalla parte esterna si tira in avanti, e simultaneamente, onde riporla a mutuo contatto. Per mantenere in questo la frattura dopo averla ridotta sarà necessario legare insieme i denti più vicini alla medesima, e particolarmente quelli, che sono più stabili ne loro alveoli, lo che si farà per mezzo di un filo ben forte. Quello poi, che è al sito della frattura si è di contenere le parti in sito per mezzo di una contentiva fasciatura fissata stabilmente sopra la testa. Una delle condizioni indispensabili alla frattura della mascella inferiore si è di nutrire il malato meno che sia possibile non introducendo nella bocca, che cibi fluidi, come brodi etc. e tenendosi da cose, che richiedono la masticazione. Si potrà supplire al nutrimento del medesimo per mezzo di lavativi nutrienti come abbiamo detto per la frattura della mascella superiore. Ordinariamente questa frattura viene consolidata in 30. o 40. giorni, e sarà più sollecita se dedita sia da un solo lato, giacchè essendo in ambi i lati non potrà il



e uso de' cibi solidi, che dopo 40. giorni circa.

La spina è soggetta alle fratture ugualmente, che le altre parti ossee del corpo umano. Devesi però a questo proposito avvertire, che le fratture della spina non consistono propriamente nella soluzione di continuità di un osso, ma piuttosto nella disunione delle vertebre fra di loro, e per questa ragione la soluzione di continuità della spina non può chiamarsi frattura, che considerandosi dessa come composta di un solo osso. Questa lesione della spina suole a preferenza accadere nelle vertebre del collo, e nell' unione di quelle del dorso con le lombari. In questi casi osservasi ordinariamente la divisione delle vertebre unita con la lacerazione dei legamenti, e cartilagini intervertebrali, con la frattura dell' apofisi delle vertebre, e segnatamente delle spinose, e qualche volta eziandio con la frattura del corpo stesso della vertebra, e lacerazione della midolla spinale, quando riconosca per cagione una palla dopo l' esplosione di un arma da fuoco. Le cadute, nelle quali si percuote il capo, la spina, o le natiche possono generalmente esser cagione della soluzione di continuità della spina.

Questa specie di frattura è pericolosa segnatamente per l' offesa, che viene a riportarne la midolla spinale, e siccome i sintomi, che aggravano la medesima dipendono in particolare dall' offesa de' nervi, ne siegue, che quanto più l' offesa sarà in alto, tanto i sintomi saranno più gravi, e la malattia pericolosa. La paralisi delle parti, che servono i nervi dalla porzione, che resta al di sotto della frattura è uno de' sintomi ordinarj di questa malattia, e quindi osservasi spesso nella medesima la ritenzione d' orina, e delle feccie, o il loro esito involontario. La commozione della spinal colla, e le commozioni de' visceri del petto, e

parte dalla clavicola, e le ultime parimenti a loro maggiore elasticità. Varie sono le fratture delle coste segnatamente per quello riguarda il dove esse si rompono, ch'è per ordinario te media delle medesime. Le fratture dell distinguonsi ancora secondo la direzione della forza, ch' agisce sulle medesime, e quindi oss delle fratture all' infuori, e delle fratture all' tro. Le fratture all' infuori accadono quando vità del petto trovasi spinta da due forze, li agiscono sulle due estremità delle coste, direzione opposta, allora siccome le due estremità sono obbligate ad avvicinarsi, la costa si rompe mezzo. Le fratture all' indentro accadono per l' contrario quando la forza agisce sulla parte media delle coste, o quando il petto percuote con violenza sopra detta parte.

Le fratture delle coste sono accompagnate da alcuni sintomi, che meritano particolare attenzione, e questi possono dipendere o dalla stessa causa, che ha prodotto la frattura, come p. e. contusione, o ferita esterna, ovvero dalla frattura stessa, e segnatamente dalle estremità delle coste fratturate, come lacerazioni della pleura, o emoragie, infiammazioni, ed enfisema. Il dolore nella respirazione accompagna queste fratture, segnatamente se il malato voglia fare delle grandi ispirazioni. In questo momento il malato conosce facilmente la frattura delle coste, premendo la parte dolente nel tempo dell' inspirazione si sente con la mano la mobilità delle coste, e persino il crepito delle medesime, qualora la frattura non sia complicata da enfisema, o non sia in luogo ricoperto da molti muscoli, come p. e. nelle estremità vertebrale delle coste.

Secondo la specie delle fratture, e giusta

lità de' sintomi, che l'accompagnano debbesi giudicare il grado del pericolo delle medesime. Se la frattura sia semplice, e senza offesa delle parti contenute nel torace, come ancora se dessa non sia accompagnata da gravi accidenti, la guarigione non sarà molto difficile. La frattura delle coste è poche volte accompagnata dalla mutazione di luogo de' pezzi infranti, attese le grandi adesioni, che ha ogni piccola porzione di costa con le altre vicine, ed essendo nella maggior parte de' casi sufficiente la respirazione per far ritornare li pezzi delle ossa nel loro stato naturale, eccetto nel caso, che la costa sia rotta in più pezzi, e qualche porzione resti totalmente distaccata dal rimanente. Se poi la frattura della costa sia unita a sintomi gravi, e segnatamente all' offesa della pleura, o del polmone, non è raro, che tali fratture siano mortali seguendone l' emottisi, o l' infiammazione del petto, che portano seco funeste conseguenze. E' d' avvertirsi, che i sputi sanguigni, e l' emottisi possono essere prodotti dalla sola forza esteriore, comunicata al delicato viscere, senza che desso sia stato offeso dai frammenti della costa fratturata.

La cura di questa specie di malattia consiste principalmente nel riporre le porzioni d' osso nel loro stato naturale, secondo nel mantenerle, e terzo nel prevenire gli effetti dell' offesa delle parti prossime alla frattura. Per ridurre le porzioni d' osso al loro stato naturale devesi applicare la fasciatura in modo, che comprima nel senso opposto all' direzione della forza, che ha prodotto la frattura, comprimendo cioè le due estremità della costa, e la frattura sia all' indentro, e comprimendo mezzo della costa, o sul luogo fratturato stes-  
 se dessa sia rotta all' infuori. Il metodo da altri pratici consigliato d' incidere gl' integumen-



ti, ed introdurre degli strumenti per elevare l'osso depresso e da moderni per esso costrutto, e pericoloso. Questa cura non mena dalla faccia a corpo, e dal petto sufficiente mezzo per contrare le cure state tentate. Per quello poi appartiene generale dovrà esser data antistessante sempre costrutto sintomi gravi, ed in esse minaccia di morte, spuma di sangue, peripneumonia. Per quello riguarda i sintomi di ecchimosi, contusione etc. mi già trovare dato le regole necessarie da usarsi casi, lo stesso dicasi dell' enfisema, che qua alle volte la frattura delle coste, è più sicuro, che la punta dell'osso fratturato si perfora. In questi rari casi attesa una sorgente d'aria può l'enfisema arrivare grado sì grande da produrre la morte. Le compresse applicate sull'enfisema possono farlo, o arrestarne i progressi, ma se cade alcuni consigliano di fare un'incisione guernita sul punto corrispondente alla frattura de l'aria trovando libera l'uscita al di fuori s'insinui più nella cellulare.

Le fratture dello sterno non sono mai attese la sua situazione, e struttura. I colpi sullo sterno tanto sul mezzo del petto quanto sulle sue estremità sono le cause ordinarie di tali fratture, quantunque si abbiano qualche esempio di frattura dello sterno da una forte contrazione de' muscoli, che al petto si attaccano; la mobilità de' frammenti è caratteristico delle fratture dello sterno, hanno anche molte volte complicate con effusione etc. Non è poi raro, che nelle fratture dello sterno si faccia nel petto uno stravasamento

la cui è mescolato del suco midollare contenuto in abbondanza nel tessuto spongioso di quest'osso. Un sintoma ancora può essere la depressione dei pezzi nella cavità del petto, depressione però, che non è così frequente essendo impedita sì dalle coste, che ritengono i pezzi fratturati dello sterno nel loro stato naturale, come ancora dalla dilatazione del polmone nella respirazione.

La respirazione difficile accompagna ordinariamente questa specie di fratture, come ancora la tosse, lo sputo sanguigno, e la difficoltà di giacere sul dorso sono sintomi delle medesime. Possono queste fratture portar anche seco la infiammazione delle parti contenute nella cavità del petto, e così ancora la loro suppurazione, la carie dello sterno, la tisi, ascesso, fistola etc.

Nella cura delle fratture semplici dello sterno altro non richiedesi, che il riposo, procurando, che i muscoli al medesimo osso attaccati restino nel massimo rilassamento, al quale effetto sarà necessario tenere il malato in una situazione, che il capo resti un poco incurvato sul petto, ed il bacino sull'addome, applicando nello stesso tempo sulla parte delle compresse imbevute in liquori risolvanti etc. Questo metodo sufficiente nelle fratture semplici dell'osso dello sterno deve essere modificato nelle fratture complicate secondo i sintomi, dai quali esse sono accompagnate. Se la contusione sia violenta, se esiste ferita esterna, se i pezzi d'osso siano penetrati nella cavità del petto, fa duopo far uso del regime antiflogistico praticando i necessari salassi, la dieta rigorosa, le bevande, ed applicando de' cataplasmi emollienti sul luogo della frattura. L'estrazione delle porzioni d'osso penetrate nel petto, come ancora l'esito delli fluidi nel medesimo contenuti sono oggetti da aversi in mira nella cura delle

fratture dello sterno. Molti pratici propongono quest' oggetto la trapanazione dell' osso medesimo operazione, che di rado rendesi necessaria ecc. nel caso, in cui l' osso abbia principiato a cariar essendo allora indispensabile di separare la carciata dalla sana, altrimenti la carie dell' osso produrrebbe delle ulceri fistolose incurabili. Adempite tutte queste indicazioni è necessario mantenere la frattura nel suo stato naturale, e questo otterrassi mezzo di una fasciatura circolare munita di presse, che si terrà tanto stretta, quanto potrà frirsi dal malato.

Avendo ora trattato delle fratture principali le ossa più interessanti del capo, e del tronco, stanno a considerarsi quelle delle ossa, che compongono l' estremità, e primieramente di quelle appartenenti alle estremità superiori. La clavicola è soggetta alla frattura essendo situata molto superficialmente, ricoperta soltanto da comuni integumenti, e fissata immobilmente alle ossa contigue alle sue estremità, mentre è libera nella sua parte media, dove la frattura è infatti più facile ad accadere.

Nelle fratture della clavicola osservasi ordinariamente, che il peso del braccio tira in basso la porzione esterna della clavicola al medesimo punto ed essendosi questa porzione abbassata viene tenuta all' indentro dal muscolo gran pettorale, qui accade, che nelle fratture della clavicola il pezzo esterno resta per solito sotto il pezzo interno, questa circostanza la spalla, ed il braccio si avvicinano al petto, non esistendo più la resistenza data dalla clavicola, la quale impedisce la scollatura di avvicinarsi allo sterno. Da questo spostamento della spalla ne viene, che nelle fratture della clavicola non può il malato elevare il braccio sopra



giacchè per effettuare questo movimento è necessario, che il braccio formi un moto di intazio-  
il di cui centro si ritrovi nello sterno per mezzella clavicola. Queste fratture possono essere accompagnate da contusione, lo che ha luogo quando la frattura sia prodotta da una forza, che ha agito direttamente sulla parte stessa. Può ancora esistere ferita ne' comuni tegumenti, e finalmente non raro osservasi, che il colpo è così forte, che non ne resta infranto in più pezzi. Se la frattura della clavicola sia l'effetto del controcolpo, i pezzi della frattura vengono spesso a forare i comuni integumenti, giacchè accadendo in questo caso la frattura per una forte pressione fra lo sterno, e la scapola, la curvatura della clavicola viene accresciuta, e rompersi i pezzi all'infuori forano la cute. La luogo nelle cadute, che si fanno o sopra il collo della spalla, o sulle mani qualora siano estese, ed in ogni caso, in cui il colpo tenda a ravvicinare la spalla allo sterno. Quando la frattura si nella estremità scapolare è alquanto difficile a scarsi restando le ossa in sito, giacchè in questo vengono ritenuti i frammenti dai ligamenti, e discono la clavicola all'apofisi coracoide.

Le fratture della clavicola accadono o per un colpo, o in virtù di una forza, o colpo diretto applicato sulla parte stessa. Nelle fratture di controcolpo l'osso è di rado rotto in più pezzi, e non esiste nè contusione, nè ferita. Contrario poi osservasi nelle fratture della clavicola prodotte da una violenza applicata sulla mano.

In questi casi può anche accadere, che i vasi clavicolari ed i nervi brachiali restino lesi fra la clavicola, e la prima costa, dal che aver origine la paralisi del braccio, o qualunquismo. Questo caso è molto ordinario quan-

do la frattura è prodotta da un colpo violento dalla caduta di un corpo pesante sulla clavicola, il quale producendo la frattura della medesima, nello stesso tempo abbassa la spalla.

Queste specie di fratture sono ordinarie, senza pericolo alcuno, ma qualche esso le accompagni dipende piuttosto dai sintomi, che son ti alle medesime, e dalla gravità delle cause l'hanno prodotte, di quello sia dalla natura della frattura. Pericolosa può essere la frattura della clavicola se sia cagionata da un colpo, ma da fuoco, se il colpo sia stato violento, abbia prodotto violente contusioni, ferite, lacerazioni etc. Quello però, che rende qualche volta le fratture di cattiva conseguenza si è la durezza del callo, che può restare per l'effetto d'un metodo di cura non adattato, e perciò la diminuzione de' moti del braccio.

Molti sono i metodi inventati per la cura della frattura della clavicola, e si sono imaginati vari apparecchi per tenere la spalla lontana dallo scapolo, sostenendola, e portandola all'infuori. La maggior parte però di questi apparecchi oltre l'essere complicati, ed incomodi pel malato non hanno punto ad ottenere l'intento che il Cerusico propone, giacchè tutti hanno il difetto di tirare la scapola, e quindi producono facilmente lo spostamento delle porzioni d'osso fratturate, e tolgono, che deesi per quanto è possibile evitare, di non ottenere un callo deforme. Oltre di che se noi esaminiamo questi diversi metodi di curare le fratture della clavicola, riconosceremo facilmente, che niuno di essi è sufficiente ad impedire l'abbassamento della spalla prodotto dal peso del braccio, e quindi l'abbassamento della parte superiore o omerale della clavicola rotta.

Il miglior metodo per contenere in sito le porzioni della clavicola fratturata senza incorrere in alcuno degli accennati inconvenienti si è quello di combinare insieme la fasciatura, che tenga le parti immobili applicando nello stesso tempo de' cuscinetti sotto la spalla, i quali servano ad allontanare la medesima dallo sterno. Il metodo è il seguente. Si pone sotto l'ascella un cuscino in forma di cono, e ripieno di crino lungo poco meno che il braccio, e largo 4, o 5 pollici, e 3 pollici grosso nella base, o nella parte, che applicar si deve sotto l'ascella. Questa base è fissata nel suo luogo per mezzo di due nastri, i quali sono alla medesima attaccati, e vengono annodati sulla spalla opposta. Situato questo cuscino sotto l'ascella prende il Cerusico il cubito della parte affetta, e flettendo l'antibraccio spinge il cubito in avanti, e indietro elevandolo insieme, e l'applica indi fortemente al petto. Con questa operazione si viene a scostare la spalla dallo sterno, e si riporta il pezzo della clavicola infranta nella sua natural posizione, e così ottiensì la riduzione dello spostamento dell'ossa, e più non resta, che a mantenere le parti in questa situazione. Per ottenere questo effetto si prende una fascia lunga 7 o 8 braccia, ed arrotolata da una sola parte. Si applica un capo della medesima sotto l'ascella del lato sano, si passa in seguito davanti il petto, e poi sul braccio del lato affetto, indi sul dorso ritornando poi sotto l'ascella del lato sano. In questo modo viene a circondarsi il tronco con molli di fascia avvertendo di stringerli sempre maggiormente quanto più si arriva vicino all'estremità del cubito dalla parte affetta, nel qual luogo della fasciatura esser compressa più fortemente restando in questo punto l'estremità della leva forata dall'osso del cubito per tenere la spalla nel-



la massima distanza dal petto. Questa prima tura serve ad adempiere alla prima indicazione quanto dire ad allontanare la spalla dal petto chiedesi ora di soddisfare all'altra, di tenere la spalla sollevata, ed a sostenere il braccio. A sto oggetto dopo aver applicato sulla frattura le compresse imbevute nello spirito di vino curato, o altro liquore, che si crederà necessario prende una seconda fascia, la di cui estremità applica ugualmente sotto l'ascella del lato sano si porta obliquamente sul petto fin sopra la spalla affetta, indi dietro il braccio, e passandola sotto il cubito si riporta obliquamente dinanzi il petto rivato sotto l'ascella del lato sano è necessario fare questo primo giro di fascia facendola girare intorno la spalla dello stesso lato. Dopo di che si riporta la fascia dietro le spalle, e si torna sulla spalla affetta. Si incrocicchia sulle compresse ricuoprono la frattura, e discendendo all'indietro del braccio si fa passare sotto il cubito, si sale dietro la spalla fino sotto l'ascella del lato opposto, terminando poi con due giri circolari intorno al tronco. Per rendere questo apparecchio solido sarà bene cucire insieme le fascie ne' luoghi dove le medesime si decussano, ovvero attaccarle insieme con delle spille. La mano è necessario sia sostenuta in una piccola sciarpa, ed è bene coprire tutto l'apparecchio con un pezzo di tela grande.

Questo apparecchio quantunque corrisponde alle principali indicazioni da aversi in mira nella cura della frattura della clavicola, non è però tale che non abbia alcuni, da' quali anzi si crede soggetto a diversi inconvenienti. In primo luogo dicono che questa fasciatura composta di un numero di fascie attorno al tronco sono questi molto sog-

scomporsi contribuendo a questo effetto i movimenti stessi della respirazione. La compressione, che l'apparecchio esercita sul petto è molto incomoda, e rende difficile ancora la respirazione, e di più essendo l'apparecchio assai complicato si rende secondo essi imbarazzante pel paziente, o di molta difficoltà nell'applicazione. Inoltre fanno osservare, che se venga a fissarsi con una fascia il cuscinetto, che ponesi sotto l'ascella, lo che non è necessario, in caso, che questo venga a rimuoversi dal suo luogo naturale è indispensabile per riporcelo di sollevare il braccio, e produrre quindi un movimento, che non può sicuramente esser di vantaggio alla frattura.

Per ovviare a questi inconvenienti si è provato di correggere il detto apparecchio sostituendo alla fascia delle cinte di tela fissate con delle fibbie che hanno creduto renderle più stabili, e quindi sia meno soggetto tal apparecchio a smoversi, oltre di che la fasciatura è meno complicata, quindi meno incomoda pel paziente, e meno imbarazzante è sì per esso, come pel Cerusico ogni volta, che deve rimuoversi. Questo metodo consiste in una cinta di tela larga circa cinque pollici, con la quale si circonda il tronco, fissandola sul medesimo per mezzo tre linguette esistenti in una delle due estremità, e che si uniscono a tre fibbie stabili nell'altra. Questa fascia, che va fissata sul tronco all'ascella del braccio porta altre quattro fibbie, due anteriori, e due posteriori, ad ugual distanza dalle estremità. Nella parte inferiore del braccio si applica un'altra cintura, che ha quattro striscie, con la quale si fissa nelle quattro fibbie della prima cintura. Sotto di essa si è di impedire, che il braccio si muova dal tronco, come ancora, che desso si porti anteriormente, o posteriormente sul medesimo.

E' finalmente necessario di aggiungere eziandio cuscinetto sotto l'ascella, affinchè la spalla non accosti di troppo allo sterno. Questo cuscinetto fissa con due fettucce, le quali si passano sulla spalla del lato sano. Questa correzione del metodo precedente è fondata sullo stesso principio, e quello di tenere il braccio aderente al tronco per impedire i movimenti delle parti fratturate, e per conseguenza è soggetto ai medesimi inconvenienti che si pretendono esistere nell'antecedente, e questo inoltre che è più complicato, giacchè richiede delle fascie, ch'è ben difficile il ritrovare sul momento, mentre poi è molto facile il procurarsi due semplici fascie, quali sono quelle, che richieggonsi nel primo metodo, che non è sicuramente, come ha preteso taluni, soggetto a de' gravi inconvenienti dimostrandoci la pratica essere esso l'unico, che soddisfa pienamente alle diverse indicazioni, che debbono avere per la consolidazione della frattura della clavicola, non escludendo per altro l'incomodo a cui va soggetto l'infermo nel soffrire l'apparecchio.

Alcuni Pratici per allontanare questo incomodo hanno consigliato di rinunciare a qualunque fasciatura, contentandosi del solo riposo, situando il malato supino nel letto col braccio del lato offeso appoggiato sopra un guanciale piegando l'antibraccio, ed avvicinando il gomito al tronco, e sul luogo stesso della frattura applicare un ceroto diaplasma. Si aggiunge a tutto ciò per vieppiù contenere la frattura una leggera fascia, che passi sopra la spalla, e sotto le ascelle, e si incroicchi dietro il dorso. Questo metodo si commenda ancora nel caso, che la frattura della clavicola sia composta, o complicata con ferita. Si usa anche in casi simili ricuoprire la clavicola con un pezzo



scapola di rado è soggetta a fratture. La  
ne è la sua situazione, essendo essa rico-  
ta grossi muscoli, e mobile in tutti i sensi  
onsequenza cede facilmente alle violenze es-  
enza fratturarsi. Convien però a questo pro-  
osservare, che alcune parti della scapola non  
de' medesimi vantaggi, e quindi sono più  
alle fratture, lo che osservasi segnatamen-  
l'acromion, che non è difeso dall'impres-  
e' colpi esterni. L'angolo inferiore della  
è ancora esposto alle fratture. L'apofisi  
è situata troppo profondamente per es-  
ggetta all'azione de' colpi esterni eccettua-  
pi d'armi da fuoco, i quali casi sono pres-  
soli, in cui accada la frattura di questa

fratture della scapola sono sempre accom-  
da una contusione considerabile, ed esse  
o per solito trasversalmente. Gli effetti di  
fratture sono varj secondo le parti divise,  
varia direzione de' muscoli, che vi si at-  
Lo spostamento maggiore accade nella frat-  
l'angolo inferiore, e dell'acromion per

tare di essa. La mobilità de' frammenti, ed  
giù delle ossa sono i segni più sicuri, ma  
malato è giovane, e la parte sia molto gonfi-  
sti segni non si riscontrano così facilmente.  
frattura sia nell'angolo inferiore è facile a  
scerarsi per la mutazione di luogo del pezzo  
tirato, ed osservasi chiaramente, che desso  
immobile se si muove la parte superiore del  
pola. La frattura dell'acromion si riconosce  
mente dalla variazione di figura, che osserva  
la spalla, dalla mobilità dell'acromion etc.  
guatamente da un infossamento, che notasi a  
go, dove la clavicola si unisce con quest'os-  
Tutti questi segni sono molto facili a ricon-  
per la situazione superficiale dell'acromion  
delle fratture della scapola più difficili a disti-  
si è quella dell'apofisi coracoide essendo  
desima situata molto profondamente.

Le fratture della scapola sono più per-  
per i sintomi, che l'accompagnano di quel-  
no per se stesse. La contusione è il sintom-  
ordinario, ed il più grave, essendo queste  
ture per solito accompagnate da gran contu-  
che viene prodotta da colpi violenti, che ne-  
riamente richiedonsi per fratturare un'osso  
coperto di muscoli come è appunto la scapo-  
ascendi sotto di essa, ed ancora i strava-  
petto possono essere le conseguenze della for-  
tusione, che accompagna le fratture della sc-

Il metodo di cura deve esser vario a  
della frattura, e segnatamente secondo la par-  
osso, dove essa esiste. Nelle fratture longi-  
li della scapola, come ancora nelle oblique  
cessario tenere i pezzi a mutuo contatto cor-  
cinare il braccio al tronco, e tenerlo in qu-  
tuazione per mezzo di una fasciatura circo-

quale avrà ancora il vantaggio di comprimere la scapola stessa, e quindi impedire lo spostamento dei pezzi, come altresì di contenere in sito le compresse bagnate in liquori attonanti, e risolventi, onde facilitare la riunione delle ossa divise. Un altro vantaggio poi di questo apparecchio si è quello d'impedire i movimenti della spalla, ed i moti del braccio indipendentemente dalla scapola. Se poi la frattura si ritrovi nell'angolo inferiore dell'osso, non è possibile opporsi all'azione del muscolo gran dentato, che tende a trasportare in basso, ed in avanti la porzione d'osso separato, perciò è necessario portare tutta la scapola in questo stato, ed a tal fine addurrà il braccio in questa direzione, onde si muova sul medesimo l'intera omoplata. Portato il braccio in dentro, in avanti, ed in basso devesi mantenere in tale situazione con una adattata fasciatura procurando, che l'antibraccio resti sempre nello stato di flessione, e mantenendolo semiflesso con una fascia fissata sulla spalla opposta.

Nelle fratture dell'acromion il muscolo Deltoidale porta in basso quest'apofisi, ed all'opposto la scapola viene tirata dal trapezio, ed angolare. In questo caso è necessario di sollevare il braccio procurando di riporre l'acromion nella sua naturale situazione per mezzo del capo dell'omero, che tende a portarlo in basso, ma siccome potrebbe il detto movimento elevare tutta la scapola, senza che poi l'acromion tornasse realmente al suo sito, si deve nello stesso tempo premere sulla scapola stessa, onde portarla ad incontrare l'acromion separato. Il mantenere il braccio elevato, e la scapola depressa sono le due indicazioni da aversi in mira nell'applicazione della fasciatura nel caso di frattura dell'acromion, e sarà parimenti indispensabile di far



sostenere il braccio, e spingere in basso la scapola nel cambiar l'apparecchio, che trattandosi di fascie di grande estensione facilmente si scompone. Nelle fratture dell'apofisi coracoide, e del capo della scapola, le quali però sono ben rare, converrà usare all'incirca lo stesso modo.

Le fratture dell'acromion attesa la forza notabile de' muscoli, che tendono a dividerlo dalla scapola stessa sono di cura più lunga dell'altre fratture di quest'osso, e di quelle delle altre ossa, giacchè se si togliesse l'apparecchio prima del tempo potrebbe la forza muscolare riprodurre nuovamente la frattura. Non è poi qui necessario l'avvertire, che ai rimedi locali debbono unirsi ancora i generali. Siccome abbiamo già detto, che le suppurazioni, stravasi, e simili sintomi sono la conseguenza di queste fratture, così è necessario prevenire tali accidenti col regime antiflogistico; formatosi poi l'ascesso sarà necessaria l'apertura, e se desso abbia luogo sotto la scapola potrà ricorrersi eziandio alla trapanazione dell'osso.

La frattura del braccio non è delle più comuni attesa la mobilità somma dell'osso dell'Omero, il quale è per conseguenza più soggetto alle lussazioni, che alle fratture. Le fratture dell'osso dell'omero distinguonsi secondo il luogo, che occupano, e principalmente si dividono in fratture del collo dell'omero, in quelle del corpo del medesimo, e finalmente in quelle delle sua estremità inferiore. Le fratture del collo dell'omero sono quelle, che accadono nella parte superiore del medesimo, e chiamansi fratture del collo dell'omero impropriamente, giacchè per solito la frattura ha luogo al di sopra dell'attacco del muscolo pettorale, e gran dorsale. Non è però impossibile, che abbia luogo ancora una vera frattura del collo

omero in seguela di una ferita d' arma da

sintomi, che seco portano le fratture dell' omero, variano a seconda del luogo, che è fratturato. Quelle del collo dell' omero così dette sono le più difficili a riconoscersi, la grossezza del muscolo deltoide ricuoprendo tutta l' articolazione, e ne viene, che può facilmente confondersi colla lussazione di quest' osso, ma in questa l' acromion forma un risalto, quando che nella frattura, di cui parliamo, la spalla gode della sua mobilità naturale. Si osserva inoltre nella frattura una mobilità maggiore, che nella lussazione, e ancora si sente una specie di moto accompagnato da crepito sotto il capo dell' omero, giacchè la parte inferiore dell' osso viene portata all' fuori dai muscoli, che vi sono attaccati; allora l' osso è portato all' infuori. Due segni ancora distinguono la frattura di questa parte dell' omero: la immobilità del capo di esso nel tempo che si fa muovere la parte inferiore dell' osso, e l' intorciamento, o almeno la mancanza di alzamento del braccio, che suole accompagnare la frattura.

Se le fratture del corpo dell' osso se desse sia sopra l' inserzione del deltoide i pezzi restano uniti per l' azione de' muscoli bicipite, e tricipite, e ancora i frammenti non sono discostati, se la frattura abbia luogo nella parte inferiore del medesimo. Se però dessa sia sopra l' inserzione del Deltoide, ed abbia acquistato nel tempo della direzione obliqua il pezzo inferiore sopra il superiore. Le fratture dell' Omero sono nella sua parte inferiore vicino i comi, e non siano tanto difficili a riconoscersi, come quelle del collo del medesimo si possono

no per altro alle volte confondere con la  
ne dell' Ulna, si distingue però molto  
osservi il cangiamento di direzione dell'  
l'ineguaglianza, che si sente nell'estrem  
mero, la crepitazione, il dolore, la d  
moti.

Per quello appartiene al pericolo de  
ra dell' Omero, qualora dessa interessi  
quest' osso, la malattia è ordinariament  
conseguenza, e guarisce facilmente pr  
dagli accidenti, che possono alle volte  
gnarla. Il pericolo però cresce sempre  
tura esista in una delle estremità dell' oss  
to più è dessa vicina all' articolazione ta  
tura è più grave. In questi casi può s  
gere l' anchilosi, può ancora la frattura r  
un callo mal formato, che poi impedis  
vimenti stessi dell' articolo, come anch  
le conseguenze può esserne la laceraz  
parti, e quindi l' infiammazione, la sup

Circa il metodo di cura delle fra  
Omero è di mestieri distinguere la loro  
la frattura sia semplice, ed esista nel  
osso non ne è difficile la cura. Il migl  
di ridurla si è quello di praticare l' est  
la contro estensione facendo tener ferma  
to la spalla per mezzo di un assistente,  
sti situato alla parte opposta della fratt  
ti le sue braccia una anteriormente sul  
malato, e l' altra posteriormente sul dor  
desimo. Un secondo assistente poi pren  
te inferiore del braccio sui condili dell'  
lo tirerà in senso opposto. Il Cernisic  
lato del braccio offeso farà con le mani  
ne dell' osso fratturato, e si conoscerà e  
duta quando il braccio è ritornato alla si



giusta, ed alla sua natural direzione, procurandogli naturalmente, che il condilo esterno dell'omero risponda alla parte più elevata del grosso della tibia. Ridotta la frattura deve applicarsi la fascia, sarà lunga 7 a 8 braccia, e rotolata da un solo filo. Si pone nella palma della mano una quantità di filo, acciò servano d'appoggio per sostenere la frattura, e fatta poi chiudere la medesima si applica la fascia principiando dalle dita, e continuando circolarmente sull'antibraccio fino all'articolazione del cubito. Arrivata a questo punto la fascia si piega l'antibraccio sul braccio, e si continua ad avvolgerla circolarmente sul braccio stesso facendo di fare due, o tre giri sul luogo della frattura, ovvero questi si fanno prima con un'altra piccola fascia. Quando si è giunto con essa fino alla spalla si debbono collocare le stecche in numero di quattro, le quali saranno formate di legno, o meglio ancora di latta. Queste si applicano intorno il luogo della frattura alle quattro parti del braccio, che se non sarà molto grossa basteranno soltanto tre. Si faranno sostenere medesime da un assistente, ed il Professore tornerà con la fascia i giri intorno il braccio, e così a ricuoprire le stecche, e mantenerle nel luogo, avvertendo di ritornare fino al cubito, sull'antibraccio, e di non stringerla troppo nel modo che non produca una dolorosa compressione. Questa condizione indispensabile per la cura di questa frattura, specialmente per i primi giorni, che la fascia applicata non solo sul braccio offeso, ma sull'antibraccio, e sulla mano, giacchè lascia questa precauzione atteso lo stringimento, che fa nascere la fasciatura nel braccio qualche volta impedita la circolazione libera nelle parti sottoposte alla frattura, e dal

ristagno de' medesimi nell' antibraccio, e nella mano possono prodursi de' gonfiori edematosi, che fermandosi nell' articolazione, ed addensandosi i fluidi in essa contenuti possono dare origine ad una falsa anchilosi. Tutta questa fasciatura deve essere imbevuta in un qualche fluido risolvente.

Applicato l' apparecchio si sosterrà la parte offesa o con un cuscino se il malato resta nel letto, ovvero con una sciarpa se desso sta in piedi, lo che forse è riputato molto meglio meno che i primi giorni, e se non esistano sintomi gravi. L'apparecchio non si rinnoverà, che dopo cinque, o sei giorni, ed in seguito anche più di raro se non sopraggiungono accidenti, che obbligano a toglierlo. Siccome poi in questa frattura forse più, che in ogni altra è facile a sopraggiungere la falsa anchilosi nell' articolazione coll' antibraccio sarà ben fatto di far eseguire de' moti all' articolazione, onde impedire la rigidità della parte. Per quello appartiene alla cura universale, ed interna in casi di frattura dell' omero ci riportiamo a ciò che abbiamo detto parlando delle fratture in generale.

Lo stesso metodo, che abbiamo esposto per la cura delle fratture del corpo dell' omero ha eziandio luogo se la frattura sia in una delle due estremità, osservando però alcune modificazioni particolari. Se la frattura esista nel collo dell' omero, le stecche soddisfano completamente al numero di tre, ma non è sufficiente la fasciatura proposta nelle fratture del corpo stesso dell' osso, essendo necessario adoperarne una simile presso a poco a quella, che abbiamo proposto per la frattura della clavicola, l' oggetto della quale si è quello di opporsi ai movimenti del braccio, procurando, che esso non si discosti dal tronco, e così si viene ad impedire che le parti fratturate si muovano dalla loro giusta

e, che difficilmente conservano ne' movimenti mancando nella parte superiore dell'os-  
so la sufficiente lunghezza, ed essendo si-  
mpio profondamente per poter esser man-  
tabile nella necessaria posizione. Gioverà  
o a questo oggetto il riempiere esattamen-  
o dell'ascella con un cuscinetto, o con del-  
per impedire l'accostamento della parte in-  
ell'osso dell'omero al tronco.

ora poi la frattura dell'omero trovisi vi-  
ondili, o siano i condili fratturati essi me-  
a malattia è assai più grave, e porta seco  
e l'anchilosi falsa. Alcuni propongono in-  
si di tenere il braccio in una estensione,  
tessa direzione dell'antibraccio, onde for-  
eme una sola linea, ed indi circondare l'ar-  
te con delle stecche mantenute da una fa-  
e dalle compresse, che suppliscano alle  
anze dell'articolazione. Questo metodo sa-  
vero il più sbrigativo, se non fosse sog-  
ortar seco l'anchilosi dell'articolazione del  
quindi sarà meglio servirsi dell'ordina-  
tura, che di sopra abbiamo indicato te-  
antibraccio piegato nella stessa maniera. Se  
ssolutamente necessaria l'applicazione del-  
sopra l'articolazione molti hanno propo-  
rmare delle stecche a cerniera, onde po-  
licare restando piegato l'antibraccio, ov-  
ossono mettere quattro piccole stecche al-  
inferiore del braccio, e quattro simili alla  
eriere dell'antibraccio, situando poi la so-  
tura. Le fratture del braccio complicate  
trattarsi secondo le regole generali già

antibraccio è soggetto alle fratture ugualmen-  
braccio, ma essendo questa parte com-



continuamente per l'azione del quadrato, e pronator rotondo. Sarà quindi miglior consiglio, che le due prime stecche accennate siano di qualche linea più larghe dell'antibraccio, affinchè i giri della fascia non agiscano sulle parti laterali del medesimo. Applicato l'apparecchio si collocherà il braccio nella sciarpa, e si terrà fisso in modo, che il malato possa anche alzarsi, e camminare per tutto il tempo della cura.

Per mantenere lo spazio interosseo, e quindi conservare i moti di pronazione, e supinazione si rinoverà l'apparecchio ogni settimana, procurando sempre di rispingere, e contenere i muscoli nel detto spazio per impedire il ravvicinamento delle ossa. Se la frattura è semplice succede ordinariamente la riunione nello spazio di 30, o 40 giorni. Nel caso poi di fratture complicate è necessario, che il malato sia sempre in letto, e si usi una fascia a bende separate, facendogli tenere l'antibraccio appoggiato sopra un cuscino nello stato di pronazione. Se gli accidenti, che complicano la frattura durino molto tempo producono il ravvicinamento delle ossa fra loro, e quindi la perdita dei moti di pronazione, e supinazione. A quest'oggetto è necessario di applicare al più presto possibile l'apparecchio di sopra accennato con le stecche, e compresse. L'ingorgamento della mano accompagnato da flitteni, o vesciche, che accade molte volte in conseguenza della fasciatura si cura slargando la fascia, aprendo le flitteni, e medicando la parte con qualche digestivo.

La frattura del raggio è più frequente di quella del cubito, giacchè oltre l'essere esso esposto a fratturarsi per i colpi esterni portati direttamente sul medesimo, è soggetto ancora a rompersi, come si dice per contro colpo, per gli urti, che

estensione, la quale si farà piegando l'antibraccio ad angolo retto sul braccio, e facendo prendere l'arto da due assistenti in senso opposto. Uno di essi cioè prenderà la mano del malato, e se si potrà meglio ancora le stesse estremità inferiori dell'ulna, e radie e l'altro terrà fisso il braccio o l'estremità superiore dell'antibraccio facendo la contr'estensione. In questo tempo il Professore riporterà le ossa nel loro sito naturale procurando di situare anche i muscoli nello spazio interosseo, lo che si eseguisce assai facilmente.

Per mantenere poi la frattura nella sua posizione deve indi applicarsi l'apparecchio consistente in due compresse piuttosto lunghe, e graduate in modo, che siano più larghe dove toccano l'articolazione. Questo si otterrà formando le medesime di un solo pezzo di tela della lunghezza dell'antibraccio, e ripiegato sopra se stesso, diminuendo sempre la larghezza della piegatura. Queste compresse saranno secondo il solito bagnate con qualche liquore attonante. Sopra le compresse si applicherà una fascia circolare, che principj a formare due o tre giri sul luogo della frattura, ed indi vada discendendo fino alla mano, dove si circondi il metacarpo lasciando fuori il pollice, e si risalisca così fino all'articolazione del cubito. Fissate in questa maniera le compresse si pongono due stecche lunghe quanto l'antibraccio alle due facce del medesimo, e ritornando con la fascia sopra le stecche fino alla mano si mantengono nella loro naturale posizione. Molti Autori consigliano di porne due altre lateralmente all'antibraccio, ma queste secondo alcuni pratici più proprie a produrre lo spostamento delle ossa, che ad impedirlo, giacchè non favoriscono esse, che a procurare il ravvicinamento dell'ulna, e raggio, cosa a cui tendono



guardo alla larghezza , ed accostarsi all' ulna stessa.

Il metodo di cura conveniente nelle fratture del raggio si è il medesimo , che quello proposto nella frattura dell' antibraccio . Deve soltanto avvertirsi , che l' estensione sia determinata principalmente sul raggio , al quale oggetto si procurerà di scostare all' infuori il frammento inferiore . Il Professore deve avere in mira di impedire l' avvicinamento del raggio all' ulna , e questo stringendo i muscoli per mezzo delle compresse per spingerli , e mantenerli nello spazio interosseo, onde conservare il medesimo. Nel rimanente si osserveranno le stesse precauzioni , che abbiamo accennate parlando della frattura dell' antibraccio.

Le fratture dell' ulna sono meno frequenti , che quelle del raggio , ed hanno luogo ordinariamente per un colpo portato direttamente sull' osso , ovvero per una caduta nella quale venga percosso il medesimo contro una resistenza. La maniera di riconoscere questa frattura non varia punto , da quella indicata per la frattura del raggio . Il metodo di cura è parimenti lo stesso avvertendo bensì di dirigere l' estensione sull' ulna , e si dovrà parimenti procurare d' impedire il ravvicinamento delle ossa . In tutte le fratture poi dell' antibraccio è necessario fare eseguire al malato dei movimenti per impedire l' anchilosi dell' articolazione del cubito .

Le fratture dell' Olecrano quantunque propriamente possano considerarsi come fratture dell' ulna , meritano tuttavia una particolare attenzione . Quest' apofisi ha molta analogia con la rotula riguardo le funzioni , che ambedue esercitano , ed i muscoli , che ci si attaccano . L' olecrano si rompe ordinariamente nella sua base , e le fratture del medesimo sono ora prodotte dall' azione stessa de muscoli estensori dall' antibraccio , o sia del tricipite , il quale estendendo con forza l' antibraccio produce la frattura



rano, ed ora accade la frattura di questa  
una violenza esterna, che percute il cu-  
vero per una caduta sopra detta parte. Il  
il più costante di questa frattura si è quel-  
dipende dall'azione del tricipite, il quale  
in alto il pezzo di olecrano fratturato,  
nell'articolazione del cubito un vuoto nel-  
esterna, che è maggiore quando l'antibrac-  
cato, di quello che quando è esteso. L'ole-  
sa al di sopra de' condili, ed è mobile re-  
sa l'ulna. Da tutti questi segni si vede,  
difficile il ravvisare questa frattura se pu-  
ista una violenta contusione, che ne ren-  
eno chiara la diagnosi, la quale però sa-  
almente sicura dopo dissipati i sintomi in-

idurre la frattura dell'olecrano fa di me-  
ere la parte fratturata a contatto dell'os-  
na, mantenerla nella stessa situazione,  
alla forza del tricipite, che tende con-  
a portarla in alto. Si deve a questo og-  
ondare l'antibraccio con una fasciatura me-  
e stretta, e facendo in seguito stendere  
io sul braccio si spinge l'olecrano in bas-  
o a contatto dell'ulna estendendo la pel-  
ito si fa passare un giro di fascia dietro  
, e sopra del medesimo, indi un altro di  
osì alternativamente in modo, che l'ole-  
fissato nel suo luogo. Si continua indi  
a fino sul braccio. Ciò fatto ponesi una  
i sfila nell'articolazione del cubito, e si  
arte interna del medesimo una lunga stec-  
forte, che si fissa poi con de' giri della  
quale deve discendere dall'estremità su-  
braccio fino alla mano. In questa ma-  
impedita ogni flessione dell'antibraccio.

zione della falange, e secondo i più moderni P ci alla disarticolazione del dito nella sua unione e estremità dell'osso del metacarpo.

Fra le fratture delle estremità inferiori la ma, che si presenta ad esaminare si è quella femore, che è molto soggetto alla medesima alla sua lunghezza. Esse possono essere o nel corpo o nelle estremità dell'osso; noi però non parliamo qui di quelle del suo collo, di cui tratteremo separatamente in appresso, e discorreremo ora di tanto di quelle del suo corpo, dell'estremità inferiore, e della superiore. Le fratture del femore presentano molte varietà, ed attesa la gran quantità e forza de' muscoli al medesimo appartenenti si cede quasi in tutte un' discostamento de' frammenti, che può accadere in moltissime direzioni. Nelle fratture oblique, e non sempre nelle trasversali i pezzi si soprappongono, e la coscia si accorcia. In generale presso che in ogni frattura della coscia il pezzo inferiore è quello, che suole esser trattenuto all'insù, se pure non si eccettui la frattura, che accade immediatamente sotto il piccolo trocane, giacchè allora il psoas, e l'iliaco, che ivi si attaccano tirano l'estremità del frammento superiore in alto, ed in avanti, ed ivi forma un tumore. Non è poi molto difficile il riconoscere le fratture della coscia, giacchè la deformità del membro, il raccorciamento, il cangiamento di direzione, la sporgenza dei frammenti delle ossa, l'impossibilità de' movimenti, il dolore, il crepito etc. non lasciano alcun dubbio sulla malattia. Queste fratture non poi molto gravi, e di cura difficile attesa la quantità di muscoli, che impediscono di mantenere unito i frammenti, e quindi richiedono molta attenzione per la cura.

Il metodo più adattato è il seguente. Il me

deve esser posto in un letto non molto largo, e fornito di materazzo piuttosto duro. La testa sarà sostenuta da un semplice cuscino, ed il letto sarà orizzontale. L'apparecchio consiste in una quantità di striscie di tela, tre stecche, compresse, un pezzo di tela largo quanto è lungo l'articolo, alcuni sacchetti di pulla di avena, e cinque lacci per tenere l'apparecchio. Dopo aver spogliato il malato con tutta la precauzione possibile si porrà la gamba offesa sopra l'apparecchio già disposto nell'ordine, con cui deve essere applicato, e si passa alla riduzione. Un'assistente prende il bacino, e premendo sulle creste dell'osso dell'ileo, mentre un'altro afferra il piede, e dopo averlo un po' girato obliquamente al di fuori lo tira a sua naturale direzione. Il Cerusico intanto procura per quanto è possibile di ridurre le ossa fratturate nella loro situazione. Ciò fatto, e continuando l'estensione si passa all'applicazione dell'apparecchio. Si pongono in primo luogo ai lati della gamba due compresse bagnate in un liquore appropriato, e si cuopre il piede, e la gamba con simil compresse. Si applicano indi le striscie di tela, che abbracciano l'articolo dalla parte superiore della coscia fino alla parte inferiore della gamba. Ciò fatto s'involgono due stecche lunghe del membro in un panno di lino adattato, e applicano lateralmente alla coscia fratturata riempiendo lo spazio, che esiste fra esse, e l'articolo con i sacchetti di pulla di avena spingendo la mano nelle parti dell'articolo, che sono depressi, affinchè la pressione sia da pertutto uguale. Si applica in seguito una terza stecca nella parte anteriore della coscia, che si estenda dall'inguine alla gamba, e si fissa il tutto con i lacci situati a diseguali. Alcuni alle stecche sostituiscono i ca-



nali, che nella maggior parte de' casi possono essere vantaggiosi ritenendo l'articolo più sciolto, onde i frammenti delle ossa sono messi a discostarsi fra loro. Riguardo poi alla fasciatura sembra in questo caso preferibile la fasciatura sì detta a diciotto capi, che consiste in nove striscie di tela lunghe poco più della circonferenza della coscia, e che sono unite l'una sopra l'altra, facendo che la porzione della striscia superiore sia poco ricoperta dall'inferiore, e vadano annodate separatamente credendo in lunghezza. Con questa fasciatura posta sotto il membro si potrà togliere ogni volta il medesimo senza passare la fasciatura sotto l'articolo, ed evitare sempre più il peso scomporre i pezzi. Alcuni Pratici preferiscono la fasciatura circolare perchè ritiene vieppiù a mutuo contatto.

La cura interna del malato sarà quella che è accennata trattando delle fratture in generale. L'apparecchio deve essere rinnovato ogni tre o quattro giorni, e più spesso ancora se arrechi fastidio al paziente. Dopo i 40 giorni se il callo è sufficientemente solido si potrà togliere l'apparecchio e sostituire al medesimo una semplice fasciatura circolare. Nelle fratture oblique del femore la fasciatura accennata è poco sufficiente ad ottenere la guarigione, attesa la facilità, che hanno le ossa di separarsi, e quindi si rende necessaria l'estensione continua, di cui si parlerà in seguito. Ne' bambini l'apparecchio consiste in una fasciatura circolare con tre o quattro stecche, ma è necessario ricuoprire l'apparecchio con una compressa a più doppi, che si rinnova ogni giorno per impedire, che le orine e le fecce non obblighino a cangiare l'apparecchio, e anche in essi si può fissare più stabilmente l'articolo, passando due o tre striscie di tela.

la eguale sopra l'apparecchio cucite al materasso.

Nelle fratture del femore vicino ai condili si deve applicare una compressa nella cavità del poplite per impedire, che i muscoli gemelli non rovescino il frammento inferiore. In quelle poi, nelle quali è staccato il gran trocantere applicasi una compressa sul medesimo per mantenerlo in sito. In tutte le fratture dell'osso del femore certamente sarà bene attendere circa 50 giorni prima di togliere l'apparecchio avvertendo però di porre in opera i metodi altrove accennati per impedire la falsa anchilosi, che spesso ha luogo nel ginocchio.

Abbiamo di sopra accennato, che le fratture del collo del femore meritano una attenzione particolare, giacchè nella cura debbono essere per alcuni riguardi trattate diversamente dalle fratture delle altre parti dell'osso medesimo. La frattura del collo del femore può esistere in varj luoghi dell'osso, e può ancora essere accompagnata dalla frattura del gran trocantere, e nei bambini può vece di questa accadere la disunione dell'epifisi. Le cagioni predisponenti alla frattura del collo del femore sono le malattie, che attaccano principalmente le ossa, i vizj cancerosi, la necrosi, la rachitide, il morbo venereo, come ancora l'età avanzata. Le fratture del collo del femore sono per lo più trasverse, e quasi mai oblique molto più per succedono ordinariamente per controcampo, e sono prodotte da una percossa sul gran trocantere, o da una caduta sui piedi. Questa specie di frattura è sempre congiunta allo spostamento delle ossa, che però può nascere anche qualche tempo dopo seguita la frattura, ed è minore nelle fratture che accadono entro l'articolazione stessa, per la quale, che il ligamento orbicolare contiene i frammenti fratturati. Lo spostamento dei frammenti d'os-

so può accadere tanto secondo la lunghezza quanto giusta la circonferenza del medesimo. In questo caso oltre l'accorciamento del membro, il ginocchio, ed il piede rare volte trovansi rivolti all'interno, ma quasi sempre voltati all'infuori, ed il peso del piede stesso è quello, che produce questo effetto.

Si può confondere la frattura del collo del femore con la lussazione del medesimo osso. Per non cadere in equivoco deve riflettere alle cagioni della malattia, ed ai segni diagnostici. Questi sono il crepito, che si sente al momento della caduta unito all'impossibilità di alzarsi, il membro fratturato è più corto, ed il ginocchio, ed il piede sono voltati all'infuori. Per mezzo dell'estensione si può rendere facilmente all'articolo la sua dimensione, e direzione, lo che non è così facile in caso di lussazione, ed in questi movimenti si sente molte volte il crepito de' frammenti delle ossa, e finalmente non potrà il malato elevare tutta insieme l'estremità inferiore.

Le fratture del collo del femore sono da molti credute assai pericolose, producendo degli ascessi, fistole, e che portano seco necessariamente la claudicazione essendone impossibile la riunione. Altri poi sono di opinione, che queste fratture in niente differiscano dalle altre. Quello, che può dirsi di certo si è, che nei vecchj è la riunione assai difficile, e spesso impossibile, negli altri casi però la difficoltà della riunione che si osserva, e la claudicazione, che spesso ne siegue dipende forse piuttosto dai metodi curativi poco adattati, che si operano, giacchè con de' mezzi bene indicati si tiene la riunione di questa frattura come di quella delle altre ossa, con la sola differenza, che cura sarà molto più lunga, e le cagioni, che



questo oggetto si applica uno scingatojo alla  
inferiore della gamba, che deve essere tirato  
assistenti, ed un' altro simile si pone nella  
parte della coscia sana, che passando sopra il  
dello stesso lato serve per tenerlo fermo, e  
rimanere la contro estensione. Nella riduzione  
in primo luogo riporre il membro nella sua  
posizione, ed in seguito nella sua direzione na-  
turalmente voltando il piede al lato opposto, in cui ri-  
posa. Se i muscoli si contraggono fortemente,  
raramente succede, si sospenderà ogni ten-  
ta e si porrà l' apparecchio delle fratture del  
dell' osso adoperando il regime antiflogisti-  
ca attendendo la cessazione di tale accidente,  
curare nuovamente la perfetta riduzione col  
metodo.

Per mantenere le ossa in contatto si richiede  
in luogo una posizione adattata. Questa consi-  
sterebbe la gamba estesa sulla coscia, e la  
sul bacino. La posizione accennata deve es-  
sere tenuta per mezzo di un apparecchio conve-  
niente. Molti sono i metodi proposti a quest' og-  
getto, è usata la fasciatura così detta a spica, si  
si applica l'astuccio molle col capo, onde

li al malato in una cura, che riesce ordinariamente assai lunga, e di produrre nell'articolo delle infiammazioni, lacerazioni, escare cancrenose, e perfino l'esfoliazione de' tendini.

Questi riflessi hanno tanto spaventato alcuni Pratici, che hanno rinunciato alla estensione continua della coscia ne' casi di frattura del collo del femore. Varie sono le opinioni de' moderni su questo argomento; ma i migliori Pratici convengono, che qualora il malato possa senza grande incomodo soffrire l'estensione continua, sia questo metodo preferibile ad ogni altro. Nel caso opposto poi dobbiamo contentarci d'applicare l'apparecchio indicato, oppure i canali, che adoperansi nelle fratture del femore, giacchè in questi casi si ottiene anche la riunione sebbene l'articolo rimanga sempre più corto. Per mantenere l'estensione continua si sono immaginate varie macchine, ma il tutto consiste a procurare, che il piede resti continuamente tirato all'ingiù, mentre il bacino resti fisso, e questo può ottenersi tanto per mezzo di un'apparecchio, col quale venga il piede tratto verso l'estremità inferiore di un'asse, la di cui estremità superiore sarà di punto di appoggio al bacino, quanto ancora fissando il piede alla parte inferiore del letto, mentre il bacino viene raccomandato alla parte superiore di esso per mezzo di un telo di lenzuolo, o sciamano, che passi fra le coscie, e si annodi sopra l'ileo del lato sano.

Sembra per altro preferibile il metodo di circondare tutto l'articolo di varie striscie di tela separate, le quali colla loro compressione si oppongono alla contrazione de' muscoli, per indi applicare due forti stecche larghe due pollici, e lunghe più dell'articolo, in particolare quella, che deve collocarsi nella parte esterna di esso, onde fissare

do il piede, ed il bacino alle due estremità di questa, quali saranno finestrate, e tenendola fissa superiormente colla sottocoscia, ed inferiormente con fasciatura appropriata, e compresse, che si adatteranno unitamente ai lacci, e cuscinetti in tutto l'arto, anche per l'altra stecca, si viene in tal modo ad ottenere una continuata estensione senza obbligare il malato ad una immobilità incomodissima, come accade nel caso, che venga fissato il piede, ed il bacino al letto stesso. Sarà poi necessario visitare spesso il malato per osservare se l'estensione è nello stesso stato. I topici sono inutili, giacchè prima di applicare l'estensione debbono essere dissipati tutti i sintomi locali coi mezzi altrove indicati. La dieta del malato sarà tenue se esistano delle complicazioni, in altro caso si deve cercare di mantenere le forze del medesimo.

Siccome le fratture del collo del femore sono più lente a consolidarsi, che le altre, così è necessario di non togliere l'apparecchio prima dei due mesi, e di non fare alzare il malato prima dei tre, potendo facilmente fratturarsi di nuovo l'osso non ancora bastantemente consolidato. Nelle fratture del collo del femore la falsa anchilosi accade più difficilmente, che nelle altre fratture.

La frattura della rotola, è per ordinario trasversa, e più o meno obliqua, di rado perpendicolare, e può questa frattura esser prodotta dalla contrazione violenta de' muscoli estensori della gamba. Nelle cadute all'indietro, nel salto, ne' moti convulsivi, ed in altre simili circostanze può anche aver luogo la frattura della rotola. Le cadute sul ginocchio sono una cagione non meno frequente di questa frattura quando la rotola percuote sopra un corpo duro, giacchè nella flessione della gamba non è essa sostenuta nel suo mezzo dalle ossa sottoposte, che lasciano un vuoto fra loro.



Nella frattura della rotula i pezzi fratturati sono allontanati per la forza, con la quale il mento superiore è tirato dai muscoli estensori la gamba, e questo allontanamento è maggiore la flessione della medesima, a cui resta fisso il mento inferiore. Questo discostamento de' frammenti rende facile la diagnosi della frattura della rotula. A questo segno poi si unisce la caduta del paziente senza potersi rialzare.

La possibilità della riunione nelle fratture quest'osso è stata richiamata in dubbio da molti autori di Chirurgia, e quindi essi credono meglio tutto il lasciare la frattura senza tentarne la riunione la quale secondo loro è impossibile, ed il tentativo produrrebbe l'anchilosi. I più recenti Scrittori sono però di sentimento, che la riunione della rotella sia possibile come quella delle altre, e siegua dessa pel contatto immediato de' frammenti ovvero per mezzo di una sostanza intermedia, e si vada a poco a poco formando, e che quindi il metodo più adattato sarà quello di procurare la riunione della frattura, molto più che l'anchilosi nel luogo se non si tenga l'articolo immobile più di quello è necessario per la consolidazione della medesima.

Se dunque si voglia procurare la riunione de' frammenti della rotola, sarà necessario tenerli uniti fra loro più che sia possibile, giacchè veramente altrimenti a formarsi fra di essi una sostanza accrescerebbe di molto la lunghezza della rotola e renderebbe difficile il camminare. Siccome la frattura della rotola è ordinariamente accompagnata da sintomi infiammatorj, è necessario dissiparli, e di curare la frattura stessa, e ciò si ottiene con la cura profilattica, che consiste nell'uso de' refrigeranti per prevenire l'infiammazione, e nella cura antiflogistica se dessa sia già comparsa.

I sintomi inflammatorj cedono conforme l' uso al metodo antiflogistico se sia adoperato a tempo , e con efficacia , se però essi continuano per qualche tempo s' insisterà sul metodo debilitante , e segnatamente sui salassi . Qualora però non sia possibile dissipare i sintomi inflammatorj in 20 , o 30 giorni è inutile applicare qualunque apparecchio , giacchè si è già formata la sostanza , che deve riunire la rotola , ed il malato non potrà camminare senza appoggio su di un piano disuguale , allora il Professore non deve avere altro in mira , che di prevenire l' anchilosi .

Prevenuta , o dissipata l' infiammazione debbonsi riunire i frammenti , e mantenerli riuniti pel tempo necessario , onde dar luogo , che si renda solida la sostanza nuova , che si forma . Per ottenere queste indicazioni si farà estendere la gamba sulla coscia , e piegare la coscia sul bacino per mettere in rilassamento i muscoli estensori della gamba , e si manterrà questa posizione dell' articolo per mezzo di cuscini . La fasciatura ordinaria , che propongono molti Autori per contenere i frammenti della rotella si è la fasciatura chiamata a otto di cifra , ma questa non comprimendo tutto l' articolo produce facilmente l' ingorgamento dell' estremità inferiore di esso , ed inoltre l' azione di questa fasciatura è insufficiente per contenere in sito i frammenti , mentre esercita una compressione dolorosa sui i muscoli .

Il metodo proposto dai recenti si è il seguente . Si fa tener fermo il bacino da un assistente , mentre un' altro tiene elevata l' estremità inferiore . Prendesi in seguito una striscia di tela più lunga , che tutto l' articolo , ed un poco più larga della rotola , e si stende sulla parte anteriore della gamba fissandola con alcuni giri di fascia sulla parte inferiore di essa , e precisamente sul dorso del piede lascian-



done fuori tre, o quattro pollici, che si ripie-  
e si fermano con nuovi giri di fascia, si-  
ta ricuoprire tutta la gamba fino, che si-  
ge all'osso fratturato. Allora accostando i p-  
osso fra loro, e facendo tener bene distesa  
scia di tela, che lo ricuopre, come ancora  
do bene la pelle, acciò le sue piegature non  
terpongano fra i pezzi, e ne impediscano la  
nisione, si fissano essi in sito con due compres-  
terali, ovvero facendo un'apertura nella stris-  
tela, che si continuerà indi a ricuoprire dalla  
scia circolare sino all'alto della coscia, e pe-  
nerla meglio distesa si ripiegherà al di sopra  
dola con nuovi giri circolari fino alla gamba  
impedire di piegare la gamba si applica una  
ca al di sotto dell'articolo, che arrivi dalla  
al calcagno, e che si fissa con una nuova fas-  
cia circolare, si porrà tutto l'articolo alquanto  
vato, ma in modo, che formi un piano incli-  
ed il piede sia molto più alto, che la coscia.

Questo apparecchio è sicuramente il mi-  
di quanti ne siano stati proposti, ma non è  
d'inconvenienti, fra i quali annoverasi la fi-  
con cui si slenta la fasciatura, e quindi ne  
lo slontanamento de' pezzi, il dolore che esse  
duce, e la pressione non sufficiente, che esercita  
a quest'incomodi rimediasi in parte col visitare  
so il membro, e rinovare l'apparecchio. Mol-  
tri metodi sono stati proposti per contenere  
to questa frattura, ma sono tutti più, o meno  
getti a maggiori difficoltà di quello, che ab-  
riportato. Da questa difficoltà sono stati indotti  
ti Professori a proporre di lasciare la frattura  
medesima senza applicare fasciatura di sorte-  
cuna, assicurando, che con questo sistema s-  
ne a prevenire l'anchilosi, e non restano im-



i movimenti del ginocchio, ma per quello riguarda l'anchilosì si può tener lontano facendo eseguire dei moti all'articolazione dopo venticinque, o trenta giorni, ed i movimenti del ginocchio restano sempre più difficili, che nella riunione dell'osso.

Le fratture della gamba distinguonsi in fratture di ambedue le ossa, in fratture della tibia, ed in quelle della fibola. Le fratture di ambedue le ossa insieme sono le più frequenti, e diconsi comunemente fratture della gamba, ed accadono ordinariamente verso la metà dell'osso. Queste fratture sono soggette allo spostamento dei frammenti segnatamente a quello, che accade secondo la loro larghezza, e la gamba presenta una convessità anteriormente. La rotazione del piede può eziandio produrre uno spostamento all'infuori, o all'intentro, ma il primo caso è il più comune.

La diagnosi delle fratture della gamba è una delle più facili, segnatamente se non siano esse nella parte superiore, e vicino all'articolazione del ginocchio, e la prognosi è meno pericolosa di quella delle fratture della coscia, riguardando però sempre la qualità della frattura, ed i suoi sintomi.

Per la cura di queste fratture si deve situare il malato in un letto duro, stretto, ed orizzontale, sul quale si porrà un cuscino ben lungo, e largo ripieno di avena. Sopra di esso verrà situato l'apparecchio composto di tre lacci, un pezzo di tela quadrata, alcune striscie di tela, due compresse, varj cuscinetti di pulla di avena, e tre stecche, due laterali più lunghe della gamba, ed una anteriore più corta di essa.

Dopo fatta l'estensione, e la contro estensione si applicano le compresse, e le striscie di tela separate, quali possono fermarsi con qualche punto di filo nella parte anteriore dell'articolo per mag-

gior comodo, senza la striscia, che le sostiene posteriormente, si principia con esse dalla parte anteriore della gamba. Può ancora soddisfare a quest'oggetto la fasciatura a 18 capi. Si collocano indistintamente tre stecche procurando, che esse comprimano ugualmente da tutte le parti, al quale oggetto si porranno fra esse, e la gamba i cuscineti accennati di sopra. Le due stecche laterali s'involgono nel pezzo di tela quadrata, e vengono ritenute con i lacci insieme con la terza posta anteriormente tra le due ossa per mantenere più, che sia possibile lo spazio interosseo. Lo stivaletto di *Pott* può anche esso mantenere in sito questa frattura. Una fasciatura che passa sotto la pianta del piede, ed incrociandosi sul dorso di esso viene fissata lateralmente alla gamba serve per mantenere il piede nella stessa posizione, cosa estremamente interessante, anzichè di coprire il piede con uno de' soliti archi, e ciò il peso delle coperte non lo faccia inclinare da una parte, o dall'altra. Le compresse situate sotto il calcagno sono molto dannose, giacchè colla loro compressione possono produrre un'ulcera di cattiva indole, con scopertura d'osso. Il principio generale nella cura di queste fratture deve essere di tenere tutto l'articolo in una posizione semiflessa, sostenuto però sempre da cuscini adattati. Molto utile si rende in questi casi la fasciatura a diciotto capi, che noi già abbiamo esposto di sopra, e che ha il vantaggio di tenere anch'esso stretto l'apparecchio senza obbligare di sollevare il membro al rinnovare ogni medicatura. Per mantenere questa frattura si può ancora far uso delle stecche laterali etc. da qualcuno raccomandati in simili circostanze. L'apparecchio si bagnerà con dell'acqua tiepida canforata, e si rinoverà ogni settimana almeno e dopo 50 giorni ordinariamente il callo è sol-



a sufficienza, che il malato possa principiare a camminare con delle grucce, e muovere l'articolazione, ed allora si sostituirà una semplice fasciatura circolare all'apparecchio accennato. Per quello appartiene ai casi di fratture complicate della gamba, e quello riguarda la cura interna, nulla abbiamo da aggiungere a quanto abbiamo di sopra esposto.

Le fratture della sola tibia sono molto frequenti, ma poco pericolose, giacchè non sono soggette a spostamento delle ossa, o almeno questo è poco significante, dal che però ne viene, che la diagnosi di queste fratture è assai difficile, segnatamente se la frattura sia nella parte superiore dell'osso. L'esame delle cagioni, e de'sintomi della malattia possono dar qualche lume sulla natura della medesima. Per la cura di questa malattia dopo fatta l'estensione, e riposti i frammenti nel loro stato naturale s'applica nella parte anteriore della gamba una compressa stretta, e lunga ritenuta da una fascia circolare, ed indi tre stecche sottili, che si tengono in sito con gli ultimi giri della fascia. Il malato non dovrà appoggiarsi sulla gamba affetta, e molte volte sarà necessario applicare la fasciatura che abbiamo di sopra indicato per la frattura della gamba. La frattura della tibia esige presso a poco l'istesso tempo per consolidarsi, che quello abbiamo detto per quella della gamba.

Le fratture della Fibola sono meno comuni, che quelle della Tibia, e questo accade in virtù della sua elasticità, e situazione, essendo essa meno allo scoperto della tibia, ma qualche volta può produrre una straordinaria abduzione del piede, ed allora il malleolo esterno è come separato dal resto dell'osso. La frattura più pericolosa della fibola si è quando essa resta fratturata vicino al piede. I cataplasmi emollienti, ed i salassi sono indi-



cati per dissipare qualunque principio d' infiammazione , e gonfiore . Si circonda l' articolo di fascie separate , e per mezzo di due stecche ben lunghe , e che passino il ginocchio si procurerà , che il piede non si muova dalla situazione adattata . Questa frattura richiede ordinariamente un mese per la formazione del callo non sopraggiungendo ascesso , carie etc. accidenti , che anche esigere potrebbero l' amputazione della parte , fuori di che altro non resta , che muovere il piede , e la gamba per prevenire l' anchilosi . Se la frattura sia lontana dall' articolazione si ricerca l' apparecchio indicato nelle fratture delle ossa della gamba sebbene qualcuno consiglia l' applicazione di una sola stecca sul lato esterno dell' articolo , escludendo l' interna , come inutile , senza omettere le debite cautele per conservare lo spazio interosseo , benchè ciò non sia tanto interessante come nell' antibraccio .

Le fratture dell' ossa del piede richiedono l' istessa cura , che quelle delle ossa della mano . Una frattura però , che merita particolare attenzione si è quella del calcagno . Queste fratture sono poco frequenti attesa la solidità dell' osso , e la di lui situazione . Può rompersi il calcagno per la contrazione violenta degli estensori del piede , ma questa causa è più rara nel calcagno , che nell' olecrano , e nella rotola essendo esso più forte di queste due ossa . Queste fratture accadono ordinariamente nella caduta sulla pianta del piede , essendo esso in estensione . Il malato sente un crepito nel calcagno , sopraggiunge il dolore , che si aumenta ne' moti del piede , l' infermo non può stare in piedi , nè camminare , ed il calcagno si gonfia , la porzione del medesimo , a cui si attacca il tendine d' Achille diviene mobile , e si osserva qualche volta , che i pezzi sono separati fra loro , cosa però ben difficile a ri

mascoli gemelli, e solare. Per mantenere  
nella detta situazione si può far uso del-  
la così detta di *Petit*, oppure si prende  
una benda ben lunga, che dal dorso del piede si  
porta sotto la pianta, e si fissa ivi una lun-  
ga striscia di tela con alcuni giri. Si sten-  
de, e si porta la lunghetta, e la fascia  
si porta fino al poplite, dove si ferma con  
dandone alcuni prima, e dopo ripiegando  
la di tela, e ricuoprendola colla fascia ivi  
a l'applicazione. Questa striscia deve es-  
sere più, che sia possibile. Sarà bene ricuo-  
prire la parte offesa con una compressa, che si so-  
vrappone mezzo di una piccola fasciatura a 8 di  
necessario riempire con delle sfile le ca-  
vità rimangono lateralmente al tendine di Achil-  
le, resti meno compresso, che sia possibile.  
In questo modo la frattura guarisce in 30,  
giorni, ed ordinariamente senza accidenti. Do-  
po questo tempo si potrà togliere la fasciatura, che  
può essere incomoda, ma si dovrà porre attenzio-  
ne di non piegare molto il piede, come ancora a non  
appoggiarsi molto fortemente sulla pun-  
ta, altrimenti sarà facile, che la frattura tor-  
turi, richiedendosi molto tempo per la

## DELLE LUSSAZIONI.

**S**otto il nome di *lussazione* intendesi in già la variazione rispettiva, che accade i porti naturali delle ossa; e questo può nas to quando la testa di un'osso esce dalla c stinata a contenerlo, quanto se le superfic lari di due ossa più non si corrispondano. tori distinguono le lussazioni in *complete*, *plete*, chiamando complete quelle, nelle qu riazione accennata è totale, ed incomplete nelle quali essa non è che parziale, ed all' perficie articolari si toccano ancora per qual to delle loro cartilagini, ed a queste lussa complete non sono soggette, che le articol ginglimo, nell'articolazione all'opposto per si la lussazione è sempre completa.

Oltre questa divisione generale delle ni ve ne sono delle altre non meno intere osservarsi nella pratica, vale a dire riguard cie di articolazione, che è affetta, e la dire condo la quale è lussato l'osso, che viene sificare le lussazioni in *interne*, *esterne*, *pe anteriori*, *superiori*, *inferiori* etc. Una distin meno interessante si è quella, che riguard po di essa, giacchè le lussazioni invecchi infinitamente più difficili a ridursi, che q centi. E' parimenti da distinguersi la lussazi plice da quella complicata con altri sintom ferite, fratture, contusioni etc. che ne poss to variare la prognosi, e ritardare la cura lattia.

Quello però, che merita molta consid per parte del Cerusico nell'intraprendere



esima. Le cagioni occasionali interne delle  
oni sono il gonfiamento delle cartilagini ar-  
, il raduno della sinovia, e le forze musco-  
el primo caso la lussazione accade a gradi,  
ndo si fa in un momento. Le cause occa-  
esterne principali sono i colpi, le cadute etc.  
oi queste cagioni agiscano, si richiede, che  
za venga portata in una direzione obbliqua  
tà, in cui s'articola l'osso, altrimenti il  
terno altro non farebbe, che portar con for-  
o dell'osso contro la sua cavità articola-  
articolarioni a ginglimo la lussazione è  
dalla sola violenza esterna, ma nelle ar-  
i orbicolari ci si unisce sempre l'azione de'  
Nelle lussazioni poi di qualunque genere  
mpre una distensione, o lacerazione più,  
grande delli ligamenti, e delle capsule, lo  
è facile ad intendersi.

è molto difficile il riconoscere l'esisten-  
lussazione. Convieni però osservare, che  
ior parte delle lussazioni rincontransi mol-  
omuni alle fratture, ed alle contusioni. I  
principali delle lussazioni sono l'allungamen-

lontano dall'osso lussato, e non sull'osso non si viene a promuovere l'irritazione de' muscoli allo stesso osso: contraendosi verrebbero ad impedire dell'osso lussato, o almeno di molto ritardare di sembra, che debbasi questo metodo: che per la ragione che quanto più lo si applica l'estensione della parte lussata, tanto più è la leva, e per conseguenza tanto più si ottiene. Nè deve temersi che per le azioni intermedie vengano a soffrire lesioni, e consumare porzione della forza, giacchè i muscoli stessi rendono le lussazioni solide abbastanza, e formano una continua.

Vi sarebbero per altro delle ragioni che ci ad abbracciar il primo metodo. Per la forza estensiva sopra il carpo, in occasione dell'omero, l'articolo deve restare steso, ed i muscoli, che dall'omoplate all'antibraccio vengono stirati, e per questo si contraggono alquanto prima di renderli pongono alla facile riduzione, apporrendo dolore; al contrario si evita questo nel primo metodo, potendo far tenere l'antibraccio, e per conseguenza in questi muscoli bicipite, e tricipite.

Qualunque sia il punto, ove si fa l'estensione, è miglior metodo servirsi di capi capaci, l'azione de' quali può regolare che qualunque macchina, che se esercitata troppo forte può lacerare ancora i tegumenti senza ridurre la lussazione: fare molti assistenti ad un articolo si può fare un nastro all'intorno di esso, il quale tirato dai medesimi.

occurando però, che la direzione, con cui  
esercita sia perpendicolare alla superficie ar-  
ticolare, dalla quale è uscito l'osso lussato. Quan-  
do due forze vengano esercitate esattamente  
il Professore prenda il momento adattato, e  
è molto facile il far rientrar l'osso nella sua

Alora però con questi mezzi la lussazione  
irriducibile varj sono i metodi proposti  
vincere la forza muscolare, ch'è quella, che  
impedisce alla riduzione di essa. In primo luogo  
posto di dare al malato una posizione, nel-  
la quale non avesse alcun punto di appoggio per  
i muscoli, come p. e. ponendolo sopra  
una tavola orizzontale ben stabile. Se questo mezzo  
non è sufficiente si procurerà d'indebolire l'azio-  
ne muscolare per mezzo dei replicati salassi, ba-  
ne, e molti propongono anche l'uso dell'opio,  
emetico o simili, che producendo una debo-  
lezza nella macchina, fa rilassare i musco-  
li etc. e se ne ottiene più facilmente  
la riduzione. Altri hanno ritrovato molto vantaggio da  
una continua distensione dei muscoli, che venendo



struttura della parte. La varietà sola, che ossi in questa lussazione si è, che possono uscire cavità ambedue i suoi condili, ovvero uno soltanto. Molti Autori chiamano completa la prima lussazione, ed incompleta la seconda, ma questa nominazione è difettosa, essendo la lussazione completa quella soltanto, nella quale l'osso non è intieramente dalla sua cavità. Nei bambini tenera non può lussarsi la mascella, giacchè il mento po, e le branche dell'osso si uniscono ad un punto molto ottuso, e quindi i condili essendo nella cavità rezione quasi del corpo dell'osso, formano il centro de' movimenti della mascella, nè possono essere spinti fuori delle cavità articolari.

La lussazione della mascella inferiore è prodotta raramente da violenze esterne, ma per lo più per il contrario dalla forza de' muscoli, e segnatamente dallo sbadiglio, giacchè questa lussazione viene fatta dall'abbassamento straordinario della mascella. In questo caso i condili scorrono dall'indietro in avanti sotto le radici trasverse delle apofisi zigomatiche ed entrano nelle cavità di tal nome, allora si aprono gli angoli della mascella portandosi all'indietro, mentre si abbassano i condili trasferendosi in avanti, e quindi la bocca resta aperta. I condili premendo i nervi temporali profondi, e masseteri, e producono i dolori, ch'accompagnano questa lussazione. Oltre l'apertura della bocca si osserva nella parte anteriore dell'orecchia un vuoto nel luogo che occupava il condilo della mascella, e rimpetto un'eminenza al di sotto della gota formata dall'apofisi coronoide, i muscoli si allungano, e si osserva la secrezione della saliva, le gotte sono tumefatte, i denti inferiori sono in avanti, ed il malato non può nè parlare, nè inghiottire.

Se la lussazione è recente questi segni so-

il malato resti seduto, ed appoggi la testa al  
di un ministro, il quale la tenga ferma por-  
le mani sulla fronte del paziente. Il Profes-  
cuopre i suoi pollici con una fascia, o con  
molino per non esporli ad esser morsicati,  
roduce nella bocca più indentro che può su-  
mi denti molari. Le altre dita sono appog-  
otto il mento. Presa così la mascella premen-  
pollici sul punto indicato si viene essa ad  
re, e si porta indi all' indietro, onde i con-  
gano ad uscire dalle fosse zigomatiche. Quan-  
rofessore si accorge, che questo ha avuto ef-  
si alza il mento coll' altre dita, e tenendo  
nti molari si vengono così a spingere all' in-  
condili. Molte volte la contrazione de' mu-  
ene a produrre una costrizione momentanea  
scelle, onde restano esposti i pollici del Pro-  
ad essere offesi, motivo per cui è necessa-  
portarli subito all' infuori, e situarli fra i  
le gote.

per prevenire la recidiva si applica la *fionda*,  
*coletto* detto anche *mentoniera*, e si procu-  
tamente ne' primi giorni di non far prende-

i più recenti credono con ragione questa lussazione impossibile; e ciò al riflettere soltanto ai mezzi, coi quali uniscono al corpo delle vertebre, e loro apofisi trasversali.

Le lussazioni della clavicola sono molto più rare delle fratture di essa, come appunto si osserva in tutte le altre ossa lunghe. La clavicola poi può lussarsi in ambedue le sue estremità, sternale cioè, ed omerale. Quella della estremità sternale non è difficile ad accadere, giacchè le superficie articolari della clavicola, e dello sterno non sono eguali, ed inoltre i ligamenti dell' articolazione sono piuttosto deboli cioè il capsulare, e l' interclavicolare. Questa lussazione può accadere in alto, in avanti, ed in dietro, ma non in basso, giacchè lo impedisce la cartilagine della prima costa. La più frequente è la lussazione anteriore, che accade quando la spalla portasi all' indietro. Le altre due specie sono molto più rare. Nella lussazione anteriore l' estremità della clavicola lacera i ligamenti, e si porta avanti lo sterno formando un tumore sotto la pelle duro mobile quando si muove la spalla. Da questi segni prodotti dalla situazione superficiale dell' osso nasce, ch' è molto facile il riconoscere questa specie di lussazione. Nelle altre poi saranno diversi i sintomi, p. e. si troverà una fossa invece dell' elevazione nella lussazione all' indietro, ed in questa si osserveranno gli effetti della compressione dell' osso lussato sulla trachea, e si vedrà elevata l' estremità della clavicola nella lussazione superiore, nè corrisponderà essa all' estremità della clavicola opposta.

Per ridurre la lussazione, di cui parliamo o sia quella anteriore dell' estremità sternale della clavicola, si deve procedere presso a poco nella stessa maniera, che abbiamo indicato trattando della



ra di quest' osso . Si fa estendere il braccio al  
 ante , e formandone come una leva , si porta per  
 ro di esso la spalla all' infuori , e si procura  
 di trasportare l' estremità lussata della clavi-  
 cola nel senso medesimo , in cui si è fatta la lussa-  
 zione , onde poterla poi più facilmente ricondurre  
 verso la faccetta , che dessa ha abbandonato . Que-  
 sta manovra è assai facile , ma essendo i legamenti  
 lacerati è difficile a mantenere l' osso in questa si-  
 tuazione , dalla quale si rimuove ad ogni moto del-  
 la spalla . E' quindi indispensabile fissare il braccio  
 con la stessa fasciatura , che si adopera per le frat-  
 ture della clavicola , e ciò è necessario tanto in que-  
 sta lussazione , quanto nelle altre specie di lussazio-  
 ni dell' estremità sternale della medesima . Però con  
 tutto questo mezzo , e quantunque si tenga molto  
 tempo l' apparecchio per dar luogo ai ligamenti la-  
 cerati di riunirsi , è ben raro , che si ottenga di con-  
 tenere la faccetta articolare della clavicola sulla fac-  
 cetta articolare dello sterno per la piccolezza delle loro  
 superficie , e per la debolezza de' ligamenti , motivo  
 per cui dopo la guarigione rimane sempre un poco più  
 prominente l' estremità della clavicola lussata .

Le lussazioni dell' estremità omerale della cla-  
 vicola sono meno frequenti di quelle della sua estre-  
 mità sternale , attesa la forza dei ligamenti conoi-  
 detti , e romboide , i quali s' uniscono alla scapola .  
 Per la posizione obliqua delle faccette articolari  
 non accade questa lussazione ordinariamente , che  
 insù , ed ha luogo in sequela di una caduta  
 della spalla , giacchè allora la clavicola scorre  
 dall' acromion dal basso in alto , si rompono i li-  
 gamenti , e la spalla viene portata verso il tronco  
 l' azione de' muscoli . I segni di questa malattia  
 sono assai chiari , e sono il dolore ne' movimenti  
 della spalla offesa , e la protuberanza , che forma

Questa specie di lussazione sebbene ordinariamente non accompagnata da gravi accidenti, è molte volte difficile a ridursi, e spesso produce come abbiamo detto la paralisi del deltoide.

Molti metodi sono stati immaginati sì dagli Antichi, che dai Moderni Scrittori di Chirurgia per la reposizione di queste lussazioni. Noi però ci limiteremo a riportare quello soltanto, che dai più recenti viene stimato il migliore, e ch'è il seguente.

Si pone nel cavo dell'ascella un cuscinetto ben duro, che riempia il medesimo, e si estenda anche un poco al di fuori sì in avanti, che all'indietro per impedire, che il panno destinato alla contro estensione comprima i tendini de' muscoli gran pettorale, gran dorsale, e gran rotondo. Per mantenere la forza opposta all'estensione si pone sopra l'indicato cuscino il panno che deve essere ripiegato a più doppi in modo, che sia largo circa quattro dita, e passandone i due capi verso la spalla opposta si fanno tenere agli assistenti. Per impedire poi che la scapola non siegua l'estensione è necessario applicare un altro simile laccio sul corpo della spalla, e passandolo orizzontalmente avanti, e dietro il tronco si fanno sostenere i due capi ai medesimi assistenti; finalmente un'altro sarà destinato a comprimere dall'alto in basso l'acromion. Per fare poi l'estensione si passa intorno all'estremità inferiore dell'omero, oppure al carpo un panno piegato sopra se stesso della larghezza di tre in quattro dita trasverse, il quale si raccomanda ad uno, o più assistenti, a tenore della forza, che deve impiegarsi, per far nascere l'allungamento de' muscoli, cui tiene fisso il capo dell'osso nella nuova sede. Il malato resterà a sedere, ed il Professore situato alla parte esterna del braccio Inssato quando vede, che i muscoli cedono alla forza estensiva pren-

andosi con forza sulla parte inferiore del li-  
to orbicolare , questo lacerandosi viene l'osso  
cure dalla sua cavità ; alla forza del colpo de-  
ggiungere ancora l'azione muscolare del gran  
ale , gran rotondo , e gran dorsale , giacchè  
tto , che si percuote il cubito questi muscoli  
traggono per trarre l'omero verso il tronco ,  
non potendo accadere a motivo , che il cu-  
fisso sul punto , che viene a battere , la lo-  
ne si esercita sul capo dell'omero , che vie-  
essi tirato in basso . Da questa lussazione può  
la paralisi del deltoide per la compressio-  
nervo circonflesso .

on è molto difficile il riconoscere questa lus-  
dell'omero , giacchè il braccio è sempre più  
nell'altro , lo che si vede benissimo confron-  
cubiti posteriormente , il braccio diviene obli-  
il cubito resta allontanato dal corpo . Si  
oltre che l'osso dell'omero si è portato all'in-  
giacchè passando le dita sul braccio non  
questo nella sua parte superiore la mede-  
istenza , ch'osservasi nello stato sano . Si  
tre di ciò un vuoto sotto l'acromion nel



figura nell' articolazione del cubito . Ad onta di questi segni non è difficile equivocare su tal srazione prendendola segnatamente per una frattura della parte inferiore dell' omero , dell' olecrano del capo del raggio , motivo per cui è necessario esaminare attentamente i sintomi tutti , giacchè si applicasse l' apparecchio per le fratture senza durre la lussazione , dopo 2. o 3. settimane si ridurrebbe questo impossibile , e potrebbe seguirne che l' anchilosi .

Molti metodi sono stati proposti per ridurre questa lussazione , ma il migliore è quello , che passiamo ad esporre . Si fa sedere il malato , e prendendosi da un' assistente l' estremità inferiore dell' antibraccio , e tirando il medesimo viene a formarsi l' estensione nello stesso tempo , che un' altro assistente prende la parte media del braccio , e fa controestensione . Il Professore situato alla parte esterna del paziente piglia con ambedue le mani l' estremità inferiore dell' omero , mentre con i polli spinge inferiormente l' olecrano , e lo fa rientrare nella sua cavità . Alcune volte sia perchè la lussazione è invecchiata , sia pel temperamento robusto del paziente non è sufficiente l' estensione e contro estensione fatta con le sole mani degli assistenti , ed allora è necessario di applicare un laccio al carpo , ed un altro al braccio , o all' ascella ponendo un cuscinetto nel cavo di essa , come praticasi nella lussazione dell' omero .

Ridotta la lussazione si collocano delle compresse imbevute in qualche liquore risolvente , e si mantiene in sito col mezzo di una fascia che forma nell' articolazione una specie di 8. di cifra , onde contenga le ossa nella loro posizione naturale . Si avvertirà di tenere l' antibraccio semiflesso , e di continuare la fasciatura lungo il medesimo fino al

dità per prevenire il gonfiore, che altrimenti avrebbe luogo. La lacerazione de' ligamenti, che accade in questa lussazione, produce qualche volta de' sintomi infiammatorj, e segnatamente del gonfiore, ed in questo caso è di mestieri far uso del metodo antiflogistico praticando dei salassi, cataplasmi emollienti, e simili mezzi. Passati alcuni giorni devesi procurare di far eseguire all' articolazione de' movimenti per prevenire l' anchilosi, alla quale è quest' articolazione esposta più di ogni altra.

La lacerazione del ligamento annulare produce ne' casi di lussazione posteriore dell' ulna anche quella del capo del raggio, il quale viene spinto in avanti sull' ulna, e questo fa, che sebene siasi ridotto quest' osso, ciò non ostante non possono eseguirsi i movimenti di pronazione, e supinazione senza dolore, non potendo girare le ossa l' uno sull' altro. Si riconosce facilmente la causa, giacchè osservasi il capo del raggio poggiato sull' ulna, e molto più in avanti, che l' estremità inferiore dell' omero, con cui si articola, nel qual caso per poco, che si spinga all' indietro si riduce facilmente, e si mantiene in sito con una compressa ritenuta dall' apparecchio descritto di sopra. Questo apparecchio va poi rinnovato almeno ogni tre giorni.

La lussazione dell' ulna all' indietro deve ridursi al più presto, altrimenti col tempo diviene irriducibile, e si forma una falsa articolazione, che permette soltanto alcuni movimenti imperfetti dell' antibraccio.

Se l' ulna si lussa anteriormente, deve necessariamente accadere la frattura dell' olecrano, e quindi la cura sarà la medesima, che quella abbiamo indicato parlando di questa frattura, eccetto che essendo il disordine nelle parti molto maggiore, che in caso di semplice frattura, o lussazione si richie-



derà più energico l'uso dei salassi, ed in generale del regime antiflogistico.

Le lussazioni laterali dell'ulna sono facili a riconoscersi, come ancora a ridursi, ed a mantenersi ridotte, bastando una semplice fasciatura circolare, ma siccome lo sforzo per produrre queste lussazioni deve essere stato assai grande, così producesi molta lacerazione, e distrazione nelle parti molli, motivo per cui violenti saranno i sintomi infiammatori, ai quali si rimedia con i metodi già di sopra accennati.

La seconda specie di lussazione dell'antibraccio è la lussazione dell'estremità superiore del raggio sull'ulna, ed allora il capo del raggio si porta anteriormente, o posteriormente. Gli Autori di Chirurgia distinguono questa lussazione in primitiva, che accade in un punto per esterna violenza, e consecutiva, che accade lentamente. La lussazione anteriore del raggio è più difficile ad accadere, che la posteriore, perchè i movimenti di supinazione, che producono la prima sono più limitati, che quelli di pronazione cagione dell'altra. Nelle lussazioni posteriori la mano è in uno stato di pronazione, nè può ridursi al suo sito naturale, e si sente il capo del raggio indietro a lato dell'olecrano. Per ridurla basta prendere colla destra la mano del paziente, e porla in istato di supinazione, mentre con la sinistra si spinge in avanti il capo del raggio, applicando poi i soliti rimedj attonanti, e procurando di usare molta cautela ne' moti dell'antibraccio, giacchè il ligamento annulare non riprende la sua solidità, che dopo molto tempo. Nella lussazione anteriore sarà lo stesso il metodo eccetto che si comprimerà il capo del raggio dall'innanzi all'indietro. Le lussazioni consecutive sono frequenti ne' bambini, e vengono prodotte dalle con-



zioni, che gli si fanno provare conducendoli, o evandoli per le mani. A questa malattia si ridia coll' uso de' bagnoli tonici, e coll' evitare le zioni, altrimenti oltre la lussazione, che ne vien nascono spesso de' tumori articolari, carie d' osse, fistole etc. segnatamente ne' bambini già affetti vizio scrofoloso, alle quali non si rimedia che l' amputazione.

Finalmente la terza specie di lussazioni dell' an- raccio è quella dell' estremità inferiore dell' ul- . Questa può accadere in avanti, o in addietro, la prima è più rara della seconda, giacchè do- ando essa venir prodotta dalla supinazione trop- grande della mano, questo moto è meno faci- , che quello di pronazione, da cui viene cagio- na la seconda specie di lussazione. Il capo del raggio scorre sull' estremità dell' ulna in avanti, o l' indietro, e molte volte restano lacerati i liga- menti, che uniscono queste due ossa, ed il capo dell' ulna portasi avanti il raggio. La mano resta in uno stato di supinazione senza poter esser ripor- tata alla pronazione, si sente avanti il raggio il tu- more formato dal capo dell' ulna, e si vedono le due ossa, che non restano in una situazione pa- rallela.

Per ridurre questa lussazione non può prati- carsi l' estensione, ma basta, che un' assistente ten- la mano, e la volti un poco verso il lato radia- allora si spinge dal Professore la testa dell' ul- all' indietro, ed il raggio in avanti, mentre nel po medesimo l' assistente, che tiene la mano la ta allo stato di pronazione. Si sente intanto un o crepito nel rientrare l' osso nella sua cavità, al momento si rendono facili i movimenti di pro- one, e supinazione. Si applicano delle compres- mbevute in un liquore attonante, e risolven-

te, e si colloca una fasciatura, tenendo l'antib-  
cio, e la mano in riposo.

La lussazione dell'estremità del cubito all-  
dietro è più comune di quella, di cui abbiamo  
qui parlato. In essa la mano resta in uno sta-  
pronazione senza poter mettersi in supinazione  
ossa sono parimenti in una situazione obbli-  
ma il capo dell'ulna si sente dietro il raggi-  
cagione di questa lussazione è ordinariamente  
pronazione troppo forzata. Il metodo per rid-  
questa lussazione è lo stesso, che abbiamo in-  
to per l'altra, trattone, che tutti i movimenti  
bono eseguirsi in senso contrario. Questa luss-  
ne va ridotta al più presto, altrimenti resta  
possibile a ridursi. Se ciò non si faccia sul  
mento la parte si gonfia, e allora si richiede l'  
degli emollienti, e calmanti, ed anche di qualche  
lasso prima di passare alla riduzione.

La mano può lussarsi in quattro maniere, e  
anteriormente, posteriormente, all'indietro, ed  
infuori. Queste due ultime però sono le più ra-  
atteso che le superficie articolari sono in questo  
so di maggior lunghezza, e che le apofisi stile  
impediscono le lussazioni accennate. La lussazi-  
posteriore è la più frequente di tutte, e questo  
sce molto dalla direzione inclinata all'indietro  
le superficie articolari dello scafoide, semilun-  
e piramidale. La lussazione posteriore del carpo  
luogo nelle cadute, che si fanno sulla mano in  
di flessione. I segni della lussazione sono il tu-  
re formato dal carpo dietro l'estremità infer-  
delle ossa dell'antibraccio, la profondità, che  
servasi nella parte anteriore del carpo, e nelle  
to di gran flessione, in cui è la mano senza  
possa porsi in istato di estensione.

Il metodo di ridurre questa lussazione



ste nel far tirare da un assistente la mano, mentre un altro ritiene l'antibraccio, ed allora sarà facile di far rientrar l'osso nella sua cavità premendo sull'eminenza formata dietro le ossa del raggio.

La lussazione del carpo anteriormente succede nelle cadute sulla mano estesa. Questa lussazione di raro è completa, ed è difficile a riconoscersi attesa la quantità di tendini, che passano avanti il carpo, e che impediscono di osservare l'eminenza formata anteriormente dal medesimo. Il metodo di cura è lo stesso dell'antecedente. Queste lussazioni sono quasi sempre accompagnate da lacerazione di ligamenti, e da un ingorgamento, che richiedono l'uso dei tonici, e risolventi, ed anche in seguito degli emollienti se sviluppansi sintomi d'inflammazione.

Le due specie di lussazioni laterali sono di raro, o mai complete. La loro diagnosi è assai facile, nè difficile ne è la riduzione, che si ottiene facendo delle leggiere estensioni, e riponendo l'osso nella sua cavità. Un'oggetto molto interessante da aversi in mira in tutte le lussazioni del carpo si è la lacerazione de' ligamenti, e la distrazione delle parti, che possono produrre facilmente l'anchilosi, o la carie.

Le ossa del carpo, e metacarpo sono collegate insieme con ligamenti così forti, ed inoltre i loro moti sono tanto poco estesi, che le lussazioni sono impossibili. Abbiamo tuttavia degli esempj di lussazione dell'osso grande della cavità formata dallo scafoide, e semilunare.

Le dita possono lussarsi nella loro articolazione col metacarpo, o nell'articolazioni delle falangi. Nell'articolazione del metacarpo le prime falangi non possono restar lussate, che all'indietro, impedendo la lussazione in avanti non solo la struttura l'estremità dell'ossa, con cui si articolano, ma



eziandio la resistenza, che offre la palma della mano. Le prime falangi del pollice, e del dito minimo sono le sole, che possano lussarsi all'indentro, e la prima del pollice soltanto può lussarsi all'infuori, ed è essa ancora la più esposta alle lussazioni all'indietro. E' ben chiaro, che in genere queste lussazioni si formano per una forza esteriore portata in direzione opposta sull'altra estremità della falange, che si lussa; come anche può nascere una lussazione all'indietro di un dito, se un corpo resistente agisca vicino la testa della falange da lussarsi nel momento, che tutta la mano è diretta con violenza verso di esso, come suole accadere in una caduta etc. Non è difficile di riconoscere questa specie di lussazioni, osservandosi chiaramente la deformità della parte prodotta dalla situazione della falange dietro l'osso corrispondente del metacarpo; la seconda falange è piegata sulla prima per la contrazione del muscolo flessore, il dolore, e l'impossibilità di estendere la prima falange non lasciano dubbio alcuno sull'indole della malattia.

Queste lussazioni non sono molto pericolose, ma può aumentarsi il pericolo, se questa specie di lussazione accade nella prima falange del pollice, eccetto nelle persone, che hanno i ligamenti notabilmente rilasciati, ed è per altro necessario di ridurle al più presto possibile, giacchè dopo alcuni giorni più non riesce di farlo. La riduzione non è in genere assai difficile, ma lo è bensì in quest'ultima sì per la quantità di muscoli, che circondano l'articolazione della prima falange del pollice coll'osso del metacarpo, come per la poca presa, che offre la medesima per esser posta in estensione. Si circonda a quest'oggetto la falange con un laccio, che è necessario tirare con molta forza, e nello stesso tempo si fa ritenere il carpo da un

assistente, ed insieme il Professore farà rientrare l'osso nella sua cavità. Le lussazioni delle falangi dell'altre dita, e specialmente quelle, che si articolano coll'osso del metacarpo sono più facili a ridursi che quella, che abbiamo esposto finora, per potersi più comodamente fissare l'estensione, ed il metodo da adoperarsi presso a poco è il medesimo.

Passando ora ad esaminare le lussazioni dell'estremità inferiori, le prime da considerarsi sono quelle del capo del femore. Esse sono meno frequenti, che le fratture del collo di quest'osso, e ciò nasce dalla stabilità di quest'articolazione prodotta dalla profondità della cavità cotiloidea, e dalla quantità de' muscoli, che la circondano. Essendo in molti casi difficile il distinguere la frattura del collo del femore dalla lussazione di quest'osso sono state sovente confuse queste due malattie, e si è presa spesso la frattura per lussazione, motivo per cui si è creduta questa più frequente di quello, che lo è realmente.

La lussazione del capo del femore è di 4. specie ben determinate, ed ammesse da tutti i Pratici, e sono 1. la lussazione superiore, ed esterna 2. la lussazione inferiore interna, 3. la lussazione superiore anteriore, e 4. finalmente la lussazione inferiore posteriore. La prima, e la terza specie sono le più frequenti, le altre due sono più rare, e segnatamente l'ultima, la quale non accade, che consecutivamente. Nelle cadute sulle piante de' piedi, o sulle ginocchia il capo del femore esce dalla cavità cotiloidea rompendo il ligamento rotondo, e l'orbicolare, e si porta sulla fossa iliaca. Accade qualche volta, che questi ligamenti si estendono senza lacerarsi in quei soggetti di fibra lassa, e che dedicati siano fino dall'adolescenza al ballo, salti etc. Allora la porzione in-



feriore del ligamento orbicolare resta tesa sulla cavità sudetta, i muscoli gluteo massimo, e medio restano rilassati, come ancora il psoas, e l'iliaco. Gli altri rimangono nello stato naturale, o un poco allungati. I segni per riconoscere questa lussazione sono la brevità dell'articolo, e lo stato di flessione, ed adduzione, in cui esso ritrovasi. Il ginocchio è più in avanti, ed indentro, così ancora la gamba, ed il piede, il gran trocantere resta più prossimo alla cresta dell'osso dell'ileo. Questi segni, e particolarmente l'immobilità dell'articolo servono a distinguere questa lussazione dalla frattura del collo del femore.

La lussazione di cui parliamo è molto grave attesa la forza grande de' muscoli, che circondano l'articolazione, e ne rendono per conseguenza assai difficile la riduzione, come ancora attesa la distrazione, e lacerazione de' ligamenti, che necessariamente deve accompagnare la lussazione di una articolazione così forte.

Per la riduzione si farà porre il paziente sopra un letto ben solido, e duro. Si passerà nell'inguine del lato sano una salvietta piegata secondo la sua lunghezza, e questa servirà per la contro estensione. Il mezzo di essa resta applicato nella parte interna, e superiore della coscia, e le due estremità passando anteriormente, e posteriormente al bacino vengono ad annodarsi sul fianco, dove sono ritenute dagli assistenti. Oltre questa salvietta è necessario applicarne ancora un'altra circolarmente al bacino, la quale passando avanti, e dietro l'addome è sostenuta da altri assistenti situati dal lato sano del paziente, e serve questa per impedire, che il bacino non venga ad inclinarsi dal lato affetto seguendo la forza d'estensione. Questa si farà con un laccio, o salvietta piegata in diago-



nale applicata intorno la parte inferiore della coscia, o della gamba, e che verrà tirata da un numero di assistenti bastante a superare la forza dei muscoli. Il Professore situato dal lato offeso del Paziente premendo sul gran trocantere farà rientrare l'osso nella sua cavità, quando il medesimo sarà arrivato al livello di essa per mezzo dell'estensione. La riduzione spesso resta assai difficile, e si richiedono replicati tentativi, ed ancora l'uso dei debilitanti per mettere in rilasciamento i muscoli. La fasciatura a spica applicata alla parte servirà per contenere delle fomentazioni emollienti, o risolvienti, si praticheranno dei salassi, e la dieta sarà rigorosa, ma sopra tutto si procurerà, che l'osso resti in sito legando li due femori insieme al di sopra delle ginocchia, ed il malato deve restare in riposo almeno tre settimane, altrimenti i ligamenti lacerati non hanno il tempo di riunirsi, e ne nascono degli ingorgamenti articolari, che terminano spesso con la carie.

La seconda specie di lussazione del capo del femore si è in basso, ed all'indentro sul forame ovale, e questa specie è anche frequente quanto l'altra. Essa ha luogo nelle cadute sui piedi nel tempo che le ginocchia sono considerabilmente lontane l'una dall'altra, in questo caso il capo del femore scorre dall'infuori all'indentro sul fondo della cavità cotiloidea, e viene a situarsi sulla porzione inferiore, ed interna del ligamento orbicolare, che resta dal medesimo lacerato, mentre si porta nella fossa otturatrice fra il ligamento, e l'otturatore esterno. La coscia è più lunga di quella del sano, il gran trocantere viene allontanato dalla cresta, e dalla spina anteriore, e superiore dell'ileo, e la natica è depressa per l'allungamento dei muscoli. Si sente nella piegatura della coscia il ca-

po del femore, la gamba è piegata legger ginocchio, e la punta del piede sono rivolti fuori, nè possono portarsi al loro stato. Da questi segni si vede, che la prognosi lussazione è meno pericolosa di quella di direzione superiore, ed esterna, giacchè i muscoli quali si opporrebbero alla riduzione restano rilassati dalla malattia stessa, ed inoltre non c'è lacerazione della parte è molto. Per ridurre questa lussazione si adopera lo stesso metodo, che nell'altra, di cui abbiamo parlato, e si accetta che l'estensione deve sul principio essere bassa, ed all'infuori, ed il capo del femore essere diretto in senso diverso.

La terza specie di lussazione del capo del femore si è l'anteriore, e superiore, questa è assai rara. In essa l'articolazione è voltata in fuori, e più corto dell'altro, il gran trocantere sta vicino alla cresta dell'ileo, e l'estremità superiore dell'osso elevando i muscoli psoas, che forma un tumore nella piegatura dell'articolazione che comprime i nervi crurali producendo dolore, ed anche la paralisi di alcuni muscoli. La lussazione è ordinariamente accompagnata da una lenta contusione, e lacerazione delle parti, attesa la violenza grande, ch'è necessaria per produrla; la riduzione è più difficile delle altre, di cui abbiamo parlato, ed il metodo è lo stesso.

Finalmente l'ultima specie di lussazione del capo del femore è quella inferiore, e posteriore, e che può nascere tanto da una violenza che obblighi il capo del femore ad uscire dalla cavità cotiloidea, ed

era portato nella fossa iliaca esterna per la  
 ne della coscia sul bacino si portò in basso,  
 indietro, e questa ne è ordinariamente la ca-  
 , onde i recenti Scrittori vogliono, che que-  
 sta specie di lussazione del capo del femo-  
 sia mai primitiva, ma sempre consecutiva.  
 li posteriori sono tesi, come ancora il psoas,  
 co. La coscia è più lunga di quella del la-  
 posto, e si sente il capo del femore alla par-  
 teriore, ed inferiore della natica, ed il ginoc-  
 ed il piede sono voltati all'infuori, trattone  
 la lussazione di cui parliamo sia in segui-  
 a lussazione superiore, ed esterna, giacchè  
 il ginocchio, ed il piede restano come in que-  
 sazione, cioè all'indietro, ma vi è di più la  
 e della coscia sul bacino, che serve a far  
 uere questo caso dalla lussazione superiore,  
 rna. Il metodo di ridurla è il medesimo,  
 biamo di sopra accennato, eccettuato sola-  
 che devesi prima estendere la coscia sul ba-

ella riduzione delle lussazioni del capo del  
 il Professore è obbligato far eseguire all'ar-  
 de' movimenti per assicurarsi, che sia ridot-  
 ciò farà con somma cautela procurando di  
 quei moti, che potrebbero riprodurre la lus-  
 . Se la lussazione superiore, ed esterna del  
 el femore non venga ridotta, il medesimo  
 a una nuova cavità articolare nella fossa iliaca  
 , e ne siegue la claudicazione.

attando delle lussazioni del capo del femo-  
 i mestieri dir qualche cosa sulle lussazioni  
 ee del medesimo. Queste vengono prodot-  
 all'ingrossamento delle cartilagini, che ri-  
 nella cavità cotiloide, o dalla carie, ch'at-  
 contorno stesso della cavità, o il capo del



femore . La contusione delle stesse cartilagini causata da violenza esterna , come cadute , percosse etc. può esser cagione del loro ingorgamento . Come ancora può esso venir prodotto da un vizio della macchina , che determinandosi in questa parte produce una irritazione . Sia poi l'ingorgamento prodotto da causa interna , o esterna le cartilagini si gonfiano , si fanno sentire de' dolori , che divengono assai forti , ed il capo del femore viene a poco a poco spinto fuori dalla sua cavità , e portato in alto , e all' infuori dai muscoli gluzj . Nel decorso della malattia l' articolo si va slungando a gradi , e dopo si raccorcia in un punto , e sopravvengono tutti i segni della lussazione primitiva in alto , ed all' infuori , i quali abbiamo già accennati parlando della medesima . Oltre questi sintomi se ne osservano degli altri particolari a questa lussazione p. e. il gonfiore della natica , che diviene dolente ; la cute resta tesa ; e si osserva un tumor bianco , si formano degli ascessi nella medesima , o nella piegatura della coscia , come ancora delle fistole , e ne scola un pus acre , e fetidissimo , sopraggiunge la febbre lenta , il marasmo , e la morte , e nell' apertura del cadavere si trova il capo del femore fuori della cavità cotiloide , questa vedesi ripiena della condensata sinovia , e le ossa alterate .

Nelle lussazioni spontanee del capo del femore prodotte da carie osservasi qualche diversità . I dolori sono da bel principio violenti , e l' articolo affetto non si slunga graduatamente come nel caso antecedente , ma si raccorcia in un punto , e si conserva l' orlo della cavità cotiloide cariato , come tresl un poco il capo del femore . I vizi interni no cagioni frequenti di questa malattia , ma più tutti forse il vizio scrofoloso .

Queste lussazioni sono malattie assai gravi ,

no molto più pericolose se il paziente è debole costituzione, la malattia antica, accompagnata da fistole, e la lussazione sia in basso, ed interna, giacchè allora l' articolo resta più lungo, e la lussazione più incomoda.

La cura della malattia consiste nel prevenire la lussazione spontanea, giacchè accaduta questa non vi è altro da sperare, che la formazione di una nuova articolazione nella cavità iliaca, o l' anchilosi del capo del femore. Ai primi sintomi dunque di essa si deve porre il paziente in perfetto riposo, e praticare de' salassi, osservare una rigorosa dieta, applicando nel tempo stesso dei risolvendi, ed emollienti alla parte a tenore dello stato della medesima. Qualora la malattia dipenda da un vizio interno, contro di esso deve dirigersi il metodo di cura. Un vescicante applicato alla parte, e mantenuto per molto tempo ha prodotto spesso degli effetti vantaggiosi, ma se ad onta di questi rimedj non si possa prevenire la lussazione deve procurarsi l'unione del capo del femore con l' osso innominato, e che questa succeda nella maniera la più comoda pel malato, lo che si ottiene con il riposo esatto, e facendo tenere sempre l' osso del femore esteso sul bacino. Gli ascessi, che si formano non vanno aperti, o almeno più tardi, che sia possibile, e con apertura piccolissima. Riguardo poi alle fistole si procurerà di tener lontano l' accesso dell' aria, e di tenerle nette con delle iniezioni astringive. Nello stesso tempo si farà uso di tonici interni, di bagni, e segnatamente minerali, nè si anno fare de' movimenti all' articolo, i quali aumenterebbero l' irritazione, ed impedirebbono l' anchilosi, che è la miglior terminazione della malattia.

La lussazione spontanea del femore in basso, interna è più rara dell' altra. I segni sono i me-



desimi della lussazione primitiva di questa specie, ed il metodo di cura non differisce da quello indicato alla prima specie di lussazione spontanea, soltanto la claudicazione, che ne resta è più incomoda.

La rotula può lussarsi in quattro modi, cioè in alto, in basso, all'esterno, ed all'interno, ma queste due ultime specie possono soltanto chiamarsi propriamente lussazioni della rotula, essendo lo spostamento di quest'osso negli altri due casi la conseguenza della lacerazione del tendine de' muscoli estensori della gamba, ovvero del ligamento inferiore della rotula, senza di che quest'osso non potrebbe lussarsi superiormente, o inferiormente. Le lussazioni laterali accadono per una violenza esterna, che spinga l'osso in questa direzione. Può molto ancora contribuire a questo il rilassamento del ligamento inferiore della rotula. Delle due specie di lussazioni laterali l'esterna è la più frequente.

Di qualunque specie sia la lussazione della rotula non è difficile il ridurla attesa la grande mobilità dell'osso, ma appunto per questa stessa ragione si rende difficile il mantenerla ridotta. La diagnosi della lussazione della rotula è assai facile restando quest'osso quasi allo scoperto. I sintomi della lussazione all'infuori sono un dolor violento, l'impossibilità di piegare la gamba, e si sente la rotula, che si è portata all'infuori, mentre nel luogo dove deve ritrovarsi la medesima appare il condilo del femore. I sintomi poi della lussazione interna sono i medesimi, eccetto, che ritrovasi la rotula nella parte interna. In tutte due poi le lussazioni il sintoma più grave si è il rilassamento de' tendine degli estensori della gamba, e del ligamento inferiore dell'osso lussato.

Questa lussazione deve essere ridotta al più



possibile, e siccome la tensione degli estensori della gamba formano il principale ostacolo sì a re il malato nel letto con la gamba estesa, e la coscia piegata sul bacino, sostiene la gamba per porre in rilasciamento i detti muscoli. In questa situazione è facilissimo il ridur la lussazione, lo che si riconosce al crepito dell'os- se rientrare nella sua cavità, ed alla cessazio- ne di tutti i sintomi della malattia, e segnatamen- te della difficoltà di piegare, ed estendere la gamba. Ma la lussazione si rende necessario il prati- care qualche emissione di sangue, ed applicare dei mollienti per dissipare, o prevenire l'ingor- go infiammatorio, che spesso sopraggiunge a causa della contusione, e distrazione delle parti che sempre siegue la violenza, che deve agi- re sull'osso stesso per produrne la lussazione. Al- trimenti di Chirurgia consigliano di mantene- re la gamba in sito per mezzo di una fasciatura adat- ta anche delle macchine, che si adoperano nella cura della rotula, ma l'incomodo, che portano questi metodi è spesso considerabile, e non sono rimedj sufficienti ad impedire, che l'osso non torni a lussarsi nuovamente ne' moti dell'ar- to. Sarà quindi miglior partito quello di man- tenere la parte per alcuni giorni in perfetto ripo- so. Dopo questo tempo far eseguire alla medesi- ma articolazione movimenti regolati, per impedire la rigidità dell'articolazione. Un sintoma, che merita par- ticolare riguardo in questa lussazione si è lo stra- zamento di sangue nella capsula articolare, e che de- terminatamente aversi in vista nella cura della ma- lattia. Il riposo, ed i mezzi già da noi di sopra indicati in occasione, che abbiamo trattato di que- sta lussazione sono i rimedj necessarj da praticarsi. Le lussazioni della rotella restano molto soggette alla

recidiva , ma questa si può prevenire con un' fasciatura contentiva , ed accaduta ancora che al sommo facile il rimetterla .

La lussazione della tibia sul femore può luogo in quattro diverse specie , cioè posteriore , anteriormente , all' interno , o all' esterno . come quest' articolazione presenta una gran superficie , le lussazioni non sono mai complete , non tendendo ciò accadere senza una grande lacerazione dei ligamenti , e tendini assai robusti , e numerosi che rendono forte l' unione delle due ossa . Da questa forza dei ligamenti nasce , che le lussazioni anteriore , e posteriore sono le più difficili , e che la tibia non si lussa , che incompletamente , e lateralmente . Queste lussazioni accadono ordinariamente in conseguenza di una gran forza , e principalmente nelle cadute , in cui la gamba è ritenuta mentre il peso del corpo porta il femore da lato , o da un altro .

Non è difficile il riconoscere la lussazione della tibia , Se essa sia posteriore trovasi la gamba possibilata ad estendersi , la rotula è fissa nello spazio , che esiste fra i condili del femore , sotto essa sentesi un vuoto , e si presenta nello stesso tempo teso il ligamento inferiore della rotula diretto obbliquamente all' indietro . Nella cavità del poplite si conosce il tumore formato dal capo della tibia . Se la lussazione sia anteriore i suoi capi saranno opposti agli accennati , e così non sarà difficile il riconoscere le lussazioni esterne ed interna dalla sola ispezione della parte .

Siccome queste lussazioni non possono ridursi senza una considerabile distrazione , e lacerazione delle parti molli , e dei ligamenti , ne segue , che è molto facile il riporla , e quindi si richiede pochissima forza di estensione , e cont

ensione; ma appunto per questo motivo tali lussazioni sono assai facili a recidivare, e quindi è necessario di mantenerle dopo ridotte in modo da impedire ogni movimento all' articolazione affetta. I migliori Pratici consigliano di servirsi in questi casi di un apparecchio simile a quello, che si pratica nelle fratture dell' osso del femore, ch'è quanto dire di canali, o di stecche laterali, e sacchetti di avena, le quali mantengano in sito le parti. Ridotta la lussazione, ed applicato il mezzo per mantenerla, siccome abbiamo detto, che la distrazione, e lacerazione delle parti molli è ordinariamente considerabile in queste lussazioni, così rendesi necessario impedirne le conseguenze, e perciò dovrà porsi in opera il metodo antiflogistico affine di prevenire l' infiammazione per ottenerne la risoluzione, che se ciò non accade passando in suppurazione come sovente succede fa di mestieri aprire l' ascesso, che si forma procurando di dare un libero scolo alla marcia, potrebbe produrre danni notabili nell' articolazione tanto ai ligamenti, quanto alle cartilagini articolari, ed anco all' estremità delle ossa stesse. Nel caso per altro che la carie delle ossa fosse la causa dell' ascesso si aprirà con la minore incisione possibile per impedire il contatto dell' aria. Accade molte volte, che la lussazione della tibia sia unita da cancrena, ed allora altro non rimane, che l' amputazione.

Alle lussazioni della gamba può riferirsi ancora quella della fibola sulla tibia, ma questa è sommentente rara, e può al più accadere in caso che rovesci il piede all' infuori, giacchè questo movimento farebbe salire la fibola, il di cui capo si erebbe sul condile esterno del femore. Riposto il piede nel suo stato si fa discendere la fibola nel luogo naturale, e si mantiene in sito con



una fasciatura circolare, e con de' bagnoli attesi. Devonsi fare eseguire de' movimenti al piede per impedire la rigidità dell' articolazione, che si produce nella lussazione di questa parte.

Le lussazioni del piede sono molto rare, essendo l'astragalo situato assai profondamente in una cavità formata segnatamente dai due condili dell' ossa della gamba, ed essendo quest' articolazione rinforzata da validi ligamenti, che sono il *transverso*, il *ligamento medio della fibola*, il *posteriore della fibola*, il *deltoidale* così detto dalla sua figura. Quattro sono le direzioni, secondo le quali può lussarsi il piede, cioè anteriormente, posteriormente, internamente, ed esternamente. Le due prime sono più rare delle altre due, e fra queste la più frequente è l' interna perchè il malleolo interno è meno lungo dell' esterno. Essa vien prodotta da un eccessivo movimento del piede all' infuori, e si conosce facilmente dalla situazione del piede stesso, che sta con la pianta voltata all' infuori, mentre l' astragalo nella parte interna al di sotto del malleolo. I segni opposti sono quelli, che accompagnano la lussazione esterna.

Queste lussazioni costituiscono una malattia più pericolosa, attesa la distruzione, e lacerazione de' validi ligamenti, tendini, vasi etc. che in queste due specie di lussazioni, l' astragalo possa escire dalla cavità articolare sia per la frattura di uno dei condili, o la lacerazione de' ligamenti, che uniscono le due ossa della gamba. Molti Pratici consigliano quindi di amputare al più presto la gamba, ma si hanno degli esempi di lussazioni del piede non seguite da gangrena. Per la cura dovrà il Professore in primo luogo riporre la lussazione al più presto, onde diminuire i sintomi infiammatorj, ed il gonfiore de

te. Un ajutante prenderà il piede per fare l'estensione, ed un altro terrà fissa la gamba nella sua parte media. Il Professore allora procurerà di far rientrare l'astragalo nella sua cavità imprimendo al piede un moto opposto a quello, che ha prodotto la lussazione. Ridotta la parte si devono applicare sulla medesima delle compresse imbevute di qualche liquore risolvente, e per mantenere il piede ridotto si situerà l'apparecchio per le fratture sostenendo così lateralmente il piede con le stecche.

Riposta la lussazione è necessario prevenire i gravi sintomi, che sogliono alla medesima sopraggiungere, e segnatamente l'infiammazione, la quale può terminare in suppurazione, formandosi degli ascessi, che producono la carie delle ossa, ovvero in cancrena, che fa dei progressi difficili ad arrestarsi. A quest'oggetto conviene subito praticare dei salassi applicati secondo l'età, ed il temperamento del paziente. Ma se il disordine delle parti sia grande si dovrà ricorrere all'amputazione. Qualche Pratico è di opinione, che invece di amputare l'articolo sia preferibile di portar via l'astragalo, giacchè si riportano degli esempj di malati guariti felicemente con questo metodo, essendosi l'estremità inferiore della tibia riunita col calceagno.

Un sintoma molto frequente nelle lussazioni del piede interne si è come abbiamo detto la frattura dell'estremità inferiore della fibola, ed a questo sintoma dovrà prendersi molto riguardo esaminando il detto osso nelle due lussazioni laterali, ed applicando l'apparecchio per le fratture, se realmente questa frattura abbia avuto luogo.

Le lussazioni anteriore, e posteriore del piede sono le più rare, ed accadono in occasione di violenta estensione, o flessione del medesimo. Le an-

teriori sono più difficili, che le posteriori; ma in ambedue esiste lacerazione de' ligamenti anteriori, o posteriori secondo la specie di lussazione. Nella lussazione posteriore il piede è raccorciato nella sua parte superiore, ed il calcagno più prominente, il tendine d'Achille è teso, l'estensore delle dita è rilasciato, ed il piede è immobile. L'opposto accade nella lussazione anteriore.

Queste due specie di lussazioni sono assai facili a ridursi, ed il metodo è il medesimo, che abbiamo accennato per le lussazioni laterali, e così debbono adoperarsi le stesse precauzioni per mantenerle ridotte, e prevenire i sintomi, che per ordinario sopraggiungono.

Fra le ossa del tarso sono rarissime le lussazioni essendo le medesime unite con forti ligamenti, e presentando grandi superficie, in modo che formano come un solo osso. Si ha qualche esempio di lussazione dell'astragalo, e del calcagno con il cuboide, e scafoide. Le ossa del metatarso non si lussano mai essendo unite insieme assai fortemente, e così le ossa delle dita, le quali presentano poca superficie agli urti esterni, che potrebbero produrre la lussazione. Però non è impossibile la lussazione del dito grosso sull'osso del metatarso. La cura conveniente si è la riduzione con i metodi già più volte accennati, e nel caso essa non riesca si propone l'estirpazione del dito.

## CAPO XXI.

## DELLE MALATTIE DELLE OSSA.

**T**ratteremo in questo capitolo delle malattie principali, ch'attaccano la sostanza stessa delle ossa, le quali sono la *Necrosi*, e *Carie*, il *Pedartrocace*, l'*Eso-stosi*, la *Rachitide*, e l'*Osteosarcosi*.



# DELLE MALATTIE DELLE OSSA 277

La necrosi è quell' affezione delle ossa , nella quale la loro sostanza si dissecca , e diviene morta. Questa malattia delle ossa ha molta analogia con la cancrena delle parti molli. Varj Scrittori di Chirurgia , e segnatamente gl' antichi non hanno distinto la necrosi dalla carie , o al più l' hanno nominata carie secca , ma questa è ben dall' altra diversa giacchè nella carie l' osso è fornito ancora di una certa vitalità. La necrosi attacca facilmente le ossa lunghe , e si estende ora più , ora meno nella loro sostanza , e la parte media delle ossa lunghe è quella , che viene sovente attaccata in questa malattia , l' estremità spongiose non vi sono punto soggette. Il sintoma principale della necrosi è l' esfoliazione delle ossa , o sia la separazione delle lamine prive di vita. La cute sopraposta s' infiamma , si gonfia , e si forma un' ascesso , che si apre dando esito ad un pus , il di cui assorbimento produce alle volte la febre , la consunzione , ed il marasmo . Dall' apertura si sente l' osso disseccato , e denudato , il perostio si viene ad ingrossare , ed ossificare , e costituisce una copertura all' osso privo di vita .

La necrosi è prodotta da cagioni interne , o esterne , e quelle sono le più frequenti , cioè i vizi venereo scrofoloso etc. I colpi violenti , ed i fortissimi ritanti sono le cause esterne . La malattia principia con dolori forti , che non cedono ad alcun rimedio , dopo qualche tempo la parte si gonfia , e s' infiamma , ed il tumore rammollito produce delle aperture fistolose . La suppurazione è abbondante , ed insieme col pus escono i pezzi d' osso secchi .

Secondo i luoghi , che occupa la malattia , e giuocando le sue cagioni varia il pericolo di essa . Nella necrosi superficiale tanto delle ossa lunghe , quanto delle ossa larghe il pericolo è assai mite , nè altro deve fare il Professore , che aiutare la natu-

ra, che per se stessa è sufficiente a produrre la guarigione. Il pericolo maggiore ha luogo nelle ossa lunghe quando il periostio si è ossificato, ed imedisce, che la natura possa eliminare i pezzi, o lamine d'osso affette.

Nella cura della necrosi poco si può fare dal Professore, ma il più è opera della natura, a cui il medesimo deve servire di aiuto, procurando di favorire la separazione del pezzo di osso attaccato dalla malattia. Se l'osso sia piano, come p. e. quelle del cranio si dovrà attendere l'esfoliazione, che accade per la suppurazione, e sviluppo del reticolo vascolare, che si forma al di sotto. In questo caso sarà bene di smovere un poco il pezzo osseo per facilitarne il distaccamento. I topici emollienti convengono più che gli stimolanti, i quali irritano di troppo, ma quello, che più interessa si è di medicare nello stesso tempo il vizio interno, che ordinariamente è la cagione della malattia. Il trapano non si rende necessario, che quando la necrosi affetta tutta la grossezza dell'osso, ed il pus si portasse sulla dura madre comprimendo il cervello. Si deve procurare di non rompere i pezzi ossei, che debbono distaccarsi, perchè l'estrazione degli altri pezzi resta difficile se sono ricoperti dalle parti molli, nel qual caso debbonsi esse incidere per mettere l'osso allo scoperto. Distaccati i pezzi d'osso, riducesi la piaga ad un ulcere semplice, giacchè i bottoni carnei, che si elevano dalla diploe, o dalla dura madre servono per base alla cicatrice.

Nella necrosi, che affetta la parte esterna delle ossa lunghe deve tenersi il medesimo metodo. Se siasi formata una fistola, e si senta al di sotto l'osso mobile, dovrà incidersi la medesima per metterlo allo scoperto. Nel caso di *sequestro* così detto, quando cioè la malattia esista in un osso lungo,



che resta rinchiusa in una specie di tubo osseo di nuova formazione si deve attendere, che l'osso rinchiuso sia separato dall'altro, che l'involge, lo che si conosce alla sua mobilità portando or da una parte, or dall'altra il membro. Arrivata la malattia a questo grado la natura non può aiutare il paziente nella separazione dell'osso, ma è necessario farne l'estrazione. Se l'osso sia circondato da forti muscoli, siccome la suppurazione sarebbe assai grande, e pericolosa, sarà meglio preferire l'amputazione, come ancora se la malattia estendasi all'articolazione. In altri casi potrà tentarsi l'estrazione del pezzo d'osso, operazione assai difficile, e dolorosa.

Il metodo per praticarla è il seguente. Si metterà allo scoperto l'osso malato procurando di far ciò nella parte meno ricoperta di muscoli, e dove non vi siano grossi nervi, o vasi sanguigni. Si faranno due incisioni semiellittiche, e si toglierà la porzione di cute, e muscoli compresa fra di esse. Invece dell'incisione si propone da alcuni il caustico; ma l'operazione è più lunga, e più dolorosa. Scoperto l'osso malato se nasca una forte emorragia si dovrà riempire la ferita, ed attendere che cessi la medesima per estrarre l'osso. Se dessa non si presenta si applicheranno subito due, o tre corone di trapano verso la parte inferiore dell'osso, e con uno scalpello si porteranno via i pezzi, che dividono i forami, dopo di che con le pinzette, o con le dita si estrarrà il pezzo d'osso rinchiuso. Riempiesi di sfilà la ferita, che riesce molto profonda, e si medica per suppurazione, la quale ordinariamente è assai lunga per la grandezza della piaga, e la durezza dei labbri della medesima. Da questo si vede, che devesi tentare molto di raro questa lunga, e pericolosa operazione ad onta degli esempj di felice successo.



La *carie* può paragonarsi alle ulcere di cattiva qualità delle parti molli, e sono soggette a questa malattia tutte le ossa, ma segnatamente quelle composte di sostanza spongiosa. Abbiamo già veduto, che questa malattia è assai diversa dalla necrosi, giacchè nella *carie* non è estinta la vita dell'osso. Questo è ammolito nella sua sostanza, è ripieno di parti fungose, e ne stilla una sierosità nerastra fetida.

Le cagioni della *carie* possono essere interne, o esterne. Queste seconde sono rare, e non ha luogo la *carie* neppure in quei casi, ne quali formasi per causa esterna un ascesso vicino ad un osso. Queste esterne servono però di cagioni occasionali quando esista già un' vizio venereo, scorbutico, canceroso, e segnatamente scrofoloso. Non è difficile il riconoscere la *carie* dell'osso, se questo sia accessibile alla vista, o allo specillo, ma non può dirsi lo stesso della *carie* di un osso profondo, e non accessibile agli stromenti, ma si può supporre la *carie* se la fistola sia diretta verso un' osso, e ne scoli un umore negro, fetido, e le parti molli siano indurite. Questi segni però non sono totalmente certi; ma è necessario ajutarsi con i segni razionali. Uno dei più caratteristici di questi si è il dolore dell'osso precedente la formazione dell'ascesso nella parte affetta molto più se ci sia il fondamento di credere un qualche vizio interno.

La *carie* è tanto più pericolosa, quanto più spongioso è l'osso, ch' essa attacca, segnatamente se è prossima ad una articolazione, ed è molto pericolosa nelle ossa corte, comunicandosi con facilità alle ossa vicine. La *carie* prodotta da causa esterna è meno pericolosa di quella nata da cagione interna, e questa seconda è unita a maggior pericolo se riconosce l'origine da un vizio canceroso, o scro-

foloso. Finalmente deve riguardarsi l'età, il temperamento, le forze del malato, lo stato delle parti molli etc.

La cura di questa malattia non è delle più facili sì per la gravezza della malattia stessa, come ancora per l'incertezza, in cui sono gli Scrittori di Chirurgia riguardo ai metodi di cura, di modo che quando ha il Professore cercato di distruggere la causa interna, che l'ha cagionata, e procurato di mantenere le forze del malato, si può dire, che abbia quasi intieramente adempito al suo oggetto, giacchè l'applicazione de' rimedj è piuttosto diretta secondo delle viste empiriche. Non appartiene qui il descrivere quali siano i mezzi per distruggere i vizj interni della macchina, ma possiamo soltanto aggiungere, che se il vizio non esiste, o sia già distrutto, onde la malattia sia diventata locale sarà necessario limitarne i progressi con accrescere l'azione della parte per mezzo di rimedj assorbenti, ed irritanti, come p. e. i balsamici, i quali procurano la disseccazione dell'osso se è cariato superficialmente, ed il distaccamento della porzione cariata. Oltre i balsamici può farsi uso ancora dell'acqua vegeto-minerale, ed anche de' cauteri. Ma questi rimedj poco sono attivi se la carie sia umida, giacchè la loro azione viene distrutta dall'umore, che scola dall'osso. In questi casi il miglior rimedio è il fuoco, che converte la carie umida in necrosi; ma per far uso di questo rimedio debbonsi avere molte cautele. In primo luogo è necessario scoprire l'osso cariato o col ferro, con la pietra caustica, e deve indi applicarsi il ferro ben arroventito, giacchè quanto è più ignito o meno dolore produce. Si applicheranno due, o tre cauterj, se il primo non sia sufficiente, avvertendo di adoperare delle cannule per difendere le

parti adjacenti , se ciò sia necessario . In questa operazione è indispensabile bruciare tutta la parte dell' osso cariato , altrimenti non si fa che renderla ribelle la malattia . Il fuoco assorbe l' umore e procura l' esfoliazione della parte separata , in ogni caso essere il primo oggetto quello di struggere il vizio interno .

La cura varia secondo la diversità delle carie . Nella carie venerea delle ossa del capo riggersi la cura contro la malattia generale , e l' oggetto potranno praticarsi le frizioni mercuriali , o le preparazioni mercuriali interne . L' uso del mercurio può produrre troppa irritazione al cervello e meningi , ed è meglio togliere i pezzi di osso con il trapano . Nella carie dell' apofisi mastoidea la cura esterna è il fuoco sommamente vantaggiosa . Nella carie delle altre ossa del capo come della base del cranio , delle mascelle etc. basta ordinare la cura interna , eccetto la carie nei seni paranasali , la quale spesso volte richiede la perforazione del bordo alveolare corrispondente .

La carie delle vertebre è di conseguenza la più funesta , producendo degli ascessi periferici , o la curvatura della spina . Gli ascessi spinali si formano o all' inguine , o in quella parte dell' ano , o alla parte posteriore del bacino dove si fa strada la marcia . Il dolore precede la formazione di questi ascessi e li aprendosi danno esito ad un pus abbondante che diventa fetidissimo al contatto dell' aria , e il cui riassorbimento produce il marasmo , e la cachessia . Questi ascessi debbono aprirsi al più presto possibile , e con piccolissima apertura per impedire il contatto dell' aria .

La curvatura della spina se dipende dalla carie , il suo effetto è la paralisi delle estremità inferiori .



riori, della vescica, e dell' intestino retto. Negli adulti questa malattia è incurabile, ma nei bambini non è lo stesso, giacchè la curvatura dipende piuttosto dal riammollimento delle vertebre, di quello sia dall' ascesso, o sia dalla carie. I fonticoli, o la moxa ai lati della spina sono in questi casi molto vantaggiosi. Se combinasi poi la detta curvatura cogli ascessi la malattia sarà gravissima, ed incurabile.

La carie dello sterno cagiona degli ascessi, che penetrano alle volte nel mediastino anteriore, dove formano delle collezioni di marcia, che producono non di raro la corrosione della pleura, e del pericardio. Questa malattia gravissima è poco suscettibile di guarigione senza ricorrere alla trapanazione dell' osso, o separarlo con lo scalpello, attendendo di non lasciarne alcuna parte affetta. Nei luoghi dove si è portata via una porzione dello sterno si viene a formare una sostanza dura, e quasi ossea, che ne rimpiazza benissimo le funzioni. Nella carie delle altre ossa poco vi è di interessante da osservare, ma conviene regolarsi secondo i precetti generali, che abbiamo esposto, prendendo attenzione alle parti prossime coll' applicazione del fuoco, e dirigendo un' adattata cura per gli ascessi, che vengono in conseguenza della carie.

Il *pedartrocace* chiamato ancora *spina ventosa*, è stato da qualche Autore confuso con l' osteosarcosi, o rammollimento delle ossa, sebbene siano due malattie diverse; come vedrassi quando noi parleremo della seconda di esse. Il *pedartrocace* propriamente detto è una malattia delle ossa, che principia dalla loro midolla, che s' infiamma, si aumenta, fa gonfiar l' osso, ne corrode la sostanza, e si fa strada al di fuori producendo poi dei tumori, che suppurano, ed in fondo de' quali si sente l' osso cariato, a traverso di cui si può penetrare nel-

dolla delle ossa, e pedartrocace l'infiammazione. Nella spina ventosa l'osso rimane ancora nella massima parte, e quindi la sua separazione più lenta che nella necrosi, e di guarigione facile senza l'amputazione, e l'osso non si riduce come nella necrosi, rimanendo quindi di qualche titolo deforme.

La cagione della spina ventosa, e pedartrocace essendo ordinariamente la diatesi scrofulosa, è necessario dirigere contro di essa la cura generale, e quindi converranno i bagni di mare, i bagni minerali, l'antimonio, la decozione di antiscrofolose etc. Per quello poi appartiene al locale converranno le docce, la cicuta, il santonio, e simili rimedj, e molti attestati ricavati grandi vantaggi dal mercurio adoperato internamente, che localmente. Se però il pus dell'osso produca un' ascesso, dovrà questo aprirsi procurandone la maturazione cogli emollienti, che sia sì dilateranno i seni, che facilmente si formano per porre l'osso allo scoperto, che allora caderà più facilmente in mano, nè sarà difficile il portarne via de'

spesso da se sola sufficiente a produrre  
one dell' osso .

e volte per altro accade , che questi me-  
sono sufficienti a produrre la guarigione  
attia , ed allora si richiede necessariamente  
tazione . Le spine ventose , che richiedo-  
operazione sono principalmente quelle , che  
le ossa nelle loro faccette articolari , quel-  
taccano il calcagno , il cubito etc. Queste  
no molto pericolose attese le grandi ade-  
struttura del calcagno , e l' ampia artico-  
l cubito , in cui si connettono più ossa .  
cale non potrà essere la quì sopra espo-  
dilatate i seni per porre l' osso allo sco-  
converrà contentarsi d' alcuni topici , i  
inati siano piuttosto ad impedire il con-  
aria , che ad agire per la risoluzione del-  
a . Le docciature , o i leggieri stimolanti  
erò indicati , ma spesse volte a nulla gio-  
per salvare la vita al malato bisogna ri-  
ome abbiamo detto , all' amputazione se esi-  
forza in esso , che esige tale opera-  
ualeche Autore di Chirurgia in occasione  
ventosa nel calcagno , prescrive di estir-  
ramente , e crede che quest' operazione sia  
asi da preferirsi all' amputazione del pie-  
to metodo per altro non lascia di essere  
e difficile . In caso però di amputazione  
quì la regola opposta a quella , che con-  
altri casi , vale a dire di fare l' amputa-  
tardi , che sia possibile sembrando a mol-  
le , che il vizio generale resti più limita-  
dogli continuare la sua azione nel luo-  
 , altrimenti amputata la parte malata non  
o di produrre la stessa malattia in altre  
osì si verrebbe a praticare inutilmente una



operazione, che deve risparmiarsi per quanto possibile. Oltre di che conviene a questo propflettere, che la cura del pedartrocace, e della spina ventosa è lunga estremamente, ed abbiamo gli esempj di malati guariti perfettamente, e lungo lasso di tempo, e principalmente se il tumore sia di tenera età.

L'*esostosi* altro non è, che un rigonfiamento delle ossa dall'addensamento de' fluidi. Questa malattia non è molto commune se non intendiamo il nome di *esostosi* le malattie conosciute sotto il nome di pedartrocace, o spina ventosa, o tumori del periostio. L'*esostosi* differisce secondo il luogo del medesimo, in cui esiste, e secondo ancora secondo il volume del tumore, le sue specie, e la sua struttura. L'*esostosi* osservasi frequentemente nelle ossa del cranio, mascella inferiore, omero, raggio, ulna, carpo, femore, e nelle altre ossa è meno comune. L'*esostosi* ordinariamente ha la forma di un tumore rotondo.

Circa la cagione di questa malattia rare volte è d'essenza esterna, ma più sovente interna, e comunemente viene prodotta dal vizio venereo, e scrofoloso. Dagli altri sintomi, che accompagnano questa malattia sarà facile nella maggior parte de' casi distinguere quale dei due vizj sia stato propriamente la cagione della medesima. Se questa malattia è prodotta per causa un vizio scrofoloso, l'*esostosi* occorre a preferenza l'ossa lunghe, o corte, e nello stesso tempo si osserverà l'ingorgamento delle ghiandole linfatiche del collo, e tutti gli altri segni scrofolosi. Nelle *esostosi* veneree poi sono più facilmente affette le ossa piane, e questo accade ordinariamente negli ultimi periodi della lue. L'*esostosi* ha luogo per ordinario nelle ossa del cranio, e della tibia, e la sua formazione è preceduta da

cali profondi, ed inoltre prima della formazione dell' esostosi si osservano tutti i sintomi dell'af-  
fezione venerea sì locale, che generale.

Di qualunque natura poi sia l' esostosi, appare sempre sotto la forma di un tumore durissimo, aderente ad un osso, immobile, e circoscritto.

Gli effetti prodotti dall' esostosi per il loro vario sono varj a seconda delle parti, che occupano, e possono alle volte essere molto pericolosi. La cagione della malattia, e la qualità della disorganizzazione, che essa ha prodotto nell' osso, sono i due punti principali, che debbono determinare riguardo la prognosi della malattia. L' esostosi prodotta da causa esterna sono più difficili a guarirsi, che quelle nate da cagione interna, e fra queste sono più ribelli quelle scrofolose, che le veneree, giacchè non abbiamo un rimedio così sicuro contro la prima malattia, e come contro la seconda. L' esostosi più dure, e compatte sono le meno pericolose non crescendo mai ad un gran volume, e il pericolo dipende, che dalla loro situazione.

Siccome noi siamo molto all' oscuro sulla maniera, con cui si producono l' esostosi, e non possiamo stabilire un metodo di cura ragionato. Quello che deve servir di base si è di dirigere la cura verso la cagione della malattia, non essendo difficile a riconoscersi l' esostosi veneree, sarà in questo caso facile la cura della medesima, trattandosi tanto di porre in opera un metodo antivenerico. Se non possiamo qui determinare quale debba essere un tal metodo, giacchè appartiene questo al trattamento delle malattie veneree in generale, di cui l' esostosi non è che un sintoma, basterà soltanto l' os-  
servare, che trattandosi del grado massimo della malattia, e di malati, i quali hanno già fatto uso di molti rimedj, la cura deve essere molto energica.

ca. Converranno quindi le frizioni di pomata mercuriale, o di una soluzione di sublimato, sale ammoniaco, opio in acqua distillata, aggiungendovi un poco di spirito di vino, di cui se ne potrà far uso anche per bagnolo, le bibite antiveneree, e finalmente il mercurio internamente, se non sia sufficiente adoperato all' esterno, ed allora sarà adattato l' uso del sublimato secondo la prescrizione di alcuni Pratici, ma spesso ciò non può eseguirsi a motivo, che i malati hanno già preso molto mercurio per curare la lue preceduta, di modo che non sono più in istato di soffrirlo, ed intanto conviene limitarsi ai diaforetici, all' opio, all' acido nitrico, mariatico ossigenato, e simili rimedj. Con questo metodo si viene a togliere la cagione della malattia, ma difficilmente si rimedia all' effetto, e resta la medesima puramente locale, poscia che l' esostosi diviene indolente, non cresce di volume, ed intanto è inutile il continuarne la cura, nè produce alcun altro incomodo, che pel suo volume, il quale se cagioni degli effetti pericolosi va estirpata, essendo qualunque rimedio locale, se non dannoso, almeno inutile.

La cura delle esostosi scrofolose consiste nell' uso dei rimedj consueti ad adoperarsi nelle scrofole come docce, bagni etc. e se l' esostosi passi in carie come alle volte succede, va diretto il piano di cura, come abbiamo già accennato parlando della carie.

Si è già di sopra detto, che tolta per mezzo de' rimedj interni la causa principale della malattia, questa diviene puramente locale, e che non è suscettibile della risoluzione per mezzo dei topici indicati, o puramente risolvendi; ma se il suo volume la rende incomoda alle parti vicine, è necessario estirparla. Questa operazione, che va risp



per quanto è possibile si fa nella maniera seguente. Se l'esostosi ha una base stretta dopo messo scoperto si sega con una piccola sega nella base, ma se questa fosse troppo grande, o in una situazione non potesse adoperarsi la sega, si fa uso dello scalpello, e del martello usando la precauzione di fissare immobilmente l'osso, e si tiene lo scalpello obliquamente, acciò agisca lo scalpello, ed incidendo insieme, e finalmente di non dare scosse molto grandi segnatamente se si sega nel capo. Il trapano, e le tenaglie incisive non sono essere ancora necessarie. Estirpata poi l'esostosi si distruggeranno i residui della medesima col ferro rovente.

*Rachitide* è una malattia, che consiste propriamente nell'ingrossamento delle apofisi delle ossa, e nello storcimento nella loro lunghezza, ed in alcune azioni prodotto dal rammollimento delle ossa stesse. La rachitide significa propriamente un'infiammazione della colonna vertebrale, ma sotto questo nome si intende comunemente la malattia formata dall'osso de' sintomi accennati, nè ogni rammollimento d'ossa viene compreso sotto il nome di rachitide.

Questa malattia è propria dell'infanzia, ed ordinariamente si manifesta nel tempo della dentizione. Noi siamo molto all'oscuro sulle cause immediate della malattia. Alcuni sostengono, che il rammollimento delle ossa sia la malattia primitiva, altre che dipenda da un vizio venereo, scorbutico, o stamamente scrofoloso, altri finalmente credono, che la rachitide possa dipendere dalla mancanza del calcio di calce nelle ossa, o dalla presenza di un acido diverso dal fosforico, ma è ben difficile pronunziare decisamente su di queste opinioni. Dunque per altro sia la causa i sintomi so-

no i seguenti. Il ventre duro, la pelle arida, articoli atrofici, il bambino è estremamente contorto, e le articolazioni si gonfiano, le ossa si curvano, il capo cresce in volume, e le facoltà mentali si sviluppano molto presto. La spina, dove reside principalmente la malattia si curva, e si raccorta, lo stesso accade nella clavicola, e nella gola.

Questa malattia è alcune volte ereditaria, deve spesso la sua origine a molte cause differenti, come la cattiva qualità di latte, o la mancanza di vitto sano, di aria, l'umidità, e come è detto principalmente alle scrofole. Per quello che appartiene all'esito della rachitide è questa una delle più gravi, non essendovi a propriamente parlare rimedio alcuno contro la medesima siccome tutto quello, che si può fare è d'impedire i progressi della malattia, così ne siegue, tanto più infausta sarà la prognosi, quanto più antica sarà la malattia, e quanto più interessanti le parti affette. Vediamo sovente delle risorserche trova la natura stessa per guarire questa malattia senza l'aiuto dell'arte, e questo accade ordinariamente per mezzo di altre malattie.

Da quello si è detto vedesi, che poco si può dire di certo sul metodo di cura conveniente alla rachitide, che però consiste generalmente negli antispasmodici. L'aria pura è una delle cose principali, come ancora la pulizia, e la situazione della camera, onde il capo non graviti sulla colonna vertebrale, e ne produca sempre più la curvatura, quindi molti consigliano di tenere il paziente in una situazione orizzontale. Le frizioni, umide, o secche, il vitto adattato, e vino puro dato epicriticamente, la mutazione della nutrice, il moto attivo



etc. sono mezzi i quali possono molto contribuire alla cura della malattia.

Questi sono i mezzi generali riguardanti l'igiene, il qual poi appartiene ai medicamenti conviene guardarlo al grado della malattia, ed allo stato del paziente, come ancora agli altri sintomi, che si uniscono alla medesima p. e. i vermi, la dentizione, le convulsioni etc. Per quello riguarda l'uso delle glandole del mesenterio, le frizioni, etc. possono essere di qualche vantaggio, ma questi mezzi saranno poco efficaci se non ci si unisce un metodo di cura generale consistente nei ritardanti, antiscrofolosi, antivenerei se il corso della malattia consiste in una di queste. A questi rimedj sarà molto utile l'aggiunta degli amari, ed altre preparazioni toniche. Molto creduto, come si è di sopra accennato, che questa malattia consistesse nella mancanza di fosfate delle ossa, ed hanno procurato di rimediare col somministrare al malato de' medicamenti che contenessero questo principio, ma l'esito non corrisposto alla loro aspettazione.

Sta qui finalmente ad avvertire, che tutti i mezzi meccanici inventati per raddrizzare le ossa dei bambini, o per impedirne la curvatura, come stecchi, ferro, stivaletti etc. sono di poca, o nessuna utilità non togliendo punto la cagione della malattia anzi sono dannosi, perchè impediscono il movimento necessario delle parti, e l'azione muscolare obbligano il paziente a conservare sempre la medesima situazione, lo che è molto pregiudiziale nella presente malattia, quindi rari sono i casi in quali essi possano aver luogo, ed al più possedere di qualche utilità ne' casi di storcimenti.

Concludasi ora per terminare questo trattato sulle



malattie delle ossa di dire qualche cosa del rammollimento delle medesime chiamato dagl' Autori *Osteosarcosi*, ed *Osteomalacia*. Differiscono queste due malattie propriamente fra loro, in quanto che nella prima le ossa perdono ogni durezza, e qualità ossea, mentre nella seconda esse si rammolliscono semplicemente. L'osteosarcosi nasce dalla mancanza del principio terreo delle ossa prodotta ordinariamente da un vizio interno, e segnatamente dal principio venereo. In questa malattia l'osso è molto accresciuto di volume, e quasi sempre si sente nel medesimo una pulsazione prodotta o dalle arterie dell'osso stesso, o da quelle adjacenti. Da questi segni non sarà difficile il riconoscere la malattia.

Riguardo alla cura essa è quasi mai possibile eccetto nel caso sia prodotta da lue venerea, nel qual caso possediamo il rimedio sicuro contro la sua causa, ed allora converrà amministrare il mercurio co' metodi adattati, nè mancherà di vedersene degli effetti vantaggiosi qualora però la malattia non sia ancora molto avanzata, giacchè in questo caso tolta eziandio la cagione della malattia restano le ossa così disorganizzate, che non è più possibile il loro indurimento. Negli altri casi sono presso che inutili tutti i rimedj interni, o locali, giacchè la malattia non lascia di fare de' continui progressi, e produce dolori, infiammazioni, carie, ulceri etc, e si propaga alle parti vicine, e per conseguenza non ci è altro rimedio, se la parte affetta ne sia suscettibile, che l'amputazione, e la cauterizzazione dell'osso, che rimane.

L'osteomalacia consiste come abbiamo detto in una mollezza delle ossa, che principia con dolori nelle medesime, e nasce dalla mancanza del fosforo di calce, che si separa invece nelle orine. Le ossa s' incurvano, la macchina s' accorcia, e la malat-

## DELLE MALATTIE DELLE OSSA. 293

La terminazione con la morte. La causa di questo morbo dipende parimenti da un vizio interno, e segnatamente dalla lue venerea. Ne' malati affetti da questa malattia le ossa sono disposte moltissimo alle fratture, le quali accadono per le cagioni le più leggiere. L'osteomalacia ha prodotto ancora delle variazioni notabili nel bacino delle donne, le quali poi sono state impossibilitate a partorire, sebbene antecedentemente avessero avuti parti felicissimi. La cura della malattia è ordinariamente impossibile, nè può sperarsi qualche vantaggio, che nel caso sia essa prodotta da un vizio interno, e segnatamente dalla lue venerea, contro di cui possediamo un metodo sicuro più che in ogni altra. Negli altri casi dovremo contentarci di un sistema di cura generale, e segnatamente dell'uso degli astringenti, fra i quali l'allume, e le sostanze contenenti il concino, che agisce forse condensando il principio gelatinoso delle ossa, onde ritenga più facilmente il fosfato calcareo.

## CAPO XXII.

### DELLE MALATTIE DELLE ARTICOLAZIONI.

Come al trattato delle fratture siegue quello delle lussazioni, così alle malattie della sostanza delle ossa naturalmente debbono venire in seguito le malattie delle articolazioni. Le articolazioni sono soggette a molti mali, che rendono difficili, o ancora impossibili i movimenti delle medesime. Noi abbiamo già di sopra parlato di alcune malattie, che sogliono sopraggiungere nelle articolazioni, nè ci resta ora, che a dire qualche cosa sull'*Anchilosi*, *Idrope delle articolazioni*, facendo menzione in questa dei



corpi estranei, che si formano in esse, e sulla *Distorzione*.

L'anchilosi è una malattia, che consiste nell'impedito moto di un' articolazione. Deve per altro riflettersi, che non ogni impedimento del moto articolare costituisce l' anchilosi propriamente detta; ma soltanto quello, che forma esso stesso la malattia principale, giacchè improprio sarebbe il dare il nome di anchilosi a quei casi, in cui l' articolazione non può muoversi a motivo di un' altra malattia, che affetti l' articolazione stessa, o le parti contigue.

Sogliono i Scrittori di Chirurgia riconoscere diverse specie di anchilosi, e distinguere la medesima in completa ed in incompleta. *Completa* dicesi l' anchilosi quando il moto dell' articolazione si rende affatto impossibile, *incompleta* poi quando essa è soltanto difficile. Oltre questa distinzione per altro esposta da tutti gli Autori si debbono secondo noi considerare molte altre varietà nelle diverse specie di anchilosi, giacchè oltre le varie cause, che l' hanno prodotta, e che per conseguenza richieggono un diverso metodo di cura, devesi considerare ancora la cagione immediata, o prossima della malattia, che merita un riguardo particolare per la direzione della cura.

L' anchilosi vera, o sia l' anchilosi propriamente detta consiste nell' unione, o saldamento delle estremità articolari di due, o più ossa, che nasce segnatamente dall' ossificazione delle cartilagini interarticolari. Questa specie di anchilosi oltre l' essere incurabile non può chiamarsi vera malattia, giacchè essa succedendo per l' ossificazione delle cartilagini, come si è detto, ha luogo per l' accrescimento del processo della stessa ossificazione, e nasce nell' età avanzata, che seco porta l' aumento di questo processo per la maggior quantità del fosfa-



to calcareo, che si separa nel sistema osseo in maggior copia quanto l'età è più avanzata, onde questo sistema, che tutto è cartilaginoso nel principio della vita, diviene interamente osseo nella decrepitezza.

L'anchilosi incompleta poi, che sebene riguardo agli effetti sia analoga a quella, che ora abbiamo esposto, pure differisce da essa in quanto, che non esiste l'aderenza delle superficie articolari delle ossa, è quella, che dipende dalla mancanza di flessibilità dei tendini, e ligamenti, che circondano l'articolazione, onde mancando queste parti della necessaria cedevolezza, il moto dell'articolazione si rende impossibile. Quest'anchilosi dipende ordinariamente dalla mancanza di esercizio delle parti accennate, che ha luogo quando un'articolazione deve restare per molto tempo immobile, come ne' casi di fratture, o lussazioni, che richieggono un lungo tempo per la guarigione, come abbiamo di sopra accennato trattando di queste malattie. Può però questa specie d'anchilosi dipendere eziandio da una malattia propria dell'articolazione stessa, come tumori bianchi, linfatici etc. li quali alterando la sostanza de' tendini, e ligamenti tolgono ad essi quella flessibilità, che si richiede, onde possano far eseguir all'articolazione i moti necessarij.

Riguardo ai sintomi di questa malattia il principale si è quello di non poter muovere l'articolazione, e questo è realmente l'unico, il quale accompagna la medesima, anzi ne costituisce l'essenza. Gli altri, che possono esserci uniti, come p. e. dolore, gonfiore etc. dipendono dalle malattie, che accompagnano l'anchilosi, o che ne sono state la causa. Noi abbiamo già di sopra esposto quali siano le principali cagioni dell'anchilosi, molte delle quali possono esser locali, e possono esistere nell'ar-

articolazione stessa , come p. e. l' impedita separazione della sinovia , che facilita la mobilità delle cartilagini interarticolari , o l' infiammazione delle parti , che compongono l' articolazioni , e che producono l' aderenza delle medesime , che dovrebbero esser mobili , e cedevoli . Oltre di queste cagioni esistenti nell' articolazione stessa l' immobilità dell' articolo cagionata da fratture , o altre malattie di parti contigue possono produrre lo stesso effetto . Può nascere eziandio l' anchilosi da vizio generale della macchina , che si determini particolarmente nelle articolazioni , o finalmente come si è detto di sopra da un accresciuto processo di ossificazione , che ha luogo segnatamente nell' età avanzata .

Dalla descrizione delle varie specie di anchilosi , e dall' esposizione delle sue diverse cause si vede , che questa malattia sarà alcune volte curabile , ed altre volte incurabile . L' anchilosi vera è sempre incurabile , anzi spesso il Cerusico non solo non può prevenirla , ma si trova obbligato a favorirla , onde evitare altra malattia più pericolosa . Riguardo poi all' anchilosi falsa si potrà essa curare quando la malattia non sia molta avanzata , e che credasi il Cerusico in istato di vincere le cause , siano desse generali , oppure locali , che l' hanno prodotta .

Nell' anchilosi vera , essendo essa come si è detta incurabile , deve il Professore quando si avvede che essa è inevitabile procurare , che l' articolo prenda qualche posizione , onde anchilosato che sia rechi al paziente il minore incomodo possibile . Il voler tentare de' rimedj locali produrrebbe forse l' infiammazione delle parti , non si verrebbe ad impedire con questo l' anchilosi , e ne potrebbe venire anche la carie dell' osso .

L' anchilosi poi falsa , o incompleta si può spes-



Felicamente, sebene riesca molte volte dif-  
 farla intieramente. Il principale oggetto  
 della causa di questa malattia si è di pre-  
 sua totale formazione, venendo sempre  
 uenza di fratture, tumori, o altre malat-  
 in vicinanza delle articolazioni, le qua-  
 no queste parti a restare per lungo tem-  
 bili, onde ne siegue ordinariamente la ri-  
 ei ligamenti, capsule articolari, e tendini,  
 odano l'articolazione, il primo oggetto per-  
 v'essere quello di far eseguire alla mede-  
 continui movimenti, onde questi parti con-  
 la loro flessibilità, per quanto per altro lo  
 lo stato della malattia principale. Se però  
 te cautele non si sia potuto impedire l'an-  
 obrassi procurare di restituire all'articola-  
 non in tutto almeno in parte la sua mo-  
 mezzo degli adattati rimedj. Questi con-  
 principalmente nell'uso degli emollienti se-  
 te sul principio della malattia, come p. e.  
 iepidi, le fomenta emollienti, e le unzioni  
 natura. Quando poi la malattia sia alquanto  
 si dovrà procurare di dare all'articola-  
 to l'esercizio possibile, senza per altro  
 pratica consigliata da alcuni di prendere  
 ani le due ossa componenti l'articolazio-  
 che potrebbe produrre delle funeste con-  
 . Fra i rimedj, che convengono in questo  
 igliori sono l'unzioni attonanti, come li-  
 volatile, canfora, spirito di sapone etc. li-  
 cque minerali, le docce, li vapori etc., con  
 medj si arriva a superare, o almeno a dimi-  
 sta ostinata malattia.

articolazioni sono oltre l'anchilosi sogget-  
 all'idrope. Noi abbiamo già parlato dei  
 sfatici, che hanno luogo nella medesima;



ma l'idrope dell' articolazioni differisce quanto che questa consiste principalmente separazione abbondante di linfa nella cavità delle articolazioni prodotta dalla troppa ne delle parti destinate a tal uso. Questa è puramente locale, e quasi mai dipende dal generale come accade nell'idrope delle parti del corpo. Non è poi facile il riconoscere questa specie d' Idrope, giacchè il radunamento nell' interno dell' articolazione è accettato ordinariamente da ingorgamento delle parti, che la circondano, e quindi con qualche tempo si arriva a sentire l'esistenza del fluido per la mancanza di dolore, il gonfiore delle parti laterali dell' articolazione, la fluttuazione, che non è profonda, ed equivoca si sente da una parte scuotendo l' opposta, lo stato naturale delle parti non lasciano dubbio sulla natura della malattia ha luogo quasi esclusivamente nell' articolazione del ginocchio, come quella, che presentando una superficie è soggetta a risentire maggiormente l' effetto delle cause irritanti, che agiscono sulle parti.

Tali cagioni sono come si è detto principalmente tutto quello, che può produrre una infiammazione nell' articolazioni, e segnatamente l' infezione, i corpi estranei, che si formano nelle parti, come anche qualche volta i vizj generali reumatico, erpetico, artitrico ed eziandio venereo etc. possono ancora dipendere da un esercizio troppo violento dell' articolazione, in somma da tuttociò che può produrre una secrezione troppo abbondante di fluido, che ivi è destinato a separarsi.

L'idrope degli articoli, o *idartro* è una malattia di cura non molto facile sì perchè non si può che la risoluzione, come ancora perchè

presenta molta difficoltà per le conseguenze, che possono sopraggiungere.

La cura della malattia consiste principalmente ne' rimedj locali, avendo noi già di sopra espresso, che questa malattia è per lo più locale. I topici risolvendi, ed eccitanti saranno quindi quelli, che avranno il primo luogo nella cura dell' idartro, e fra questi hanno luogo la scilla, il mercurio, il sapone etc. applicati secondo i metodi più adattati allo stato della malattia, ed alle forze del malato. La canfora, l'ammoniaca, e le cantarelle sono state eziandio raccomandate nella cura di questa malattia, ma l'opio sciolto nello spirito di vino rettificato si è trovato di sommo vantaggio. Ogni medicamento poi, che agisce su tutto il sistema riuscirebbe inutile eccetto ne' casi, in cui la malattia dipendesse da un vizio generale artritico, reumatico etc., ne' quali casi una cura generale potrebbe molto ajutare l'effetto di una cura locale.

Se poi questi rimedj non riescano di giovamento sarà necessario ricorrere alla punzione, la quale si potrà fare con un troicart non molto grosso, con un stretto bistouri, procurando per quanto è possibile d'impedire l'ingresso dell'aria nell'articolazione. A tal oggetto il metodo da preferirsi in questa circostanza è quello, che siegue. Fatto un lio de' tegumenti nella parte laterale dell'articolazione, ove rendesi più elevata, ed anche sentesi sensibile la fluttuazione, si tirano da un lato i tendini, per fare l'apertura col bistouri, o col art nella capsula ligamentosa, da cui sortito il sangue si lasciano sopra loro stessi i tegumenti, i quali ricuoprono la ferita del ligamento capsulare, e si impediscesi l'accesso dell'aria nell'articolazione. Riunita la ferita esterna è necessario porre

la parte, e mantenerla in perfetto riposo, prendola di pezze bagnate in qualche risolvente.

Nelle articolazioni si generano sovente corpi estranei di natura cartilaginosa, che alle volte si trovano ancora nelle borse mucose, e si sentono facilmente col tatto, qualora non siano situate sulle superficie articolari dell'ossa stesse. Essi sono di varia grandezza, e figura, e si trovano in tutte le articolazioni, ma segnatamente in quelle del ginocchio. Questi corpi estranei producono dolori fortissimi, se ritrovansi fra le due superficie dell'osso, che si articolano insieme per la compressione che producono nel moto delle medesime; ma se si ritrovano fuori delle superficie stesse, o sia avanti o dietro l'articolazione non cagionano, che un gonfiamento locale, e da cui nasce una maggior secrezione di fluido, e quindi può venirne l'idropo di sopra esposto. Noi non sappiamo affatto la causa che possa produrre questi corpi estranei, i quali al più si possono attribuire ad una secrezione anormale della borsa delle parti destinate a separare la sinovia. L'analisi chimica de' medesimi sembra, che dimostri consistere la loro base principalmente nel fosfato di calce, lo che manifesta, che un'abbondanza di questo sale nello stato della secrezione della sostanza dell'osso è la causa principale della formazione de' medesimi corpi.

Per quello poi riguarda la cura, che conviene in questa malattia essendo detti corpi duri, e quasi sempre inorganici, è facile il comprendere, che non vi è da sperare dai topici, i quali non possono affatto procurarne la risoluzione, e che l'unico metodo di cura consiste nell'estrarli. Questa operazione non è molto difficile, nè pericolosa, ed il metodo di praticarla si è il seguente. Si fa porre il malato in modo onde le parti interessate giacciono in quiete, e segnatamente i muscoli, e tendini, che circondano



olazione restino nel massimo rilassamento , si fa da un' assistente tirare la pelle da un' che sia possibile . Il Professore fisserà il estraneo con la sua mano sinistra , e con la taglia con un bistouri li tegumenti , ed il li- o , che ricuoprano il medesimo . Ciò fatto zo della pressione delle dita il corpo estra- e ad escir fuori facilmente da se stesso , lo che accade per essere desso ritenuto da una spe- gamento , o briglie così dette , che unisco- po estraneo alle parti vicine non sarà difficile rnelo recidendo questi ligamenti , o ade- n le forbici , o col bistouri stesso . Ciò ese- rà lasciare dall' assistente la cute , e sicco- ta per la sua elasticità , cessando la stiratura , ritorna alla sua situazione naturale , ne e l'apertura della medesima non corrispon- quella del ligamento , e quindi si viene ire con questo mezzo ogni accesso dell' aria olazione , che potrebbe produrre una irri- nelle superficie articolari , e che seco por- nelle cattive conseguenze . Alcuni autori so- inione , che questa precauzione sia inutile , i ovviare tale inconveniente con l' esatte re della ferita , ciò non ostante i migliori , enti Pratici sono dell' opinione da noi espo- nita poi l' estrazione del corpo estraneo si la riunione della ferita , e si appliche- nedesima qualche topico risolvente .


terminare il trattato delle principali ma- articolazioni rimane ora a dir qualche cosa orsioni , La *Distorsione* , o *distrasione* con- stiramento , o anche lacerazione delle par- che circondano un articolazione . Questa viene spesso in seguito alla lussazione , ma ancora si rincontra senza di questa quan-



, e di sovente si deve perfino ricorrere  
zione della parte, onde rimediare all'ab-  
suppurazione, ed alla carie dell' ossa, che  
ro sopraggiungono.

tra delle distrazioni consiste primieramen-  
oso assoluto dell' articolo, onde preveni-  
que causa stimolante, che possa accre-  
itazione delle parti distratte, o lacerate.  
pio della malattia saranno assai utili i co-  
refrigeranti, segnatamente l' acqua fred-  
si dovrà tenere immersa per molto tem-  
olazione affetta trattone il caso, che il  
ia una donna mestruta. Con questo sem-  
odo si riesce di guarire una distorsione,  
mi non ne siano assai gravi; ma se esi-  
zione, contusione, ecchimosi etc. sarà ne-  
ricorrere all' uso dei calmanti, come fo-  
taplasmi, ed anche ai salassi, secondo lo  
infiammazione, onde dissiparla, e preve-  
nseguenze della medesima. Risoluta que-  
opo restituire il tono necessario alle par-  
e, e lacerate, e ciò per mezzo dei corro-  
ome i saturnini, i balsamici, ed altri si-  
dj non omessi gli antiscrofolosi, se il vi-  
oloso abbia, come sovente accade, avuto  
influenza sulla gravezza della malattia. La  
ione del perfetto riposo della parte sarà  
ente necesssario. Se questi medicamenti non  
quatamente apprestati, o se il malato non  
assoluta quiete ne possono facilmente ve-  
nseguenza de' tumori bianchi, ovvero degli  
enti pericolosi, e perfino delle carie dell' os-  
ompongono l' articolazioni, delle quali ma-  
abbiamo parlato a suo luogo.





*Ferite dell' utero , e pancreas . . . pag. 158*

*Commozione de' visceri del petto , e del  
basso ventre . . . . . 159*

**PO XVII.** *Ferite d' Armi da Fuoco . . . . . 161*

**II.** *Contusioni . . . . . 168*

**IX.** *Fratture . . . . . 173*

— *del Cranio . . . . . 181*

— *dell' ossa nasali . . . . . 184*

— *dell' Arco Zigomatico . . . . . 185*

— *della Mascella Superiore . . . . . 186*

— — *Inferiore . . . . . 187*

— *della Spina . . . . . 189*

— *dell' osso sacro , e coccige . . . . . 191*

— *dell' altre ossa del bacino . . . . . ivi*

— *delle Coste . . . . . ivi*

— *dello Sterno . . . . . 194*

— *della Clavicola . . . . . 196*

— *della Scapola . . . . . 203*

— *dell' Acromion . . . . . 205*

— *del Braccio . . . . . 206*

— *dell' Antibraccio . . . . . 211*

— *del Raggio . . . . . 214*

— *dell' Ulna . . . . . 216*

— *dell' Olecrano . . . . . ivi*

— *dell' ossa del Carpo , e Metacarpo . . . . . 218*

— *della dita . . . . . 219*

— *del Femore . . . . . 220*

— *del Collo del Femore . . . . . 223*

— *della Rotula . . . . . 227*

— *della Gamba . . . . . 231*

— *della Tibia . . . . . 233*

— *della Fibula . . . . . ivi*

— *dell' ossa del piede . . . . . 234*

**X.** *Lussazioni . . . . . 236*

— *della mascella inferiore . . . . . 243*

— *della Testa . . . . . 246*

Lussazione della prima vertebra cervicale . . . . . pag.

— del Coccige . . . . .

— delle Sinfisi sacro-iliache . . . . .

— della Clavicola . . . . .

— dell'Omero . . . . .

— dell'Antibraccio . . . . .

— dell'estremità superiore del raggio sull'ulna . . . . .

— dell'estremità inferiore dell'ulna . . . . .

— della Mano . . . . .

— delle dita . . . . .

— del Capo del femore . . . . .

— Spontanee del medesimo . . . . .

— della Rotula . . . . .

— della Tibia . . . . .

— della Fibula sulla Tibia . . . . .

— del Piede . . . . .

— dell'Astragalo , e Calcagno , con il Cuboide , e Scafoide . . . . .

— del dito grosso . . . . .

CAPO XXI. Malattie delle Ossa . . . . .

Della Necrosi . . . . .

Della Carie . . . . .

— dell'ossa del capo . . . . .

— delle vertebre . . . . .

— dello sterno . . . . .

Del Pedartrocace . . . . .

Dell'Esostosi . . . . .

Della Rachitide . . . . .

Dell'Osteosarcosi , e Osteomalacia . . . . .

XXII. Malattie delle Articolazioni . . . . .

Anchilosi . . . . .

Idrope dell'articolazioni . . . . .

Corpi estranei , che si formano nell'articolazioni . . . . .

Distorsione . . . . .







**ELEMENTI  
DI CHIRURGIA  
DI FILIPPO LEONARDI**

**CHIRURGO PRIMARIO, E LETTORE DI ANATOMIA  
E CHIRURGIA NELL' ARCHIOSPEDALE DEL SS.**

**SALVATORE AD SANCTA SANCTORUM.**

**TOMO SECONDO  
CHIRURGIA MEDICA**

**SEZIONE SECONDA  
MALATTIE PARTICOLARI.**

**IN ROMA MDCCCXV.**

**Presso Crispino Puccinelli Stampatore in Via  
della Valle num. 53.**

---

*Col permesso de' Superiori.*



*[The page contains faint, mirrored bleed-through text from the reverse side, which appears as "THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION".]*

## INTRODUZIONE.

**L**e malattie , che offender possono indistintamente tutte le parti del corpo umano , sono state il soggetto della prima sezione di queste Chirurgiche Istituzioni . Convieni ora trattare in questo secondo Volume di quelle infermità soltanto , che invadono alcune parti determinate , le quali , sebbene sieno state da noi in generale esposte , meritano ciò non pertanto di essere in particolare , con distinzione trattate .

Il metodo , che seguiremo sarà quello delle parti , che ne sono affette : quindi è che daremo principio alle malattie della testa , e delle diverse regioni della medesima , passando poscia a quelle del collo , del petto , dell' addome , e delle parti genitali sì virili , che muliebri .

Denotando questi generi dei mali , quelli saranno più presi di mira , che interessano il Cerurco , tralasciando di far menzione dei meno ragguardevoli per non estendere troppo a lungo questi elementi di Chirurgia ; ed omettendo ancora la descrizione del *manuale* delle grandi operazioni , si porranno per conseguenza quelle soltanto , che non meritano essere incluse fra le medesime , poichè per esse è destinato particolarmente il terzo volume .

## I M P R I M A T U R .

Si videbitur Reverendissimo Patri Sacri Palatii Apostolici  
Magister .

*Candidus Maria Frattini Archiep. Philipp. Vicesg.*

## A P P R O V A Z I O N I .

**P**er ordine del Reverendissimo Padre Maestro del Sacro Palazzo Apostolico ho attentamente letto il secondo volume dell' opera intitolata *Elementi di Chirurgia* , composta dall' illustre Sig. Filippo Leonardi Chirurgo Primario , e Lettore nel Venerabile Archiospedale del Santissimo Salvatore in S. Giovanni in Laterano , nel qual volume ( come nel primo ) l' Autore ha riunito le antiche cognizioni , con le più recenti scoperte chirurgiche ; per cui credo utile alla facoltà , ed in particolare per li giovani studenti , che si consacrano a questo ramo dell' arte salutare la pubblicazione con la stampa del medesimo ; molto più che in esso volume non trovasi nulla che sia contro la Santa Religione cattolica , alli buoni costumi , né alla maestà de' Principi . In fede &c.

Roma li 21. Giugno 1815.

*Giovanni della Rocca Chirurgo Primario ,  
Lettore nell' Apostolico Archiospedale di  
S. Spirito in Sassia .*

**P**er obbedire agli ordini del Reverendissimo P. Maestro del Sacro Palazzo Apostolico avendo diligentemente percorso il Tomo secondo dell' opera *Medico-Chirurgica* del chiarissimo Sig. Leonardi nulla vi ritrovo , che si opponga alla santa fede , e buoni costumi ; e giudicando per le ragioni accennate nell' approvazione del primo Tomo utile la stampa del medesimo , credo potrà permetterglisi a vantaggio de' Studenti di Chirurgia .

Roma 16. Giugno 1815.

*Raffaele Canonico Bonomi Censore emerito  
dell' Accademia Teologica di Sapienza ,  
e Lettore nell' Università di Roma .*

## I M P R I M A T U R .

Fr. Philippus Anfossi Ord. Præd. Sacri Palatii Apost.  
Magister .



**P A R T E P R I M A**  
**C H I R U R G I A M E D I C A**

**S E Z I O N E I I.**

**M A L A T T I E P A R T I G O L A R I.**

**C A P O I.**

**D E I M A L I D E L L A T E S T A.**

**A R T I C O L O I.**

*Delle malattie, che attaccano le parti interne,  
ed esterne del Cranio.*

**E**gli è vero, che non solo la scatola ossea contenente il cervello detta comunemente Cranio, ma anzi il viscere contenuto può riguardarsi, come sede di altre malattie oltre quelle, di cui abbiamo parlato nel primo volume. Queste si riducono generalmente alla commozione del Cervello, e alla produzione principale, all'ernia del medesimo, all'idrope, che in questo nasce, ed all'Idrocefalo esterno, ed interno, al quale possiamo riunire la Pina bifida.

Trattando delle ferite nella prima Sezione, si è parlato della commozione de' visceri del Petto, e del basso ventre, e di quella del Cervello si è accennato semplicemente come sintoma delle ferite della testa, onde fa di mestieri vederla al presente nel suo vero aspetto per conoscere il grado, e determinare il metodo conveniente di cura.

La delicata sostanza di cui è formata la midolla spinale, rende ragguardevole, che offre uno scuotimento nato in tutti, sia per un colpo immediato, o per una commozione trasmessa da una parte anche lontana come una caduta sulle ginocchia, o sulla pianta del piede. La diversa violenza delle cagioni, e il punto da cui si trasportano al cervello, e nella midolla, sono quei che spiegano il diverso grado della commozione di questa. Dessa pertanto può limitarsi ad un semplice svenimento, e confusione d'idee, e presentarsi luminosa nell'atto della percossa del cervello, o ad un senso di peso, o di dolore se dicasi della midolla spinale. In questo caso può cagionare la perdita istantanea di sentimento, o produrre la paralisi di quelle parti le quali ricevono i nervi dal punto per il quale si unisce alla midolla spinale. Può finalmente esser tale da produrre un certo prodotto nella sostanza del Cervello, e della midolla spinale, il quale non ne permette la guarigione, e lo rende sotto il suo dominio, e morte si associa quasi contemporaneamente sgrazia.

Ad onta peraltro di questi segni da non confondersi che accompagnano i diversi gradi di commozione del cervello resta qualche volta difficile riconoscere esattamente quella specie di questa malattia. Nel secondo grado, potendosi desso confondere con lo stravasamento di sangue nella cavità del cranio, i recenti Scrittori di Chirurgia sostengono che non si può distinguere questo dalla commozione del cervello, e che sufficiente l'osservare il tempo, in cui è prodotto il sintoma più interessante che accompagna queste malattie, vale a dire la perdita di sentimento, poichè nella commozione questo sintoma

primitivo sopraggiungendo nel momento stesso della caduta, o percossa sul capo, mentre in caso di extravaso ciò non ha luogo, che dopo qualche tempo, manifestandosi cioè la sudetta perdita quasi a gradi a gradi. Noi abbiamo già veduto nel primo volume parlando della ferite della testa, che oltre l'accurati sintomi, la qualità del polso, e della respirazione può dar molto lume sull'esistenza della commozione del Cervello.

Un sintoma, che suole accompagnare le commozioni del Cervello segnatamente se queste dipendono da una caduta fatta da qualche altezza si è l'affezione del sistema epatico. In questi casi vi si uniscono tutti gl'indizj di malattia del fegato; i rimedj in ciò indicati sono necessarij, e riescono di molto vantaggio. Tutti gli Scrittori di Chirurgia si sono impiegati a spiegare questo fenomeno, e ne hanno addotte molte, e varie cagioni del medesimo; ma la maggior parte di essi sembra, che ammetta una connessione immediata fra il cervello, ed il fegato, ovvero che ripetano questa coerenza di sintomi dal disordine che nasce in cotesti casi nella circolazione, funzione, in cui il fegato ha molta parte. I più recenti per altro poco persuasi da questi ragionamenti hanno creduto, che l'affezione del fegato in seguito delle percosse del capo dipendesse piuttosto dalla scossa, che riceve tutta la macchina in simili occasioni, e che viene risentita per conseguenza dal fegato, come il viscere più malleabile, e a proporzione meno fisso, e meno difeso dalle scosse violenti. Che ciò sia vero si deduce non solo dalla situazione, e dai legamenti, che gode codesto viscere, ma ancora dall'esperienza ripetute su i cadaveri fatti cadere da varie altezze. Oltre di che si è osservato, che in queste circostanze, in cui la commozione del cervello ha



luogo senza che la macchina venga a soffrire una scossa, o commozione generale, come accade per esempio ne casi di percossa sul capo con bastoni, non si affacciano, o non si conservano i sintomi d'affezione al fegato, nè nascono ascessi nella di lui sostanza, cosa che può accadere se la detta commozione sia prodotta da altra cagione, nè si trova alcuna traccia di offesa in detto viscere, se termina la malattia colla morte.

Le commozioni del cervello, e della spinal midolla riconoscono la loro origine, come si è detto da una scossa violenta, che agisca immediatamente o da lungi su queste parti, e secondo la violenza della causa, che ha agito, e secondo la gravità dei sintomi si deve giudicare del pericolo della malattia. E' d'avvertirsi per altro, che sebbene il grado della commozione del cervello, che presenta i più semplici sintomi di sopra accennati, sembri promettere un felice successo, pure vi sono molti esempi, che dessa è terminata dopo non molto tempo colla morte del malato. Quindi è chiaro, che in genere questa malattia è per se stessa pericolosa, anche potendo produrre infiammazione, ed ascesso nella sostanza del cervello, e suoi involucri.

Per quello che si appartiene alla cura della sopra detta commozione del Cervello, e della midolla spinale, passando sotto silenzio le complicazioni di febbre, fratture &c. di cui ne abbiamo parlato a suo luogo, devesi primieramente aver riguardo al grado di essa, e secondo questo, e giusta l'età, il temperamento del malato rendere più o meno attiva la cura. L'emissioni di sangue, i minorativi, i vescicanti sono i mezzi, coi quali potrassi curare la commozione del cervello. Bisogna riflettere, che l'uso del salasso affinchè non divenga pernicioso nel ripeterlo deve essere praticato nelle prime 24 ore,

secondo che l'esigga l'età, ed il temperamento  
storico del malato, il rossore del volto &c. Que-  
potrà farsi, e ripetersi con maggior vantaggio  
piede.

Saranno eziandio in questa malattia assai utili  
 inorativi, ma quello che ha riscosso la più gran  
 approvazione da tutti i pratici si è il tartaro  
 tico. Questo rimedio dato a picciole dosi, e  
 frequentemente ripetute ha prodotto i migliori ef-  
 fetti nella commozione del cervello, e quindi è  
 di quelli, su di cui usato colle necessarie cau-  
 te può il Professore contare moltissimo in cotesta  
 azione. Vi sono alcuni pratici, che uniscono all'  
 detto rimedio l'uso continuato de' clisteri fino  
 a guarigione.

Possono anche essere di molto vantaggio i veleni, sian d'essi applicati lontano dalla parte offesa, come derivativi, sian posti sulla parte stessa tutta la sua estensione, per mantenere una continua esterna irritazione, ed aumentare l'attività della medesima, allorchè lo stato del male richiegga. Generalmente poi converranno dominare l'afflusso alla parte le frizioni spiritali, l'uso topico della neve, i bagni attonanti &c. e per la parola tutto ciò, che può rianimare l'azione depressa, e dissipare così gli effetti della azione.

ernia del Cervello detta altrimenti *Encefalo-*  
una malattia, che consiste nell' esito d' una  
ne del Cervello a traverso di un forame o na-  
come nella troppa tarda ossificazione delle  
elle, o preternaturale del Cranio, in conse-  
za di fratture, carie, ed applicazione del tra-  
&c., e che viene ricoperta nel primo caso dal-  
ingi, e dai comuni tegumenti, e nel secon-  
per lo più dalle sole membrane destinate ad

involgere il delicato viscere. Questa specie di cefalocoele dicesi accidentale.

Oltre la divisione fatta dell' Encefalocoele tiva alle cagioni, che l'han prodotta ve ne un' riguardante il tempo, in cui esso nasce. Si ernia del Cervello congenita se un bambino seco dall' utero materno cotesta malattia, ov' essendo il di lui cranio non intieramente ossifi e lasciando per conseguenza degli spazj vuognatamente nelle così dette fontanelle si viene a fare poco dopo la nascita per le gridi, e piamedesimo.

Facilmente si conoscerà l'ernia del Cervello lorchè sia accidentale, e prodotta da cagioni ne, riflettendo alle pregresse cause, da cui ha origine, che se poi è congenita, o cagionata non sollecita ossificazione delle fontanelle, i principali di essa sono in primo luogo il tumore molle, privo di fluttuazione, e che ordinariamente ha una pulsazione, la quale corrisponde presso a quella delle arterie, ma che oltre di questo ha ancora una elevazione, e depressione corrispondente al moto del polmone. Se il tumore è piccolo si trova facilmente, e si osserva alla sua base l'apertura morbosa, o naturale del Cranio. Dai detti segni si può distinguere l'ernia del Cervello da altre malattie con le quali può avere in apparenza una qualche analogia, per esempio dai tumori acquosi, che escono dalle suture, o fontanelle in caso di ernia cefalo interno, giacchè questi sebbene abbiano parentemente molta simiglianza coll' encefalocoele si distinguono pure facilmente dal medesimo perchè non hanno una specie di fluttuazione, e sono accompagnati dagli altri sintomi di extravaso sotto del Cranio. I tumori fungosi della dura madre si vengono facilmente a distinguere pel modo, con cui si for-



per i segni loro propri, de' quali noi già abbiamo a suo luogo parlato. Lo stesso ancora può dirsi dei tumori acquosi, o sanguigni, che si trovano nei bambini appena nati, i quali non sono compressibili, nè alla loro base si sente il forame nel Cranio, come nell' Encefalocele. La diagnosi è assai più difficile qualora l'ernia sia accompagnata dall'acqua, che è quanto dire la malattia essere un *Idro-encefalocele*, nel qual caso converrà far uso di tutta l'attenzione possibile per rintracciare la vera indole della medesima.

Le cagioni di questa malattia possono facilmente intendersi da quello abbiamo già di sopra esposto, parlando della sua diagnosi.

L'Encefalocele è pericoloso, ed altresì è per ordinario incurabile. Se desso è congenito, produce spesso la morte del bambino nel momento stesso della sua nascita, poichè la compressione, che soffre il tumore nel passare pel bacino, e la lacerazione, che può anche venire prodotta sono mortali, o sul momento, o poco dopo. Se però questa compressione, o lacerazione non abbia luogo può benissimo la sola impressione dell'aria, o del freddo essere causa di convulsioni mortali. Se il tumore sia piccolo non nè sarà affatto impossibile la guarigione, se si pratici una graduata, e proporzionata compressione. Nei casi di Encefalocele prodotta da un'apertura preternaturale del Cranio, come ferita, frattura &c. la prognosi dipende molto dalla lesione delle parti, e dalla commozione, che ordinariamente soffre il Cervello in questi casi.

Per la cura dell'Encefalocele, se desso sia allo scoperto, e che dipenda da un prolungamento della sostanza del viscere, si riportiamo a quanto abbiamo detto parlando de' tumori fungosi; se poi la malattia è dell'altra specie la cura consiste principalmen-

te nel ridurre il tumore, e nel mantenerlo ridotto per mezzo di una adattata compressione. Se riesca di ottenere questi due oggetti accade spesso che il forame dell'osso, che ha formato l'ernia, oppur da questa mantenuto si viene da se medesimo a chiudere, ed abbiamo degli esempi di casi di questa natura felicemente guariti. Convieni però avvertire, che la riduzione del tumore deve farsi gradatamente, molto più se esso sia di un volume considerabile, maggiore per esempio di quello di un uovo di gallina, giacchè se la compressione sia troppo forte oltre le convulsioni, ed altri sintomi pericolosi, che ne possono nascere si possono eziandio lacerare i tegumenti, che ricuoprono il tumore, i quali sono ordinariamente assai sottili. A questo oggetto sarà bene secondo il consiglio dei migliori pratici di adoperare per la compressione delle pezze di lino bagnate di un qualche liquore attonante, come per esempio vino, o spirito di vino allungato, decozione di China, o Vailonea &c. le quali si terranno ferme col mezzo di una adattata fasciatura. Qualche pratico di Chirurgia è di opinione che questa malattia ne' bambini possa procedere da una cagione venerea, e quindi ha creduto, che l'uso del mercurio potesse esser di molto vantaggio per la cura di essa.

E' poi molto dannosa l'apertura del tumore, e ne sieguono delle funeste conseguenze, quindi il Cerusico dovrà essere molto circospetto, affinchè non lo apra prendendolo per tumore di altra natura, che anzi dovrà porre in opra ogni attenzione, acciò il medesimo non si apra per la troppa forte compressione, che spesso produce un esulcerazione. I rimedj saturnini localmente applicati possono essere di molto vantaggio per impedirne l'apertura. Noi abbiamo detto doversi evitare la medesima



co del ferro , o di altri mezzi riuscendo  
te pericolosa , conviene peraltro riferire ,  
caso di *idroencefalocèle* , o sia quando l'ac-  
cità all' ernia del cervello nel tumore stesso  
Professore consiglia aprirlo per dar esito  
esima , se sia in gran quantità , purchè si  
vertenza d'impedire l'accesso dell' aria , e  
e non ne siegue alcuna cattiva consequen-  
ottiene più facilmente la riduzione dell'  
abbiamo però anche degli esempi degli ef-  
esti di tali aperture , e d'altronde sappia-  
e molte volte quest'ernie complicate sono  
con la sola compressione .

*Idrocefalo* è una malattia , che consiste , co-  
ta il suo stesso nome in una raccolta abbon-  
sierosità fuori , o dentro del Cranio , che  
una gonfiezza mostruosa del Capo . Da que-  
zioni chiaramente si vede , che due pos-  
ere le specie dell' *idrocefalo* , cioè che des-  
tingue dal luogo , che occupano le acque .  
*Idrocefalo esterno* dicesi quello , in cui queste esistono  
esterni integumenti della testa ; *idrocefalo in-*  
si chiama quello , nel quale le acque sono  
dentro la cavità del Cranio . Molti Pro-  
Chirurgia hanno usato il nome d' *idroce-*  
*no* soltanto in quei casi , ne quali il fluido  
nella cavità del Cranio ha disteso la pa-  
del medesimo , ed aumentata la circon-  
ella testa , mentre hanno chiamata *idrope*  
*ello* quella malattia , nella quale le acque  
contenute nella cavità del medesimo , nul-  
non lo hanno disteso più dell' ordinario ,  
do la sua stessa figura , e grossezza .  
*Idrocefalo esterno* è una malattia poco frequen-  
tivo della resistenza che offre , e dell' inti-  
nza , che gode la cute capillata con le parti



parti sottoposte , sulle quali è fortemente ferma da mille piccole briglie aponcurótiche , e che perciò rende difficile il raduno delle acque sotto la medesima , ondè alcuni recenti Scrittori negano per non la possibilità di tal dilatazione , e per conseguenza la formazione di questa specie di Idrocefalo . In ogni modo per altro conviene distinguere il luogo che possono occupare le acque . Se desse hanno loro sede nella cellulare subcutanea allora si osserva , che ha tutti i caratteri dell' edema , e si diffonde per necessità in tutti i luoghi , che comunicano insieme per mezzo del tessuto cellulare , come il collo , la fronte , le palpebre ec. se il fluido poi sia raccolto fra l'espansione aponeurotica , ed il pericranio , ovvero fra questo ed il cranio il tumore sarà più limitato , e non si estende , che nella periferia del medesimo . Si potranno distinguere questi due casi se si rifletta , che quando le acque sono situate fra l'espansione aponeurotica , ed il pericranio il tumore è più esteso , e più molle , ed al contrario accade quando esse esistono fra il pericranio , e l'osso . Molte volte l'idrocefalo esterno è così ristretto , e limitato ad una sola porzione del cranio , che da molti gli è stato dato il nome d'*Idrocefalo cistico* .

L'Idrocefalo esterno è di raro pericoloso , e la gravezza della malattia dipende piùchè altro dalle cagioni , che l'hanno prodotta . Queste possono dividersi in esterne ed interne . Fra le prime si annoverano le ferite , contusioni , percosse del capo ec. L'interne poi sono o un vizio ereditario , e segnatamente venerco , ovvero una retrocessione di una malattia , e particolarmente esantematica . Nel caso pertanto che la malattia sia prodotta da cagioni esterne converrà giudicare della gravezza di essa secondo la natura dell'offesa esterna , ed ogni volta po

che la causa sia interna ne sarà di molto difficile cura la malattia se dipenda da un vizio ereditario, come all'opposto sarà meno pericolosa se le dette cagioni siano tali da potersi togliere facilmente. Un'altra cosa, che deve aversi in mira nel giudicare del carattere dell'idrocefalo si è la precisa sede che hanno acquistata le acque. Se il tumore sia edematoso, o sia che le medesime esistano nella cellulare subcutanea la malattia sarà di nessun pericolo, e di facile guarigione, non così può dirsi però de' casi, ne' quali l'acqua esista sotto l'aponeurosi, o il pericranio, anzi vi sono de' Professori, i quali sostengono, che qualora l'idrocefalo abbia la sede sotto il pericranio possa deprimere il cranio, e danneggiare il cervello, o produrre la carie dell'osso sottoposto.

Per la cura dell'idrocefalo esterno conviene avere presso a poco le medesime indicazioni, che si hanno nell'edema, cioè di procurare di restituire la forza necessaria alla parte, onde possa riassorbire, e porre in circolo l'umore ristagnato. Questa indicazione ha luogo particolarmente quando il fluido sia contenuto nella cellulare, ed allora converranno gli stimolanti locali come per esempio sotto i sacchetti di erbe aromatiche, i bagnoli di vino, in cui siano bollite le medesime, lo spirito di vino, oppure questo mescolato con del bianco d'ova. Possonsi ancora in cotesti casi adoperare quei rimedj, che hanno la facoltà di deviare l'umore da una data parte come sono i vescicanti, i setoni, le scarificazioni ec. avvertendo per altro, che in queste si debba impedire per quanto si può l'accesso dell'aria, la quale potrebbe essere di sommo danno, ed a tale oggetto si procurerà tanto di fare aperture più piccole che sia possibile, quanto di procurarne sollecitamente la cicatrice.



Una delle attenzioni principali, che deve aver-  
si nella cura di cotesta malattia, si è quella di pren-  
der di mira la cagione della medesima. Sono ge-  
neralmente molto vantaggiosi in essa i purganti, e  
diuretici, ed abbiamo recentemente degli esempi an-  
che di guarigione coll' uso degli sternutatori. Molte  
vantaggiose possono essere in quest' affezione le com-  
pressioni esterne. A tal fine si potrà applicare una  
adattata fasciatura, che si andrà a poco a poco  
stringendo, e che si è trovata in molti casi riusci-  
re di sommo vantaggio.

L' Idrocefalo interno, consiste in una raccolta  
d'acqua nella cavità stessa del cranio, e questo si  
forma qualche volta nell' embrione nel seno mater-  
no, e comunemente si osserva eziandio nascere ne  
bambini, e mai sugli adulti. Questa specie d'Idro-  
cefalo non è però la più frequente ad accadere. È  
necessario distinguere le varie sedi di essa, giac-  
chè può secondo queste sedi variare la prognosi,  
e la cura della malattia. Ritrovasi l'acqua ora fra  
il cranio, e le meningi, ora fra essa, ed il cervello,  
e può finalmente radunarsi ancora nei ventricoli ste-  
ssi del cervello. Egli è però spesso molto difficile  
il conoscere quale sia veramente il luogo occupato  
dal fluido stravasato, e molto più perchè rare vol-  
te si osserva, che il medesimo occupi un sito esclu-  
sivamente, che anzi non è caso raro di trovare l'Idro-  
cefalo interno unito all'esterno.

I sintomi, che seco porta ordinariamente co-  
testa malattia sono la distensione del cranio, la di-  
latazione delle fontanelle, e suture, e questa espansio-  
ne del cranio arriva spesso a renderlo molto più  
grande del naturale, ossificandosi esso in questo  
stato di dilatazione. Avanzata, che sia la malattia  
non permette al bambino affetto di tenere alzata la  
testa, altrimenti soffre del vomito, difficoltà di re-



iro ec. , il corpo si fa ordinariamente consunto , le vene del capo sono grosse , e varicose , gli occhi socchiusi , e rivolti all' ingiù con le pupille poco mobili . Questi bambini sono conforme il solito stupidi , il polso è piccolo , debole , ed anche irregolare . A tutti gl' indicati sintomi succedono non di raro le convulsioni , la paralisi , e la morte .

L' Idrocefalo interno ha comunemente la sua sede in una sola parte del cranio , ed allora in esso si rinviene la prominenza . Per solito ciò osservasi nella fronte , alcune volte si distingue facilmente , che il tumore stravasato ha formato dell' ernie quose a traverso delle suture , o delle fontanelle .

Noi non siamo totalmente al chiaro sulle cagioni della malattia , quello che è certo si è , che generalmente essa attacca i bambini nell' utero materno . Molti sono di sentimento , che possa in questi casi procedere la medesima da una compressione , che abbia sofferto la madre sul ventre nel tempo della gravidanza , così ancora l' attortigliamento del cordone intorno al collo , una compressione acuita sul capo nel tempo del parto , sia essa prodotta dalle ossa della pelvi , sia nata dalle manovre adoperate per la sortita del feto , sia con la semplice mano , oppur con gli stromenti . Possono eziandio esser cagioni della malattia un vizio de' genitali , o un' affezione ereditaria . Se l' Idrocefalo inter-abbia luogo molto tempo dopo la nascita del bambino , si forma ordinariamente in sequela di ritrosione di altre malattie , e segnatamente esantematiche della testa . In genere la causa prossima di questo stravasato sembra per altro secondo i più re- ti Scrittori dipendere da una esalazione linfatica , o secrezione abbondante dell' aracnoidea .

Non può descriversi precisamente il corso , che il fare l' Idrocefalo , mentre desso varia a seconda

Una delle attenzioni principali, che deve aver si nella cura di cotesta malattia, si è quella di prender di mira la cagione della medesima. Sono generalmente molto vantaggiosi in essa i purganti, i diuretici, ed abbiamo recentemente degli esempi anche di guarigione coll' uso degli sternutatori. Molte vantaggiose possono essere in quest' affezione le compressioni esterne. A tal fine si potrà applicare una adattata fasciatura, che si andrà a poco a poco stringendo, e che si è trovata in molti casi riuscire di sommo vantaggio.

L' Idrocefalo interno, consiste in una raccolta d'acqua nella cavità stessa del cranio, e questo si forma qualche volta nell' embrione nel seno materno, e comunemente si osserva eziandio nascere ne' bambini, e mai sugli adulti. Questa specie d' idrocefalo non è però la più frequente ad accadere. È necessario distinguere le varie sedi di essa, giacchè può secondo queste sedi variare la prognosi, e la cura della malattia. Ritrovasi l'acqua ora fra il cranio, e le meningi, ora fra essa, ed il cervello, e può finalmente radunarsi ancora nei ventricoli stessi del cervello. Egli è però spesso molto difficile il conoscere quale sia veramente il luogo occupato dal fluido stravasato, e molto più perchè rare volte si osserva, che il medesimo occupi un sito esclusivamente, che anzi non è caso raro di trovare l' idrocefalo interno unito all' esterno.

I sintomi, che seco porta ordinariamente cotesta malattia sono la distensione del cranio, la dilatazione delle fontanelle, e suture, e questa espansione del cranio arriva spesso a renderlo molto più grande del naturale, ossificandosi esso in questo stato di dilatazione. Avanzata, che sia la malattia non permette al bambino affetto di tenere alzata la testa, altrimenti soffre del vomito, difficoltà di re-



spiro ec. , il corpo si fa ordinariamente consunto , le vene del capo sono grosse , e varicose , gli occhi socchiusi , e rivolti all' ingiù con le pupille poco mobili . Questi bambini sono conforme il solito stupidi , il polso è piccolo , debole , ed anche irregolare . A tutti gl' indicati sintomi succedono non di raro le convulsioni , la paralisi , e la morte .

L' Idrocefalo interno ha comunemente la sua sede in una sola parte del cranio , ed allora in essa si rinviene la prominenza . Per solito ciò osservasi nella fronte , alcune volte si distingue facilmente , che il tumore stravasato ha formato dell' ernie acquose a traverso delle suture , o delle fontanelle .

Noi non siamo totalmente al chiaro sulle cagioni della malattia , quello che è certo si è , che generalmente essa attacca i bambini nell' utero materno stesso . Molti sono di sentimento , che possa in questi casi procedere la medesima da una compressione , che abbia sofferto la madre sul ventre nel tempo della gravidanza , così ancora l' attortigliamento del cordone intorno al collo , una compressione accaduta sul capo nel tempo del parto , sia essa prodotta dalle ossa della pelvi , sia nata dalle manovre adoperate per la sortita del feto , sia con la semplice mano , oppur con gli stromenti . Possono eziandio esser cagioni della malattia un vizio de' genitori , o un' affezione ereditaria . Se l' idrocefalo interno abbia luogo molto tempo dopo la nascita del bambino , si forma ordinariamente in sequela di retrocessione di altre malattie , e segnatamente esantematiche della testa . In genere la causa prossima di questo stravasato sembra per altro secondo i più recenti Scrittori dipendere da una esalazione linfatica , o secrezione abbondante dell' aracnoidea .

Non può descriversi precisamente il corso , che fa l' idrocefalo , mentre desso varia a seconda



Una delle attenzioni principali, che deve aver si nella cura di cotesta malattia, si è quella di prender di mira la cagione della medesima. Sono generalmente molto vantaggiosi in essa i purganti, e diuretici, ed abbiamo recentemente degli esempi anche di guarigione coll' uso degli sternutatori. Molto vantaggiose possono essere in quest' affezione le compressioni esterne. A tal fine si potrà applicare una adattata fasciatura, che si andrà a poco a poco stringendo, e che si è trovata in molti casi riuscire di sommo vantaggio.

L' Idrocefalo interno, consiste in una raccolta d'acqua nella cavità stessa del cranio, e questo si forma qualche volta nell' embrione nel seno materno, e comunemente si osserva eziandio nascere nei bambini, e mai sugli adulti. Questa specie d' Idrocefalo non è però la più frequente ad accadere. E' necessario distinguere le varie sedi di essa, giacchè può secondo queste sedi variare la prognosi, e la cura della malattia. Ritrovasi l'acqua ora fra il cranio, e le meningi, ora fra essa, ed il cervello, e può finalmente radunarsi ancora nei ventricoli stessi del cervello. Egli è però spesso molto difficile il conoscere quale sia veramente il luogo occupato dal fluido stravasato, e molto più perchè rare volte si osserva, che il medesimo occupi un sito esclusivamente, che anzi non è caso raro di trovare l' Idrocefalo interno unito all'esterno.

I sintomi, che seco porta ordinariamente cotesta malattia sono la distensione del cranio, la dilatazione delle fontanelle, e suture, e questa espansione del cranio arriva spesso a renderlo molto più grande del naturale, ossificandosi esso in questo stato di dilatazione. Avanzata, che sia la malattia non permette al bambino affetto di tenere alzata la testa, altrimenti soffre del vomito, difficoltà di re-

piro ec. , il corpo si fa ordinariamente consunto , e vene del capo sono grosse , e varicose , gli occhi socchiusi , e rivolti all' ingiù con le pupille poco mobili . Questi bambini sono conforme il solito stupidi , il polso è piccolo , debole , ed anche irregolare . A tutti gl' indicati sintomi succedono non di raro le convulsioni , la paralisi , e la morte .

L' Idrocefalo interno ha comunemente la sua sede in una sola parte del cranio , ed allora in essa si rinviene la prominenza . Per solito ciò osservasi nella fronte , alcune volte si distingue facilmente , che il tumore stravasato ha formato dell' ernie equose a traverso delle suture , o delle fontanelle .

Noi non siamo totalmente al chiaro sulle cagioni della malattia , quello che è certo si è , che generalmente essa attacca i bambini nell' utero materno stesso . Molti sono di sentimento , che possa in questi casi procedere la medesima da una compressione , che abbia sofferto la madre sul ventre nel tempo della gravidanza , così ancora l' attortigliamento del cordone intorno al collo , una compressione accaduta sul capo nel tempo del parto , sia essa prodotta dalle ossa della pelvi , sia nata dalle manovre adoperate per la sortita del feto , sia con la semplice mano , oppur con gli stromenti . Possono eziandio esser cagioni della malattia un vizio de' genitali , o un' affezione ereditaria . Se l' Idrocefalo inter-  
nal abbia luogo molto tempo dopo la nascita del bambino , si forma ordinariamente in sequela di ritrosione di altre malattie , e segnatamente esantematiche della testa . In genere la causa prossima di questo stravasato sembra per altro secondo i più recenti Scrittori dipendere da una esalazione linfatica , o secrezione abbondante dell' aracnoidea .

Non può descriversi precisamente il corso , che fa fare l' idrocefalo , mentre desso varia a seconda



Una delle attenzioni principali, che deve aver-si nella cura di cotesta malattia, si è quella di prender di mira la cagione della medesima. Sono generalmente molto vantaggiosi in essa i purganti, e diuretici, ed abbiamo recentemente degli esempi anche di guarigione coll'uso degli sternutatori. Molto vantaggiose possono essere in quest'affezione le compressioni esterne. A tal fine si potrà applicare una adattata fasciatura, che si andrà a poco a poco stringendo, e che si è trovata in molti casi riuscire di sommo vantaggio.

L'Iidrocefalo interno, consiste in una raccolta d'acqua nella cavità stessa del cranio, e questo si forma qualche volta nell'embrione nel seno materno, e comunemente si osserva eziandio nascere nei bambini, e mai sugli adulti. Questa specie d'idrocefalo non è però la più frequente ad accadere. È necessario distinguere le varie sedi di essa, giacchè può secondo queste sedi variare la prognosi, e la cura della malattia. Ritrovasi l'acqua ora fra il cranio, e le meningi, ora fra essa, ed il cervello, e può finalmente radunarsi ancora nei ventricoli stessi del cervello. Egli è però spesso molto difficile il conoscere quale sia veramente il luogo occupato dal fluido stravasato, e molto più perchè rare volte si osserva, che il medesimo occupi un sito esclusivamente, che anzi non è caso raro di trovare l'idrocefalo interno unito all'esterno.

I sintomi, che seco porta ordinariamente cotesta malattia sono la distensione del cranio, la dilatazione delle fontanelle, e suture, e questa espansione del cranio arriva spesso a renderlo molto più grande del naturale, ossificandosi esso in questo stato di dilatazione. Avanzata, che sia la malattia non permette al bambino affetto di tenere alzata la testa, altrimenti soffre del vomito, difficoltà di re-



ec., il corpo si fa ordinariamente consunto, le vene del capo sono grosse, e varicose, gli occhi socchiusi, e rivolti all'ingiu' con le pupille mobili. Questi bambini sono conforme il sottoposti, il polso è piccolo, debole, ed anche pallore. A tutti gl'indicati sintomi succedono non raramente le convulsioni, la paralisi, e la morte.

L'Idrocefalo interno ha comunemente la sua sede in una sola parte del cranio, ed allora in esso si rinviene la prominenza. Per solito ciò osservasi nella fronte, alcune volte si distingue facilmente che il tumore stravasato ha formato dell'ernia che si spinge a traverso delle suture, o delle fontanelle.

Noi non siamo totalmente al chiaro sulle cagioni della malattia, quello che è certo si è, che generalmente essa attacca i bambini nell'utero materno. Molti sono di sentimento, che possa in questi casi procedere la medesima da una compressione che abbia sofferto la madre sul ventre nel tempo della gravidanza, così ancora l'attortigliamento del cordone intorno al collo, una compressione accesa sul capo nel tempo del parto, sia essa prodotta dalle ossa della pelvi, sia nata dalle manovre adoperate per la sortita del feto, sia con la semple mano, oppur con gli stromenti. Possono eziandio esser cagioni della malattia un vizio de' genitali, o un'afezione ereditaria. Se l'Idrocefalo interviene a luogo molto tempo dopo la nascita del bambino, si forma ordinariamente in sequela di ritorno di altre malattie, e segnatamente esantemata della testa. In genere la causa prossima di extravaso sembra per altro secondo i più re-  
Scrittori dipendere da una esalazione linfatica, secrezione abbondante dell'aracnoidea.

Non può descriversi precisamente il corso, che fa fare l'idrocefalo, mentre desso varia a seconda

delle cagioni , e dell'età, e temperamento del paziente. I bambini , che vengono alla luce con questa malattia muojono spesso nel tempo del parto per la compressione , che soffre il tumore in tal circostanza , ed altri muojono poco tempo dopo . Se i bambini affetti da Idrocefalo interno scampino la morte , presentano sempre una lesione delle funzioni del cervello attesa la compressione , che il medesimo ne soffre . Generalmente l' Idrocefalo interno è incurabile , nè si conoscono de' casi di guarigione , che in quello sopraggiunto dopo la nascita , che se si curi a tempo può alle volte esser rimediabile . Il tutto dipende per altro dalla cagione della malattia , e dal tempo , che il malato ne è affetto , poichè , se la causa possa rimuoversi , e la malattia non molto antica si potrà sperare la guarigione , e l' opposto poi sarà in caso contrario . Se si apra il cranio delle persone morte di quest' affezione , si osserva costantemente , che il cervello è piccolo , e compresso , fino a ridursi molte volte alla forma di una semplice lamina , o membrana . La cavità del cranio , ed i ventricoli stessi del cervello sono ripieni d' acqua , ed i vasi tutti di queste parti sono gonfi , e varicosi .

Per la cura è molto vantaggioso tutto ciò , che può allontanare dal capo l'umore contenuto , richiamando nelle parti esterne vicine una adattata irritazione . Quindi saranno molto utili i vescicanti alla testa , o alla nuca , dietro le orecchie ec. Uno dei rimedj molto raccomandati nell' idrocefalo interno è il mercurio amministrato in varie forme , ma specialmente il calomelano internamente nello stesso tempo , che si praticano le unzioni mercuriali esterne . Egli è inutile quì nuovamente il ripetere , che la prima indicazione della cura deve essere quella di attaccare direttamente la cagione del-



atti, richiamando in specie l'eruzione cutanea dalla retrocessione di essa sia stato prodotto l'idrocefalo. Riguardo alla punzione, che può forse aver luogo in alcuni casi, si è dedita sempre dannosa qualunque sia stata la causa usata nell'estrazione delle acque. Tra i rimedii annoverati come utili per la cura dell'idrocefalo interno troviamo assai celebrati i purganti, e diauretici, gli errini, e simili.

Coll'idrocefalo interno dobbiamo congiungere ancora un'altra malattia, che ha con esso molta similitudine, cioè l'idrope del Cervello così chiamata. Essa non differisce dall'idrocefalo interno se non perchè le acque sono radunate nei ventricoli stessi del Cervello. In questa malattia si distinguono da tutti pratici tre periodi. Il primo periodo è quello, nel quale principia il dolore di testa, vomito, diarrea alle volte con febbre, e dolori dell'addome, il paziente è abbattuto di forze, ed inquieto, ha le pupille dilatate, gli occhi spaventati, e spesso convulsi. Nel secondo il polso diviene lento, ed irregolare, e si aumentano tutti i sintomi descritti nel primo periodo, e principia il sopore. Nel terzo finalmente il polso s'impicciolisce, e diviene frequente. La pupilla si rende immobile, il globo dell'occhio si osserva estremamente convulso. Le convulsioni crescono enormemente in tutta la macchina, e si distinguono segnatamente nel polso. Sopraggiunge la paralisi, ed il malato soccombe dopo poco tempo.

L'idrope del Cervello può dipendere da cagioni tanto esterne, che interne. Tra le prime si annoverano generalmente le percosse sulla testa, e le lute sulla medesima. Le ferite di testa possono produrla, e si osserva molte volte, che dedita si manifesta, che molto tempo dopo la lesio-



sione esterna, che l'ha prodotta. Le cause terne possono essere molte. La retrocessione malattia esantematica come scarlattina, rossetta, vajuoli l'hanno spesso costituita. Possere cagione di essa l'edema delle estremità ri, il vizio venereo, scrofoloso, scorbutico.

Generalmente l'idrope del Cervello ricoda tutti i pratici di cura molto difficile, alvi sia il caso di averla veduta guarire naturale. Quello, che si può quì dire in generalche allora vi sarà speranza di guarigione, la malattia sia nel suo principio, e dipenda una cagione ben conosciuta, e che non siaibile a togliersi.

Per la cura si deve procurare di favorire evacuazioni, e particolarmente quelle linfiche. Convengono quindi i purganti, gli emetici, i diuretici, i vescicanti, gli assorbenti ec.. Uno de' medicamenti che è stato trovato de' più utili in questa malattia si è come nell' Idrocefalo interno il mercurio ministrato sotto varie forme, giacchè questo metallo agisce distintamente sul sistema linfatico. Il calomelano, o mercurio dolce sembrano le preparazioni meglio indicate, che qualunque altra per quest' affezione. La salivazione, che spesso si praggiunge è stata da alcuni creduta poter essere la causa della guarigione; ma abbiamo degli esempi d' Idrope del cervello guarita senza questo effetto. Riguardo all' uso degli stimolanti sembra che poco, o nulla abbiano essi luogo nella presente malattia, poscia che molti sostengono, che questa è di natura infiammatoria, e provano la loro opinione colla sezione dei cadaveri de' malati d' Idrope del cervello, nei quali si è trovata l' infiammazione delle meningi.

*La spina bifida detta ancora Idrorachitide*

a il più delle volte congenita, che può riferirsi all'idrocefalo interno consistendo essa in un tumore alla parte posteriore della spina prodotto da una raccolta d'acqua nel canale vertebrale, e che si osserva comunemente nelle vertebre lombari; ma qualche rara volta ancora nelle altre parti della spina.

I sintomi, che seco porta questa malattia sono un dolore circoscritto molle con fluttuazione, e che si scompaia sotto la compressione, poichè il tumore rientra nel canale vertebrale. Compresso il tumore si sente nel fondo di esso, che le vertebre si dividono, dal qual sintoma è nato il nome della malattia, e che la distingue dalle altre in questa classe. Essa è quasi sempre congiunta ad una debolezza generale del malato, e spesse volte ad una debolezza dell'estremità inferiori, la quale non degenera in una vera paralisi.

Ma sono gli aspetti, che presenta questa malattia per quello riguarda l'apertura delle vertebre, come ancora per quello, che si appartiene alla natura dell'umore contenuto, essendo esso non sempre chiaro, ma purulento, o mescolato col sangue. Si osserva frequentemente, che la spina bifida si confonde con l'idrocefalo, onde si è supposto, che in questi casi l'acqua discendesse dal cervello nel canale delle vertebre. L'idrorachitide procede propriamente dalla medesima causa dell'idrocefalo interno, e si trova come questo nei neonati, e si osserva che si è detto spesse volte congiunte queste malattie. In quei casi, ne quali si rinviene la spina bifida senza raccolta di acque, vi è ogni ragione per credere, che desse abbiano esistito dianzi, e poi siano per qualche cagione state riassorbite, o eliminate altrove.

Del resto, che si sa di sicuro riguardo all'idrorachitide si è, che dessa è incurabile,

giacchè tutte le istorie, che abbiamo di tal natura sono terminate infelicamente, e tutta l'arte Cerusica può consistere nell'allontanare per quanto è possibile questo termine fatale, che spesso molto sollecito, mentre se l'apertura sia grande, e prossima al capo il bambino o nasce morto, o muore poco tempo dopo, in caso diverso vive alcune settimane, e mesi, e si hanno ancora degli esempj varj se si debba prestar fede ad altri scrittori persone vissute degli anni.

La cura proposta per la spina bifida o idricale, o palliativa, alla quale conviene ricorrere, come spesso succede, non riesce la prima cura radicale consiste nel procurare l'evacuazione delle acque contenute nel tumore, e nella riunione delle ossa divise. Si è da qualcuno proposta l'apertura del tumore per dar esito alle acque, una tale operazione è stata sempre seguita da un esito funesto qualunque sia stato il metodo adottato, e quante siano state le cautele poste intorno a questo oggetto, come spesso suole terminare il tumore venga anche ad aprirsi da se medesimo. Lo stesso possiamo dire della legatura del tumore da cui nascono delle convulsioni, che vengono a breve tempo seguite dalla morte dell'infermo, probabilmente perchè non è possibile di evitare nella legatura il comprenderci qualche ramo nervoso del plesso gnatamente della cauda equina. I rimedj applicati localmente per risolvere il tumore riescono per la maggior parte inefficaci, e la compressione per se seco il pericolo della rottura del tumore, che come dicemmo mortale. Molti medicamenti sono stati proposti sì esternamente, come internamente per risolvere il medesimo, ed in particolare i purganti, diuretici ec.; ma niuno ha prodotto successo felice. Il setone, i fonticoli sono eziandio d



osi per l'apertura, che producono. Resta finalmente, che parliamo di due medicamenti proposti in questi ultimi tempi per l'Idrorachitide. Il primo è il mercurio dato internamente, e gli autori, che lo propongono si fondano sull'analogia esistente fra l'idrorachitide, e l'Idropisia del cervello, e idrocefalo interno, nelle quali malattie questo rimedio è molto giovevole. Altri suppongono, che il fuoco possa essere vantaggioso fondandosi sull'esito felice, che si ottiene da esso nel così detto capostorno degli animali domestici, che è prodotto pressochè nella medesima maniera, che l'idrorachitide. Non abbiamo per altro esperienze sufficienti per poter giudicare del valore dei due accennati rimedj in cotesta malattia.

Per quello, che riguarda la riunione delle vertebre, poco o nulla può fare il Cerusico per avere la parte contratta una congenita viziosa conformazione nello sviluppo entro l'utero materno, osservandosi ordinariamente lo scostamento delle vertebrali apofisi spinose, sebbene la loro riunione, se pur succede puossi ripetere dalle forze naturali, ciò non ostante il Professore non deve omettere la graduata laterale compressione sul luogo affetto, onde facilitare l'unione delle porzioni di vertebre allontanate; ma quello, che gioverà poi più di ogni altra cosa, sarà di correggere il vizio interno, che può aver prodotto la malattia, la qual cosa se renderassi sotto il dominio dell'arte, non mancherà qualche volta di procurare un'esito felice. Così per esempio vi è ogni ragione di credere, che in caso s'avesse riconosciuta un'origine venerea, gli antididreumatici a tempo amministrati dal Professore, produrranno dei buoni effetti.

Se la cura radicata non riesce, come pur trop-

po quasi sempre accade, deve il Cerusico tarsi di quella palliativa. Essa consiste, abbiamo detto, nel tenere leggermente compresso il tumore acciò non cresca molto, e nell'istesso tempo difenderlo dall'aria, onde non s'infiammi e rompa. Si potrà riunire alla compressione topici astringenti, e spiritosi, i quali possono produrre anche la diminuzione del tumore, e pretende che dessi abbiano anche guaritura; ma essendo l'esperienza generalmente rispondente a queste opinioni, sarà bene a i detti rimedj con estrema cautela.

## ARTICOLO II.

### *Delle Malattie degli Occhi.*

**P**er dare un cert'ordine ai mali della testa cominceremo dalle malattie degli occhi per passare a quelle delle orecchie, del naso, e della bocca. Parlando adunque delle affezioni degli occhi cominceremo primieramente quelle delle vie lacrimali, e quelle delle parti esterne del globo di cui si passeremo quindi alle malattie, le quali attaccano lo stesso in generale, ed alcune sue porzioni particolari, terminando infine con quelle del bulbo.

Tra le malattie delle vie lacrimali hanno luogo l'affezioni dei punti lacrimali, del canalicolo, dello stesso nome, del sacco nasale, e quelle che attaccano la cellulare, e la cute sopra posta al sacco, le quali tutte impropriamente si chiamano col nome di *fistola lacrimale*.

L'affezione dei punti, e condotti lacrimali sono essere la loro ostruzione, o la loro perforazione, e finalmente l'obliterazione di essi prodotta

mente da ulceri vajolose. Queste affezioni indistintamente cagionano la lagrimazione, quale anche accompagna l'ostruzione del sacco nasale; ma non sempre le ultime accennate, cioè l'affezioni delle parti esterne, che lo ricuoprono, fra le quali ha il primo luogo il così detto *anchilope* tumore infiammatorio, che ivi sviluppa, se questo però non sia prodotto dall'affezione di già esistente nel sacco nasale, altrimenti anche in esso vi si associa l'epifora, quale deve ripetersi dall'ostruzione di detto sacco, e non dall'esistenza dell'*Anchilope*. Se questo passa in suppurazione, o si esulcera lo che di sovente accade dicesi *egilope*, che neanche per se stesso produce la lagrimazione, ma se si vedono sortire le lagrime dall'ulcere stessa, è segno certo, che sia già corrosa il sottoposto sacco nasale, ed allora è formata la vera fistola lagrimale, che consiste propriamente parlare nella sortita delle lagrime dalle proprie vie all'esterno mediante un'ulcera, cheiasi formata nel sacco nasale, ed in tal caso chiamasi fistola lagrimale esterna; oppure alle volte questa ulcera essendo nata alla parte opposta di detto sacco, la quale abbia prodotto la carie dell'osso ungueale, come qualche volta può accadere le lagrime in colle materie sortono dalla narice corrispondente, e il quale si distingue dal primo, chiamandosi fistola lagrimale interna, e a qualcuno è piaciuto aggiungerele il nome di *complicata*.

Riguardando noi le pocanzi accennate affezioni alle vie lagrimali per pure cagioni della vera fistola lagrimale dobbiamo dire essere di questa il sintomo caratteristico l'aridità nella narice corrispondente, se sia esterna, e la sortita per questa di marcia, e lagrime se sia interna.

Le cagioni dunque della fistola lagrimale, che consideriamo come altrettante malattie, le qua-



li possono causarla, ma altresì possono nodurla, si restringono all'ostruzione delle vie lacrimali, e sotto un certo rapporto vi si può anche la dilatazione del sacco nasale detta ancora ernia del sacco, o *ernia lacrimale*, perchè due volte dopo essere stata stimolata da replicati tentativi per la guarigione, s'infiamma, si esulsa, e può cagionare la vera fistola.

L'ostruzione di dette parti può nascere o interna, oppure esterna o locale. Tutti i vizi umori come venereo, scrofoloso, artritico, eretico, e venajoloso producendo l'infiammazione, o latente nelle membrane delle vie lacrimali, si rendono causa dell'impedito passaggio delle lagrime. Le fratture, le lussazioni, le fistole, le secrezioni viziose delle ghiandole meibomiane detta *oftalmia purulenta*, la suppurazione, la traspirazione sono le cause esterne, o locali che nel loro primo apparire, o consecutivamente fanno ostacolo al libero passaggio delle lagrime, e si rendono tante volte origine di una vera fistola lacrimale. La dilatazione del sacco nasale è ordinariamente la conseguenza di altri disordini in queste parti, li quali hanno cagionato la paralisi del muscolo, e il medesimo per la prolungata distensione delle membrane. Il sacco nasale è in questo stato indolente, e il medesimo passa pel naso, e comprime i dotti lacrimali. La prognosi di queste affezioni inclusivamente alla vera fistola lacrimale si deduce non solo dalla loro indole, ma anche dalle cagioni che l'hanno prodotte, al tempo che si sono formate, ma eziandio dall'età, e dal temperamento del malato.

Se l'ostruzione proceda da un vizio degli umori, il solo combattere questo cogli adattati rimedi generali e locali può rendersi sufficiente mezzo per curare la malattia, come egualmente vedonsi

vere tante altre morbose località per esemplarmente nell'uretra &c. Se ad onta di questo cotesto metodo curativo, non riesce a guarir la malattia, allora piuttosto di servirsi di specilli, ed altri istromenti inventati per le vie lagrimali, le varie iniezioni immatate oggetto &c. si può ricorrere con rifugio all'operazione, abbenchè sono pochi i cui si rende necessaria.

Se la contusione, o frattura soltanto abbia prodotta la malattia, i mezzi da noi altrove indicati a questo, che servono a togliere l'irritazione dell'affetto saranno rimedj sufficienti per guarirla. Se la viziosa separazione delle Meibomiane sia la cagione dell'ostruzione, un unguento applicato localmente composto di butiro preparata, bolo armeno, e precipitato bianco simile può eziandio condurre alla guarigione. L'amministrazione de' diaforetici di quercure, allorchè per cagione riconosca la soppressionazione ne produrrà efficacemente la dissoluzione della malattia. Così dicasi di quella irritable delle vie lagrimali, che produce generalmente, che dissipasi sotto l'uso di qualche purgante per riconoscerne la sua origine nella saburra nelle prime vie. Il richiamare finalmente alla cute una malattia esantematica dalla metastroccessa sarà il metodo di cura conveniente se colla sua retrocessione abbia prodotto la malattia nelle vie lagrimali.

Se la malattia del sacco nasale difficilmente si superi, si ricorra all'uso de' rimedj corroboranti e stringenti, come la tintura di cantarelle, o una soluzione di pietra infernale, di allungandovi eziandio una compressione sul naso per mezzo anche di adattati strumenti.

quindi è necessario in tal caso ricorrere a descrizione, della quale ci riportiamo a descrivendone l'istituzione nell'ultimo volume.

Indispensabile poi si rende cotesta cura nella vera fistola lagrimale se non sia riu-  
rirla con i rimedj accennati inclusivamente  
come il sudescritto unguento, od altro adatti  
sta la cagione, che l'ha prodotta. La p  
altro dei più recenti scrittori dimostra, che  
fistola lagrimale esterna non di raro guar-  
calmente coll'anzidetto metodo curativo.

Le palpebre sono soggette ad attacco  
all'altra nei loro margini, e questa mala-  
*anchiloblefaro*. Siccome le palpebre possor  
lamente essere aderenti fra loro, ma poss  
dio rimanere attaccate al globo dell'occhio  
molti professori di Chirurgia si distingue  
blefaro in due specie, una delle quali con  
aderenza delle palpebre al globo dell'occhio  
nell'aderenza delle medesime fra di loro.  
tima specie viene poi distinta in anchiloblef  
e spurio, secondo che le palpebre sono ri-  
mente, ovvero apparentemente per mezzo d  
co denso, e tenace. Se desso sia spurio  
de, che la cura è così facile, e sicura, ch  
essere l'oggetto della Chirurgia, e quindi  
mo qualche cosa soltanto dell'Anchiloblefaro.

Questa malattia rare volte è generale, e  
si mai sono le palpebre riunite insieme  
l'estensione dei loro margini, giacchè il  
delle lagrime impedisce codesta loro tota-  
ne, e resta sempre uno spazio di una, o  
che permette lo scolo delle medesime, la  
gli oggetti dirigendo gli occhi lateralmen-  
rimane spesso uno strabismo abituale, che



L'anchiloblefaro riconosce per sua cagione una infiammazione, ed esulcerazione dei tarsi, che continui per un certo tempo, e produce l'aderenza dei medesimi. Lo stesso ha luogo eziandio quando l'aderenza esiste fra la faccia interna della palpebre, ed il globo dell'occhio, venendo la malattia egualmente prodotta dall'infiammazione, ed esulcerazione della superficie di quest'organo, e dell'interno delle palpebre non solamente per una causa esterna, ma ancora per una malattia preceduta, e segnatamente pel vajuolo, che suole essere una delle più frequenti cagioni di cotesta morbosa aderenza.

La cura dell'anchiloblefaro non è in se stessa nè difficile, nè pericolosa, trattandosi soltanto di dividere con un istromento l'aderenza, che le palpebre hanno contratto fra loro, o col globo dell'occhio. L'unica precauzione da prendersi in questi casi si è di non offendere il globo stesso. A questo oggetto si adopera un bistorì piccolo, ed ottuso nell'estremità se l'anchiloblefaro sia imperfetto, ed innandolo nell'apertura, che resta fra le palpebre viene facilmente a separare l'adesione delle membrane avvertendo per altro di non tenere la parte tagliente del bistorì verso il globo dell'occhio. Si può anche adoperare per questa operazione una piccola forbice, con la quale si rende in alcune circostanze anche più comoda.

Se per altro l'aderenza delle palpebre sia per la loro lunghezza resta alquanto più difficile introdursi l'istromento necessario fra esse, ed il globo dell'occhio, dovendosi primamente procurare di dividere la medesima al di fuori con la precauzione di non offendere il sottoposto globo, lo che terrà se si scostano le palpebre fra loro, ma vertirà di principiare il taglio in un angolo dell'occhio per evitare l'offesa della cornea lucida.

Qualora le palpebre siano riunite al globo occhio oltre l'esserlo fra loro, l'operazione è più difficile, e di esito assai incerto, mentre che presenta non poca difficoltà nel separare l'aderenza delle palpebre con esso, questa facile si verrebbe a rinnovare attesa l'inflamazione e suppurazione, che sieguono ordinariamente, e di più si rende inutile la medesima essendo comunemente il globo in uno stato tale si crede con fondamento impossibile la restituzione della vista.

L'anchiloblefaro di questa specie si riceve facilmente se si osservi, che ambe le palpebre possono scorrere sul globo dell'occhio, e che fermo non può muovere liberamente il medesimo. Tale aderenza è il prodotto di cagioni esterne ed interne, come l'altra, di cui abbiamo parlato. Si osserva di molte specie, e gradi; Per effetto di questo caso la separazione delle palpebre col ferro senza offendere il globo merita questa tutta l'attenzione, quale deve consistere nel tenere le medesime quanto si può discoste dall'occhio. Se l'aderenza è assai forte, e molto estesa è malagevole il separarla, e se dessa abbia luogo sulla cornea lucida quasi certo, che questa sia opaca, e quindi si crede come abbiain detto inutile l'operazione. Gli autori raccomandano per impedire la nuova aderenza delle palpebre di interporre fra le medesime ed il globo delle foglie d'oro, o di quelle di argento, adoperano i battiloro; ma questi corpi estranei irritando l'occhio non servono che ad accrescerne l'inflamazione, ed il dolore. Più vantaggioso potrebbe forse essere il muovere continuamente l'occhio e bagnare l'interno delle palpebre con qualche unguento emolliente a cui in seguito vi si può unire dello stratto di Saturno, o qualche grano di canfora.



pure servirsi di un unguento di simil natura , ma l'esperienza c'insegna , che questi mezzj riescono il più delle volte inefficaci .

Oltre la concrezione sono soggette le palpebre a molte altre malattie , fra le quali si annoverano principalmente il loro rovesciamento , il prolasso , ed il lagofalmo .

Il rovesciamento delle palpebre può essere di due specie , può cioè aver luogo all' infuori , o all' indentro . Il primo caso dicesi *ectropio* , ed il secondo *entropio* . L'ectropio , ossia il rovesciamento in fuori delle palpebre osservasi più frequentemente nella palpebra inferiore , e lascia l'occhio scoperto , ed esposto all'azione de' corpi esterni , oltre di che non si possono raccogliere le lacrime fra i due tarsi . La cagione più ordinaria di questa incomoda malattia sono le cicatrici della pelle della palpebra , o in vicinanza di essa , le quali producendo l'accorciamento della cute impediscono , che la palpebra possa ricoprire l'occhio , ma può oltre di ciò nascere ancora la malattia da un tumore , o grossezza straordinaria della membrana interna della palpebra , la quale viene ad allontanare la medesima dall'occhio , ed a spingerla in basso . Può finalmente avere origine la malattia da una debolezza , o paralisi del muscolo orbicolare delle palpebre , e viene in conseguenza di oftalmia invecchiata , o nasce ancora spontaneamente nell'età avanzata .

Per la cura di questa malattia rare volte sono sufficienti i rimedj locali , ma ordinariamente si richiede una operazione . Per quello che riguarda l'uso de' medicamenti conviene riflettere in primo luogo alla cagione della malattia . Se dessa è nata per vizio della cute , come per esempio da un accorciamento della medesima prodotto da una cicatrice la cura sarà più difficile , che se dipenda da gonfiore della con-



giuntiva. I rimedj locali, che convengono in questo caso sono gli emollienti per ottenere il rilassamento della cute, e l'applicazione di alcune liste di ceroto agglutinante, le quali restando fissate alla palpebra inferiore, ed alla fronte la tengono sollevata, ma essendo questo metodo spesso inutile, o poco durevole il suo effetto, sarà meglio tagliare la cute esternamente, e tenendo poi discostati fra loro i labbri della ferita, procurare di ottenere una larga cicatrice, e così supplire al raccorciamento della cute. Questo taglio si principierà col bistouri facendo una piega alla palpebra, e si continuerà poi con piccole forbici secondo la direzione dell' orlo della medesima. Per tenere separati i labbri della ferita si adopereranno le piccole liste di ceroto fissate alla fronte, ed anche alla gota, se il bisogno lo richieda, ma questo metodo rare volte porta seco il desiderato effetto.

Più facile resta come si è detto la cura dell'ectropio qualora dipenda da un vizio della congiuntiva. Se questa sia tumefatta sarà spesso sufficiente il portar via colle forbici la gonfiezza, avvertendo indi di tener sempre sollevata la palpebra col ceroto agglutinante. Convien quì riflettere, che molte volte non si rende neanche necessario il taglio, cedendo spesso il gonfiore al solo uso de' topici, come una leggiera soluzione di pietra caustica, o altri medicamenti di simil natura. Siccome per altro accade spesso, che questa specie di ectropio venga prodotta da un vizio interno della macchina, o da retrocessione di malattia precedente nulla si otterrà dai rimedj locali, o dall' operazione, se nell' uno, ed altro caso non ci si riunisce insieme la cura interna adattata.

Finalmente l'ectropio procedente da paralisi, o inerzia della palpebra è una specie delle più diffi-

ti a guarirsi, ed è quasi sempre incurabile. L'applicazione dei topici stimolanti fra i quali viene particolarmente raccomandato dai pratici l'olio di finocchio, ed altri stimolanti di simil natura è il metodo il quale dev' essere posto in pratica, ma per altre rare volte è seguito da un esito felice.

L'entropio, o sia rovesciamento delle palpebre, indentro produce ordinariamente l'irritazione del globo dell'occhio, essendo i tarsi rivolti verso la cornea opaca, e succedendo per conseguenza una infiammazione delle ciglia contro il globo stesso. Questa malattia dipende per lo più da un rilassamento anormale della palpebra, e segnatamente de'suoi tegumenti. Può essa nascere ancora da una mollezza dei tarsi, da cicatrici esistenti nella parte interna delle palpebre, e finalmente come si pretende da qualcuno anche da uno spasmo del muscolo orbitare delle medesime.

Secondo la cagione, che riconosce l'affezione de-essere diretta la cura. Se l'entropio venga prodotto da rilassamento della cute della palpebra, è necessario rimediare al medesimo coi corroboranti caldi, e si potranno ancora adoperare dei caustici, ma se questi non siano sufficienti farà mestieri di recidere una porzione degl'integumenti delle palpebre formando una piega sulla medesima e dopo riunire i due labbri della ferita mandoli a contatto con qualche ceroto agglutinante e poi il raccorciamento de'tarsi sia la cagione della malattia, si rimedierà a questa col recidere medesimi trasversalmente senza per altro tagliare la palpebra. I rimedj corroboranti convengono nel caso di rilassamento dei sudetti, e con ancora od antispasmodici si dovrà rimediare i casi di entropio, nel quale venga esso prodotto da uno spasmo de muscoli delle palpebre.



Se desso proceda da un preternaturale allungamento della palpebra superiore, come accade comunemente nei casi di edema di queste parti, è che deve curarsi con de' mezzi, i quali sieno a restituire alla medesima il tono necessario, o divenga capace a contrarsi, come nello stato sano ovvero risolvere l'ingorgamento, che è la cagione della malattia. A questo oggetto vengono consigliati gli attonanti, come i bagni freddi, le cantarelle, e anche la soluzione di pietra infernale. Alcuni Autori commendano ancora di stendere, e stirare con qualche forza per replicate volte la palpebra, ed assicurano di averne ottenuta con questo mezzo la perfetta guarigione. Se dagl' indicati rimedj non giunge a dissipare quest' incomodo rilassamento della palpebra superiore, è necessario ricorrere al taglio di quella porzione ridondante di cute, lo che si formando una piega trasversale della palpebra, e ricidendo la medesima con la forbice riunendo la ferita con un ceroto adesivo, ed una fasciatura adattata. Quello che conviene quì osservare si è di portar via una porzione di cute, che non sia maggiore, o minore di quella che costituisce la malattia.

Qualora il prolasso dipenda da paralisi dell' elevator della palpebra si deve tutta la cura dirigere a restituire alle parti il tono, che hanno perduto col richiamarvi l'influsso de' spiriti animali. Questa specie di prolasso è di cura difficile, ed osservasi ordinariamente nelle persone di età avanzata. I rimedj, che in allora convengono sono i tonici liquidi, ed in particolare l'acqua fredda, i vescicanti le cantaridi, l'ammoniaca, e simili altri stimolanti, come la canfora &c. Molti hanno consigliato ancora la doccia sull' occipite, che spesso ha prodotti buoni effetti. Alcuni altri Scrittori hanno pensato che molte volte la cagione di questa paralisi f



fezione gastrica, particolarmente quando la malattia viene accompagnata da dolore di testa, sibilo alle orecchie, nausea &c. ed in questa circostanza si consiglia gli emetici, i purganti, e lovente i vescicanti alla nuca oltre i stimolanti toglia di sopra accennati.

Se finalmente il prolasso dipende da una contrazione spasmodica del muscolo orbicolare delle palpebre è chiaro, che la principale indicazione della cura deve consistere nell'uso interno, ed esterno de' muscolospasmodici. Convien per altro riflettere, che la strabismia in questi casi è comunemente sintomata da altre malattie, come per esempio l'isterismo, l'ipocondria, e segnatamente del ballo di S. Vito. Ciò posto i rimedj locali sono di poco vantaggio, ma è necessario diriggere la cura contro la malattia principale.

Il *Lagofthalmo* è un' affezione opposta al proptosis delle palpebre, poichè nel lagofthalmo il malato non può chiudere le medesime, ed è obbligato continuamente a tenere l'occhio scoperto. Siccome le palpebre non possono riunirsi ne viene, che le palpebre non prendono il loro corso naturale, e quindi segue una continua lagrimazione. La luce affiora fortemente gli occhi del malato, e la vista si offusca, venendone ancora a soffrire il globo oculare, mentre resta continuamente esposto all'azione dell'aria, e de' corpi esterni.

Due possono essere le cagioni della malattia, cioè essa dipendere o da un gonfiore preternaturale del globo dell'occhio, ovvero da un raccorciamento della palpebra superiore, e questa seconda causa più frequente del lagofthalmo. Varie sono le cagioni, che producono codesto raccorciamento, e sono o uno spasmo de' muscoli, o un raccorciamento tanto di essi, quanto de' tegumenti comuni. II.

muni prodotto da una ferita, piaga, cicatrizza tra cagione qualunque analoga.

Secondo queste varie cagioni deve dirsi la cura della malattia. Se il lagoftalmo dipende da spasmodica contrazione de' muscoli palpebrali, verranno unicamente i rimedj antispasmodici, e mezzo di essi si otterrà facilmente la guarigione della medesima. Più difficile poi si renderà quando dipenda da una mancanza di tegumenti, o di forza muscolare, che obblighi la palpebra a restare sollevata. In tal caso è stata proposta un'operazione consistente nel recidere le fibre lacerate, o quella porzione di tegumenti, la quale impedisce, che la palpebra si possa distendere libero dell'occhio. Ciò fatto si procura per mezzo di cerotti adesivi di tenere la palpebra applicata alla parte sottostante, affinchè riprenda la sua naturale situazione. Con questo mezzo si ottiene perfettamente la cura della malattia, poichè quando si cicatrizza la ferita si viene nuovamente ad appiattare la palpebra; non manca per altro cotesto mezzo non di raro di produrre un qualche vantaggio.

I tumori delle palpebre sono di natura diversa fra loro, tanto se riguardiamo la loro sede, quanto se consideriamo la sostanza della quale sono composti. Essi sono ordinariamente molto più duri, e pajono generalmente della stessa indole de' tumori cistici. Occupano talvolta ambedue le palpebre, e molte volte si osservano vicino a quelle delle medesime, e più raramente hanno luogo nel mezzo di esse. Quelli, che nascono sul margine delle palpebre vengono detti *orzajo*, e questo ha un carattere molto più grave, ed incomodo di quello dei tumori ordinarj degli altri punti delle palpebre, essendo soggetto ad una infiammazione, che è assai molesta particolarmente se di

causa generale, o da un vizio della macchina. Si ingue eziandio fra i tumori delle palpebre quello che sopraggiunge nella caruncula lacrimale, e dipende dall'ingrossamento della medesima. Questo tumore dicesi *encantide*. Noi discorreremo di queste due specie di tumori particolari dopo aver parlato dei tumori delle palpebre propriamente detti.

Questi tumori sono della stessa natura dei tumori cistici, come si è già detto di sopra, quindi i sintomi, che l'accompagnano sono simili a quelli indicati, allorchè abbiamo parlato di codesta specie di tumori, ed il metodo di cura in altro non differisce che riguardo al luogo, che dessi occupano. Ciò produce, che il sintoma il più incomodo dei medesimi si è il loro volume, che alle volte può essere alquanto considerabile, ed allora sono d'impedimento all'elevazione della palpebra superiore, e abbiano la loro sede nella medesima, come per lo più accade. Fuori di quest'incomodo, altro danno non producono questi tumori, non essendo per loro natura di pericolo alcuno.

La cura de' tumori delle palpebre è di due specie, ch'è quanto dire la risoluzione, e suppurazione, e la demolizione. I rimedj, che convengono per risolvere, o facilitare la suppurazione in questi tumori sono i medesimi, che abbiamo indicati per la cura de' tumori cistici, che si osservano in altre parti del corpo, e quindi i ceroti emollienti, o quelli leggermente stimolanti, come il diachilon, il mercuriale, ed altri simili medicamenti sono molte volte bastanti per promuoverne la risoluzione, o suppurazione, ma se ciò non accada come non di raro succede, non vi è altro rimedio, che quello di farne stirpazione. Per estirpare questa sorta di tumori deve incidere la cute delle palpebre a seconda del-



le sue pieghe trasversali procurando di non e-  
dere la sottoposta cisti, allora premendo un  
si viene facilmente ad ottenere l'uscita del tu-  
con tutta la cisti. Si medica indi la ferita con  
zione di taffetà, o ceroto agglutinante, e si otti-  
ordinariamente in pochissimo tempo la cicatrice,  
gnatamente se si abbia l'attenzione di far uscire  
ma il sangue piucchè è possibile. Qualora ricio-  
sca il Professore, che sia rimasta ancora qualche  
cola durezza nella palpebra dipendente da una  
cola porzione di cisti, che non sia stata estirpata,  
sarà bene di toccarla col caustico prima di riunir  
la ferita, abbenchè i più recenti Scrittori di Chi-  
rurgia siano di sentimento, che la suppurazione  
che siegue l'estirpazione di questi tumori è per  
sola bastante a distruggerne il residuo del tumore  
o della cisti. Siccome questi tumoretti restano mol-  
volte assai aderenti alla congiuntiva, ne viene, e  
si rende impossibile di estirparli senza portar via  
porzione della medesima, lo che produce un fo-  
alla palpebra, che difficilmente cicatrizza. Per evi-  
re quest' inconveniente alcuni recenti Autori di Chi-  
rurgia hanno proposto di farne l'estirpazione dalla  
parte interna rovesciando la palpebra, e così non  
recide, che la congiuntiva lasciando intatta la pelle.  
Questo metodo però può riuscir facile nei tumori  
tuati nel mezzo della palpebra, e non molto distan-  
dal tarso, ma se le palpebre sono infiammate, e irrita-  
te, se si aprono difficilmente, come ancora se il tu-  
more sia molto distante dal tarso, o situato vicino  
le commissure delle medesime resterà assai difficile  
ed anche impossibile, o pericoloso l'estirparlo dalla  
parte interna.

L'orzajuolo è parimenti un tumore delle palpebre  
ma che merita di essere considerato separatamente.  
Esso differisce dagl' altri tumori, che si forman

queste parti, perchè si presenta mai sempre in uno de' suoi margini. Questo tumore è piuttosto piccolo, e della grossezza di un grano d'orzo, dal che prende il suo nome. Alcuni moderni Scrittori distinguono tre stati nell'orzajuolo, cioè quello di infiammazione, di suppurazione, e di indurazione.

Se codesto tumore sia infiammato s'assomiglia ad un piccolo foruncolo, e produce ancora una infiammazione nelle palpebre, la quale per altro si va dissipando a poco a poco secondo, che desso viene a suppurare, o s'indurisce. In questo ultimo caso si rende incomodo per la sua mole, mentre impedisce il libero movimento delle palpebre.

Varie possono essere le cagioni della malattia, di cui parliamo. Esse distinguonsi comunemente in esterne, o locali, ed interne, o generali. Le prime sembrano essere le meno frequenti, ma non per questo non sono eziandio molte volte causa dell'orzajuolo. Le seconde possono essere le malattie interne, e particolarmente i vizj degli umori, o le impurità delle prime vie. Secondo queste cause deve esser diretto il sistema della cura, quindi non deve restringersi ai soli topici, ma secondo la natura delle medesime dirigere la cura generale, e locale. Se dunque l'orzajuolo dipenda o da un vizio d'umori, o da qualche imbarazzo nelle prime strade, fa di mestieri in primo luogo rimediare a questi disordini, collo sbarazzare le vie per mezzo degli adattati rimedj, che praticando una cura interna, come abbiamo detto, la quale sia bastante a correggere la prava indole degli umori, che è la cagione della malattia. Per quello che s'appartiene alla cura locale alla medesima qualora l'orzajuolo sia in uno stato infiammatorio, essendo questo tumore della stessa natura del foruncolo si dovranno adoperare presso poco i medesimi rimedj, che si usano in esso,



quindi sul principio converranno particolarmente gli emollienti onde promuovere la suppurazione, essendo impossibile l'ottenere la risoluzione. Molti Scrittori per altro sostengono, che se si principia a curare la malattia prima che siasi realmente formato il tumore, ma non apparisca che sotto la forma di una piccola infiammazione della palpebra se ne possa ottenere la risoluzione, ed a quest' oggetto propongono i risolvendi, e segnatamente l'applicazione del freddo. Ogni volta che siasi ottenuta la suppurazione dovrà procurarsi l'esito della marcia, adoperando ancora se fia di bisogno la lancetta, o il caustico per dare uscita alla medesima, ed alla piccola cisti del tumore, la quale altrimenti ne produce con facilità la recidiva, ed a questo oggetto sarà ancora bene di premere alquanto il lembo del tumore per fare uscire il pus ivi contenuto. Non potendosi per altro alcune volte ottenere la suppurazione del tumore, o l'esito totale della marcia, rimane esso indurito, e produce gl'incomodi sopraccennati. In allora conviene ricorrere all'uso dei topici risolvendi, come saturnini, o altri simili. Questi medicamenti possono essere utili sì risolvendo il tumore indurito, lo che per altro poco frequentemente accade; come ancora procurandone l'infiammazione, che passando in suppurazione può produrre la cura radicale.

Quando il tumore delle palpebre consiste in un preternaturale ingrossamento della caruncola lacrimale si chiama *encontide*. Questo tumore è rossastro, fungoso, del volume d'una nocciola: abbiamo per altro degli esempj, che sia cresciuto ad un volume molto maggiore. Esso è di ostacolo alle palpebre, onde possano chiudersi esattamente, impedisce l'assorbimento delle lagrime, ricuopre i punti lacrimali, e porzione della cornea trasparente, quindi



continuamente l'occhio, e cagiona impedimento alla vista. Riconosconsi ordinariamente in Chiodi due specie di encantide, la prima semplice, benigna, e la seconda cancerosa, e si distinguono loro perchè la prima è poco dolorosa, e presenta l'aspetto ordinario de' tumori di questa natura. L'encantide cancerosa è all'opposto livida, dura, rossa, versa del sangue al minimo contatto, produce pus icoroso, e cagiona dei dolori forti, e continui, che si estendono fino al fondo dell'orbita superiore, e su tutta la faccia.

L'encantide viene per ordinario causata dalle lesioni dell'occhio, e segnatamente da quelle che attaccano la caruncola lacrimale; ma può dipendere da cagione esterna, come per esempio qualche corpo estraneo, che irriti questa parte. L'encantide sia formata da codeste cause è per lo più benigna, ossia della prima specie, ed è facilmente curabile o con la suppurazione, o con la stirpazione. Quando poi essa sia di natura cancerosa, dipende in tal caso sempre da un vizio locale, e difficilmente cede all'uso de' rimedj; ma non è curabile riproducendosi eziandio dopo l'estirpazione.

Se il tumore sia di natura semplice, o benigna, si prescrive la cura col rimuovere la cagione locale, se questa esista, in caso diverso si tratterà nella stessa maniera, che gli altri tumori cistici, applicando altresì qualche topico astringente, ed irritante poi si osservi, che desso passi in suppurazione, sarà necessario dar esito alla marcia aprendo con una lancetta.

Con tal metodo molte volte si ottiene la cura della malattia, ma qualche rara volta accade che il tumore diviene duro, indolente, e non risponde a' rimedj indicati, ed in allora devesi neces-

rente, che si può in appresso distruggere  
stico. Questo mezzo sarà eziandio giovevole  
restare l'emorragia, la quale è alle volte co-  
bile, nè cede ad alcun altro rimedio. Sta-  
suppurazione si laverà l'occhio con qualche  
astringente.

Riguardo all' encantide cancerosa è inut-  
cura locale per ottenere la guarigione; poi-  
non cede che alla cura interna, la quale pe-  
volte è sufficiente a distruggere il vizio della  
na. Questa malattia si estende non di raro  
la membrana pituitaria, ed alle ossa cagion-  
la carie. Se si può giungere a guarire la ca-  
la malattia generale, l'estirpazione, ed il  
potranno esser giovevoli, altrimenti conver-  
tentarsi della cura palliativa, che consiste  
cotici localmente applicati per diminuire i  
La legatura proposta da alcuni per l'estirpa-  
questo tumore è al presente rigettata da tut-  
tici, perchè dolorosa, difficile per non pote-  
praticata se non che nel caso, in cui il tum-  
bia una base molto stretta, e finalmente, per-  
stano sovente delle appendici dette lippor-

no, e per conseguenza merita una particolare considerazione. Sotto il nome di oftalmia s'intende dai medici l'infiammazione della parte interna delle palpebre, e del globo dell'occhio.

Questa malattia è di molte specie, ma noi riporteremo qui soltanto le principali, e quelle ammesse dai migliori pratici, che è quanto dire l'oftalmia semplice detta ancora *tarassi*, l'oftalmia sintomatica, o dipendente da un vizio delle prime vie, l'oftalmia sanguigna, l'oftalmia varicosa, l'oftalmia acuta, o *chemosi*, l'oftalmia flemmonosa, e l'oftalmia venerea. Da tutte queste divisioni fatte dagli autori, si vede, che la più adattata dell'oftalmia è quella in acuta, e cronica, in idiopatica, e sintomatica, e noi siamo di sentimento, che questa divisione sia sufficiente per la pratica.

I sintomi, che seco porta la malattia sono vari secondo il grado, la sede, e le cagioni della medesima. Si osserva ordinariamente un rossore, e gonfiore nella congiuntiva, ed alle volte ancora nelle palpebre, l'occhio è molto sensibile alla luce, e sente nel medesimo un continuo prurito accompagnato da puntura, calore, e dolore, ora più forte, ora più mite. Il polso è duro, e di sovente febbrile. Nello stato più violento dell'oftalmia, ossia nella *chemosi* la congiuntiva diviene gonfia tanto nella parte interna delle palpebre, quanto sulla stessa sclerotica, ed intorno la cornea lucida. Tutti questi sintomi variano per altro secondo il grado dell'infiammazione, ed in generale sono molto più intensi nell'oftalmia acuta, che nella cronica.

Le cagioni dell'oftalmia sono tante, e sì varie, che quasi impossibile il numerarle tutte. Oltre le generali delle infiammazioni molte ne esistono particolari per l'occhio, e che meritano speciale considerazione. Queste si possono dividere in esterne,



ed interne. Alle esterne appartengono le percosse o violenze esteriori, ed i corpi estranei, che irritano l'occhio, e la luce forte, l'applicazione portata troppo a lungo, e simili altre cagioni. Alle interne poi appartengono precisamente la retrocessione di umori morbosi, e la metastasi di altra malattia segnatamente esantemi, o imperigini, il vizio venereo, scrofoloso, erpetico &c. e così ancora varie altre malattie, che possono rendere male affetti gli occhi, o le parti vicine, come il vajuolo, la rosalia, ed altre simili. Una delle cagioni più comuni dell'oftalmia, e che merita molta attenzione si è il già nominato vizio venereo, ma è necessario in questo caso esattamente distinguere l'oftalmia dipendente da cotesto vizio generale, o lue confermata da quella, che nasce dalla gonorea retrocessa. Dalla diversità delle cause della malattia, si forma una prognosi diversa, ed un vario metodo di cura.

Per quello che appartiene alla prognosi dell'oftalmia sebbene generalmente parlando questa malattia non sia nè pericolosa, nè mortale, pure non per questo è alle volte dessa grave, e produce delle conseguenze considerabili. Se l'oftalmia è semplice si risolve facilmente, e non ha alcuna sequela pericolosa, se per altro essa sia grave, o accompagnata da sintomi più forti, non è tanto facile la sua cura, nè tanto sicuro il suo esito. Due cose sono il nostro sentimento da considerarsi per formare una giusta prognosi di queste gravi oftalmie, primo cioè le cagioni, che l'hanno prodotte, e secondariamente le altre malattie, che possono esserne le conseguenze. Se la infiammazione dell'occhio venga cagionata da vizio venereo, scorbutico, scrofoloso, o da retrocessione di una qualche seria malattia segnatamente esantematica è chiaro, che dessa sarà

più grave, e di cura più difficile, che quando conosca una cagione locale o esterna, o una generale. Riguardo poi agli effetti dell' oftalmia se la medesima sia di quella specie capace di durarli, può lasciare nell' occhio dei vizj, che consistono delle malattie totalmente particolari, come le macchie della cornea, l'albugine, lo pterigio, l'ipopio &c., delle quali parlerassi a suo luogo. Ma non può ancora venire la perdita totale della vista. Quello che devesi in generale riflettere secondo la nostra divisione si è, che l' oftalmia acuta è più grave, e pericolosa della cronica, ma che all' opposito questa è più difficile a guarirsi dell' altra. Riguardo poi all' oftalmia idiopatica, e sintomatica, ognun vede, che trattandosi della prima dovrà determinarsi il grado, e riferirlo a quello, cui la farà inguere in acuta, o cronica, e parlando della seconda potrassi regolare la prognosi giusta la malattia principale.

La cura dell' oftalmia è forse delle più difficili di quelle delle altre malattie degli occhi attesa la natura, che presenta cotesta malattia stessa. La base generale della cura deve consistere nel procurare la risoluzione dell' infiammazione, se l' oftalmia sia idiopatica, e questo si ottiene con il metodo antinfiammatorio, di cui già si è parlato trattando delle infiammazioni in generale, quale anderemo adattando alla malattia di cui parliamo. Qualora poi l' oftalmia sia sintomatica, ovvero dipendente da altre malattie, la cura maggiore dovrà essere diretta secondo l' indole della malattia, che l' ha prodotta.

Nell' oftalmia idiopatica convengono quindi gli emollienti locali, la dieta tenue, ed i minorativi, e questa è accompagnata da leggera febbre riesce molto vantaggioso una soluzione di sale ammoniacale e tartaro emetico amministrata internamente.



Se poi la malattia dimostri un carattere più maligno, e non ceda ai metodi accennati si richiede l'uso dei salassi replicati secondo l'indole della medesima, ed il temperamento del paziente, a cui pottrassi unire l'uso interno del nitro, e fintanto che esiste una vera infiammazione gli emollienti locali in forma di cataplasma, come quelli di polpa di mele, e di zucchero candido, le frequenti lavande dell'occhio con decotto di foglie di malva, ed altri simili si rendono molto giovevoli per il grado dell'oftalmia di cui si parla. Terminato questo grado della malattia si può passare all'uso dei collirj formati di decotto di malva, e pochissime gocce di spirito di vino, a questo finalmente si potrà unire secondo il consiglio dei migliori pratici l'uso dei vescicanti dietro le orecchie, o al collo, o anche nei casi più gravi il setone alla nuca, che viene da tutti riconosciuto per uno dei rimedj i più energici nelle gravi malattie degl'occhi. Nei casi di violenta oftalmia, o nel suo massimo grado detto *phlogosis* possiamo eziandio ricorrere, oltre gli emollienti locali, ed i replicati salassi generali, anche ad una deplezione locale, o per mezzo di una quantità di sanguisughe applicate intorno all'orbita, o secondo il consiglio di alcuni pratici con delle sacrificazioni nella congiuntiva fatte con uno scopettino particolare inventato a questo oggetto. L'uso però di cotesto istromento porta sempre notabili inconvenienti, che meritamente è stato prosritto, e se mai si rende necessaria la recisione dei varicosi della congiuntiva si preferisce l'istromento tagliente, che dai recenti scrittori si creò uno dei rimedj più energici particolarmente nei casi di grave gonfiore della medesima, o nell'oftalmia così detta angolare.

Una delle cose principali, che deve aversi



nella cura dell' oftalmia si è quella di rimuoverla, come abbiamo detto le cagioni, che l'hanno prodotta, e quindi si dovrà avere riguardo particolare, affinchè il malato s' allontani da qualunque causa irritante l'organo della vista, e precisamente dalla forte luce.

Per quello che s'appartiene ai medicamenti locali, nel primo stadio della malattia, ossia nel periodo infiammatorio, nulla vi è d'aggiungere a quanto abbiamo già sopra detto, e secondo ancora le indicazioni generali, che abbiamo dato parlando dell' infiammazione. Qualora poi sia calmato questo stato, continui tuttavia il male per una specie di irritazione della parte, si richiede necessariamente l'uso di qualche attonante, come le preparazioni di opio, o di sali vitriolici, e perfino anche il laudanum. Il precipitato rosso, il vitriolo vermiglio, il mercurio sotto varie forme si sono eziandio trovati rimedj molto vantaggiosi nelle oftalmie infiammatorie. Non abbiamo qui bisogno di accennare, che le oftalmie prodotte dall' esistenza di corpi estranei nell' occhio, l'estrazione dei medesimi è il metodo conveniente per la cura della malattia, e che un emolliente locale per dissipare l'irritazione che ivi si è formata.

Accennata così brevemente la cura dell' oftalmia infiammatoria in generale rimangono alcuni avvertimenti da darsi sulle varie specie, e complicazioni della medesima, che esigono un metodo di cura particolare, e che la possono rendere idiopatica o sintomatica, come qui appresso vedremo. Alcuni Autori ammettono l' oftalmia gastrica, dipendente da saburra delle prime vie. Quando non essendo, che sintomatica, si riconosce facilmente a segni gastrici coesistenti, e quindi facile il metodo di cura procurando di to-

gliere le saburre gastriche per mezzo degli emetici, e minorativi secondo le forze, ed peramento del paziente, localmente servir sole fomentazioni emollienti, e qualora, come sovente, si formi qualche ascesso nelle palpebre, è necessario farne l'apertura. Questa specie di oftalmia è quasi sempre di natura erisipelacea, essendo spesso accompagnata dall'erisipela della faccia, ed è molte volte epidemica. Oltre la gastrica può essa ancora riconoscere la sua causa da un vizio nel sistema biliare. Siccome in questo caso l'oftalmia non diversifica punto dall'ordinaria, e può assumere i due gradi di leggera cioè, e violenta, quindi richiede lo stesso metodo di cura, eccetto, che si deve aver riguardo al sistema bilioso attaccato. Se questa sia periodica, come sovente accade, si richiederà l'uso della china.

La seconda specie di oftalmia, che particolarmente dee considerarsi, e che può essere idiopatica, si è l'*angolare*, o *varicosa*. Il suo nome deriva dall'essere la medesima situata costantemente nell'angolo dell'occhio, e viene formata da una proliferazione di vasi varicosi. La cornea trasparente intorbidata da una leggera opacità detta *membrana*, la quale vi si mantiene dai detti vasi, e recedendo si dissipa la macchia stessa. Prima di questa recisione si può far uso con vantaggio degli attonanti, e stimolanti, essendo essa di natura cronica. Fra questi si annoverano principalmente le preparazioni vitrioliche, e particolarmente l'aceto di rame, col quale si fanno dei Colliri in una proporzionata quantità d'acqua. Se questo metodo sia insufficiente, non vi sarà altro rimedio, che quello di recidere li sudori varicosi, lo che produce un salasso locale,

di essere seguito come abbiain detto da un effetto. Per recidere codesti vasi, è di me-  
collevarli con una pinzetta, e poi tagliarli con  
bice. Si procura l'esito del sangue con delle  
tazioni calde, e si lava in seguito l'occhio con  
lij attonanti per restituire la forza alla con-  
va.

Oftalmia *flemmofosa* merita eziandio essere con-  
ta particolarmente. Essa si è chiamata ancora  
nazione interna, atteso, che attacca le parti  
e dell'occhio, come l'iride, l'uvea, e la ca-  
del cristallino. Questa specie d'infiammazione  
particolare, che termina quasi sempre per  
tazione. I sintomi, che l'accompagnano sono  
a poco i medesimi delle altre specie, eccet-  
si sviluppano generalmente con maggior in-  
, e si rileva, che le parti interne sono af-  
iù che nelle altre oftalmie, conoscendosi di-  
ente l'iride più rossa, e la pupilla ristetta.  
sta infiammazione si risolve, lo che per al-  
cade ben di raro, ne nasce sempre un qual-  
sordine nelle parti interne dell'occhio, co-  
aratta, amaurosi, ipopio, ed in questi casi  
re non potrebbe dirsi vera risoluzione; poi-  
l primo caso corrisponderebbe a quella termi-  
e dell'infiammazione, che dicesi indurazione  
ondo ad una metastasi, e al terzo ad una  
tazione. Per quello, che appartiene alla cura  
alattia, nulla si può aggiungere a quanto ab-  
detto trattando dell' oftalmia, e delle in-  
zioni in generale adattando per altro il tutto  
o dell' oftalmia. Qualche Autore propone il  
, come assai vantaggioso in questa specie di  
a per prevenire la diminuzione, e perdita  
ista, che ordinariamente ne siegue.

Oftalmia *venerea* è sintomatica, e si distingue



conseguenze di questa oftalmia sono com-  
piuttosto gravi, poichè può nascerne o  
della cornea, o la suppurazione dell' occhio  
toma più costante di questa specie di oft-  
lo scolo dall' occhio di un umore di natu-  
a poco simile a quello, che scola dall' ure-  
casione di blenorragia. Alcuni Autori soste-  
che non esiste realmente questa sorta di o-  
ma che essa ha luogo soltanto qualora  
l'occhio con le dita intrise nel fluido, che s-  
uretra nella blenorragia, la maggior parte  
servazioni sembra peraltro dimostrare il co-

Il metodo migliore per la cura di qu-  
lattia si è quello di richiamare al più prest-  
lo, la di cui soppressione ha causato l'of-  
quindi molti consigliano l'uso delle cand-  
quali introdotte nell' uretra sono spesso  
ad irritare la medesima in modo da ripro-  
scolo gonorroico, il quale diminuisce con-  
mente l'infiammazione. Convieni per altro-  
re, che il ritorno dello scolo non sempre  
duce la perfetta guarigione, ed inoltre,  
delle candelette, o delle adattate injezion-  
casi non è praticabile attesa la sensibili-  
grande dell' uretra, la quale occasione

diluenti, ed i bagni detti pediluvj, onde  
 mare il flusso gonorroico. Per quello che ri-  
 la la cura locale si faranno delle lavande all'  
 o, e si potrà mescolare nelle medesime una  
 one di mercurio, eccetto, che nello stato in-  
 natorio, nel qual caso sarebbe imprudente l'am-  
 trare questo rimedio sia localmente, sia inter-  
 nte, o in frizioni, e quindi non si deve esso  
 erare, che nel caso abbia la malattia preso un  
 ere cronico. Una delle cose, che si rende spes-  
 ecessaria nella oftalmia di questa specie si è la  
 ficazione, o il taglio della congiuntiva, radu-  
 osi di frequente sotto la medesima la materia  
 otrogica, che anzi viene ancora da molti consi-  
 a l'apertura della cornea, se il pus si stravasi  
 a camera anteriore dell'occhio. In caso, che  
 reda poi necessario l'uso del mercurio, quello  
 moso adoperato localmente in collirio sarà il  
 dio più utile, ed adattato.

L'oftalmia venerea prodotta da una lue gene-  
 dicesi dagli Autori *oftalmia sifilitica*, e questa  
 ordinariamente dopo l'apparenza di molti sin-  
 di lue, come bubboni, ulceri, dolori vene-  
 te. Questa specie di oftalmia sembra simile alle  
 , ma la coesistenza de' sintomi di lue venerea,  
 tinazione della malattia stessa, che non cede ai  
 j ordinarij, e spesso produce gravi consequen-  
 ono segni sufficienti per farla distinguere dalle  
 specie di oftalmia. Una delle conseguenze le  
 ordinarie dell'oftalmia sifilitica si è quella di  
 rre dei disordini nelle parti interne dell'oc-  
 dai quali nasce soventemente la perdita della

a cura di cotesta malattia consiste nell'uso  
 ercurio, e questo medicamento guarisce facil-  
 l'oftalmia sifilitica, la quale non è che un  
*om. II.* *d*

sintoma della lue generale. Convien per altro avere alcune particolari considerazioni nell' uso dell'anzidetto medicamento, posciachè non di raro il medesimo produce l'esacerbazione della malattia cagionando una troppo forte irritazione, e quindi siamo sovente obbligati a tralasciarne l'uso, e ricorrere ai debilitanti, anzi sarà molto prudente il permettere qualche salasso, e purgante alla cura mercuriale, come altresì l'amministrare internamente dell'opio, se la malattia è accompagnata da forte dolore.

Molto più difficile è il curare l'oftalmia sifilitica, quando la lue non sia ancora comparsa generalmente con i suoi ordinarij sintomi, o non vi siano segni di lue generale. Allora essendo difficile conoscere la cagione della malattia è ancora meno agevole il metodo di cura. L'esame esatissimo dell'affezione preceduta, e di tutto ciò, che riguarda la salute del malato, può solo dar qualche lume, ma un sintoma, che tutti gli Autori danno come sicuro, e caratteristico di questa specie di oftalmia si è quello, che essa diviene più dolorosa durante la notte, come appunto accade in quasi tutti i sintomi di lue. Qualora il Cerusico dopo questi esami siasi assicurato della natura venerea della malattia, il mercurio, e segnatamente il gommoso sciolto nel latte, o il sublimato localmente, e questo, e altra preparazione internamente adoperata, sarà il rimedio conveniente, e unico per la medesima.

L'oftalmia *scrofolosa* è sempre riunita ai sintomi, che caratterizzano le scrofole, e quindi non di diagnosi difficile. Essa è ordinariamente di carattere cronico come è appunto la malattia, che produce, di cui n'è un sintoma, e non richiede altro metodo di cura, che quello, che si adopera generalmente contro le scrofole riunendovi sempr



alche medicamento locale, che possa aver luogo  
za essere opposto all' indicazione generale. Que-  
specie di oftalmia è ordinariamente di cura molto  
ga, e difficile, e spesso produce dei disordini  
ll'occhio stesso, come ulceri, macchie della cor-  
a, stafiloma &c. e perfino la perdita della vista.  
acqua di calce, e la China amministrata interna-  
nte sono i rimedj stimati i migliori in questa spe-  
di oftalmia. A questi rimedj generali si potrà  
giungere localmente l'uso del vitriolo di marte,  
lla tintura tebaica, l'antimonio, ed altri simili sti-  
lanti, i quali si adattino ai diversi caratteri, che  
esenta la malattia medesima, come per esempio indi-  
to sarà l'uso dell' acqua fredda, se conoscesi nella  
arte affetta un eccessivo sviluppo di calore.

Se l'oftalmia dipenda da un vizio erpetico do-  
nante nella macchina sarà sempre accompagnata  
una eruzione erpetica sul volto, o altrove, e  
olte volte si osserva, che l'oftalmia succede nei  
si, in cui per mezzo di rimedj stimolanti, e ri-  
troussivi siasi ottenuta la retrocessione dell' Erpete.  
oftalmia erpetica è molto ostinata, e di raro gua-  
sce perfettamente, portando seco sovente la caduta  
elle ciglia. Il metodo di cura conveniente in que-  
malattia consiste ne' rimedj generali adattati a  
larire la cagione della medesima. I bagni otter-  
mo il primo luogo, indi i diaforetici &c. Qualche  
utore protesta aver ricevuto molto vantaggio dall'  
o dell' emetico, e dalle ulceri artefatte. Se tuttociò  
basti nell' oftalmia prodotta da altre malattie  
anee retropulse come la *psora* si è anche tenta-  
ma inutilmente la nuova comparsa della malat-  
mediante un replicato contagio, ma più effica-  
si è l'uso esterno del linimento formato di vi-  
lo bianco, fiori di solfo, bacche di lauro, ed  
di lino.

purganti. Questi purganti vanno amministrati al terzo, e quarto stadio della malattia, ed a po finita la medesima. Fra essi principal luogo il calomelano, ed il vino antimoniat

La suppurazione dell'occhio è una malattia che nasce comunemente in seguito dell'oftalmia e che consiste nella formazione di una massa, e biancastra tirante al giallo: abbenchè recenti, i quali hanno scritto sulle malattie degli occhi, non venga quest'umore tenuto per vicia; ma piuttosto per una linfa concreta, e sata prodotta dall'inflammazione stessa come aver luogo in molte infiammazioni di altre parti del corpo umano. Da molti Scrittori di Chirurgia si è dato a questa suppurazione il nome di *empima* in qualunque parte dell'occhio si trovi la materia purulenta. Altri per lo contrario hanno riservato il nome d'*ipopio* soltanto per l'ascessa interna dell'occhio, *ovice* hanno chiamato la suppurazione, che accade fra le lamine della cornea, e finalmente la suppurazione di tutto il bulbo dell'occhio distinta col nome di *empiema* dell'occhio.

Noi accenneremo qui per maggior esat

La prima specie è quando la materia purulenta che si forma si trova nella sostanza della congiuntiva, che investe la cornea, la seconda se essa ormi fra la cornea lucida, e la congiuntiva, che la ricuopre, la terza specie è quella, in cui la suppurazione accade fra le lamine della cornea stessa, quarta è la suppurazione, che succede nella camera anteriore, e la quinta finalmente quella, che nasce nella camera posteriore. Di queste due ultime specie da qualche scrittore di Chirurgia se ne forma una soltanto riferibile all'ipopio; come egualmente noi diciamo potersi riunire le tre prime in una sola specie, essendone ben piccola la differenza, ed eguale la cura.

I sintomi della suppurazione dell'occhio sono vari secondo la sede della medesima. Se essa abita nel luogo nella superficie esterna della cornea, si vede ineguale, e forma delle piccole prominenze in vari punti della medesima, e ciò nasce dall'alterazione della sostanza stessa della congiuntiva. Se la suppurazione esista fra le lamine della cornea, e la congiuntiva, che la ricuopre, la malattia compare sotto la forma di un ascesso, ch'è molto piccolo, bianco, ed acuminato. Qualora sia fra le lamine della cornea stessa, e che si è distinta da molti, ne abbiamo detto col nome di onice, apparisce come la precedente sotto la figura di un tumore, o ascesso biancastro, ma assai più appianato di quello, che si forma fra la cornea, e la congiuntiva, ed alle volte cangia di luogo, e premendosi l'ascesso medesimo si osserva, che muta di figura. In ogni volta che la suppurazione esista nella camera posteriore, si vede spesso, che la materia occupa l'interior parte di essa in forma di mezza luna, e non raro si estende in tutta la camera anteriore ricoprendo affatto l'iride. Questa specie di suppurazione



queo, ed il cristallino, e soventemente anche la membrana del vitreo, ed il paziente perde intiera la vista.

Due altre specie particolari di ipopio sono essere eziandio menzionate, la prima delle quali è quella chiamata ipopio spurio, che consiste nella formazione di un umore puriforme, che si genera da se stesso nell'occhio, senza che quivi si generazione di materia purulenta sia preceduta da alcuna oftalmia, e che quindi si è chiamata ipopio spurio. La seconda specie si chiama ipopio metastatico così detto, il quale dipende dallo spargimento di un umore non puriforme, ma è piuttosto dipendente dalla metastasi di un umore. Questa specie osservasi nelle puerperose &c., ed esso è molte volte periodico.

La cagione più frequente dell'ipopio è la purazione dell'occhio è l'oftalmia acuta, e siccome si è qui sopra accennato può esso ancora molte volte dipendere da un umore portato da altre parti per le metastasi. Ciò ha luogo segnatamente per la effusione di quello vajuoloso, della tigna, del morbo nereo &c., e può finalmente dipendere anche

turalmente senza bisogno degli ajuti dell' ar-  
 to accade qualora esista la marcia nella so-  
 della congiuntiva , o fra essa , e la cornea ,  
 fra le lamine della cornea stessa . Se poi la  
 zione esista nell' interno dell' occhio , allora  
 ttia è molto grave , e porta seco alle volte  
 o la perdita della vista , ma ancora quella  
 chio medesimo ; anzi può eziandio se siano  
 i sintomi , porre in rischio la vita del ma-  
 roducendo delirj , convulsioni &c.

cura della suppurazione dell' occhio , o dell'  
 deve essere principalmente diretta secondo  
 ni , che l' hanno prodotta , e secondo le spe-  
 ssa . Giusta questi principj la cura deve con-  
 nel procurare di diminuire l' infiammazione se  
 e coadiuvare al riassorbimento della marcia ,  
 i esito ogni volta che sia necessario . Que-  
 otterrà in primo luogo cogli emollienti lo-  
 sando in seguito agli attonanti , onde riani-  
 zazione degli assorbenti , e procurare la riso-  
 della marcia . L' operazione di aprire l' asces-  
 occhio dovrà evitarsi per quanto è possibi-  
 dovrà indispensabilmente praticarsi ne' casi ,  
 si riconosca per consenso affetto il cerebro ,  
 in pericolo la vita del malato .

la prima indicazione si porranno in opera  
 tanti , fra i quali ottengono il primo luogo  
 i , supposto che esista ancora una vera in-  
 zione , i quali debbono essere tanto generali ,  
 locali , ma questi riserbati per ultimi , cioè  
 le coppe scarificate alla nuca , o con molte  
 e alle tempia . All' uso dei salassi si potrà  
 quello de' minorativi adoperati secondo il tem-  
 po , e lo stato del paziente . Nello stesso tem-  
 necessario di far uso de' sedativi locali , e que-  
 ano principalmente gli emollienti , come per

esempio, i decotti di fiori di malva, di radica di altea, i pomi bolliti, e simili. In seguito i vescicanti applicati dietro le orecchie, ed alla nuca saranno molto profittevoli tanto per derivare dall'occhio l'umor, quanto per facilitarne il riassorbimento. Quando l'infiammazione sia cessata, o sia molto mitigata si potrà passare all'uso degli attonanti, i quali serviranno alla seconda indicazione. In questo stadio della malattia si usa con molto vantaggio un'infusione di fiori di malva, e poche gocce di spirito di vino, indi quest'ultimo si può unire ad una qualche decozione tonica. L'uso del vitriolo, e della canfora si stima in cotesto caso dai pratici molto vantaggioso. La decozione di china con l'estratto di Saturno è stata da altri consigliata come utile, e così ancora le decozioni di piante aromatiche, ed i sacchetti delle medesime erbe applicate alla parte.

Se ad onta di cotesti metodi il pus non venga riassorbito, o sia in troppa gran quantità, è necessario di dargli esito per mezzo dell'operazione. Molti Scrittori di Chirurgia sostengono, che sia meglio di lasciare, che la suppurazione venga da se stessa a formare l'apertura del piccolo ascesso, purchè l'esistenza delle marce non produca mai dolori violenti, e non è così facile dar esito alle medesime. Per altro si sono al presente riconosciute per insussistenti queste ragioni, ed i migliori pratici consigliano ne' casi, in cui come si è detto venga segnatamente affetto il sensorio comune, di ricorrere al più presto possibile all'operazione, molto più che l'apertura dell'ascesso fatta in tempo, è l'unico mezzo sicuro onde conservare la vista almeno in parte, e non rendere tanto deforme il globo dell'occhio. Una delle difficoltà, che s'incontrano in tale operazione si è quella, che dipende dalla consistenza della materia contenuta, e quindi varj met



ti proposti per dar esito alla medesima, se-  
nte qualora essa si ritrovi nella camera po-  
. Noi non istaremo quì ad esaminare cote-  
rsi processi, ma esporremo soltanto quello,  
liamo il più preferibile. Questo consiste nell'  
della cornea trasparente. Tale apertura de-  
te alquanto grande per dar esito alla marcia,  
inariamente è assai densa, si fa questa aper-  
lla stessa maniera, che si opera per estrarre  
cristallina nell' operazione della cataratta,  
dire tagliando la cornea nella sua parte in-  
ed allora la cicatrice non resta incontro alla  
, e non è d' impedimento alla vista. S' in-  
il coltello ordinario da cataratta, e si ta-  
la cornea nel luogo accennato. Non esce con-  
il solito tutta la marcia nel momento dell'  
one, essendo essa il più delle volte assai densa,  
condo il consiglio di migliori pratici non è  
rio, ma è piuttosto dannoso di affatigare l'oc-  
n delle iniezioni, o compressioni, onde pro-  
l'esito della marcia, molto più che questa  
a poco va ad escire da se medesima senza  
di alcun ajuto dell' arte. Altro non devesi  
l Cerusico, che visitare spesso l'occhio, e  
vede, che la ferita si sia chiusa, lo che si  
dall' osservarsi la marcia nella camera ante-  
e dal non vedersi la medesima nell'apparec-  
si deve nuovamente riaprire la ferita con lo  
metodo indicato.

Terminare tutto ciò, che riguarda la sup-  
one dell'occhio, fa di mestieri accennare il  
curativo, che conviene nell' ipopio sintoma-  
o altrimenti detto spurio.

l'ipopio sintomatico non richiede cura diversa  
lla, che si pratica per la malattia principa-  
specie più comuni di questo ipopio sono la

venerea, la vajuolosa, l'artritica &c. Molte volte nasce ancora da deposizioni lattee, da quelle di mercurio, e in seguito di febbri acute. E' chiaro, che in cotesti casi il metodo di cura deve principalmente consistere nel togliere la cagione principale della malattia, non lasciando però nello stesso tempo di porre in uso i rimedj locali, e segnatamente l'operazione, se rendesi necessaria come abbiamo di sopra accennato.

L'*Idroftalmia* è una malattia consistente nell' tumefazione dell' occhio con protuberanza prodotta dall' accumulamento di un umore, di cui esso è ripieno. Questo umore non è sempre l'umore acqueo, che per la sua troppa gran quantità distende la cornea lucida, ma è una degenerazione di tutti gli umori dell' occhio, e principalmente dell' umor vitreo, che muta consistenza diventando più fluido, e nello stesso tempo crescendo in quantità.

Sono state ammesse da' Professori varie specie di questa malattia secondo la qualità dell' umore che costituisce la medesima, e secondo il luogo, ch' esso occupa. Quindi è, ch'è stata distinta l'*idroftalmia* in anteriore, e posteriore, la prima delle quali viene prodotta dall' umor acqueo, che si raduna in gran copia, ed allora la malattia dimostra esistere principalmente nella camera anteriore; poichè la cornea lucida più prominente, e distesa si presenta, non che più allontanata dalla pupilla. Se poi la medesima nasca da una maggior quantità dell' umore vitreo, il quale oltre di ciò muti consistenza, in tal caso l'*idroftalmia* viene detta posteriore, e si osserva l'iride spinta in avanti presso la cornea, e la pupilla immobile.

I sintomi, che accompagnano l'*idroftalmia* sono i seguenti. Se la malattia sia di natura cronica i suoi progressi sono assai lenti, e l'occhio non



enta di volume, che insensibilmente. Sul primo sente il malato un senso di peso, e stiramento e tensione nell'occhio. I moti del medesimo sono assai difficili, e la vista diviene egualmente scaturata. Il globo dell'occhio si mostra più gonfio e più duro, che nello stato naturale. La pupilla diviene di maggior diametro, e non è più così mobile, la lente cristallina principia col divenire opaca, ed indi ancora a sciogliersi, e quindi viene a mancare intieramente la vista, si accresce il dolore del globo dell'occhio, si tumefà straordinariamente, ed i dolori si propagano alle parti adiacenti: nasce un flusso di lagrime, la superficie della cornea restando esposta continuamente all'aria non può più essere ricoperta dalle palpebre, e vedendo continuamente irritata dalle ciglia viene ad infiammarsi, e questo si unisce ancora ad accelerare la perdita della vista, se questa non sia già del tutto perduta. L'infiammazione viene eziandio ad occupar il tarso della palpebra inferiore.

Le cagioni dell'idroftalmia sono molte, e vaghiacchè ad esse si possono riferire tutte le cause capaci di produrre una raccolta di umore acquoso in una data parte. Ordinariamente essa attacca i bambini di tenera età, e quelli più adulti, ma a differenza coloro i quali sono dotati di un temperamento pituitoso, o vivono in luoghi, che favoriscono questa disposizione, come per esempio, in climi umidi. Le percosse esterne sull'occhio, e le infiammazioni del medesimo, segnatamente quelle da vizio interno, come per esempio, venerea, scorbutico, e scrofoloso sono sovente la causa dell'idroftalmia. In generale può ammettersi per cagione prossima di questa malattia l'accumulo in tutte le raccolte di linfa, che accade nelle varie parti del corpo umano, la mancanza dell'assorbimento dell'umore linfatico, e per con-



seguenza si può ripetere dallo stato viziato de' assorbenti indeboliti, ristretti, ovvero ostrutti, siano. Perciò alcuni Autori credono, che le cagioni dell'idroftalmia si possano ridurre a tre classi, esse producono una ostruzione nell'occhio, o debolezza, o finalmente uno stimolo maggiore naturale.

La prognosi dell'idroftalmia è generalmente poco favorevole. La malattia è per se stessa molto vece, e di raro curabile, poichè per solito termina nella perdita totale della vista. L'opacità del cristallino, i vizj della retina, l'infiammazione del globo dell'occhio ne sono le conseguenze. Vi sono d'ordinario esempi d'idroftalmia degenerata in cancro, e suppurazione prodotta dalla medesima, che hanno dato per conseguenza la carie delle ossa del cranio. L'idroftalmia posteriore è generalmente assai grave dell'anteriore. In genere la cura è assai difficile, e quasi impossibile sì è il prevenire la recidiva.

Per la cura della malattia si sono proposti molti rimedj, ma sebbene generalmente essi riescono poco efficaci ciò non ostante crediamo necessario far riflettere, che il calomelano amministrato internamente, ha agito mirabilmente in alcune malattie della stessa natura dell'idroftalmia, abbenchè non fossero conseguenza di affezione venerea; così ancora dicasi dell'uso interno della digitale purpurea o della digitale epiglottide in questa malattia. I purgativi, gli emetici, i derivativi applicati alle parti vicine, come setone, vescicante &c. sono stati in questa distintamente raccomandati, ma non tutti sempre seguiti da successo fortunato. Può essere di sommo vantaggio il richiamare alla cute la malattia esantematica retrocessa, o il combattere il vizio esistente nella macchina, quale si abbia il fondamento di credere essere stata la cagione della malattia.

I collirj risolvanti, i quali possono eccitare l'azione de' vasi assorbenti in genere convengono nell'oftalmia. La punzione della cornea è una operazione creduta necessaria, e da molti praticata con qualche successo, secondo quello, che essi dicono, per altro noi poniamo mente a quanto ne han detto i migliori pratici resteremo convinti, che questa operazione non è sufficiente per guarire la malattia, giacchè non è la sola quantità di umore causa di essa, ma il vizio o nel medesimo, o nei solidi. La punzione o taglio della cornea altro effetto non produce, che quello di evacuare il globulo dell'occhio dando esito all'umore acqueo, ma non restituisce al rimanente del medesimo quella qualità, di cui esso deve esser fornito, acciò l'occhio sia in istato sano. I dolori si rendono alle volte tanto violenti, che il Professore si trova obbligato ad aprire il tumore per dare qualche sollievo al paziente; essendo una cosa molto dannosa per il malato di aspettare, che il tumore si apra naturalmente, mentre in cotesto caso la malattia farebbe de' progressi, che potrebbero produrre delle conseguenze pericolose, ed il malato soffrirebbe innumerevolmente de' dolori molto violenti.

Riguardo alla maniera di praticare tale operazione alcuni propongono di pungere la cornea, questo per mezzo di un piccolo troicart, altri dicono miglior metodo quello d'incidere la sclerotica stessa; noi per altro crediamo, che nell'idroftalmia anteriore sia sufficiente l'apertura della cornea lucida, come abbiain detto per la suppurazione dell'occhio; che se poi l'idroftalmia sia posteriore ed i dolori siano molto grandi, e che dai sintomi si comprenda essere alterata l'interna struttura dell'occhio, allora converrà vuotare il medesimo tagliando circolarmente tutta la convessità del,

la cornea, e così impedire, che l'infiammazione paghi al cervello. L'incisione si principia dal globo esterno all'interno, servendosi del bisturi di cui si fa uso nell'operazione della cataratta, ed introdotto il medesimo si deprime, onde si taglia recisa tutta la circonferenza inferiore della cornea. Si alza indi il lembo di questa recisa, e si taglia ancora superiormente. Portata via la cornea trasparente, ed uscito l'umore, si medica l'occhio con delle sfilas, e dopo alcuni giorni si chiude l'occhio lasciando una concavità, alla quale si rimette un occhio di vetro.

Può accadere, che in seguito di aver fatta cotesta operazione si riempia l'occhio di nuovo, o che da questo s'innalzi della carne, o che la quale se non cede all'uso esterno della cataratta, o simili, per lo che si può dubitare dell'esistenza di carie nell'orbita, o che minacci la distruzione della parte in un cancro, ed in allora l'operazione del globo dell'occhio non dovrà esser esitata.

Il prolasso di quest'organo ha ricevuto molti nomi, e si è detto *exoftalmia*, *oftalmofrosi*, *bulbo ec.* Ma tutte queste denominazioni significano, se non che l'esito dell'occhio fuori della cavità dell'orbita. Molti Scrittori di Chirurgia hanno confuso sotto queste denominazioni varie specie di malattie totalmente diverse fra loro, e hanno compreso ancora sotto il nome di *exoftalmia* que' casi, ne' quali l'occhio gonfia straordinariamente per caso di idroftalmia, staffiloma, o altre malattie, che l'accrescono di volume, è obbligato a uscire dalla sua cavità, altri poi distinguono que' casi, riserbando il nome di *exoftalmia* a que' soli, ne' quali l'occhio è obbligato ad uscire dalla sua cavità pel suo volume accresciuto morbosamente.



mando poi prollasso dell'occhio quei casi, in esso quantunque in istato sanissimo esce dall'orbita per una qualunque di quelle cagioni esterne, esporremo in seguito. Quando il globo dell'occhio è uscito dall'orbita resta ordinariamente sull'empia, o sulle guance, ed il malato perde la facoltà di vedere, quantunque osservansi de' casi, ne' quali sebbene l'occhio sia uscito dall'orbita, e quindi il nervo ottico, ed i muscoli siano molto stirati, ciò non ostante resta un qualche grado di facoltà visiva.

Gli Scrittori di Chirurgia ammettono comunemente tre cagioni del prollasso del bulbo, e sono le percosse sulla testa, i colpi sull'occhio, e le crescenze nell'orbita stessa, se poi vogliamo considerare sotto il nome di exoftalmia ancora quei casi in cui l'occhio esce dalla propria cavità per accrescimento del suo volume, dovremo ammettere per cause della malattia tutte quelle, che danno origine ad un ingrossamento preternaturale del bulbo. A queste cagioni possiamo aggiungere ora la paralisia de' muscoli retti dell'occhio, e può generare il prollasso del bulbo. Questa malattia viene molto raramente prodotta dalle percosse esterne sulla testa, ma non è così della seconda cagione della medesima. Non è raro, che i colpi sull'occhio producano il prollasso del bulbo, e segnatamente qualora essi siano dati con degli strumenti abbastanza sottili per poter penetrare fra il globo dell'occhio, e le pareti dell'orbita.

La malattia è varia secondo le diverse cagioni che l'hanno prodotta. Qualora sia dedita cagionata da percosse sul capo, non è necessario avvertire che queste offese se sono capaci di formare il prollasso del bulbo, debbono necessariamente essere ancora degli altri sintomi assai più gravi,

e pericolosi. Nel caso, che il prolasso venga causato da una percossa sull'occhio stesso, secondo la natura di questa, converrà giudicare del pericolo della malattia. Ordinariamente in questi casi il globo dell'occhio soffre una forte contusione, e lo stesso accade nelle parti adiacenti, qual cosa deve essere presa in considerazione. Alcune volte resta per la posizione dello stromento, che ha costituito il prolasso, fra l'orbita, ed il globo, e può cagionare i de' gravi danni, e può per esempio forare l'orbita, e penetrare fino al cervello, e rendersi così molto pericoloso il caso, come ancora è grave se lo stromento penetri ne' seni mascellari, o nel naso. Riguardo poi al prolasso del bulbo, conseguenza del gonfiore dell'orbita stessa, sia esso nel tessuto orbitulare, come per esempio un ascesso ec. sia nelle ossa, come un esostosi, il prolasso accade a poco a poco, ed il pericolo è proporzionato alla natura della malattia, ma spesso termina essa con la perdita della vista, mentre nei casi di prolasso prodotto per violenze esterne essa molte volte si ricupera.

La cura del prolasso dell'occhio consiste nel rimettere il globo nella sua naturale situazione, e mantenervelo per mezzo di una leggiera pressione. In genere poi ad oggetto di ciò conseguire saranno molto giovevoli delle faldelle di stoppa finemente bevute nel bianco d'uovo con un astringente, per esempio, un poco di allume, le quali si lasceranno per qualche giorno sopra le palpebre.

Non è peraltro sempre sufficiente il riportare il globo dell'occhio nella sua cavità se non si toglie nello stesso tempo la cagione prossima della malattia. Se cotesto prolasso sia stato prodotto da una causa locale, come per esempio, da un ingrossamento preternaturale, o scirrosità della glandola lagrimal



da un tumore di qualunque specie esistente nell'orbita stessa, da un ascesso nel seno mascellare ec. è necessario di procurare l'estirpazione di questi tumori, o l'apertura dei medesimi, senza di cui tentamenti si renderebbe inutile la reposizione del bulbo dell'occhio, ancorchè questa potesse effettuarsi. I rimedj locali, e generali dovranno essere adattati secondo il caso particolare, e giusta le regole generali altrove indicate. Ma se poi tali metodi dimostrano inutili converrà ricorrere all'estirpazione del bulbo dell'occhio.

Il ridurre il globo dell'occhio nella sua cavità non è un'operazione difficile, molto più se il prolasso sia recente. L'infiammazione però delle parti dell'occhio può essere una circostanza, che merita tutta l'attenzione del Professore, che deve trattarla coi metodi adattati. Riguardo l'offesa di tutte le parti dovranno esser curate nel miglior modo possibile prima di ricorrere all'estirpazione del bulbo, che rendesi necessaria qualora esso non possi ridursi, per le lacerazioni nate nelle parti che trattengono nell'orbita, o perchè non possa ridursi come abbiamo detto quella cagione, che ha contribuito a gradi il prolasso di quest'organo.

Le macchie della cornea sono in genere una varietà della medesima, la quale occupa o tutta, o porzione della sua superficie, non che alle volte altera sostanza, quindi si sono dati dagli Autori nomi a questa specie di malattia chiamandosi *opacità*, o *nebula* altrimenti *achlys* quando l'opacità della cornea è nel minimo grado possibile, *nuvoletta* è detta allorchè dessa è alquanto maggiore, e finalmente si è dato il nome di *albugine*, o *leucoma* ovvero *nephelium* all'opacità totale della cornea lucente, la quale acquista un color di creta bianca, e impedisce intieramente il passaggio della luce.



e quindi produce la perdita totale della vista. Questa medesima macchia si è distinta da quella di *aigis* se congiunta alla medesima vi sia una certa elevazione, che elevatezza. Dessa merita attenzione per non confonderla colla suppurazione in detta parte. Per questa distinzione sembra assai poco importante, giacchè nulla essa porta di variazione nell'indole della malattia, essendo sempre della stessa indole, nè presentando altra differenza da quella, che nasce dalla maggiore, o minore estensione della medesima. La distinzione però è recente, ed interessante pare esser quella che si conosce col nome di leucoma, che consiste in una macchia prodotta da cicatrice nata in conseguenza di un'altra malattia, ed intendendo per albugine la macchia nella cornea lucida, che non si eleva sulla superficie di essa, come l'altra macchia che interessa tutta la sostanza della membrana cornea. Questa di frequente è prodotta dalla Chemosi.

E' pertanto eziandio di sommo vantaggio per la pratica il distinguere la qualità, e la posizione di coteste macchie. Se la macchia occupi una piccola porzione della cornea lucida, e sia poco densa, produce poco il danno, che può essa produrre si restringe un po' il certo offuscamento nella visione, e quindi non si vede gli oggetti ricoperti da una nebbia, ma per altro, che ne sia al medesimo impedimento la percezione visuale, ma se all'opposto la macchia sia molto densa, ne forma la vera cecità, come per esempio nell'albugine, e questa è la vera cecità nel leucoma giusta la sua situazione. Conviene ancora distinguere la posizione delle macchie. Se queste restino dirimpetto precisamente alla pupilla, quantunque occupino soltanto una piccola parte della cornea trasparente, impediranno l'ostante la visione, e questo accadrà molto

luce, che nell'oscurità, poichè nel primo caso la pupilla è molto più ristretta, e quindi minor superficie opaca della cornea si ricerca per ricoprirne interamente. Così ancora più impediscono la vista le macchie superiori della cornea, che le inferiori, e finalmente è ben chiaro, che le macchie della cornea situate lateralmente alla pupilla producono una vista oblunga, o strabismo.

Alcuni Scrittori di Chirurgia distinguono ancora coteste macchie secondo la loro circonferenza. In questo riferiscesi quella specie di difetto degli occhi detto *arco senile*, che consiste nell'opacità del suo orlo inferiore, che presenta una figura semicircolare, ed allora la cornea si osserva più piccola del naturale.

Le cagioni delle diverse specie accennate delle macchie della cornea lucida sono varie, l'oftalmia acuta, o cronica, le cicatrici prodotte da ferite, o da ulcere della medesima, e finalmente i vizii degli umori, come il venereo, lo scorbutico, lo scrofuloso, i quali o si complicano coll'oftalmia, o si danno assoluta causa delle medesime. Questa malattia ordinariamente consiste nell'ingrossamento della lamina della cornea, o in una specie di callo, ovvero in uno stravasamento di un denso umore linfatico fra le lamine, o arrestato nei suoi piccoli vasi.

Per quello riguarda l'esito della malattia il tutto dipende dalle sue cause, e dal tempo, che l'occhio ne è affetto. Egli è certo in generale, che sono incurabili quelle macchie della cornea, le quali dipendono da una cicatrice della medesima causata da un'ulcera, o da una ferita, che interessando la sostanza stessa della cornea non possono cancellarsi, mentre all'opposto saranno facili a guarirsi quelle macchie, che dipendono da qualche vizio interno, qualora si pratichi una cura adat-

rimane dopo l' oftalmia , è di guarigione facile , anzi spesso non ha bisogno di rimedio , ma non è così dell'albugine , della nuvola , e segnatamente la prima , sono molto difficili a svanire . Se la malattia sia recente , e il soggetto giovane generalmente d'essa è di cura più facile , che in circostanze opposte , quando le macchie , che sopraggiungono ai bambini sconsuolano con somma facilità . Molto ancora può influire sull'esito della cura la profondità della malattia , ma in generale la guarigione di cotesta malattia è quasi sempre molto difficile , e lunga .

Il metodo , che conviene in simili casi è molto diverso secondo che la malattia è locale o generale , giusta la sua cagione , ed a tenore dello stato di essa , quindi nell'apprestare il rimedio dovrà aver si riguardo a tutti questi punti principali , e particolarmente , sempre ripetiamo , somministrando i rimedj interni , qualora interna sia la causa della medesima . Infiniti rimedj sono somministrati localmente , ma per solito non sono essi seguiti da effetto vantaggioso . Fra questi rimedj sono aver luogo gli emollienti se la malattia è di macchie , e l'irritazione del globo dell'occhio chiedono ; altrimenti devono presciegliersi



olto nell'acqua di calce, un unguento formato  
 butirro recente, tuzia preparata, sale ammoniaco,  
 curio dolce, e tanti altri simili, i quali se pro-  
 ducano una irritazione forte nell'occhio, si fa ces-  
 sare per mezzo degli emollienti locali. Convien per-  
 ciò confessare, che ad onta degli elogi, che so-  
 stati dati a cotesti rimedj dagli Autori stessi,  
 li hanno proposti, non sempre essi corrispon-  
 dono all'espertazione di chi li adopera. Adottato  
 il sistema di cura locale secondo lo stato della  
 cchia, sarà bene contemporaneamente amministra-  
 re per bocca come risolvente in qualunque caso di  
 una mite preparazione mercuriale, o antimo-  
 niale con l'estratto di qualche pianta, che si creda  
 al Professore adattata alla cagione se esiste, la  
 quale può aver prodotta la malattia. Alcune volte  
 talmente saranno anche necessarj dei rimedj irri-  
 tanti, e perfino molti hanno consigliato ancora in  
 tutti i casi l'uso dei caustici per formare un ulce-  
 re, che si raccomanda di tenere aperta fino che non di-  
 stacca la macchia stessa.

Si è trovato altre volte molto utile il metodo  
 di formare una pupilla artificiale, qualora sia rico-  
 verata la pupilla naturale dalla macchia della cornea,  
 questo si pratica sollevando la cornea, e reciden-  
 do una porzione dell'iride, ovvero distaccandola  
 dal suo lembo. Se alla macchia della cornea corri-  
 spondono de' vasi varicosi della congiuntiva, molti  
 professori hanno creduto utile il reciderli con una  
 forbice, ed è certo, che il più delle volte quest'ope-  
 razione ha prodotto in pochi giorni lo svanimento  
 della macchia. Altri pretendono, che raschiando  
 queste macchie possa attenuarsi a modo la cornea  
 e restituire la vista al primo stato, ma questo  
 metodo poco viene approvato da' migliori pratici  
 perchè la cicatrice dopo tale operazione ne viene

a formare una nuova opacità nella cornea lucida e quindi rimane lo stesso difetto.

Questa parte dell'occhio può essere anche mal affetta da ulceri, che sebbene noi ne abbiamo parlato in generale della cura trattando delle medesime, ciò non ostante quelle della cornea lucida meritano essere considerate particolarmente. Esse hanno luogo comunemente in conseguenza di una oftalmia acuta, la quale produce in questa parte la suppurazione. Codeste ulceri possono causare dei gravi danni, posciache se si lascino molto tempo senza apprestarle gli adattati rimedj, o se questi non sieno convenienti, possono estendersi molto, e cagionare non solo l'opacità della cornea per la cicatrice, che lasciano; ma eziandio possono consumare tutta la sostanza della medesima, e formare un'apertura, da cui esce in un coll'umor acqueo l'iride stessa.

Per la cura di queste ulceri conviene avere molto riguardo al grado dell'oftalmia. Se l'ulcera della cornea lucida venga accompagnata ancora da un grado violento di oftalmia è giusto, che a questa debba diriggere tutta l'indicazione curativa tentandone la risoluzione; ma se all'opposto quest'oftalmia sia molto diminuita nella sua forza, o per meglio dire sia dissipato il vero stadio infiammatorio, è indispensabile il credere, che dessa venga più tosto mantenuta dall'irritazione prodotta dall'ulcera stessa, e che quindi guarita questa venga a solversi per conseguenza anche l'oftalmia. In questa circostanza il metodo curativo più adattato si è quello dell'uso dei rimedj stimolanti, che agiscono special modo come risolventi, fra i quali hanno luogo in particolare le preparazioni vitrioliche, di cui abbiamo parlato trattando delle altre malattie degli occhi. Gli Autori più recenti per altro sono di sentimento, che il caustico sia il rimedio il più e



to, e il più attivo per impedire i cattivi effetti tali ulceri, e guarirle radicalmente. Il miglior istico d'adoperarsi in questi casi si è la pietra ernale, con cui deve replicate volte toccarsi la superficie dell'ulcere, fino che si formi la cicatrice, e ciò si eseguisce facendo tenere sollevata la palpebra per mezzo di un adattato istromento. La cautela usarsi in questo metodo si è principalmente quella di non prolungare di troppo l'uso del cauterio, e di non servirsene troppo frequentemente, e se si abbia a produrre nuovamente l'oftalmia, verrebbe a rendere la malattia stessa più ribelle di più difficile guarigione. Dopo applicato il istico essendo l'ulcere prossima alla guarigione si farà uso, invece del medesimo, di qualche colore stimolante, per esempio, vitriolico ec.

Lo *Pterigio* nominato ancora da molti autori *Pan-*  
*Ungula*, ec. consiste nell'ingrossamento, e talvolta indurimento della congiuntiva, la quale forma nell'angolo interno dell'occhio, o nel suo angolo esterno una specie di membrana falsa di figura triangolare, la di cui punta si avvanza sulla cornea trattata, ed alle volte arriva fino incontro alla pupilla, egli è raro per altro questo ultimo caso, poichè diuene cieco per codesta malattia. La parte interna della congiuntiva è quella, che ne è sovente affetta: si osservano alcune volte due pterigi in uno stesso occhio, alle volte fino a quattro. Finalmente non sono rari i casi, ne' quali lo stesso attacchi i due occhi insieme, osservandoli ancora due per ciascheduno.

Il dolore, che seco porta questa malattia è ordinariamente assai mite, ma quello, che dessa produce d'incomodo si è l'impedimento, che cagiona nell'occhio, e l'oscurità, che porta nella vista. Lo *pterigio* è per solito di colore rosso pal-



lido, e questo è quello, che si è chiamato *Unguento* dagli antichi Chirurghi. Ma non di raro è rosso ed allora la congiuntiva è infiammata, ed i vasi della medesima sono varicosi.

I più recenti Autori distinguono una specie di pterigio detto *adiposo*, e sotto questo nome intendono un'escrescenza, che presenta l'aspetto di un tubercolo molle, indolente, di color giallo, e simile al grasso. Questa specie di pterigio non è molto voluminosa, ed è conforme il solito situata sulla superficie della cornea verso l'angolo esterno dell'occhio. Il carattere più deciso di esso si è quello, che si può molto facilmente prendere con la pinzetta questa falsa membrana, o tumoretto, che non accade punto negli altri tumori della cornea opaca i quali sono molto aderenti alla medesima. Nello Pterigio poi così detto vero, il quale interessa la congiuntiva, che ricopre la cornea tutta questa o in tutto, o in parte è quasi sempre opaca, e la seconda della sua estensione produce l'indebolimento della vista.

Riguardo alle cagioni della malattia sono assai varie le opinioni degli Autori, ma tutti convengono che la più ordinaria si è l'oftalmia cronica, e soprattutto quella dipendente da causa venerea, e si può in generale convenire, che dessa viene prodotta dalle medesime cagioni, che abbiamo accennate essere quelle delle macchie della cornea. Alcuni hanno preteso, che lo pterigio consista nella formazione di una membrana preternaturale, che nasca dalle caruncole lacrimali, e si estenda fino sulla cornea trasparente, ma i più recenti Scrittori sono di sentimento contrario, molto più che il medesimo si accade nell'angolo esterno dell'occhio, e quindi dedendosi comunemente, che l'oftalmia è la cagione ordinaria di cotesta malattia tutto induce a cre-

che dessa in altro non consista, che in una *pseudomembrana*, la quale si sia formata per mezzo di condensazione degli umori nella congiuntiva dipendente particolarmente da una depravazione de' tesimi, osservandosi quasi sempre, che il vizio ereditario, scrofoloso, scorbutico, erpetico &c. sono la causa dell' oftalmia, che ha prodotto lo pterigio. Noi diciamo, che questa oftalmia non abbia sempre presentato un carattere cronico, poichè sappiamo, che le pseudo-membrane si formano in altre parti del corpo umano in seguito d'intense infiammazioni.

La terminazione dello pterigio è per ordinario tale se intraprendesi la cura nel suo principio, altrimenti richiedesi necessariamente l'operazione. Esso può rimanere per lungo tempo nello stesso stato senza produrre de' grandi inconvenienti, e specialmente senza essere molto doloroso, ma quanto più esteso, e poco esteso, tanto più facile ne è la guarigione. Se poi la malattia sia avanzata, è assai difficile a guarirsi, e spesso affatto incurabile. Ogni volta che dessa dipenda da un vizio generale sarà più facilmente curabile, che quella prodotta da un vizio locale, che cagiona una specie di disorganizzazione di parte. Sarà ancora di cura molto più difficile lo pterigio, qualora vi si unisca all' addensata congiuntiva non il rilasciamento della medesima, ma l'immobilità sulla parte, che occupa, e segnata, come se questa sia sulla cornea lucida.

Per la cura dello pterigio dobbiamo distinguere la cura generale, e quella locale, che si effettua per mezzo dei rimedj, o coll' operazione. I rimedj, che sono indicati per la cura generale della malattia sono quelli particolarmente adattati a togliere il vizio generale, che ha prodotto la medesima, e quindi avran-  
no per primo luogo i mercuriali nel pterigio dipendente da causa venerea, gli antiscorbutici in quello

anche in dose alquanto forte, e per molto  
mentre l'occhio in tale circostanza è molto me-  
sibile dell'ordinario. Il mezzo di applicarli sa-  
lo di servirsi di un pennello, che si passi fra  
giuntiva, e la palpebra, e se l'irritazione sa-  
si potrà dopo far uso di un qualche emolliente  
per ciò prevenire basta talvolta passare subito  
tro pennellino intinto nel latte sulla m-  
parte.

Se poi cotesto metodo non sia sufficiente  
solvere lo pterigio sarà necessario ricorrere  
razione. Questa si pratica nel modo seguen-  
duto il malato, ed appoggiato con la testa i-  
si fa da un assistente sollevare la palpebra su-  
re, ed abbassare l' inferiore, allora il Profess-  
ve prendere con un pajo di pinzette lo pteri-  
la sua base, e sollevandolo colle medesime  
recidere o per mezzo di un coltellino adatt-  
vero colla forbice curva. Fatto il primo ta-  
deve tener sempre sollevato per mezzo del-  
zette, e quindi staccarlo a poco a poco dal-  
giuntiva col medesimo coltello fino che si p-  
infine si separa totalmente. Per fare quest' op-  
ne è necessario di procedere con molta cautela  
de prevenire l' offesa delle parti sottoposte.



uni migliore il principiare a distaccare lo pterigio dalla parte dell'apice, altri da quella della base. Il secondo metodo sembra il più facile, ed il più sicuro, essendo ordinariamente lo pterigio medesimamente aderente nella sua base, e molto più mobile, e questo punto di maggior mobilità è quello, che deve scegliersi. Se facciasi con questo metodo l'operazione ancorchè rimanga qualche piccola porzione dell'addensata membrana, si dissipa da se medesima, ed ancorchè resti opaca quella porzione della cornea lucida, alla quale è dedita aderente, questo inconveniente non è da porsi molto a calcolo, nè per il Cerusico per tal motivo astenersi dal praticare l'operazione con un metodo assai più facile, che è quello di cominciare a recidere lo pterigio dal punto che abbiain detto nel suo punto più mobile. Egli è certo però, che da qualunque parte si principi l'operazione una conseguenza della medesima si è, che il punto della cornea, se va ricoperta dal pterigio, rimane sempre opaca per la cicatrice, che lascia tale operazione. All'oggetto di ovviare a cotesto inconveniente si è proposto di tagliare circolarmente la congiuntiva, che ricuopre tutta la cornea da una mezza linea distante da questa, o che si fa col mezzo della forbice a cucchiajo, ed col mezzo di pinzette adattate. In seguito si separa la congiuntiva, che ricuopre la detta cornea, e si ottiene l'intento; si è creduto poter seguire il medesimo col taglio de' soli vasi sanguigni, che si trovano sparsi sul bianco dell'occhio, senza offendere la sclerotica. Se siasi distaccato lo pterigio come abbiaino di sopra accennato prima il taglio di esso, allora l'emorragia, che accompagna sembra bene spesso essere di qualche durata, ma non è necessario di fermarla. La piaga appresso medicata con delle stuella di sfilà

imbevute in qualche emolliente sul principio passando in seguito agli attonanti secondo lo stato della medesima, fra i quali è molto raccomandato un miscuglio di bianco d' uovo, e vitriolo bianco, che può servire ancora a dissipare qualche leggiera opacità rimasta nella cornea lucida.

Lo pterigio adiposo, di cui si è di sopra parlato non richiede un metodo diverso di cura, eccetto che è necessario far uso di un qualche caustico locale dopo che è stato estirpato, e segnatamente della pietra infernale. Lo stato in seguito dell' occhio dovrà decidere il Professore sul metodo di cura da praticarsi.

Lo *Staffiloma* viene definito comunemente l'ingrossamento della cornea lucida, o della sclerotica. Questa malattia differisce dall' albugine, perchè è accompagnata da una prominenzza della cornea molto maggiore, e spesso viene a portar seco la perdita della vista. Due specie distinguonsi generalmente di staffiloma, e sono quello della cornea, e quello della sclerotica. Lo staffiloma della cornea forma un tumore duro, opaco, convesso, ed impedisce, che si possano chiudere le palpebre, e desso si avvanza nella parte esteriore delle medesime. L' effetto di questa specie di staffiloma è la deformità dell'occhio si è quello di rendere difficile la visione, ed ancora d'impedirla totalmente. Dicesi staffiloma totale della cornea, quando essa è tutta opaca nella sua superficie, dura, e densa. Questa specie fa ordinariamente de' progressi lenti, ma che arrivano spesso spesso a produrre un volume di qualche considerazione, ed acquistare una consistenza quasi cartilaginosa, e che può degenerare in un tumore canceroso. In tal caso la malattia eccita dei dolori molto forti, ed ancora le infiammazioni. Nello staffiloma della cornea



anza nella parte interna, ossia nella camera anteriore dell'occhio siegue ordinariamente l'aderenza del collo dell'iride, la qual malattia dicesi dai Latini *Synechia*. La lacrimazione continua è anch'è un sintoma, che accompagna il primo dei due generi di staffilomi, poichè pel rovesciamento delle membrane, che spesso ne nasce, le lagrime non possono liberamente passare ai punti lagrimali. Esistono anche degli staffilomi, che occupano soltanto una porzione della cornea, e questi sono stati chiamati staffilomi parziali, e finalmente si osserva alcune volte che lo staffiloma esteriore è formato di tanti nodi verrucosi rassomiglianti ad un grappolo, lo che ha fatto dare il nome a questa specie di malattia di staffiloma a grappoli.

Lo staffiloma della sclerotica non è così comunemente quello della cornea lucida. Il colore del medesimo è di un rosso cupo, tendente al nero, e talte volte accompagnato da vasi varicosi. La sclerotica ora è dura, ora molle, e forma come una specie di ernia, rimanendo in forma di protuberanza. In questa specie di staffiloma vengono innanzi tutto tumore ancora le parti sottoposte, come l'umor acquoso, l'iride, l'uvea ec. Molti Autori per altro sono di sentimento, che tale malattia non appartenga a diverse sorti, che abbiamo accennato dello staffiloma, ma sia di un carattere diverso, e costituisca una più grave malattia dell'occhio, che può dirsi ernia del medesimo.

Le cagioni dello staffiloma comunemente ammesse dai Cerusici sono varie; ma le più frequentissime restringono alle contusioni dell'occhio, alle ferite inveterate, e segnatamente quelle dipendenti da un vizio della macchina, come venereo, scorbutico, scrofoloso, o vajoloso, e le oftalmie determinate.



in forma di polvere, adoperando le medesime tele, delle quali si è parlato trattando dell'uso caustici nella cura di questa malattia, e procedo minutamente di non destare alcuna infiammazione, e molto meno nella superficie interna dello pebre. Per quello che riguarda la compressione questo metodo più dannoso che utile, e per conseguenza è al presente intieramente abbandonato.

Più vantaggio si ottiene dal taglio nella dello staffiloma benanche sia cavo, ma parziale, chè facilmente si chiude la piccola apertura cornea. Esso per altro ha luogo principalmente nello staffiloma racemoso così detto, mentre se altri diversi grappoli abbiano una specie di base più mole della cima vengono facilmente ad esser tolti con un paio di forbici. Se la base poi sia alquanto più larga, allora sarà meglio servirsi del rino, o del coltello da cateratta, e dopo è necessario toccarle col caustico, cioè o butirro d'antimonio o pietra infernale, altrimenti vengono facilmente riprodursi. Nei grandi staffilomi il taglio è difficile a praticarsi, dovendosi portar via quasi tutta la cornea, e per conseguenza si è da molti considerato di aprirlo per lungo, lo che però riesce inutile venendosi a chiudere l'apertura, e resta la malattia nello stesso stato. Altri hanno pensato di tagliare circolarmente la sclerotica, se questa sia la sede dello staffiloma, ma tal rimedio sarebbe più grave della malattia medesima per le conseguenze indispensabili, che ne susseguirebbero. Egualmente può dirsi dello staffiloma, che ha la sua sede nella cornea lucida, pel quale sebbene usassero molte cautele nella recisione, cioè di tagliare obliquamente portandone via una sola parte di essa, ed in seguito aver luogo a distaccare l'altra parte dello staffiloma col caustico, e

DEI MALI DELLA TESTA. 51

no dall'apertura si produrrebbe l'esito dell'iride, del cristallino, e del vitreo. Nasce ordinariamente un'infiammazione, che poi cagiona la perdita del globo, a cui si dovrebbe supplire coll'occhio artificiale. Sarà bene il riflettere, che se il medico può guarire una porzione dello stafiloma, potrà eziandio distruggerlo intieramente come qualche volta è accaduto. La legatura, ed il fonticolo sulla cornea, rimedj proposti per la cura di questa malattia, sono al presente poco usati come inutili, e spesso dannosi, e segnatamente di tale effetto si è il primo.

Il *prolasso dell'iride* detto ancora da molti stafiloma dell'iride è una malattia, che consiste in un tumore di colore oscuro, qual'è formato dal prolasso, o spostamento di una porzione di essa a traverso di un'ulcere, o ferita della cornea trasparente. Questo tumore è alle volte molto piccolo, altre volte più grande. Nel primo caso si è distinto col nome di *miocéfalo* da *mios* sorcio, e *cefalos* capo, se poi sia di mole alquanto maggiore molti lo chiamano *stafiloma dell'iride*, quantunque rigorosamente parlando il nome di stafiloma non competeva, che in quei casi, ne quali l'iride si sposta dalla sua situazione; ma resta ricoperto dalla cornea, che si chiama propriamente *stafiloma spurio dell'iride*, mentre nella procidenza soltanto di questa, esso rimane ricoperto. *Melon*, o *elos* si è chiamata ancora quella specie di procidenza dell'iride, in cui il piccolissimo tumoretto formato da questa membrana resta duro, e calloso.

Codesta affezione è sovente accompagnata dall'ophtalmia, lagrimazione, e dolori assai forti, i quali aumentano quando si muove l'occhio, giacchè accade, che la porzione d'iride uscita fuori stropiccia sulla parte interna della palpebra. Il tumore for-

lente, per altro produce de' gravi inconvenienti la situazione della pupilla, poscia che viene essere l'iride continuamente tirata verso la da cui essa è uscita dalla cornea, la pupilla rimane più nel centro dell'occhio, si avverte luogo dove resta il tumore, muta figura, ovale, ed è impossibilitata a restringersi alla luce, motivo per cui essa rendesi insopportabile all'occhio del malato. Alcuni Scrittori di già suppongono, che questa porzione d'iride ta fuori possa essere soggetta alla cancrena, può aver luogo segnatamente ne' casi di forte ingorgamento. Ordinariamente poi il termine della lattia si è, che la porzione d'iride, che è aderente ai lembi dell'apertura della cornea, anzi tutta la superficie stessa dell'iride esser tirata vicino alla cornea, ed in contatto di questa, resta aderente alla sua faccia interna.

Le cagioni, che producono cotesto processo sono le ferite, o ulceri della cornea. Se in queste circostanze accada una compressione dell'occhio, la lattia ha luogo più facilmente. Dopo l'operazione della cataratta essa è assai frequente, ma non ha sì di poca conseguenza attesa la grandezza della cornea lucida. Non è peraltro lo stesso



simili, come ancora per una compressione esercitata sull'occhio inavvertentemente. In quel mentre ando già riunito in parte il taglio, il foro, che luogo all'ernia, o procidenza è minore, e quindi nasce una specie di strozzamento, che produce ingrimazione, dolori fortissimi, ed anche una lenta oftalmia, nella stessa maniera che si osserva nel prollasso prodotto da tutt'altra cagione. Gli Autori riportano de' casi, ne' quali il prollasso dell'iride sia accaduto per una forte commozione, lo che non si può altrimenti spiegare se non che per la contrazione nervosa, che ha luogo de' muscoli dell'occhio, e che obbligano il medesimo ad esser compresso contro le pareti dell'orbita, e quindi sia obbligata l'iride ad uscir fuori. Quest' accidente può accadere dopo l'operazione della cataratta, o in altro caso qualunque, ove siavi l'apertura della cornea. Sono alcuni di sentimen- che dopo l'operazione della cataratta la sclerotica, che si contrae in virtù della sua elasticità sia capace a produrre il medesimo.

Noi già abbiamo veduto di sopra quali siano gli effetti, che cagiona ordinariamente il prollasso dell'iride, e quindi si può facilmente dedurre quante volte debba la prognosi della malattia. Convien inoltre distinguere principalmente da quanto tem- po essa si sia formata. Se il prollasso dell'iride sia poco, molto più difficile, ed alle volte anche im- possibile sarà la riduzione della membrana, giacchè la contrae una aderenza come abbiain detto con la superficie interna della cornea, e così ancora più difficile sarà la riduzione se l'apertura di questa è piccola. Nel caso opposto, se cioè il prollasso è recente, e senza aderenza, e la ferita alquanto grande sarà molto facile la guarigione riducendo la membrana.

Questa riduzione della porzione d'iride ta fuori è il miglior metodo per la cura de lattia, quantunque molte volte non possa ri e convenga ricorrere al taglio, ai caustici, la legatura proposta da alcuni. Per ridurre devesi tenere il metodo seguente. Si farà care il malato sul dorso, e mentre che coa si solleveranno i lembi della cornea si risping cilmente l'iride al suo luogo. E' necessar altro dopo ridotta la porzione della membran ta fuori di usare la maggiore attenzione acc non torni ad uscire nuovamente, lo che suc cadere con somma facilità. La situazione a del malato sarà il mezzo il più giovevole, co cora il tenere le palpebre chiuse, ma conver guardarsi dal comprimere l'occhio con una fas assai stretta; poichè come abbiamo di sopra nato la compressione dell'occhio si è una di gioni del prollasso dell'iride; sarà quindi ciente una leggiera fascia con del ceroto, la tenga riunite le palpebre. Spesse volte l'irid fiammata, e dolorosa ad ogni moto del globo. sto stato è necessario ricorrere al metodo gistico, e segnatamente alla quiete, ai salassi mi. Fuori del caso d'inflammazione forte c chio sarà bene di far cadere sul medesimo c to in tanto una luce assai forte, la quale sti do l'iride, ne renda facile la contrazione, conseguenza la mantenga nel suo luogo.

Il taglio del tumore formato dalla porzione de protuberante fuori della cornea, può ess cessario ne' casi, ne' quali il tumore formato iride, ch'è uscita fuori sia duro, e volumi Il metodo comunemente praticato si è di re il tumore con la punta delle forbici precisa a livello dell'ulcera, o ferita della cornea, e

adoperare il caustico. Questa operazione non può aver luogo, che nel caso la procidenza sia molto avanzata, giacchè se dessa sia recente sarà facile, e recidendo la porzione d'iride venga ad aprir la camera, e si produca l'esito dell'umor aqueo. Ma alcuni pretendono, che in questo caso sia facile la recidiva, formandosi non molto dopo una nova procidenza come prima, nè vi è altro mezzo per impedirlo, che quello di toccarlo col caustico. Il vantaggio maggiore, che si ottiene dal taglio si è di opporsi a quello stropicciamento, che il tumore esercita colla superficie interna delle palpebre, e che è spesso cagione d'inflammazione, ma conviene per altro confessare, che questo metodo è molto inferiore a quello della riduzione, mentre nel taglio la pupilla resta deforme, e per la sua situazione, e figura, lo che non accade nel generalmente nella riduzione, qualora sia decentemente eseguita, e quindi non dovrà praticarsi il taglio, che in quelle circostanze, in cui non possa ridursi, attesa la durezza del tumore, e l'aderenza, che l'iride può aver contratto con la cornea lucida dopo un certo lasso di tempo.

Il caustico può convenire nei casi, ne' quali ha luogo il taglio, anzi è necessario spesso farne uso anche dopo reciso il tumore. Se per altro esso non è tanto duro, e voluminoso sarà sufficiente il solo caustico. Ordinariamente soddisfano all'oggetto tre, o quattro applicazioni del medesimo, e desse producono la distruzione del tumore. Il caustico più adattato a questo fine si è la pietra infernale, il butirro d'antimonio. Questi producono sul principio un qualche dolore, ma esso è di poca durata. Accade sovente, che al cadere dell'escara si oscuri ancora quella protuberanza dell'iride, ed allora rende necessario l'uso del caustico ripetutamente.



Alcuni Professori hanno proposto di estirpare il tumore per mezzo della legatura, ma questo metodo presenta infiniti inconvenienti, poichè oltre l'essere molto più doloroso degli altri, e cagionare spesso de' gravi accidenti, è più difficile a praticarsi, e l'esito ne è molto incerto, quindi al presente di commun consenso tutti preferiscono il taglio, ed anche il caustico, se il prolasso sia indolente, nè sia praticabile la riduzione, per facilitare la quale si può anche dilatare l'apertura della cornea colla punta del coltello da cateratta.

Pupilla imperforata chiamasi quella malattia in cui la pupilla è chiusa perfettamente in modo da non concedere alcun passaggio ai raggi di luce. Siccome però varj possono anche essere i gradi dello stringimento della pupilla, quindi è che si sono date diverse denominazioni a codesta malattia secondo i suoi diversi gradi, distinguendo segnatamente il restringimento della pupilla, che non permette l'ingresso, che a pochi raggi di luce, e quindi rende la vista assai difettosa, e questo vizio dicesi *Phthisis pupillae*, o *Myosis*. All'opposto poi quel vizio della pupilla, nel quale essa trovasi come abbietto affatto chiusa dicesi *Synagesis* e questa può essere congenita. In tal caso l'otturamento arriva a cancellare ogni traccia della pupilla, ed il malato appena può distinguere la luce dalle tenebre.

Le cagioni di questo restringimento parziale o totale della pupilla sono principalmente le infiammazioni dell'occhio, le quali si estendono non all'iride. Ma oltre le infiammazioni possono esservi molte altre cause di questa malattia: fra delle quali annoveransi in primo luogo i vizj interni della macchina, e segnatamente il venereo, scrofoloso

petico, vajuoloso ec. Può ancora il restringimento della pupilla essere un' effetto semplicemente spaziodico, lo che osservasi nelle donne isteriche, ma ora desso partecipa dei caratteri della malattia principale, e non è permanente, ma dura solo per tutto il tempo dell'accesso. Molte volte l'affezione prende ancora un aspetto periodico. Altre fiate si veduta nascere da una irritazione forte dell'occhio, e ciò accade nelle persone obbligate ad avanzar gl'occhi continuamente dei piccoli oggetti, ma molto luminosi, mentre allora a poco a poco essendo la pupilla obbligata a rimanere costantemente ristretta perde gradatamente la facoltà di dilatarsi, e si viene a restringere in modo da impedire la vista nei luoghi meno luminosi.

Delle cagioni meccaniche possono eziandio produrre la chiusura totale della pupilla, o sia la *synygesis*. Può questo forame rimanere otturato da un tumore di sangue in occasione dell'operazione della cataratta, come altresì può venire otturato da una porzione di pus in caso di qualche suppurazione delle parti circonvicine. Qualcuno ha creduto, che la membrana pupillare alle volte non si distrugga nel feto, e che per conseguenza resti chiusa la pupilla detta *cataracta pupillaris*, che meglio si direbbe col nome di *synygesis congenita* come ancora sappiamo per tradizione esser nato qualche bambino coll'iride assolutamente imperforata, e per conseguenza senza pupille. Ma questi casi non sono tanti frequenti. Una cagione dell'otturamento della pupilla, che merita attenzione si è il distacco dell'iride nel suo orlo dalla cornea, a cui è aderente. Allora nel luogo di questa separazione si viene a formare un'apertura, che dà passaggio alla luce, ma che però dall'altro canto produce l'otturamento totale della pupilla. Le scosse vio-



lenti del capo possono essere le cause di questo distaccamento dell'iride nel suo lembo, può dipendere ancora da altre cagioni come per esempio da ulceri della cornea, e simili. Quest'apertura alcune volte non porta l'otturamento della pupilla, e, se lo produce, di sovente supplisce alla perdita della vista facendo le funzioni di una pupilla artificiale.

L'imperforazione, o restringimento della pupilla naturale non è di così facile guarigione, e se questa malattia è molto avanzata sarà ben difficile il guarirla senza praticare un operazione, poichè la sudetta perde la facoltà di restringersi, e dilatarsi, e rimane chiusa abbenchè siasi tolta intieramente la cagione, che la teneva otturata. Nei casi di vizio interno è ben naturale, che non si potrà curare cotesta malattia senza distruggere cogli antidoti necessarij questa stessa cagione interna. I varj metodi poi, che si sono proposti per formare una pupilla artificiale in occasione del vizio congenito, o accidentale di cui parliamo gli esporremo nella Chirurgia operatoria.

Prima di passare a trattare delle malattie, che interessano propriamente le parti più interne dell'occhio, come la lente cristallina, il vitreo, ed il nervo ottico, fa di mestieri esporre alcune affezioni, le quali dipendono dal globo dell'occhio in generale, o dalla relazione delle sue diverse parti fra loro. Queste sono la *miopia*, la *presbiopia*, la *nictalopia*, e l'*emeralopia*, tralasciando la *Diplopia*, che può esistere in un occhio, o in ambedue, essendo essa o un sintoma prodotto dall'amaurosi, o un effetto d'ineguaglianza nella cornea lucida, oppure nella lente cristallina, per lo che ci riportiamo a quanto da noi si dice sull'affezioni di queste particolari parti, o finalmente può essere eziandio la *diplopia*.



nata dall' esistenza di due pupille in un occhio, allora sarà incurabile.

La miopia è un vizio della vista, che consiste nel non poter distinguere esattamente gli oggetti se non siano molto vicini all' occhio. Il fenomeno che forma questa malattia nasce dalla troppo solta unione dei raggi, i quali riunendosi in un foccolo prima di arrivare alla retina, si vengono a render di nuovo divergenti, e quindi formano sulla stessa un' immagine confusa. Qualora per altro l' oggetto sia molto vicino all' occhio, ed i raggi arrivino alla cornea lucida molto divergenti essi non convergono nel foco tanto presto, e questo verrà a cadere precisamente sulla retina; onde l' oggetto sarà distinto chiaramente. Le cause di questa distanza del foco dalla retina possono essere non solo le prime, le quali tendono ad allontanare la retina dalla lente cristallina; ma ancora quelle, le quali producono una maggiore potenza refrattiva agli umori, o alle parti, per le quali devono passare i raggi riflessi dall' oggetti. Tra le prime possiamo annoverare principalmente un' abbondanza troppo grande di umori dell' occhio stesso, onde venendo ad accrescersi esso in ogni dimensione si venga ad aumentare il suo diametro antero-posteriore, e quindi la distanza dalla retina della lente cristallina, onde il vizio di questa venga ad esistere prima della malattia accennata. Fra le seconde cause poi, o sia le seconde, che accrescono la potenza refrattiva dei mezzi per cui devono passare i raggi riflessi dagli oggetti, possono annoverarsi la maggior densità dell' umore acqueo, o vitreo, e la maggior convessità del cristallino. Ordinariamente questa malattia è incurabile; segnatamente qualora dipenda da un vizio permanente di struttura degli occhj, ed in specie da una cornea troppo convessa della lente. Per altro esistono

dei casi, nei quali l'arte può essere di qualche corso. Se la miopia riconosca per origine una po grande abbondanza di umori, onde questi gano a rendere troppo grande il globo dell'occhio egli è naturale, che la diminuzione dei medesimi sarà la principale indicazione d'aversi in mira la cura di questa malattia. Noi parlando dell'idropia abbiamo già dato le regole generali onde bilire un metodo di cura adattato nel caso, e parliamo, che ha molta analogia colla malattia cennata. Quando poi la miopia dipenda da una cresciuta forza refrattiva degli umori, che di so nasce da un vizio interno della macchina, contro questo sarà facile il formare un piano di adattato, che alcune volte viene seguito da successo. Se finalmente la grande convessità lente sia la causa della malattia, ognun vede che questa sarà incurabile, e non resterà altra risorsa che quella di fare uso di lenti concave, le rendendo divergenti i raggi, che vengono riflessi gli oggetti, che si osservano, non possono esser visti prima di arrivare alla retina, onde formando un fuoco sopra di essa si distingue l'oggetto chiaramente. A questo metodo poi conviene spesso ricorrere che negli altri casi di Miopia, in cui sebbene la malattia non consista nella troppa convessità lente, dipende per altro essa da altre cagioni, o non possono esattamente determinarsi, o non tali, che possano cedere ai rimedj.

Opposta alla miopia si è la *Presbiopia*, o il *sbetismo* così detto. Questo difetto della vista consiste in una difficoltà di vedere gli oggetti prossimi all'occhio, e nella necessità di tenerli lontani dal medesimo per vederli chiaramente. L'effetto di questa malattia contraria a quello della miopia dipende appunto da cause totalmente opposte a



le, da cui questa viene prodotta, quindi esso consiste nell'unione dei raggi al di là della retina onde si riunirebbero in un punto dietro la medesima, e quindi non cadendo il loro foco direttamente su di essa si viene a produrre su questa membrana un'immagine confusa, ed il soggetto vedrà non chiaramente gli oggetti. Questa distanza troppo grande di foco nasce principalmente dalla poca quantità d'umori dell'occhio, e quindi ha luogo segnatamente nei vecchi, nei quali venendosi a diminuire gli umori di quest'organo la retina viene ad avvicinarsi alla lente, ed il foco di questa viene a rimanere al di là di detta membrana. Una delle cagioni principali della presbiopia può ancora essere l'operazione della cataratta, nella quale togliendosi la lente cristallina i raggi soffrono una minor refrazione, e quindi si vengono a riunire più lontano del luogo della retina, a meno che il soggetto operato non fosse stato miope, e la minor refrazione, che soffrono i raggi per la mancanza della lente, non venisse compensata esattamente dalla maggior dimensione del diametro antero-posteriore dell'occhio, e dalla maggior forza refrattiva degli umori del medesimo.

La presbiopia all'opposto della miopia cresce nell'avanzarsi dell'età, poichè nella vecchiaja generalmente gli umori dell'occhio sono in minor quantità, e quindi la lente sempre più si avvicina alla retina. Questa malattia è ordinariamente incurabile attesa l'impossibilità di rimuovere le cause; ma se mai qualcuna di esse potesse essere tolta sia essa locale, sia generale valeranno le stesse regole da noi proposte per la miopia, eccettochè avrà luogo una contraria indicazione. Un rimedio poi palliativo, e che converrà nella maggior parte di casi, in cui la malattia è incurabile si è quello dell'uso delle lenti convesse, che producono un effetto opposto a quel-



lo delle lenti concave convenienti nella miopia, e che indispensabilmente convengono nella presbiopia, perchè la malattia riconosce una cagione totalmente opposta. Per mezzo adunque delle lenti convesse si vengono a rendere i raggi, che si presentano nell'occhio meno divergenti, e quindi vengono a riunirsi prima di quello, che si riunirebbono se non si facesse uso di tali lenti, quindi è che il foco del cristallino venendo ad essere precisamente sulla retina, l'immagine, che si forma su di essa resta distinta, e quindi si vede chiaramente l'oggetto. S' intende poi, che non è possibile determinare il grado di convessità conveniente alle lenti adattate per ogni presbite, ma che dovrà essere desso minutamente quanto sia necessario per supplire alla mancanza di convessità della lente, di grandezza del globo &c. come egualmente varj gradi di concavità si richiedono dai miopi secondo il grado della loro vista, e da ciò ne nasce, che i presbiti sono continuamente soggetti a variare lenti, poscia che crescendo, come abbiain detto nella vecchiaja le cause della malattia, si richiede di frequente aumentare la convessità della lente.

Un' affezione, che appartiene parimenti alla lesione della vista si è la così detta *nictalopia*, ossia quell' affezione dell'occhio, nella quale si vede meglio di notte, che di giorno dalle voci *nix*, e *opsis* che significano notte, e vista; sebbene molti Autori forse poco badando all'etimologia della parola vogliono, che sotto il nome di *nictalopia* si esprima quell' affezione in cui si vede chiaramente di giorno. Altri poi pretendono potersi conciliare questa differenza col credere la malattia intermittente, e che appaisca in diverse ore; ma allora prenderebbe altro nome, come dimostreremo in appresso parlando di

altre malattie degli occhi. La nictalopia dunque consiste nell'impedimento di vedere gli oggetti col lume del sole, oppure distinguerli anche chiaramente, ma con impressione fastidiosa, o finalmente nulla vedono durante il giorno, lo che si chiama *nictalopia perfetta*.

Molte sono le specie di questa malattia ammesse dagli scrittori di Chirurgia, secondo che hanno creduto diverse le cagioni della medesima, sembra però, che queste possano ridursi a due, cioè a una affezione nervosa, o ad un vizio locale delle parti costituenti il globo dell'occhio. Alla prima causa si riferisce una sensibilità troppo grande del nervo ottico, e della retina, onde alla luce del sole si restringa in modo la pupilla, che o non possa passare per la medesima la quantità di raggi sufficienti, onde formare la visione distinta, o che anche essendo ristretta soltanto più del naturale produca la percezione chiara degli oggetti, ma con una impressione fastidiosa, che può divenire dolorosa, e finalmente si riferisce alla prima cagione, se la pupilla trovasi immobile, e dilatata, quale stato di essa dicesi *midriasis*, onde cade nell'occhio un'eccessiva quantità di raggi, per la quale si annienta la percezione degli oggetti. All'opposto poi in una luce moderata, come moderatissima è quella della notte, la pupilla si viene a dilatare, o trovasi di già dilatata più del necessario, e così dassi passaggio ad una quantità di raggi, onde formare sulla retina un'immagine distinta senz'alcun incomodo, anzi la distinguono più chiaramente degli altri.

Le cagioni che possono produrre questa specie di nictalopia sono una lunga inazione degli occhi, le conseguenze di malattie nervose, e segnatamente quelle che attaccano il capo, come *emicranie*, *febbri notturnali*, &c. quali ultime cause parrebbe, che al



cessare di esse, dovesse dissiparsi l'estrema bilità della retina, come di avviso sono varj ri, ma ciò non è sempre vero particolarmente: si usano a tempo quei rimedj a tal uopo ad. In fatti abbiamo molti esempj, che alcuni ind afflitti una volta dalla nictalopia in seguito di nosocomiali sono stati obbligati praticare dei ri per una serie di anni, alla fine di cui hanno bisogno di perseverare in essi, per impedire sequenze, che potrebbero nascere dalla trop sibilità della retina.

Riguardo al vizio locale delle parti cost il globo dell'occhio, le quali possono prod nictalopia, noi non facciamo menzione, che macchie della cornea tralasciando di parlare leggiero offuscamento del cristallino, o di u cipio di debolezza della retina, o dell'inflam ne delle parti interne dell'occhio causata sospensione di mestruj in una donna, o cose le quali a propriamente parlare non possono verarsi fra le cagioni della nictalopia, ma de riguardarsi come malattie diverse, e conosce un puro sintoma la difficoltà di vedere gli nella forte luce. Le macchie della cornea ad se esistono incontro la pupilla, essendo que giorno poco dilatata attesa la forza maggior luce viene ricoperta in gran parte, o intier dalla macchia, e si impedisce quindi o in p in tutto la chiarezza della vista; all'opposto luce molto moderata sia di giorno sia di no sendone meno forte l'impressione, ed essen conseguenza più dilatata la pupilla resta un zione sufficiente di quest'apertura non ricopert macchia, onde dar passaggio ad una quantità gj bastante per formare un'immagine sufficient distinta.



Secondo le cagioni, che abbiamo accennato dovrà riggersi la cura della malattia. Se questa dipende da una sensibilità troppo grande del sistema nervoso degli occhi, sia essa prodotta dalla prolungata privazione dello stimolo della luce sul medesimo sia agitata da malattie nervose, l'indicazione curativa consisterà nel diminuire questa troppo gran sensibilità, e ciò potrà ottenersi tanto coll'assuefare gradatamente gli occhi a soffrire lo stimolo della luce, quanto coll'uso dei rimedj interni, i quali possano diminuire la sensibilità nervosa, e si procurerà separatamente di non esporre l'occhio, per quanto è possibile, all'azione di una luce forte adoperando in questo caso degli occhiali verdi, e facendo uso di vetri di minor densità nell'applicazione prolungata a cotest'organo. In genere un vitto sano composto di cibi animali, e vegetabili sarà molto indicato. Il freddo topicamente applicato una, o più volte al giorno potrà essere di qualche vantaggio, specialmente dopo un lungo esercizio degli occhi sopra piccoli oggetti.

Opposta alla malattia testè accennata si è l'altra detta *emeralopia*, che è quanto dire quell'affezione dell'occhio, in cui il malato vede bene di giorno, ma non può vedere di notte, o a una luce debbole. Gli autori più recenti credono con ragione, che questo difetto di vista dipenda da una mancanza di sensibilità della retina, e del nervo ottico, onde il malato non possa avere la vista chiara, che quando il sistema nervoso sia stimolato da una sufficiente quantità di luce, e quindi possa questa malattia contrarsi come un principio di amaurosi, ossia come un principio di debolezza della retina, e del nervo ottico. Dovendo noi trattare in seguito dettagliatamente dell'amaurosi crediamo dunque poterci limitare al presente di parlare dei rimedj adattati

capsula del cristallino, e però si è chiamata  
mente dai Cernuschi *cateratta cristallina*, o  
che occupa la lente stessa, e *cateratta membrana*  
la, che rende affetta la membrana, o la ca  
la lente. Alcune volte poi sono combinat  
queste specie di cateratta, ed allora dic  
conosciuta ancora sotto il nome di *crista*  
*lare*. Si crede ancora da alcuni Scrittori  
negata l'esistenza della seguente specie di  
consistendo secondo il loro sentimento ne  
damento di quel poco umore detto del *Mo*  
tenuto fra la lente cristallina, e la sua  
teriore, il quale sebbene produca presso  
medesimi effetti delle altre accennate spe  
pure non esiste nè opacità della lente, nè  
la capsula.

Distinguesi eziandio la cateratta in  
immatura, chiamandosi matura quella, in  
cità della lente, o capsula è completa, e  
ra quella in cui restavi ancora qualche  
in queste parti.

Oltre tali distinzioni ne vengono fa  
alcuni Autori per riguardo alla natura  
lattia.

Si divide in quattro specie la cateratta

re, e condensandosi ottura la pupilla, ovvero si glutina sulla superficie anteriore della lente cristallina. La seconda è costituita dall' offuscamento di una porzione della membrana che contiene l' umore vitreo, ossia della membrana jaloidea, che ricuopre la parte posteriore della lente cristallina, e che forma quella piccola cavità in cui dessa è situata. Questa seconda specie è stata da alcuni chiamata *cateratta jaloidea*. La terza consiste in una membrana preternaturale, ed opaca esistente avanti la capsula del cristallino, cui l'hanno chiamata *cateratta choroidealis*. La quarta finalmente si è l' effetto dell'imperforazione della pupilla; ma questa malattia appartiene sicuramente meno, che le altre specie di cateratta.

La cateratta merita di essere considerata non in rapporto alla sede che occupa, ma anco alla consistenza, ed aderenza, che può avere acquistata, ed alla cagione, che l'ha prodotta come in seguito vedremo.

I sintomi che accompagnano cotesta malattia sono ordinariamente i seguenti, e dal luogo, che occupa l' opacità stessa si può molto dedurre circa la sede della medesima. Se la cateratta abbia luogo nella parte anteriore della capsula del cristallino si osservano allora delli piccoli punti bianchi superficiali, simili a delle macchie convesse situate immediatamente dietro alla pupilla, e l' offuscamento accade poco sollecitamente. All' opposto poi se l' opacità è profonda, e che sembrano le macchie piuttosto di figura concava, è da presumersi, che l' opacità esista nella parte posteriore della capsula stessa. In questi due casi l' opacità è eguale in tutta la periferia, e segnatamente alla circonferenza. Quando dessa ha la sua sede nella lente cristallina, l' occhio principia a vedere meglio i corpi situati  
Tom. II.



gi. All' opposto nell' oscurità dilatandosi viene a rimanere scoperta una porzione n  
lente . Potrà eziandio il professore prene  
lume dall' ispezione locale riguardo all' c  
cristallino , poichè si vede una macchia ord  
te di color grigio , o biancastro , che rim  
la pupilla immediatamente , e che corris  
grandezza della medesima . In generale t  
pio della malattia il paziente vede avanti  
una nebbia continua , dei punti neri , e  
getti di simil natura , a poco a poco qu  
scamento và crescendo in modo , che alla  
lato può solamente distinguere la luce c  
bre . In seguito il volume , la consistenza  
lore del cristallino variano moltissimo ne  
ta , ma quello si può quì avvertire con tutt  
ri pratici recenti , si è , che la durezza della  
è sempre un' indizio dell' antichità dell' al  
vario colore per altro della medesima dip  
sua maggiore , o minore consistenza , men  
sa è poco dura , o come dicesi cateratta  
lattiginosa , il colore è bianco , ma lattig  
opposto è bianco , ma lucido nella cater  
lare . Se la cateratta poi sia dura , il suo  
sarà così chiaro . Questo discorso ora ci

Oltre gli accennati sintomi nelle diverse specie eratta, si può in quella di natura lattiginosa chiamata osservare non solo, che il suo colore le al latte, ma ancora si vedono sulla super-  
ella lente alcune macchie, che non sono co-  
ma variano a seconda de' moti dell' occhio,  
che volta scompaiono ancora intieramente.  
e nella cateratta di questa specie la lente cri-  
diviene di una consistenza minore, che nello  
naturale, ed alle volte ancora è quasi fluida,  
è che si osserva quasi costantemente, che  
tà della medesima è maggiore nella sua parte  
re, e non di raro la lente stessa essendo sì  
si separa dalle sue aderenze, e ne sorte por-  
di essa per la pupilla. In questa specie di ca-  
il paziente vede forse meno, che nelle altre  
di questa malattia, e spessamente non arriva  
nguere il lume del giorno. Il contrario dei  
accennati succede ordinariamente se la cate-  
ia dura, giacchè allora la lente diviene più  
i moti della pupilla sono più liberi, la lente  
di un colore meno bianco, ed alle volte passa  
in oscuro, si osserva chiaramente la distan-  
esiste fra l'iride, e la lente, ed il malato  
ue bene la luce.

A molti autori si conosce eziandio un'altra spe-  
cateratta che potrebbe chiamarsi media fra le  
cennate, e questa dicesi cateratta molle, o  
dalla sua consistenza media fra la fluida, e  
. I sintomi di questa specie di cateratta sono  
a poco i medesimi di quelli della cateratta  
eccetto che si osserva in essa, che essendo  
sa non hanno luogo i movimenti delle mac-

questo è per quello riguarda la cateratta, che  
propriamente nella lente, ma non è molto fa-

ratta, in altro dessa non consistendo che i  
plice offuscamento della capsula, che acc  
l'operazione. Siccome estraendosi, o dep  
la lente cristallina, la membrana capsulare  
dinariamente nel suo luogo, così venend  
ritata nel tempo dell'operazione viene a  
marsi, e da questa infiammazione, o da  
bosa cagione interna ancora esistente nell  
na, qualche tempo dopo ne viene spesso  
Si conosce questa cateratta se si riflette a  
d'infiammazione, che sopraggiungono dopo  
pressa, o estratta la lente, e che sono la  
la nuova opacità. Questa specie di catera  
assolutamente evitarsi se più numerose esp  
faranno decidere sulla nuova maniera di f  
razione, coll'estrarre cioè mai sempre l'  
stallino in un colle sue capsule.

L'aderenza della cateratta è un oggetto  
in molta considerazione nel trattare questa  
Qualora la cateratta sia aderente deve neces  
te essere offuscata la capsula, anzi può la  
sa essere totalmente libera. Alcuni Scritto



Via la lente si porta via ancora la capsula, ma è così negli altri due casi, ne' quali può la detta senza essere d'impedimento all'operazione. Non difficile il riconoscere l'aderenza della capsula all' e se si osservi la lente come attaccata dietro la lla, se questa resti immobile, e se si vedono ni della cateratta nella capsula anteriore. Per lo poi riguarda l'aderenza nella parte posteriore alla membrana dell'umor vitreo è questa im-ibile a riconoscersi se non facendo l'operazione. renze accennate si possono dedurre ancora dalle ni della malattia, poichè se la cateratta venga tta da infiammazione d'occhio violenta, vi sarà o di sospettare quasi con sicurezza, che la me- sia aderente.

Merita finalmente molt'attenzione la cateratta licata. Qualunque malattia dell'occhio può com- si con la cateratta, ma la loro complicazione infuiscie sull'esito della malattia, e sul meto- i cura da tenersi, se ne eccettuiamo la sua licazione coll'amaurosi. Se il malato sia affet- queste due malattie insieme riesce quasi sem- nutile l'operazione, non essendo sotto il pote- lla Chirurgia, che la sola amaurosi incomple- Quello che vi è di difficile si è, che si rende volte impossibile il distinguere questa compli- ne, quantunque celebri Scrittori abbiano prete- dare delle regole, e fra le principali quelle di guere la luce, lo che può farsi nella sempli- teratta, ma non in quella complicata con amaurosi. Questo certamente è il segno più probabile, e di sole è ancora quello dell'immobilità, e dilata- della pupilla. Si potrà conoscere per altro con ne maggior fondamento, se si rifletta alla ca- , ed al corso, che ha tenuto la malattia. e cagioni della cateratta sono in generale tutte

quelle, che sono capaci di produrre una lesione violenta nell'occhio, da cui possa nascere l'infiammazione di quest'organo. Lo stesso può accadere ancora in una scossa forte del medesimo, dalla quale ne siegua il distaccamento della lente cristallina, o la lacerazione della capsula. Ma oltre queste cagioni esterne possono esserne eziandio delle interne. Fra queste ha luogo principalmente una certa debolezza dell'organo della vista, come accade segnatamente nell'età avanzata, l'abitazione in luoghi molto umidi, l'applicazione continua a riguardare degli oggetti molto piccoli, l'abuso dei liquori spiritosi, e del vino, e finalmente la retrocessione, o metamachina, ma particolarmente artritico, erpetico, scrofoloso, scorbutico, reumatico, vajuoloso, venereo &c.

Da tutto quello abbiamo veduto possiamo commodamente dividere le cagioni della cataratta in esterne, ed interne, e si può ancora considerare la medesima come conseguenza di una malattia generale, oppur locale. Egli è chiaro, che se dessa sopraggiunga in una persona di buona costituzione, e sana, ed in conseguenza di una cagione esterna, dovrà considerare come malattia puramente locale; ma se all'opposto il soggetto, che viene attaccato dalla cataratta fosse di già affetto da un vizio scrofoloso, venereo &c., e la cataratta sopraggiungesse senz'alcuna causa esterna manifesta, potrebbe con ragione dedursene, che cotesta opacità è l'effetto di una malattia generale, o sia di un'affezione generale della macchina. Questa distinzione è molto interessante per la cura della malattia, essendo nel primo caso sufficiente l'estrazione della lente, che nel secondo caso riuscirebbe incerta, se non vi sia interna. Oltre le cagioni accennate al-

I Autori ammettono la cateratta ereditaria, e la cateratta innata.

La cateratta è una malattia, per la quale sono proposti molti medicamenti, ma difficilmente, si può dire, mai si guarisce per mezzo di esse conviene sempre ricorrere all' operazione. Noi possiamo quì estenderci sul metodo di praticar questa operazione, poichè dobbiamo trattarne per lo più nella seconda parte di questi elementi. E' quì dunque da riflettersi soltanto, che nelle cateratte innate può ricevere il malato molto vantaggio per che tempo dall' uso delle lenti convesse, ed altre, che nelle cateratte dipendenti da cause interne si può sicuramente ottenere maggior vantaggio rimedj interni, e locali, di quello, che nelle cateratte dipendenti da cagioni esterne, le quali difficilmente guariscono senza l' opera della mano Chirurghica. Questo ha luogo distintamente in quelle prodotte da una metastasi di un qualche umore morschoso, che siasi determinato particolarmente all' oc-

I medicamenti proposti per la cura della cateratta, e l' oggetto de' quali si è quello di produrre il riassorbimento dell'umore, che forma l' opera della lente, e della capsula, si pretende da molti che possano più facilmente aver luogo in caso di cateratta della capsula, di quello che nella cateratta della lente, essendo quest' ultima per solito di una consistenza tale, che poco vi rimane a fare sull' assorbimento. Per altro ne' casi, ne' quali la cateratta non sia molto consistente, ma di natura molto fluida, potranno essi sotto un certo punto di vista essere giovevoli, anzi siccome non è difficile in molti casi di conoscere prima dell' operazione la consistenza della cateratta, non sarà inutile tentare prima della medesima l' uso di si-



di vapori , ovvero istillandolo a poche g  
occhio stesso . Si riflette inoltre , che il  
la china , e lo zolfo possono forse essere  
taggiosi , perchè le cateratte le più frequ  
babilmente sono quelle dipendenti da vi  
reo , scrofoloso , o da retrocessione di una  
esantematica , e segnatamente della scabbie  
per altro a cui deve particolarmente risfet  
amministrazione di questi rimedj si è , c  
tunque essi non riescano a togliere affat  
teratta , onde si renda ciò non ostante  
l' operazione , non riescono mai totalmen  
qualora siano amministrati propriamente ,  
diminuendo , o togliendo affatto la cag  
malattia vengono ad impedire le conseg  
lenti , che spesso nascono in seguito dell'  
ne , e segnatamente le infiammazioni forti  
teratta secondaria . Tra i medicamenti pro  
la cateratta possiamo ancora annoverare l'  
tà , e gli emuntorj , come vescicanti , fon  
dai quali medicamenti molti pretendono a  
cavato grandi vantaggi . Ma se ad onta  
si vedesse poi che la malattia non passa

in opera, che l'operazione abbassando, o estraen-  
la lente medesima, e facendo quest'operazione  
le dovute cautele, non tralasciando nello stes-  
tempo quel sistema di cura interna più adatta-  
e proprio, che si creda dal Cerusico rapporto  
cagione, e natura della cateratta, colla quale  
far si possa, che dessa si renda di qualche pro-  
. Noi esporremo altrove quali debbono essere  
ste cautele, e quale il metodo di operare.

Il *Glaucoma* è una malattia, che è stata dagli  
ichi confusa con la cateratta, poichè sotto il  
ne di glaucoma s'intendeva ogni opacità dei mez-  
pe' quali devono passare i raggi prima di ar-  
re alla retina. Al presente, che si è applicato  
usivamente il nome di cateratta all'opacità del-  
ente cristallina, e sue capsule, si è riservato il  
ne di glaucoma all'offuscatione dell'umor vitreo.  
ntomi che accompagnano questa malattia sono  
so a poco i medesimi di quelli, che vengono  
dotti dalla cateratta, da cui il glaucoma è molto  
cile a distinguersi particolarmente se la caterat-  
ia incipiente. I recenti Scrittori, che hanno prin-  
ato a dividere queste due malattie, poco hanno  
ato dei segni caratteristici del glaucoma, e si  
o contentati di dire semplicemente, che in que-  
malattia si vede l'opacità dietro il cristallino.  
stesso possiamo dire delle cagioni del glauco-  
, essendo queste poco note, e tutte le cognizio-  
che abbiamo su questo punto si restringono a  
noscere la causa della malattia da una degenera-  
ione di umori, la quale si può credere con qual-  
fondamento essere l'effetto di un vizio nei me-  
mi. Da questo si deduce, che poco possiamo  
particolarmente dire sulla cura della malattia.  
questa adunque dipenda da un vizio generale  
te abbiamo da aggiungere a quello abbiamo già

spesso accennato sulla cura conveniente alle malattie locali dipendenti da un umore scrofoloso, scorbutico, erpetico, venereo ec. Potranno per altro nel glaucoma essere assai vantaggiosi i vescicanti, i fonticoli, i setoni alla nuca, come ancora i purganti, ed in somma tutti quei rimedj, che saranno adattati o a diminuire la quantità degli umori alla parte affetta, o a correggere in tutta la macchina la loro cattiva qualità. Ci sembra, che queste due indicazioni curative debbano essere unite indispensabilmente nella cura del glaucoma.

L' *Amaurosi* altrimenti detta ancora *gotta serena* è una malattia, che consiste nella privazione totale, o nella diminuzione della vista prodotta da una paralisi del nervo ottico, o della retina, e che lascia l'occhio nel suo aspetto, e conformazione naturale. Quindi ne viene, che questa terribile malattia è assai difficile a conoscersi, poichè non vedendosi all' esterno alcun segno di essa, fa di mestieri riportarsi alla relazione del malato, che asserisce di soffrire la diminuzione, o perdita totale della vista. Uno dei segni più comunemente ammessi per certi in questa malattia è la dilatazione, ed immobilità della pupilla, ma non sempre ha luogo questo sintoma, essendo molte volte la pupilla nello stato naturale, e qualche volta ancora più ristretta, che nello stato sano. Lo stesso possiamo dire dell' immobilità della pupilla, che di sovente è mobile ancora nell' amaurosi, ma questo può nascere eziandio dall' irritazione della luce sull' occhio sano ( se ne sia affetto un solo ), e ristringersi per consenso la pupilla di quello malato, questo però si vede facilmente se si faccia tener chiuso l'occhio sano, poichè se l'altro è affetto da amaurosi, la pupilla non si restringerà punto. Si può anche ammettere come sintoma di questa malattia lo stra-



mo, mentre il paziente non riguarda gli oggetti direttamente. Nell'occhio affetto da amaurosi la pupilla non è di colore negro come nello stato turale, ma si vede come un bianco nel fondo dell'occhio; alle volte si vede di color verdastro, e molte volte si può dai non pratici confondere questa opacità, che si vede dietro la pupilla con la cataratta. Per evitare l'errore basta per altro ricordare, che l'opacità nell'amaurosi vedesi piuttosto nel fondo dell'occhio, che immediatamente dietro la pupilla come nella cataratta, e di più si osserva, che il malato è affatto cieco, sebbene l'offuscamento, che si vede sia così debole, che non potrebbe produrre tanto effetto se esistesse nella lente cristallina. Il caso più difficile a conoscersi è quello, in cui l'amaurosi è complicata con la cataratta, giacchè allora come abbiamo detto parlando di questa i sintomi di una malattia si possono a qualche modo confondere con quelli dell'altra; la forza è ripetere, per non deviare dal sistema elementare propostoci, di far riflessione alla ragione, ed al modo con cui si è formata la medesima.

È vario il tempo, in cui si produce questa malattia essendo il suo corso molto rapido in alcuni, i quali perdono la vista subitamente, mentre in altri dura mesi, ed anche anni prima di causare cecità, ma questo vario corso dell'amaurosi sembra dipender molto dalle cause, che l'hanno prodotta. Così ancora varj sono i sintomi, coi quali essa principia, giacchè alcune volte sembra nascere all'accrescimento della sensibilità dell'occhio, ed altre volte all'opposto da una diminuita sensibilità del medesimo, e sembra ancora non di raro, che si vengano coi sintomi, che dimostrano una raccolta di umori nell'occhio. Generalmente in cotesta ma-

lattia i malati vedono sul principio come de' moschini avanti gli occhi, ed indi de' corpi lucenti ec.

L'amaurosi attacca ordinariamente tutti due gli occhi nello stesso tempo, ovvero il secondo viene affetto poco dopo il primo. L'amaurosi sembra, che principi nel mezzo della retina, poichè quando comincia ad offuscarsi la vista i malati vedono meglio guardando lateralmente, che direttamente gli oggetti. Esistono per altro de' casi, ne' quali l'amaurosi attacca un solo occhio, e questo accade quando la cagione dell'amaurosi è locale, e segnatamente se la malattia dipenda da una lesione violenta dell'occhio, da una oftalmia, o da una lesione del ramo frontale del nervo oftalmico. Si osserva alcune volte, che tale paralisi non esiste in tutta la retina, ma soltanto nella metà di essa. Questa specie di amaurosi detta da alcuni *dimidiata* produce l'effetto di non vedere gli oggetti, che per metà, e questa soltanto può dirsi *Emipia*, mentre sotto tal nome varj Scrittori riconoscono codesto vizio nella visione, ma prodotto da altre cagioni, il quale è un puro sintoma di altre malattie, come sarebbero diverse macchie della cornea, una posizione preternaturale della pupilla, un distaccamento dell'iride da un punto del suo bordo per qualunque causa esterna. Lo stesso si dica se la malattia esista in un sol punto della retina, giacchè allora il paziente vede una macchia nera sugli oggetti, che egli riguarda.

Da tutte queste osservazioni, e da altre, che per brevità passiamo sotto silenzio si sono dagli Autori di Chirurgia formate varie specie di amaurosi. Le più interessanti da aversi in riguardo sono l'amaurosi *completa*, ed *incompleta*, l'amaurosi *recente* o *inveterata*, e finalmente l'amaurosi *continua* e la *periodica*.

Una delle cose molto da considerarsi per la



della malattia si è il conoscimento delle sue  
oni. Molte, e varie possono essere quelle, che  
ducono l'amaurosi, ma si possono desse como-  
ente ridurre a tre punti principali, cioè 1. la  
ra del capo, 2. la debolezza del sistema ner-  
, 3. qualche affezione, che agisca simpaticamen-  
all'occhio.

La pletora dei vasi del cervello, e dell'occhio  
uce l'amaurosi comprimendo il nervo ottico,  
retina, e ciò accade particolarmente o in con-  
enza di uno stimolo violento sulla testa, come  
esempio un sole forte, ovvero dopo la soppres-  
di un flusso sanguigno, come mestruale, emor-  
ale, epistassi, o altro abituale ec. le febbri acu-  
l'oftalmia ec. possono produrre questa specie  
maurosi. L'applicazione continua degli occhi  
pecie tenendo la testa bassa, ed il tronco in-  
ato può produrre lo stesso effetto. Il medesi-  
ficasi delle percosse fatte sulla testa.

La seconda cagione consiste nella debolezza del  
na nervoso, e segnatamente di quello dell'or-  
della visione. L'abuso in specie prematuro  
iaceri venerei è sovente la causa di questa  
lezza. L'abitare in luoghi molto illuminati dal  
, e particolarmente dove esista della neve, o  
corpi bianchi, il legger molto la notte, op-  
nel giorno in un luogo, ove sia una forte  
, e l'esser soggetto ad evacuazioni abbon-  
e continue sono le cause ordinarie della debo-  
de' nervi dell'occhio. Se l'amaurosi nasce in  
guenza di una debolezza locale di quest'or-  
sarà meno da temersi, che quella, che ha  
ne dalla debolezza di tutto il sistema nervo-  
Abbiamo degli esempj di questa debolezza na-  
diarree violenti, da forti passioni d'animo,  
acuazioni abbondanti, e repentine di un umore.



qualunque . Il riguardare gli oggetti con un sol occhio indebolisce il medesimo più che il guardarli con due ec.

La terza causa è come si è detto un' affezione , che agisce per connaturale , e stretta relazione sull' occhio . Questa da molti si pretende , che consista unicamente in un' affezione gastrica delle prime vie , e la gotta serena prodotta da questa causa è alle volte intermittente . Ma oltre di cotesta cagione può ancora l' amaurosi dipendere da vizj de' visceri , e precisamente del fegato cagionati da passioni d' animo , da vermi , ed altre simili malattie .

Oltre queste tre cagioni principali , che abbiamo detto produrre segnatamente l' amaurosi , ne esistono ancora delle altre , che non si possono riportare sotto alcuna delle tre classi accennate , e queste sono i vizj generali della macchina , e le affezioni locali . I vizj generali della macchina sono particolarmente l' artritico , l' erpetico , lo scabbioso , ed il venereo . Le malattie esantematiche ritrocesse , e distintamente quelle del capo sono sovente causa d' amaurosi . Può parimente nascere la gotta serena da una crisi di una malattia acuta ec . Riguardo alle cause locali può produrre l' amaurosi tutto ciò che può cagionare la lesione di parti necessarie all' integrità della visione , e quindi l' offesa del nervo sopraciliare , i corpi estranei entrati nell' occhio , la compressione del nervo ottico prodotto da un qualche tumore , ascessi , ferite d' occhio ec . Si deve ancora a questo proposito riflettere , che un infiltramento sieroso nel cervello , che comunichi con l' orbita stessa comprimendo il nervo può produrre l' amaurosi . Qualche autore riporta de' casi , ne quali si rileva , che alcune volte la cagione dell' amaurosi abbia la sua sede nella membrana pituitaria .

DEI MALI DELLA TESTA. III

di, che la malattia possa dipendere dall'arredimento di un flusso catarrale del naso.

L'amaurosi è una malattia di cura assai difficile, anzi è d'essa generalmente incurabile, particolarmente se sia inveterata. Se però la malattia sia recente, ed incompleta vi è speranza di poterla guarire. Quello per altro, che decide molto sulla prognosi d'essa sono le cause della medesima poichè se esse possono togliersi, la malattia sarà curabile. L'amaurosi sia sopraggiunta lentamente, e si sia aumentata insensibilmente sarà di cura molto più facile, che quella, che viene tutta in un punto, poichè le cagioni di quest'ultime sono più recenti, più facili a togliersi, mentre quelle dell'altre sono più antiche, e resistono all'azione de' medicamenti. Se la causa sia ben nota, è chiaro, che queste faciliterà molto la cura.

Gli oggetti, che deve avere in mira il Ceruico nella cura dell'amaurosi sono di togliere principalmente le cagioni della malattia, ed in oltre di ridare ai nervi quel tono, che essi possono aver perduto per l'azione delle medesime. Convien peraltro riflettere, che spesso la causa di cotesta debolezza locale è tanto oscura, che non si può arrivare a conoscerla, ed allora conviene dare i rimedj per sopprimere i sintomi, e gli effetti, che essi producono. Avendo noi già esposte in dettaglio le cagioni comuni dell'amaurosi poco sarà necessario dire sulla cura di questa malattia, che secondo la medesima deve esser diretta.

Nell'amaurosi della prima specie, o sia dipendente da plethora si richiede il metodo evacuante, emetico, e principalmente i salassi. Questi sono molto più vantaggiosi se si faranno presente alla parte, e quindi sono in questi casi utili le sanguigne dalla jugulare, o le sangui-

sughe in quantità alle tempia. Oltre i salassi verranno i purganti, ed i vescicanti, e se la dipende dalla soppressione di una qualche evacuazione è certo, che il primo oggetto deve esser lo di richiamare la medesima.

La seconda specie di amaurosi, ossia quella dipendente da debolezza va curata con un metodo tutto opposto, e quindi nella medesima saranno utili i medj stimolanti. Fra questi hanno luogo principalmente la china, ed i marziali adoperandoli tanto internamente quanto esternamente. Per uso esterno gioveranno ancora moltissimo la doccia, e strofinazioni fatte con liquori spiritosi tanto alle tempia, quanto sulle palpebre, ed al sopraciglio. L'acqua fredda è stata in questi casi molto raccomandata, ed i vescicanti, o la tintura di cantarelle, ancora l'elettricità. La canfora si è eziandio trovata giovevole, e finalmente la moxa da applicarsi alla nuca, o alla fronte. Questi medicamenti altro dovranno adattarsi alla specie di debolezza che forma la cagione della malattia, posciachè se debolezza sia generale convengono piuttosto gli stimolanti, che agiscono su tutto il sistema, mentre all'opposto se dessa sia puramente locale saranno più adattati gli stimolanti locali; ma uniti agli altri detti.

Per quello poi, che appartiene alla terza specie di amaurosi, o sia quella, che abbiamo detto consensuale, o simpatica conviene esaminare qual sia l'organo primieramente affetto, che produce la malattia. Noi osserviamo generalmente, che l'amaurosi di questa specie per ordinario riconosce la cagione da una saburra delle prime vie, e quindi il metodo di cura deve consistere primieramente negli evacuanti, che è quanto dire purganti, ed emetici, e dopo di essi potrà passarsi all'uso dei



geri tonici , e segnatamente della china , che nel tempo che darà del tono ai nervi della macchina , ed a quelli dell' occhio ristituirà alle prime vie il vigore , che possono aver perduto sotto l' uso degli evacuanti . Fra i medicamenti , che si sono adoperati con vantaggio nell' amaurosi prodotta da affezioni gastriche è stato particolarmente lodato il tartaro emetico , la di cui azione per altro viene reduta da molti Autori non essere in questi casi evacuante , ma piuttosto stimolante il sistema nervoso . Esso per altro è molto utile segnatamente se uniscasi con altri attonanti . Molti altri medicamenti sono stati proposti per la cura di questa specie di amaurosi , e particolarmente varie preparazioni antimoniali , come il kermes , lo zolfo dorato , il vino antimoniato , e simili . Si è pure ricercato del vantaggio da qualche preparazione mercuriale , in specie da quelle , che agiscono producendo qualche evacuazione , come per esempio il calomelano .

Resta ora a far menzione sulla cura dell' amaurosi prodotta da vizio generale degli umori , o da lesione locale . Se la malattia dipende da vizio generale degli umori , è indispensabile , che la cura consista nel correggere la cattiva indole medesima , quindi si dovrà trattare la malattia con quei medicamenti adattati al vizio predominante sia esso venereo , artritico , erpetico , scorbutico , scrofoloso ec. Può in questi casi essere molto utile il richiamare l' irritazione all' esterno per mezzo di un vescicante , o setone , fonticolo , o apismi , secondo lo stato della malattia . Questo si fa generalmente luogo nelle ripercussioni di malattie segnatamente esantematiche , ed in specie di quelle del capo , come per esempio la tigna .

Se l' amaurosi venga prodotta da cagioni locali ,

siccome le medesime sono spesso impossibili a togliersi, così la cura radicale ne è impossibile, e tutto al più quello, che si può ottenere per mezzo dei rimedj si è di ritardare l'avanzamento della malattia. Qualora poi l'amaurosi dipenda da offesa del nervo frontale, gli stimolanti locali, fra i quali l'elettricismo possono essere di qualche vantaggio. Finalmente in quella dipendente da vermi si appresteranno gli antidoti necessarj come l'etiope minerale, il felce maschio, la valeriana ec.

Per terminare il trattato delle malattie più interessanti degli occhj ci resta di brevemente parlare del cancro dei medesimi. Avendo noi già trattato nella precedente sezione del cancro in generale, in cui abbiamo anche accennato quello dell'occhio in particolare, poco dobbiamo aggiungere su questo ultimo, dovendo esso esser curato secondo le medesime regole generali già esposte. Per altro un riflesso merita a questo proposito una particolare attenzione, e ciò si è il luogo della malattia, poiché essendo l'occhio situato così vicino al sensorio comune, ed avendo una connessione così immediata con esso per mezzo di tanti nervi, la malattia può facilmente, e sollecitamente attaccare questo viscere tanto interessante, e produrre delle funeste conseguenze.

Dalla descrizione, che noi abbiamo dato dei sintomi, i quali accompagnano il cancro si può facilmente dedurre quali siano le apparenze, che presenta il cancro dell'occhio, e che difficilmente potranno dar luogo ad equivoco sulla natura, ed indole della malattia, ma il gonfiore, il dolore esteso, e l'aspetto stesso della medesima non lasceranno alcun dubbio sulla diagnosi.

Lo staffiloma, l'oftalmia, e le altre malattie gravi, che interessano il globo dell'occhio possono esser



usa del cancro del medesimo, e secondo queste canoni potrà il Cerusico formare un piano di cura per questa malattia, che è sempre grave, e pericolosa, particolarmente, come si è detto per la sua vicinanza al cervello. Sebbene pochi sono i medicamenti, che si trovano utili in questo caso, ciò non ostante dovrà il professore non omettere di tentare quei rimedj adattati, tanto contro la natura cancerosa della malattia, che già abbiamo esposti trattando del cancro in generale, quanto contro il vizio dominante che esista, o contro la cagione locale di malattia precedente. Per altro se questi rimedj riescano poco efficaci, come suole avvenire, e se ci sia luogo da temere, che per mezzo del nervo ottico possa venire affetto il cervello, il miglior partito si è quello di ricorrere all'estirpazione del globo dell'occhio, che non meritando di essere inclusa fra le grandi operazioni, l'esponiamo qui appresso. Questa si pratica per mezzo di una forbice convessa, o anche meglio di un bistouri procurando di distaccare il globo dalle sue aderenze coll'orbita, ed indi recidendo il peduncolo del medesimo composto del nervo ottico, muscoli, vasi ec. Si deve in questo caso porre attenzione a portar via tutte le parti affette, inclusivamente alla congiuntiva, ed alle palbre se siano anch'esse indurite, alterate nel colore ec. onde non resti il minimo germe della malattia, che potrebbe facilmente riprodursi, e cagionare delle cattive conseguenze. L'emorragia si arresta facilmente con la compressione, posciachè la cavità dell'orbita presenta una resistenza sufficiente per tale oggetto.



nerale , il felce maschio , la valeriana ec.

Per terminare il trattato delle malattie interessanti degli occhj ci resta di brevemente del cancro dei medesimi . Avendo notato nella precedente sezione del cancro le , in cui abbiamo anche accennato quell'occhio in particolare, poco dobbiamo aggiungerlo ultimo , dovendo esso esser curato secondo le regole generali già esposte . Per altro merita a questo proposito una particolare attenzione , e ciò si è il luogo della malattia , chè essendo l'occhio situato così vicino al cervello comune , ed avendo una connessione immediata con esso per mezzo di tanti nervi , la malattia può facilmente , e sollecitamente produrre in questo viscere tanto interessante , e produr le funeste conseguenze .

Dalla descrizione , che noi abbiamo fatto de' sintomi , i quali accompagnano il cancro dell'occhio , facilmente dedurre quali siano le apparenze , e che difficilmente si possa senza il cancro dell'occhio , e che difficilmente si possano dar luogo ad equivoco sulla natura della malattia .

sa del cancro del medesimo, e secondo queste ca-  
 si potrà il Cerusico formare un piano di cura per  
 sta malattia, che è sempre grave, e pericolosa,  
 icolarmente, come si è detto per la sua vicinanza  
 rvello. Sebbene pochi sono i medicamenti, che si  
 vano utili in questo caso, ciò non ostante do-  
 il professore non omettere di tentare quei ri-  
 adattati, tanto contro la natura cancerosa della  
 tia, che già abbiamo esposti trattando del can-  
 generale, quanto contro il vizio dominante  
 sta, o contro la cagione locale di malattia pre-  
 te. Per altro se questi rimedj riescano poco  
 i, come suole avvenire, e se ci sia luogo da  
 e, che per mezzo del nervo ottico possa ve-  
 affetto il cervello, il miglior partito si è quello  
 orrere all'estirpazione del globo dell'occhio,  
 on meritando di essere inclusa fra le grandi  
 ioni, l'esponiamo qui appresso. Questa si  
 e per mezzo di una forbice convessa, o an-  
 eglio di un bistouri procurando di distaccare  
 o dalle sue aderenze coll'orbita, ed indi re-  
 o il peduncolo del medesimo composto del  
 ottico, muscoli, vasi ec. Si deve in questo  
 orre attenzione a portar via tutte le parti af-  
 inclusivamente alla congiuntiva, ed alle pal-  
 se siano anch'esse indurite, alterate nel co-  
 e, onde non resti il minimo germe della ma-  
 che potrebbe facilmente riprodursi, e cagio-  
 elle cattive conseguenze. L'emorragia si ar-  
 acilmente con la compressione, posciachè la  
 dell'orbita presenta una resistenza sufficien-  
 tale oggetto.

## ARTICOLO III.

*Delle Malattie degli Orecchi .*

**L**e malattie , che attaccano gli orecchi tanto numerose , quanto quelle degli occhi esistono per altro alcune ancora in queste che possono portare la perdita dell' udito re alle volte eziandio in pericolo la vita di mo . Siccome però l'organo dell' udito è posto alla vista del Professore , e le sue parti sono molto nascoste , ed alcune affatto invisibili , quindi è , che le malattie dell' orecchio sono tanto ben conosciute , quanto quelle degli organi de' sensi . Gli Autori di Chirurgia comunemente per maggior chiarezza divisione dell'organo dell' udito in quelle dell' esterno , ed in quelle dell' orecchio interno .

Fra le malattie dell' orecchio esterno non primieramente attenzione quelle , che danno tutto il padiglione , giacchè essendo esse necessarie per riflettere i raggi sonori nel meato torio , se desso manchi , quantunque non sia la sordità assoluta , pure non potendo i raggi così essere esattamente diretti nel meato stesso seguirne almeno per vario tempo una diminuzione dell' udito . La mancanza del padiglione nasce ordinariamente in conseguenza di un istrumento tagliente , che venga a recidere desso resti ancora in parte attaccato alla cartilagine , e si vorrà tentare di riporlo in sito , e per mezzo di rotoli adesivi , o se dessi non siano sufficienti anche raccomandato qualche punto di suture a mantenerlo nella sua situazione , col qual mezzo si ottiene qualche volta la riunione , non o



tattata fasciatura, che per ben situarla, e non fare fastidio alla sensibilità del padiglione deve riempito di cotone quello spazio, che passesso, e le parti sottoposte, come anche riempire il cavo dell' orecchia. Se gli esposti metodi siano sufficienti per la riunione, o se dal feriente sia stato portato via intieramente, altro rimane, che il medicare la ferita coi metoninarij, e dopo seguita la cicatrice supplire alla lacerazione del padiglione con qualche istromento di cera, o di altra adattata sostanza, che si lega ai capelli, e supplisce passabilmente al difetto prodotto dalla ferita.

In alcune volte anche il lobulo dell' orecchio può essere soggetto a qualche malattia, e questa consiste principalmente nei tumoretti, che hanno la loro sede nella cellulosa di cui è formata la parte principale del medesimo. Dessi sono sovente l' effetto dell' infiammazione prodotta dal forare il lobulo stesso, ma questa non è, che la causa occasionale della malattia, poichè i vizj interni della macchina possono molto contribuire, e rendere la medesima di difficile considerazione, producendo delle ulcere di particolare carattere, che obbligano ad intraprendere una cura interna. In generale l' indicazione curativa di questi tumori consiste nell' estirpazione secondo le regole già date parlando dei tumori in generale. Se si riunendovisi una particolare complicazione procedendo da cagione interna si dovrà intraprendere la cura antisifilitica, antiscorbutica, o antiflogistica ec. secondo l' indole del vizio preesistente.

L' ostruzione del meato auditorio è una malattia che è sovente congenita, come dipendente da un vizio di conformazione. Quest' ostruzione può essere di più specie: può cioè il meato auditorio

medesima, e dando così il libero passaggio.  
La difficoltà di questa operazione consiste  
primamente nell'individuare esattamente il luogo preciso, dove  
si trova detta membrana, cosa, che è alquanto difficile, se  
la medesima sia situata un poco profondamente, a causa  
della tortuosità del canale stesso. E' necessario prendere  
molta attenzione di non offendere la membrana del timpano, il qual pericolo ha  
avuto a molti l'uso del caustico a quella parte  
tagliente. Ciò che dovrassi procurare è l'apertura della  
membrana sarà di mantenuta, al quale oggetto saranno molto  
adatti i fili, o altri corpi, come per esempio delle  
lamine di cera.

La seconda specie di ostruzione del canale  
che dipende da un ingrossamento delle  
cartilagini del canale stesso, è ordinariamente  
incurabile, segnatamente quando questo  
ha fatto segno da rimanere oblitterato affatto, se  
non lasci ancora qualche spazio, non sarà  
possibile per mezzo dell'introduzione di corpi  
gradatamente accresciuti di ottenere a poco  
a poco una maggior dilatazione del medesimo.

el medesimo di qualunque natura essi siano. Al-  
 volte però può esistere dentro l' orecchio una  
 senza cellulare, che lo riempia, ed in questo ca-  
 l miglior rimedio si è quello di spingere un  
 cart alla profondità di 15. a 18. linee fino che  
 ente un vuoto, ed indi porre nel canale un qual-  
 corpo, che impedisca, che esso nuovamente si  
 luda. Se però l' ostruzione del canale arriva fino  
 membrana del timpano, la malattia sarà incu-  
 e. Se siano entrati casualmente nell' orecchio de'  
 i estranei duri, come ossa di ciliegie, e simili  
 necessario spalmare le parti con dell' olio, on-  
 cilitare l' esito del corpo ivi arrestato, e do-  
 li questo si procurerà di estrarlo colle pinzet-  
 altrimenti se ciò non è possibile si faranno delle  
 zioni nell' orecchio stesso, e così si estrarrà più  
 mente. Il cerume delle orecchie è quello, che  
 e volte radunandosi in gran quantità, ed ad-  
 andosi vieppiù ottura il meato auditorio, e pro-  
 la sordità. Questa cagione è delle più fre-  
 ti, particolarmente nell' età avanzata, la cura  
 altro di essa non è molto difficile, giacchè sarà  
 iente l'introdurre un poco d'olio nell' orecchio  
 ammolire il cerume, ed injettarvi poi dell' ac-  
 calda per iscioglierlo. Si potrà ajutare l'esito del  
 ne con uno stromento adattato detto comune-  
 e stuzzicaorecchio.

Le malattie della membrana del timpano, che  
 tano attenzione particolare sono l'indurimento  
 medesima, l'ossificazione, il suo laceramento,  
 anco la sua distruzione totale. Queste malat-  
 on sono generalmente facili a conoscersi da qual-  
 intoma esterno, ma è assolutamente necessaria  
 zione locale, che molte volte resta difficile a  
 o della situazione del meato auditorio. La mem-  
 del timpano è soggetta a diventare sempre più



densa col crescere dell'età, ma se sopraggiungono delle infiammazioni in queste parti, arriva essa non di raro ad una durezza considerabile. Questo nasce particolarmente dagl'ingorgamenti della membrana mucosa, che riveste quella del timpano nella sua parte interna. Tale ingrossamento della membrana produce, che non essendo essa più adattata alle oscillazioni non può più trasmettere nella cassa del timpano le vibrazioni de' raggi sonori, e quindi ne siegue la sordità. Molti rimedj sono stati proposti per la cura di codesta malattia, ma a dire il vero con poco profitto, poichè inutili sono ordinariamente rimaste le fumigazioni da alcuni consigliate, come ancora le iniezioni fatte dalla parte interna dell'orecchio, o sia per la tromba eustachiana. Oltre a che questi rimedj sono assai difficili a porsi in opera. Alcuni pratici moderni hanno proposto di sostituire a tutti questi metodi quello di perforare la membrana del timpano, metodo quanto di più facile esecuzione, altrettanto più sicuro, ed infatti si è molte volte con questo mezzo riuscito ad ottenere la cura della malattia. Si adopera a tal fine un troicart piccolo un poco curvo, si solleva il padiglione esterno dell'orecchio per poter rendere più retro il tratto del meato auditorio esterno, e s'introduce lo stromento in modo, che arrivi a perforare la membrana del timpano nella sua parte anteriore, ed inferiore, acciò non offendosi la corda del timpano ed il manico del martello. Altri Autori all'uso del troicart sostituiscono quello del caustico, ma questo può essere riunito spesso a gravi inconvenienti, e segnatamente di restarne qualche porzione nel meato auditorio. Nei casi di ossificazione avrà luogo lo stesso metodo, ma ciò riuscirà di raro utile nella perfetta ossificazione della membrana del timpano. Ne è da temersi, che questo foro, che ri-

nella membrana sia d'impedimento all' udito, re sappiamo da moltissime osservazioni, che i malati sentono benissimo ad onta che la membrana non sia intiera, come esporremo meglio qui esso trattando dei laceramenti della medesima. Cotesta membrana può restare lacerata, e si cove facilmente la malattia facendo delle forti espirazioni, avendo il naso, e la bocca chiusa, giacchè allora de l'aria uscire dal meato auditorio esterno, lo che nosce pel motò di un lume, de' capelli &c., e pel aggio nella gola delle iniezioni fatte al condotto torio esterno. Lo specillo cautamente introdotto ancora dar molto lume su questa affezione. Essiene prodotta ordinariamente da violenze esterne, e per esempio l'incauta introduzione degli stuzzicorecchi, dall'urto violento di altri corpi, o anche l'aria, così ancora si può rompere la detta membrana occasione di malattie locali, come ulceri, suppurazioni &c. Queste aperture per altro non sono to difficili a chiudersi naturalmente secondo le oscillazioni dei più celebri pratici, ma qualora anrimanesse una piccola apertura nella membrana ne viene da questa alcun impedimento all' udito. Egli è vero, che alcuni esempj vengono riportati da varj Autori di Chirurgia, i quali dicono, che rottura della membrana del timpano, abbia avuto ogo la sordità irreparabile; se per altro riflett bene a queste osservazioni sembra più, cheabile, che la perdita dell' udito non sia stata licemente prodotta dalla lacerazione della membrana del timpano, ma piuttosto bensì dal rimanere o il punto, dove si attacca il manico del marte, e quindi rimanendo quest' osso distaccato dal posto, ne verrà appresso il disordine delle alveole, si verrà a distaccare la staffa dalla finestra, e venendo a seguirne lo scola delle acque con-



tenute nel labirinto, i nervi rimarranno inabili a trasmettere le oscillazioni dell'aria. Ed infatti egli è certo da molte osservazioni, che non solo un forame nella membrana del timpano non è sufficiente a produrre la sordità, ma neanche lo è la perdita degli ossetti medesimi sapendosi, che in molti casi non ostante la distruzione di essi in occasione di suppurazione il paziente ha continuato a sentire passabilmente bene, lo che dà motivo a credere, che in alcune circostanze la membrana, che ricuopre la finestra rotonda possa servire allo stesso uso, che la membrana del timpano. Nei casi dunque di lacerazione, o distruzione totale di questa membrana poco avrà da fare il Cerusico nel primo caso, se non che prevenire i sintomi, ed in particolare l'infiammazione delle parti, e l'emorragia, che possono essere la conseguenza dell'azione violenta, che ha prodotto la lacerazione della medesima. Nel secondo caso poi, che la lacerazione nasca da una suppurazione nell'interno dell'orecchio si dovrà il Professore regolare secondo i precetti, che daremo in seguito trattando di questa specie di suppurazione.

*Otitide* si dice l'infiammazione del meato auditorio, e di tutte le parti interne dell'orecchio. In questa malattia risente il malato un continuo dolore molte volte assai acuto nell'orecchio affetto, che si propaga alle parti vicine. Essa riconosce ordinariamente per cagione un reuma, una erisipela della faccia, e delle parti esterne dell'orecchio, o l'azione di corpi estranei introdotti nel medesimo, ed è questa malattia pericolosa sì per la suppurazione che può nascere, come eziandio per la propagazione dell'infiammazione, che può arrivare alle parti più interne, e produrre ancora la morte. Appartenendo l'*Otitide* piuttosto al Medico, che al Cerusico sarà sufficiente l'accennare in generale riguardo alla cura, che dessa



consistere nel metodo antiflogistico principian-  
 i salassi generali, ed indi locali, adoperan-  
 do stesso tempo delle iniezioni emollienti, e  
 o poi all'uso dei vescicanti qualora lo stato  
 malattia li richieda.

Il riguardo merita per parte del Cerusico la  
 azione dell'orecchio, che spesso è la conse-  
 dell'inflamazione del medesimo. Lo scolo  
 varia secondo l'indole della suppurazione stes-  
 ichè o si fa per la tromba di Eustachio, o  
 l'orecchio interno nelle fauci, ovvero si pre-  
 er l'orecchio esterno. Nel primo caso la mem-  
 del timpano è intiera, nel secondo essa viene  
 irsi, cadono le ossetta dell'udito, e la con-  
 za può esserne come abbiamo detto la sordità.  
 ancora succedere, che il pus restando nella ca-  
 del timpano invece di rompere la membrana del  
 imo si faccia strada nella sostanza cellulare dell'  
 mastoide, e produca la carie della medesima  
 ando con un tumore all'esterno in detto luo-  
 anche formando la deposizione all'interno del  
 con pericolo della vita del malato, poichè al-  
 a marcia si fa strada fra l'osso temporale, e la  
 madre, e comprime il cervello, ovvero lacera la  
 membrana. Può eziandio l'ascesso forar l'os-  
 formare un tumore tanto all'esterno, quanto  
 erno del cranio, i quali comunichino fra di  
 Questi non lasciano di essere molto pericolo-  
 bbonsi distinguere a tale proposito alcune spe-  
 scoli purulenti delle orecchie, che meritano  
 e considerati. Il primo è quello de' fanciulli,  
 principio suole essere sempre benigno, se  
 on sia di natura scrofolosa, come spesso ac-  
 Debbono ancora particolarmente riguardarsi  
 oli purulenti, che dipendono da vizio parti-  
 della macchina, come erpetico, venereo &c.

ed i quali essendo semplicemente sintomatici meritano essere curati secondo la malattia primitiva. Alcuni finalmente riportano de' casi di suppurazione di orecchio prodotte da polipi nel medesimo.

Giusta queste diverse cagioni della malattia deve essere diretto il metodo di cura. In generale sarà regola poi di non usar mai in codesti casi dei forti ripercussivi, o iniezioni astringenti, potendo questi medicamenti produrre delle funeste conseguenze, particolarmente se la malattia venga causata da vizio interno. La prima indicazione nella cura di essa, sarà quella d'impedire il passaggio delle marce nelle parti, dove potrebbe produrre del pericolo, e di diminuire la suppurazione stessa. Per quello, che appartiene alla diminuzione della suppurazione, questa non si può ottenere con de' rimedj violenti, ma è necessario contentarsi dei semplici astersivi, e delle iniezioni tiepide di orzo per esempio, e mele rosato, passando in seguito a quelle un poco attonanti come sono il vino, e lo spirito di vino allungati coll'acqua, qualche decozione leggermente astringente, a cui si può unire piccola dose di tintura di mirra &c. Nei casi di suppurazione prodotta da vizio interno sarà necessario aprire un emuntorio, cioè un vescicante, o meglio ancora un setone, e nello stesso tempo praticare una cura interna, ed allora essendovi altra strada aperta alla marcia si potrà procedere all'uso di iniezioni alquanto più forti, dovendosi allora meno temere una ripercussione.

Qualora poi ad onta di questi rimedj non si sia potuto arrivare ad impedire, che la marcia abbia occupato le cellule mastoidee, onde potersi presumere la carie, sarà necessario aprire l'apofisi mastoidea stessa per dar esito al pus, e questo si potrà fare con un troicart, facendo poi pel medesimo forame



delle iniezioni astersive, se per altro cotesto fluido siasi inoltrato sotto l'osso temporale, e che vi sia gran fondamento di ciò credere, converrà anche ricorrere alla trapanazione.

La carie delle ossa dell'organo dell'udito può venire in seguito della suppurazione, ma essa non ha luogo, che rarissime volte nella parte petrosa, essendo questa troppa dura per venirne soggetta, e quando essa accade, ha ordinariamente la sua sede nell'apofisi mastoide, e di lì la marcia infatti passa nella cavità del timpano, dove produce ancora la carie degli ossetti dell'udito situati nella sudetta cavità, non che cagiona la totale distruzione della membrana del timpano, e l'apertura della finestra ovale, da cui nasce irreparabilmente la sordità. In caso di suppurazione dell'orecchio prodotta da cagione venerea, la carie ne è sempre il termine. Questo ordinariamente si dà a conoscere come di sopra abbiamo detto con un tumore dietro l'orecchio, il quale aprendosi sentesi collo specillo la carie dell'osso sottoposto. Il caustico attuale è il miglior rimedio, e forse l'unico in questi casi.

Può la mancanza di udito dipendere eziandio da vizio de' nervi, e particolarmente dalla loro debolezza. Vi è chi ha creduto assai utile in questo caso l'emetico, ma in generale converrà la cura intera attonante, osservando per altro, che se la malattia nasce da cagione locale sarà incurabile. L'elettricità è stata ancora molto encomiata nella sordità nervosa, e sene è ritratto del vantaggio.

Convieni a questo proposito osservare, che l'affezione dei nervi inservienti all'organo dell'udito può esser varia, e consistere o nell'elevata sensibilità di quest'organo, o nella diminuzione della medesima. Nel primo caso ogni impressione sonora sull'orecchio diviene al medesimo intollerabile. Nel se-



condo se ne richiede una ben forte sulla membrana del timpano , affinchè possa percepirsi un qualche suono . La cognizione delle cagioni , le quali hanno prodotto la malattia , può dar molto lume sul metodo di cura da tenersi nella medesima : dobbiamo per altro quì riflettere , che la maggior parte di queste cause sono poco note , e difficili a conoscersi , e che in molti casi se vengano conosciute difficile ne è il rimuoverle , segnatamente quelle , che dipendono da una continua esposizione dell'organo dell'udito ad impressioni troppo forti , o troppo deboli , le quali cagionano nei nervi una troppo gran debolezza , e sensibilità , onde essi non possono venire stimolati , che da impressioni analoghe a quelle , a cui sono assuefatti . Per altro l'uso degli evacuanti , e debilitanti , come ancora quello degli stimolanti ben diretto , e regolato secondo le cagioni della malattia potrà essere assai utile nella cura di queste affezioni dell'organo dell'udito .

#### ARTICOLO IV.

##### *Malattie del Naso .*

**L'**organo dell'odorato è soggetto a molte malattie oltre quelle , delle quali abbiamo già parlato trattando delle malattie generali come ferite , fratture &c. Tra le medesime noi sceglieremo le più interessanti , che sono l'obliterazione delle narici , l'epistassi , il polipo , la coriza , l'ozena , e gli ascessi dei seni mascellari , e frontali .

L'obliterazione delle narici può nascere o per un vizio congenito , che consiste in una aderenza delle ali del naso , ovvero per una esulcerazione di queste parti , che produca il medesimo effetto , e segnatamente quelle cagionate da ulceri d'indole maligna , e prodotta

el primo caso  
 in un bistouri,  
 to tempo dopo  
 nule, le quali  
 o la riunione,  
 quire. Lo stes-  
 bastante nelle  
 veniente da ca-  
 a cura locale è  
 erale coi rimedj  
 enerei mentre il  
 ogni altro tra-  
 e Scrittore mo-  
 mento delle na-  
 a membrana pi-  
 o di qualche vi-  
 alle parti vicine,  
 etette, o cannule  
 nelle narici, e se-  
 abbiamo detto, in  
 rimedj opportuni a

Il naso quantunque sia  
 che il Cerusico, non è  
 te obbligato a presta-  
 che essa sia troppo vio-  
 generali. Convienè usa-  
 re questa emorragia, par-  
 da pletora generale, o da  
 abituali. Qualora però si  
 nè giovino le aspersioni  
 iezioni astringenti, an-  
 i passare alla compres-  
 tanto dalla narice ester-  
 e sfilà imbevute in un  
 continua per lo ad

riore si viene a portarlo  
forma una compressione  
zione di filo fuori della  
lo quando non sarà più  
filo accennato si sono a  
argento, di gomma ela  
quello composto di una  
tro una molla di acciaio  
è entrata nella narice si  
facilmente nella narice  
dulo, ed alla sua estrem  
poi la molla, e così il  
riore. E' necessario indi  
un turacciolo simile, il  
lascerà in sito 4 o 5 gior  
epistassi nate da vizio in  
medj diretti contro il n  
frequentemente nello scorbuto  
verranno i rimedj adatta

Un'altra malattia de  
il polipo del naso, mal  
cadere. Parlando dei tur  
adiposi nel trattato dell



te non meno rimarchevole. Questa consiste in un ulcere del naso, che tramanda delle materie putride fetidissime, ed accompagnata spesso da carie dell'ossa del naso. Dessa cagiona al paziente de' dolori continui, ed infetta fino il fiato del medesimo. La coriza è sovente la causa dell'ozena, che consiste nell'inflammazione della membrana pituitaria, e che esige quei riguardi, i quali si prescrivono generalmente nell'inflammazione di tal natura. Se l'ozena riconosce la sua origine da questa affezione della membrana mucosa delle narici, dessa è sempre cagionata dal vizio venereo, abbenchè possa ancora dipendere da quello scrofoloso, erpetico, e canceroso etc. L'ozena sebbene è malattia quasi sempre incurabile, almeno radicalmente, essendo come si è detto spesso unita alle carie delle ossa, particolarmente se la medesima sia avanzata, ciò nonostante non debbono tralasciarsi i rimedj generali, e locali convenienti alla natura di essa. L'oggetto principale della cura dunque si è quello di astergere localmente le ulcere con dell'iniezioni adattate, di stabilire qualche emuntorio, e di somministrare de' rimedj proprj a distruggere la cagione interna della malattia. Le iniezioni consisteranno nella decozione di China, o di corteccia di Quercia, ed altre piante analoghe, alla quale si unirà dello spirito di vino, e dello zucchero. Sarà vantaggiosa ancora l'applicazione sull'ulcere di poche sfilate con unguento formato di estratto di saturno, laudano liquido, olio di amandole dolci, e poca cera depurata. Ma ciò, che molto interessa si è di dare i medicamenti interni. Essendo il più delle volte l'ozena d'indole venerea si dovrà principalmente somministrare il mercurio, e la decozione di salsaparrilla. La miglior preparazione sarà il sublimato usato con le dovute cautele, se il temperamento del

malato ne permetta l'amministrazione. Nelle ozenes scrofolose, erpetiche etc. si adopereranno i rimedj adattati contro questa malattia, e se la cagione della medesima non appartenga a quelle qui sopra accennate, i frequenti minorativi, gli evacuant, l'indicato unguento, e specialmente i derivativi applicati in vicinanza della parte offesa potranno essere di molto vantaggio per la cura dell'ozena.

Ai mali, che attaccano il naso appartengono ancora quelli dei seni mascellari, e dei seni frontali. Le principali malattie de' seni mascellari si possono restringere agl' ascessi, ed ai polipi. Gli ascessi dei seni mascellari riconoscono la loro origine dall' infiammazione catarrale della membrana pituitaria. Questa principia con un dolore profondo nella parte, che si estende dai denti molari fino all' orbita, ed occupa tutta l' estensione del seno stesso. Le parti esterne non sono sul principio alterate, ma a poco a poco principiano a gonfiarsi, il seno si riempie di materia, le ossa si rammolliscono, e si gonfiano, e si osserva di sovente all' esterno il tumore prodotto dalla raccolta del fluido. Dal naso esce una materia puriforme quando il malato si soffia il medesimo con forza, ed alla fine il pus si apre una strada nella parte inferiore del seno ordinariamente nell' arco alveolare, o sulla faccia, ne resta una fistola, e cadono i denti per la carie dell' ossa.

Le cagioni di codesta malattia possono essere interne, o esterne. L' infiammazione della membrana pituitaria è la più comune. Questa può essere determinata da molte cagioni p. e. le contusioni sulle gote, la carie di uno dei denti molari, ma questa può essere ugualmente la causa, che l' effetto della malattia. L' estrazione dei medesimi denti



l'irritazione della membrana pituitaria, o per un  
to che può lasciare nel fondo dell'alveolo è ca-  
te ugualmente di produrre l'infiammazione. Fra  
cause di essa si debbono ancora annoverare le  
ite della guancia, che penetrino nel seno, così  
andio quelle dell'orbita, l'infiammazione delle  
ti interne del naso etc. Ma può talvolta questa  
attia riconoscere una cagione interna, e segna-  
mente un vizio venereo, come anche quello scro-  
so, o scorbutico, e finalmente la ritrocezione  
qualche esantema, che occupi la faccia, o la  
a.

Gli ascessi dei seni mascellari non sono di gua-  
ione difficile se vengono conosciuti, e ben trat-  
sul principio, ma se la malattia abbia fatto dei  
gressi, e siansi prodotte delle fistole, e la ca-  
delle ossa, si rende molto complicata, e di esi-  
ncerto, e sovente pericoloso.

Le indicazioni, che debbonsi avere nella cura  
malattia sono in primo luogo di procurare un'  
libero al pus, in secondo luogo di deterge-  
seno, ed in terzo finalmente di togliere le ca-  
i dell'ascesso se è possibile.

Per procurare il libero esito al pus è necessa-  
aprire il seno nella sua parte più declive. Il  
ior metodo per praticare quest'operazione si è  
a di estrarre uno, o più denti molari secon-  
bisogno, ed indi forare l'alveolo con un troi-  
onde dar esito al pus. Si deve estrarre a pre-  
za il dente cariato, sia esso la cagione, o  
tto della malattia. Se tutti i denti sono sani  
trarrà il terzo, o quarto dente molare, o an-  
meglio come altri vogliono basterà perforare il  
al basso della fossa canina.

Aperto il seno mascellare, ed uscito il pus si  
astergere l'ulcera con delle iniezioni adatta-



te, e nello stesso tempo procurare, che il foro vi rimanga il tempo necessario per la cura. A quest' oggetto si faranno delle iniezioni con dell' acqua d'orzo, e miele, od altre astersive adattate alla natura delle ulcere, ed allo stato delle ossa. Per mantenere poi l'apertura fatta fa di mestieri introdurre continuamente nella medesima o delle tastre di sfilà, o delle sponghes, o qualunque corpo capace di tener dilatato il foro. Quando le ulcere sono asterse essa si chiude da se stessa in tempo più o meno lungo, secondo l'estensione delle medesime. Nei casi di origine venerea, o altra interna si adopereranno i rimedj adattati, e già più volte accennati, e mai abbastanza raccomandati. Riguardo alle fistole, esse poche volte richiedono rimedj locali, cedendo da se stesse dopo tolta la cagione generale della malattia.

I polipi dei seni mascellari sono escrescenze ordinariamente carnose, che si formano nel seno medesimo, e che procedono da cause locali, o generali. Ordinariamente nascono in conseguenza di flussioni ripetute della membrana pituitaria, che ricopre il seno medesimo, e sono di colore rosso-stro, e duri. A poco a poco riempiono essi tutta la cavità del seno, allora crescendo continuamente in volume distendono il seno medesimo, ed arrivano perfino a romperlo nelle parti più deboli, segnatamente sotto l'orbita, spingendo fuori della medesima l'occhio. Per solito terminano col fare cadere i denti, ed in questo caso si stabiliscono delle aperture fistolose, dalle quali esce eziandio l'azione del polipo. Esso talvolta si fa ancora strada per l'apertura dei seni mascellari, e si prolunga nelle fosse nasali. L'assottigliamento delle reti dei seni, o anche la carie delle medesime, non la conseguenza della malattia.

La cura di questi polipi non molto differisce quella, che abbiamo accennato parlando degli stessi dei seni medesimi. Per distruggere l'escrescenza è necessario aprire il seno stesso nel luogo, che presenta una maggiore elevatezza, lo che non è difficile essendo le ossa in questo luogo molto tenui, e di poca consistenza a motivo della malattia. Il foro deve essere della maggiore ampiezza possibile, nè questo deve dar luogo al timore di lacerità, o difficoltà di rimarginarsi, poichè tolta l'escrescenza carnosa, le ossa riprendono il loro naturale luogo, e la ferita si rimargina perfettamente. Quest'apertura produce non di raro delle emorragie considerabili, ch'è necessario arrestare con delle compresse, o altri metodi adattati prima di passare a distruggere la sostanza poliposa. Il metodo a questo fine da alcuni proposto di strappare il polipo tagliandolo, o strappandolo, presenta molti inconvenienti. In primo luogo è desso sempre seguito da forti emorragie, le quali impediscono l'operazione, ed inoltre sebbene venga trasportata felicemente a termine, non ne siegue per questo sempre la totale guarigione, poscia il polipo estirpato in questa maniera facilmente ripullula. Il miglior metodo quindi da tutti i recenti Pratici raccomandato si è quello del fuoco, giacchè con esso vengono ad evitare i due inconvenienti accennati. Il metodo di adoperare il fuoco si è quello far uso di un ferro rovente. Questo deve essere condotto nella cavità stessa del seno, portando più volte nel medesimo fino a distruggere totalmente la massa poliposa nella sua radice. E' necessario, che il ferro sia arroventato fino a divenire color bianco, e si deve ripetere l'operazione fin alla distruzione totale dell'escrescenza. Tre, o quattro applicazioni del caustico sono alle volte



sufficienti a questo oggetto, ma non di raro se ne richiedono di più. L'applicazione di tal rimedio produce ordinariamente una maggiore, o minore infiammazione, alla quale deve ripararsi col metodo antistilogistico.

Le malattie, che attaccano i seni frontali sono presso a poco le medesime di quelle, che abbiamo accennato aver luogo nei seni mascellari, soltanto sono meno comuni forse perchè meno facili a riconoscersi sebbene siano ugualmente frequenti. Alcuni Pratici sono di sentimento, che gl'ascessi dei seni frontali quasi mai dipendano da causa locale, ma riconoscano per ordinario una cagione interna generale, all'opposto di quelli dei seni mascellari, l'origine de' quali è ordinariamente locale. Vario anche le malattie di queste parti nella prognosi, essendo gl'ascessi dei seni frontali assai più pericolosi, attesa la vicinanza degl'occhi, e del cervello.

Non è così facile il riconoscere una suppurazione esistente nel seno frontale, potendo il dolore, che accompagna questa malattia essere sovente poco sensibile, e confondendosi facilmente dessa con una coriza ostinata, molto più poi se le marce si aprono una strada pel naso, la dilatazione del seno, che potrebbe essere un indizio sicuro non osservasi mai all'esterno, perchè ivi la lamina ossea è più compatta, che all'interno. Per altro se notasi un dolore acuto nel seno medesimo accompagnato da febbre, e scolo abbondante di materie per la narice non si potrà più dubitare della vera indole della malattia, ed essa diverrà poi certissima se le medesime in luogo di escire da questa parte si facciano strada all'esterno del seno corrodendo la lamina esteriore, che lo compone. Se questa corrosione invece di nascere nella lamina esterna del seno accade nel



mina interna di esso , allora resta più oscuro trattare vero della malattia, ed in questo caso molto pericolosa , producendo l'azione delle marce sul cervello un' apoplezia mortale, di cui sovente ignora la cagione .

La cura degli ascessi dei seni frontali è simile quella degli ascessi dei seni mascellari . Se può Cerusico riconoscere lo stadio infiammatorio della malattia deve trattarla col metodo antiflogistico , ciò di raro accade , nè dessa si conosce , che quando è già stabilita la suppurazione . Per dar esito in questo caso alle marce non vi è altro metodo che quello di aprire un foro nella parte anteriore del seno frontale per mezzo del trapano , ma in molti casi la difficoltà della diagnosi , e la leggerezza apparente della malattia sono di ostacolo a questa operazione per parte del Cerusico , e del malato , e dall' altro canto non si può ritardarla di molto per timore , che le marce si aprano una strada all' interno , molto più se lo scolo pel naso è scarso , e scarso . Se questo fosse molto abbondante si potrebbe forse risparmiare l'apertura dell' osso non essendo impossibile il deterger l'ulcera per mezzo delle iniezioni introdotte per le narici . Si può ora evitare l'operazione dell' apertura dell' osso per mezzo del trapano quando le marce l'abbiano fatto esse medesime , avvertendo per altro di dilazionare l'apertura se dessa non sia sufficientemente grande , onde darle esito .

Qualunque per altro sia stata la maniera , con cui siasi ottenuta l'apertura del seno , l'oggetto del Cerusico deve esser quello di astergere il medesimo , e questo si ottiene con delle iniezioni già di sopra accennate , contenendosi in tutto come nella cura degli ascessi dei seni mascellari , eccetto che nella vicinanza del cervello , e la possibilità della

corrosione della lamina posteriore del seno si deve andare con somma cautela nell'uso dei rimedj irritanti. Se dopo fatta questa operazione resti impedito il passaggio delle marce nel naso, seguitano esse ad escire per l'apertura fatta, che diviene poi fistolosa. Ciò accade sovente quando esiste già la carie delle ossa. Per rimediare a questo inconveniente molti propongono di aprire nuovamente la strada del naso con una tenta introdotta dal seno, ma restando questo assai difficile altri preferiscono d'indurre una suppurazione in tutto il seno facendo delle iniezioni, nelle quali sia stata sciolta una piccola dose di pietra infernale. Questi metodi per altro non sono sempre seguiti da esito felice, e non di raro accade, che il paziente resta con una fistola incurabile.

## ARTICOLO V.

### *Delle Malattie della Bocca.*

**L**e malattie della bocca possono distinguersi in quelle delle labbra, delle gengive, e dei denti, degli organi salivali, della lingua, e palato. Delle altre malattie, che interessano alcune parti interne della bocca si tratterà parlando di quelle della gola, omettendo le altre della mandibola, come fratture, e lussazioni avendone parlato nel primo volume.

Le malattie dei labbri oltre alcune già accennate parlando dell'affezioni in generale sono principalmente la loro riunione, il labbro leporino, le ulceri, ed il cancro. La riunione delle labbra è una malattia molto rara, e se qualche volta accade è congenita. Nascendo questa deformità naturale si guarisce facilmente dividendo i labbri uno dall'altro per mezzo di una incisione orizzonte



e. La precauzione necessaria da aversi in questo caso si è quella di tagliare esattamente secondo la divisione, che si osserva esternamente fra i due labbri.

*Il labbro Leporino* è una malattia la quale è ordinariamente congenita, abbenchè possa essere anche accidentale, e consiste in una divisione, o fessura longitudinale del labbro superiore. Questa è molto più comune della precedente, e per ordinario esiste nel mezzo del labbro stesso, e di raro si osserva nel labbro inferiore. Può darsi il caso, che essa nasca da una ferita delle labbra, e questo è quello, che dicesi labbro leporino accidentale, ed è molto più raro del congenito.

Dividesi dagli Autori il labbro leporino in semplice, doppio, e complicato. *Semplice* dicesi quando una sola è la spaccatura, che lo forma, *doppio* quando esse sono in numero di due, nel qual caso per altro si osserva raramente, che il pezzo intermedio arrivi fino ai bordi dei labbri, ma resta più delle volte sotto la forma di un bottoncino carneo. *Complicato* finalmente si chiama quello, cui oltre alla fessura del labbro si è riunita eziandio la spaccatura del palato, ossia mascellari, uvola, e velo pendulo.

I sintomi prodotti dal labbro leporino sono principalmente quelli d'impedire lo sputare, il masticare, il parlare ec., e tali incomodi sono tanto maggiori, quanto più è estesa la spaccatura del labbro stesso, anzi se questa sia tanto grande, che pervenga fino alle narici, e sia unita ad una divisione corrispondente delle ossa palatine, ne resta in parte impedita ancora la deglutizione, passando i cibi, e le bevande dalla cavità della bocca a quella delle narici. E' da osservarsi per altro, che nei bambini il labbro leporino non impedisce punto il



preferito in tutti i casi, eziandio in quelli, ne' quali ha luogo l'uso de' caustici, poichè la cura è più sollecita, meno dolorosa, ed inoltre sicura, mentre all'opposto se si voglia tentare il taglio troppo tardi, e dopo aver fatto uso inutilmente de' caustici si corre pericolo, che l'operazione non sia fatta in tempo opportuno, ed il cancro resta soggetto alla recidiva. L'asportazione del cancro ha luogo adunque per quanto voluminoso esso sia, e si fa portando via col ferro tutta la sostanza cancerosa, procurando in seguito di riunire per quanto è possibile i labbri della ferita, che è con perdita di sostanza. Per separare completamente tutto il cancro va fatto il taglio secondo la situazione del medesimo, e la parte, che occupa. Comunemente si distinguono quattro casi, cioè se il cancro esista nel margine del labbro senza molto profundarsi, si può recidere con un taglio orizzontale. Se ritrovasi nella parte anteriore del medesimo senza, che arrivi fino alla posteriore si potrà portar via la sola porzione anteriore del labbro. Lo stesso si dica se il cancro abbia luogo nella parte posteriore, e se finalmente desso occupi una porzione notabile del labbro tanto in altezza, che in grossezza si deve affatto estirparlo facendo due tagli, che si riuniscono in basso in un angolo, portando via la porzione intermedia. Questa ferita con perdita di sostanza si deve medicare con la sutura cruenta, la quale procura in breve tempo la cicatrice ancorchè la ferita sia di molta estensione. Negli altri tre casi accennati le ferite si medicano come ferite semplici. Questa operazione è ordinariamente seguita da esito felice, ma non rare volte è soggetto il cancro a recidivare e siccome questo nasce sovente da una cagione interna esistente nella macchina, così sarà bene in-

traprendere subito una cura interna adattata, onde prevenire il ritorno della malattia.

Ai mali della bocca può riferirsi eziandio l'*odontalgia* malattia, che consiste secondo i più recenti Scrittori di Chirurgia in una infiammazione della membrana mucosa, che ricuopre i denti stessi. Questa malattia spesso molto dolorosa può dipendere da varie cagioni, ma una delle principali si è l'alternativa del caldo, e del freddo, ed anche la carie del dente stesso, che mettendo allo scoperto i nervi rende più forte l'azione degli agenti esteriori sopra i medesimi, e quindi ne produce l'infiammazione delle parti contigue. Se l'infiammazione della membrana mucosa sia la cagione immediata dell'*odontalgia*, gli emollienti, ed i derivativi locali, come scarificazioni alla gengiva, o l'applicazione di alcune sanguisughe in essa, oppure i derivativi generali secondo la violenza della medesima formeranno la base della cura. Si crede di somministrare un vantaggio dopo l'esposto metodo l'applicazione di un cataplasma di *cicuta*, e *josciamo*. Se poi l'*odontalgia* dipende da un vizio particolare del dente, segnatamente dalla carie, l'estrazione del medesimo si tiene comunemente pel' unico rimedio conveniente. Devesi per altro riflettere, che la carie molte volte non è, che la cagione predisponente della malattia, per lo che i medesimi rimedj propri uniti alla dieta, ed ai calmanti locali indotti nel dente guasto possono talvolta essere loro soli sufficienti; ma se il dolore continua, che la specie della carie lo permetta, la cauterizzazione collè debite cautele, e l'impiombatura del dente possono eziandio guarire l'*odontalgia* senza correre all'estrazione del medesimo, quale dovrassi soltanto eseguire, se la carie occupa la radice del dente, o abbia distrutta gran porzione della sua corona.

matorio . In questi casi la gota è alle volte non si può aprire la bocca , vi si unisce il dolor di capo , e passa nella parte affettione con rossore , e dolore , dopo tempo in un piccolo ascesso . La cagione primaria di questa malattia , si è un vizio del dente , e segnatamente la carie del medesimo , ancora dipendere dall' azione del mercurio sulle parti interne della bocca , come altresì dalla azione difficile ne' bambini , non che dalla percussione sia per un colpo , o in seguito del movimento di un dente , e finalmente da un umore acido , che siasi determinato particolarmente nel dente . Alcuni sono di sentimento , che l'ascesso si forma in conseguenza di questa infezione se non venga aperto con sollecitudine , e si produca la carie dell' osso sottoposto , ma si è ordinariamente esso si apre da se medesimo , e che non ha tempo di produrre la detta carie . Per curare questa affezione nel suo stato iniziale si dovrà adoperare il regime debilitante , e stentato nei salassi , dieta , fomenti emollienti .



in pochi giorni. Qualora per altro la cagione della parulide sia permanente, e segnatamente venga da un dente cariato, allora non è dessa la facile guarigione, infatti, o si riproduce di nuovo, o resta per sempre aperto il foro dell'osso, o formando una fistola, che non si guarisce, o si estrae il dente viziato, che la produce. Quando lo stesso si dica se l'infiammazione sia estesa sulle parti vicine, alle gengive, e se abbinata una fistola nelle guance, come alcune volte accade. Questo metodo non è per altro sufficiente, oltre la carie del dente esista ancora quella della mascella, giacchè allora dopo estratto il molo si dovrà distruggere col caustico la porzione d'osso cariato. La parulide prodotta da contusioni delle gengive, o frattura delle mascelle va curata come si è già detto parlando delle contusioni, e delle ulcere in generale.

Le ulcere delle gengive sono alcune volte la conseguenza della parulide, e se sieno molto estese formano quella malattia detta *stomatocace*. Esse di rado sono primarie, ma spesso sintomatiche, o di lesioni locali, come denti guasti, o dentizione difficile, o di malattie generali di tutta la macchina, e particolarmente del vizio venereo, o scorbutico, o possono venire anche in conseguenza di debolezza, o irritazione del ventricolo. Da questo facilmente si vede, che poco si potrà sperare nella maggior parte di queste malattie dalla cura locale, se non si toglie la cagione, che l'ha prodotta. La cura in genere altro consiste nelle superficiali scarificazioni della gengiva è tumida, e ne' rimedj topicamente applicati, come acido di limone, spirito di vino allungato, una soluzione d'allume, ed altri simili. Se queste ulcere sono di natura venerea, o scorbutica, riportiamo per la cura a quanto ne abbiamo detto nel primo volume. Se finalmente la malattia di-

che nasce dalle ulceri delle medesime  
ste sono di cattiva indole , o procedo  
interno , ovvero attaccano le persone , c  
luoghi di aria mal sana . Lo scorbutico  
più ordinaria della cancrena delle geng  
sto ha luogo molto ne' bambini , ne' qu  
sovente delle letali conseguenze , non p  
questi impedire la deglutizione dell' um  
Per la cura deve tenersi il metodo gi  
per la cancrena , unendovi per altro nello  
po i medicamenti indicati contro lo sc  
cui come si è detto spesso dipende la

L' *Epulide* è una escrescenza fungos  
give alle volte anche esulcerata . Questa  
essere o semplicemente locale , ovvero  
da un disordine generale della macchin  
mo caso è dessa di facile guarigione ,  
l'escrescenza per mezzo del taglio , e  
nello stesso tempo alla cagione locale .  
ste molte volte ne' vizj de' denti , come  
pio nella frattura , o carie dei medesim  
casi dovrà recidersi l'epulide , e dopo  
dente , o la radice del medesimo , se d  
to sia rimasta nell' alveolo , se poi l'epu  
profonda , e situata fra gli alveoli , ed i de

ributo si osserva sovente l'epulide, e questa or-  
 ariamente non si limita ad una sola porzione del-  
 gengive come quando dipende da cagione pura-  
 te locale, ma tutte le gengive diventano gonfie,  
 osse gettando sangue alla minima pressione, che  
 ga esercitata sopra le medesime. La gengiva cre-  
 tanto, che ricuopre fino i denti stessi, quali prin-  
 lano a vacillare, ed indi a cadere. Questa spe-  
 di epulide non può guarirsi con la sola cura lo-  
 , ma si richiede la cura antiscorbutica. Il tu-  
 re deve recidersi, e dopo si potrà far uso del  
 rovente, che giova mirabilmente in questa oc-  
 sione. Il ferro rovente è molto utile ancora nei  
 di epulide molto inveterata, ne' quali essa è or-  
 ariamente assai voluminosa, e produce la carie  
 l'osso sottoposto. Quando poi l'escrescenza fun-  
 sa sia arrivata a rammollire l'osso stesso della  
 indibola, ed aumentarne il volume, oltre l'uso del  
 co si dovranno estrarre ancora i pezzi d'osso,  
 si vanno continuamente separando, ed indi ser-  
 si dei mezzi già da noi descritti per la cura del-  
 carie.

I *denti* sono egualmente, che le altre parti del  
 po umano soggetti a molte malattie, fra le qua-  
 ono le principali quelle, che accompagnano la  
 tizione, la carie dei denti, e la loro lussa-  
 ne. Nella dentizione de' bambini si osservano  
 eralmente i sintomi di una irritazione nelle gen-  
 e, i quali vanno sempre crescendo, e produco-  
 delle convulsioni, infiammazione, diarrea, feb-  
 ec. nè cessano, che coll' esito del dente. Se il  
 abino abbia nella sua macchina un vizio rachitico,  
 , scrofoloso, o venereo, i sintomi prodotti dalla  
 tizione saranno maggiori. Generalmente si os-  
 a, che i denti canini sono quelli, che produ-  
 o i sintomi più durezza, e meno di tutti gl'in-



to libero del dente, onde impedire i sint  
nascono se essa sia difficile, e nello stes  
è necessario di calmare i medesimi con g  
rimedj. Per facilitare l'esito del dente si  
posti varj metodi, alcuni consigliano di  
re in bocca al bambino de' corpi duri, con  
premendo la gengiva essa venga a poter  
facilmente incisa dal dente stesso, altri p  
no per lo stesso oggetto di ammolliare le ge  
adattati emollienti, ma la maggior parte c  
no, che il metodo il più sicuro sia quello  
dere la gengiva sopra il dente, onde procura  
ta libera al medesimo. Questa operazione  
alcuna conseguenza, ed è sempre di solliev  
bino. Per praticarla si adopera una lance  
la quale si fa l'incisione sul dente stesso  
per altro sembra di adoperare un istrom  
tagliente ottuso, potendosi facilmente rompe  
ta della lancetta dalla durezza, che presen  
te, su cui si deve incidere. Se desso sia i  
incisivi basta fare un taglio longitudinale,  
ni poi, e nei molari se ne richiede uno cru

sono questi di natura infiammatoria, o spasmodici. Se i sintomi infiammatori siano molto violenti. Se i sintomi spasmodici siano molto violenti, sarà bene far uso del regime antiflogistico, praticando cioè qualche salasso, ed amministrando qualche purgante, se lo stato del basso ventre lo richieda. Saranno molto vantaggiosi i salassi locali con delignante applicate alle parti circonvicine. Per lo poi riguarda i sintomi spasmodici il miglior medicamento sarà l'opio, o meglio il laudano dato alla dose di due o tre gocce. La diarrea come non va mai arrestata, se per altro il bambino non fosse troppo indebolito dalla medesima, si procurerà di mitigarla coll'uso dell'opio. Nei casi di stitichezza sarà necessario di far uso di qualche leggero purgante come siroppo di cicoria con rabarbaro ec.

Nella seconda dentizione non si osservano tante difficoltà nella nascita dei denti, e quindi non richiede essa quasi mai l'ajuto del Ceru-  
 . Può per altro alcune volte accadere, che il latte di latte impedisca, che venga fuori il secondo dente, allora ne siegue facilmente, che questo viene a spuntare in direzione obliqua, e resta incomodo al paziente. In tal caso è necessario, che il primo dente venga estratto per tempo, avvertendo per altro di non far ciò poi troppo sollecitamente, altrimenti ne verrebbe a soffrire il nuovo dente, che si spuntare. Dalla mancanza di questa precauzione, di estrarre cioè i denti di latte a suo tempo nasce, che i secondi denti vengano alle volte situati, ed obliqui. Può per altro questo dipendere ancora da altre cagioni, e segnatamente dalla mancanza di spazio per i denti stessi essendo pre i secondi denti più larghi di quelli della prima dentizione, o sia di quei da latte, e ciò si osserva particolarmente nei canini, i quali essen-

do degli ultimi a mutarsi trovano spesso il luogo troppo stretto, e quindi vengono a spuntare anteriormente, e colla loro punta offendono la parte inferiore dei labbri. In simili casi è necessario estrarre il dente, o raddrizzarlo. Se però esso è nato obliquamente per mancanza di luogo sarà necessariamente il miglior partito quello di ricorrere all'estrazione del medesimo. Nei casi per altro ne' quali venga il riporlo al suo luogo tre sono i mezzi proposti a questo oggetto, e sono il pellicano, la lamina, e la legatura. Per mezzo del pellicano si vengono a comprimere i denti obliqui verso il loro luogo naturale, e coll'ajuto di questo stromento si può ottenere una forza sufficiente a questo oggetto, ma appunto per questa forza, che si deve esercitare sul dente ne siegue, che spesso viene rotta quella parte di alveolo, contro cui si obbliga a portarsi il dente, e resta un vuoto nel punto, dove esso prima esisteva, quindi è che da alcuni si propone di comprimere bensì il dente col detto stromento ma replicate volte, ed adoperando ogni volta piccola forza, e così ottenere a gradi il raddrizzamento del medesimo. L'uso delle laminette è in molti casi preferibile, ed è più comodo. Consistono queste in due lamine d'oro, o d'argento, delle quali una applicata anteriormente, e l'altra posteriormente ai denti, e fissata l'una all'altra per mezzo di vici si viene a comprimere continuamente il dente, e riporlo nella sua natural posizione. Finalmente la legatura consiste nel legare il dente con un filo di seta, o d'oro, e fissarlo ai denti vicini stringendo ogni giorno la legatura, onde esso da questa graduata compressione venga obbligato ad occupare il suo luogo. Devesi per altro avvertire, che acciò riesca questo raddrizzamento dei denti è necessario che il soggetto sia giovane, acciò le ossa, che for-



o l'alveolo possano cedere alla legatura, altrimenti o dessa riuscirebbe inutile, o si romperebbe lo medesimo, quindi nelle persone adulte se nte produce incomodi notabili sarà miglior par- l'estrarlo.

La carie dei denti è una malattia molto frequente dei medesimi. Essa principia ordinariamente con una macchieta di colore meno bianco, e medicato dello smalto, e tendente piuttosto al gialla quale a poco a poco va diventando più oscura e finalmente forma una cavità o foro nel luomedesimo. Secondo che questo è secco, o umidicei la carie secca, o umida, la di cui specie è quella, che fa i progressi più rapidi, strugge in poco tempo la sostanza interna del e. La carie dei denti è accompagnata sovente violenti dolori, e molto frequenti, segnatae se dessa principi nel canale del dente stessa da qualcuno viene detta *Spina ventosa*. Questecie di carie de' denti dimostra sano l'aspettoerno del dente, ma le continue odontalgie, a seguito il color diverso indicato, che acca la corona del medesimo non pongono più alcunio sull' esistenza della carie nel canale di esso. carie abbia posto allo scoperto il nervo, allora si e esso assai sensibile al freddo, al calore, ai cibi tutte queste cose producono dei grandi dolori alla, se pure non ne venga distrutta la sensibilità per o della carie stessa, la quale arriva a distrug- il nervo. Questa malattia produce molte volte bre, infiammazione delle parti vicine, fistole ec. agioni, che sogliono causarla sono particolar- e le offese dello smalto dei denti, il quale se i in qualche punto a lasciare scoperta la parte os- le' medesimi, questa rimanendo esposta al con- dell' aria viene facilmente a cariarsi. I denti viziati possono facilmente comunicare la ca-

rie ai denti vicini se essi non vengano estratti a tempo. Può ancora la carie de' denti dipendere da una cagione generale, o disposizione della macchina, e questo osservasi segnatamente nello scorbutto, rachitide ec. In tali circostanze l'estrazione del dente guasto non è che un rimedio palliativo, giacchè appena viene estratto il medesimo, che la carie attacca gl' altri.

Nella cura dei denti carciati il primo oggetto deve esser quello di impedire il progresso della malattia, lo che non può farsi con altro mezzo, che separando la parte affetta da quella sana. Questo si ottiene limando la porzione del dente, o raschiandola. Ciò fatto si deve introdurre nel buco qualche sostanza calmante, come gli opii, ma i più adattati sono l'olio essenziale di cannella, e di garofani ec. e si passerà indi ad impiombare il dente, ossia ad introdurre nella cavità dei piccoli foglietti d'oro, i quali otturando esattamente il medesimo impediscono, che i cibi vi entrino, e cagionino dolore. Se la macchia formata dalla carie sia molto superficiale basterà l'uso della lima, ed allora non sarà necessaria l'impiombatura, ma se essa sia un poco profonda, onde abbia avuto bisogno del raschiatojo, e siasi formata una cavità, è indispensabile impiombare il dente. Questa operazione per altro non si dovrà fare, che dopo adoperati i rimedj accennati, i quali se non si rendono bastanti a distruggere la sensibilità del dente, sarà bene far uso di un piccolo ferro infuocato, che viene ad agire con più sicurezza. Se la carie poi esiste nella radice del dente, ognun vede, che questi metodi non hanno luogo, ma è necessario di estrarlo.

L'estrazione dei denti è una operazione di qualche riguardo, che fatta senza le debite precauzioni può produrre dei gravi inconvenienti. Le cagioni



terminano alla medesima sono i dolori forti  
ti, la carie, e la situazione irregolare del  
Varj sono gli stromenti inventati a questo  
o. I principali fra essi sono la tenaglia, la  
inglese, il pellicano, ed il piè di capra. Gli  
ti, che debbono generalmente preferirsi so-  
lli, che estraggono il dente in direzione per-  
olare, e così non si corre rischio di rompe-  
veolo. Questi sono la tenaglia, ed il piè di  
Nell' uso del pellicano, e della chiave ingle-  
raendosi il dente come lateralmente rimane  
strappata, e lacerata la gengiva, lo che pro-  
alle volte dell' infiammazione. Per evitare  
inconveniente si rende necessario distaccare  
la gengiva dal dente col mezzo di un coltello  
to. Molte volte accade, che nell' atto dell'  
one il dente viene a rompersi nella sua co-  
e rimane la radice nell' alveolo, e lo stesso  
e ancora se la corona sia stata già distrutta  
entamente dalla carie, e sia caduta, allora si  
svellere la radice, lo che si farà col meto-  
ennato, scoprendo prima un poco la mede-  
onde poter dare presa allo stromento. I sin-  
iù considerabili, che sogliono sopraggiunge-  
o questa operazione sono l' infiammazione della  
e l' emorragia. L' infiammazione che ha luo-  
eralmente per la lacerazione della gengiva si  
a mitigare facendo uso delle fomentazioni  
nti, e di un regime antiflogistico. Ri-  
poi all' emorragia essa può alle volte es-  
onsiderabile, e merita tutta l' attenzione.  
pedirla si praticherà una compressione adat-  
il' alveolo stesso introducendovi delle picco-  
lla di sfilà inzuppate in qualche liquore astringe-  
come l' alcool, una soluzione di vetriolo,  
i volatile ec., e se questi non ottengono il



loro effetto, come suole accadere in specie se l'alveolo sia fratturato, e la gengiva lacerata, sarà necessario ricorrere al fuoco cauterizzando la parte con un ferro rovente.

Invece di estrarre i denti in occasione di carie è stato da alcuni proposto di smoverli semplicemente dal loro luogo, onde strappare il nervo dei medesimi, e così renderli insensibili riponendoli dopo nello stesso luogo. Questa operazione per altro ha trovato pochi seguaci, attesa l' inutilità della medesima, ed il dolore, che produce eguale a quello dell' estrazione, che è preferibile giacchè guarisce la malattia sicuramente; mentre lo smuovere un dente dal suo luogo non lo rende spesso immune dal soffrire nuovi dolori. Una operazione molto analoga all' accennata si è quella, che qualcuno ha voluto proporre, cioè di estrarre il dente malato, pulirlo, impiombarlo, e quindi rimetterlo nell' alveolo, oppure supplire alla mancanza di esso con un altro preso o da un cadavere, o da una persona vivente.

Il nuovo dente eseguisce benissimo le funzioni necessarie, e si stabilisce solidamente sull' alveolo purchè non sia degl' ultimi molari. Alcuni poi sono di sentimento, che quest' operazione eseguita col dente di una persona vivente possa essere di molto danno producendo alcune volte dei gravi sintomi, che hanno molta analogia con quelli della lue venerea, e quindi preferiscono l' uso di denti di cadaveri, o di quelli artificiali formati di avorio, o di denti d' ippopotamo.

I denti sono ancora soggetti alla lussazione, ossia a vacillare nel loro alveolo. Se questa malattia dipenda da una violenza esterna, ed il soggetto sia giovane sarà molto facile la guarigione della medesima procurando di fissare il dente nel si

colo più stabilmente, che sia possibile, e mantenendolo per mezzo di una legatura adattata, ma se il vacillamento del dente dipenda da una malattia principale della gengiva, la quale abbia attaccata la sostanza ossea della mandibola stessa, come luogo nelle malattie veneree, e scorbutiche, i rimedi generali contro le medesime saranno la principale indicazione da aversi in mira dal Ceru-

I mali, che attaccano la lingua sono principalmente l'aderenza alle parti vicine, l'infiammazione ed ulceri, la grossezza preternaturale, ed il cro. L'aderenza della lingua alle parti adiacenti può aver luogo lateralmente, o inferiormente per mezzo del frenulo. Il primo caso è molto raro, e allora esso si rinvenisse sarebbe facile il rimediare distruggendo quest' adesione congenita per mezzo del ferro tagliente. Più comune è quell'aderenza che viene prodotta dal frenulo, il quale essendo troppo lungo si estende molto verso l'apice della lingua, ed impedisce i movimenti della medesima. Questa conformazione del frenulo rende possibile, che l'estremità di quest'organo possa giungere fino ai labbri, e quindi il bambino non può succhiare il latte. In questo caso, che però non è molto frequente, come si crede, non vi è altro rimedio, che tagliare il frenulo con le forbici. Codesta operazione è facilissima, e di nessuna conseguenza. Si prende a tal fine una tenta scannellata, cui s'introduce la lamina nella bocca del bambino, e si procura di far entrare il frenulo nell'apertura longitudinale, che trovasi in questa lamina. Allora si solleva la tenta in alto, e così sollevandosi ancora la lingua il frenulo viene a restarsi eseso, onde resta molto facile il farne la sezione con un pajo di forbici ottuse in punta. L'unica



precauzione, che si dovrà avere in tale circostanza sarà quella di portare le forbici più in basso, che sia possibile per evitare l'offesa delle ranine, che produrrebbe una emorragia di conseguenza, ed alle volte anche mortale per la quantità di sangue, che il bambino viene ad inghiottire. I metodi ordinarj, che si adoperano per fermare l'emorragie, vale a dire la compressione, e la legatura non sono praticabili nella lingua, la prima per la mobilità estrema dell'organo stesso, la seconda per la quantità di nervi, di cui esso è provisto, che la renderebbero pericolosa. Sono è vero stati proposti molti metodi, e machine per procurare una compressione sulla lingua, ma essi sono quasi sempre inutili, quindi se l'emorragia sia di qualche conseguenza, nè si fermi naturalmente, altro non rimane, che di ricorrere al fuoco, e quindi si farà arroventare un piccolo stiletto di ferro, e toccandosi con esso il luogo, donde esce il sangue si formerà un escara, che viene ad arrestare perfettamente l'emorragia. Questa operazione per altro non è sempre tanto necessaria, quanto comunemente si crede. Molte volte si osserva che quantunque il frenulo sia troppo corto nella nascita del bambino si viene a poco a poco a slungare da se stesso, e perciò si rende inutile l'operazione. Molto più sarà poi da biasimarsi il costume di quelle levatrici, le quali non di raro senza necessità strappano, e lacerano il frenulo ai bambini producendo così dei dolori, emorragie, ed altri danni considerabili, che terminano alcune volte colla morte del bambino. Sovente nasce al frenulo un escrescenza carnosa, che rende incomodi i moti della lingua. Questa dovrà estirparsi col taglio, e si fermerà l'emorragia nel modo accennato.



La lingua è soggetta all' infiammazione come in altra parte del corpo umano, e questa si è la *Glossitide*, di cui uno de' principali sintomi si è quello del gonfiore, che è alle volte tanto grande da impedire non solo la loquela, e la deglutizione; ma minacciare ancora la soffocazione. Il regime antispasmodico forma la base principale della cura della *Glossitide*, quindi si praticheranno degli abboniti salassi tanto generali, quanto locali, che concorranno segnatamente nell' applicazione delle sanguisughe sotto il mento, o ancora alla lingua stessa qualora questa sporga fuori della bocca, cosa spesso accade. Saranno poi ancora molto utili i lassivi dalle ranine; ma siccome questi nell' infiammazioni violenti della lingua sono sempre accompagnati da qualche difficoltà, perciò dovrà il Chirurgo piuttosto ricorrere alle scarificazioni nella parte superiore della lingua, che saranno alquanto profonde. Queste non portano conseguenza alcuna, ed in pochi giorni guariscono, e siccome quando si sono fatte, la lingua era gonfia, così ne accade, ritornando essa nello stato naturale, le dette incisioni divengono molto più piccole, e meno prodotte di quello apparissero sul principio. I vescicantici riescono eziandio alle volte molto utili applicati al collo del paziente, o anche secondo i primi Scrittori di Chirurgia alla gola. Se il gonfiore della lingua sia capace d' impedire il passaggio ai necessary alimenti, o rimedj, alcuni propongono farli passare per un tubo flessibile introdotto per il naso fino nella parte superiore dell' orofaringe, altri poi d'introdurli per mezzo di cristietto, metodo che è da molti usitato, e creduto il più utile. Quando la *Glossitide* in suppurazione si adopera i emollienti, e si procurerà di favorire la medesima coi metodi accennati parlando della suppu-

razione, e sarà altresì necessario ricorrere all' apertura dell' ascesso al più presto possibile, onde impedire la soffocazione.

E' soggetta la lingua a delle ulceri di varia natura, secondo la quale meritano esse un metodo particolare di cura. Se desse nascono da una cagione locale come p. e. da un dente nato fuori di luogo, che con la sua punta offende la lingua, o da una concrezione calcarea sarà facile il rimediarvi estraendo il dente stesso, o togliendogli la punta con la lima, o portando via la concrezione calcarea con adattati stromenti, ma spesso dipendono queste ulceri da cagione interna, e generale, come p. e. dal male venereo, dallo scorbutico, e possono ancora avere origine dalla saburra delle prime vie, o dall' uso del mercurio. Conosciuta la cagione della malattia non sarà difficile conoscere quale sia il metodo di cura conveniente giacchè converranno gl' antivenerei, ed antiscorbutici se dalla lue venerea, o dallo scorbutico dipenda la malattia, si evacueranno le saburre delle prime vie se da queste venga essa prodotta, e si sospenderà finalmente, o si mitigherà l' uso del mercurio se da ciò riconosca la sua origine. Oltre questa cura generale per altro gioveranno ancora molto de' rimedj locali. Alcuni hanno ricavato molto vantaggio dall' uso del sugo, e decozione di piante acidule, ma sono poi di utilità decisa i caustici, fra i quali hanno luogo particolarmente gli acidi, che si mescoleranno con alquanto di mel rosato, che ne diminuisce l' azione. Si potrà ancora ricorrere alla pietra infernale, che serve mirabilmente per distruggere queste ulceri adoperando parimente del mel rosato, dopo l' applicazione della medesima. Delle ulceri cancerose della lingua ne parleremo in seguito.



La lingua alle volte cresce di volume, e diviene così lunga, che perfino sorte dalla bocca, e questo vizio è congenito. Sul principio il male sembra di poca conseguenza, giacchè piccola è la quantità della lingua, che esce fuori dalla bocca, ma se questa malattia venga disprezzata nel suo principio diviene alla fine di qualche considerazione poichè la medesima via via si tumefà, cresce sempre più nella sua lunghezza, ed arriva a cuoprire il mento formando una deformità molto notabile. Oltre di che il paziente non può inghiottire tanto facilmente, il peso della lingua viene a portare all'insù l'osso joide, e la laringe, di più restano sempre aride le fauci, posciachè la saliva sorte continuamente, ed irreparabilmente per la bocca. I denti vengono spinti dalla lingua fuori de' proprj alveoli, e premendo essi vicendevolmente sulla lingua troppo voluminosa vengono ad inciderla, ed escoriarla. La masceila inferiore si abbassa, e la lingua termina col formare delle ulceri, e divenire gradatamente di un volume considerabile.

Per la cura di questa malattia hanno proposto alcuni di recidere quella porzione della lingua, che esce fuori della bocca, ma tale metodo non è adottabile, perchè quando è diminuita di volume la lingua si viene a rendere notabile la perdita di una porzione della medesima, trattone il caso, che esporremo più appresso. In genere le indicazioni quindi da adempirsi in questa affezione saranno di procurare la diminuzione di volume dell'organo, e di mantenerlo nel suo sito naturale. Sul principio della malattia, essendo essa ordinariamente molto leggera, giacchè si osserva nel neonato la lingua, che esce dalla bocca soltanto di alcune linee, sarà spesso sufficiente il far uso di qualche semplice astringente locale, e fra questi vengono dai Moder-



La ranula è una malattia, che consiste in un tumore sotto la lingua, ed ai lati del frenetto. Questo tumore contiene della saliva, e nasce dalla ostruzione del *dotto Varteniano*, il quale porta la saliva separata dalla glandola sottomascellare. Se un simile tumore in questa parte contiene un pus diverso, non sarà desso una vera ranula, ma un tumore saccato ordinario, che per solito merita lo stesso trattamento. La cura consiste nell'aprire questo sacco. Questa verrà fatta per mezzo di un bisturi, o di forbici, onde si darà esito alla saliva contenuta nell'umore di aspetto sanioso, o altro che si trovasse servi unito. Le parti laterali della cisti possono facilmente separare colle stesse forbici mediate l'uso di un pajo di pinzette. Dopo alcuni giorni il resto del sacco si va cautamente toccando con un leggiero caustico. Questo trattamento porta in poco tempo la guarigione della malattia.

Nel palato si osservano molte volte ulcere, e dei tumori. Le ulcere del palato sono il più frequente l'effetto del morbo venereo, e quindi richiedono la cura interna mercuriale, avendo sempre l'avvertenza d'impedire per quanto è possi-

ritazione. Se trattando dunque queste ulceri col cerusico si affacci la salivazione, invece di migliorar si vengono a rendersi di guarigione assai più difficile. Fra le cagioni generali di queste specie di ulcere si annovera ancora sovente lo scorbuto, ed anche sono soggette ad una notevole emorragia. Il trattamento antiscorbutico non agisce tanto sollemente ad arrestare il sangue, e quindi frequentemente il Cerusico è obbligato a ricorrere al ferro anche per avere quest' effetto.

Dipendono poi alcune volte queste ulcere da lesioni puramente locali, e segnatamente da corpi estranei fitti nel palato, come spine, scheggie d'osso, ed ancora da malattie de' denti della maxilla superiore. La diagnosi della malattia si rende sovente in questi casi difficile, onde è necessario, che il Cerusico vi ponga tutta la dovuta attenzione; conosciuta per altro l' indole di essa sarà facile la cura, trattandosi di togliere il corpo estraneo, o il dente, che è la cagione dell'ulcera. Presso che in tutti questi casi l'ulcera assume un carattere fistoloso.

Una delle conseguenze molto da temersi nelle ulcere del palato si è la carie delle ossa palatine, facilmente succede per la poca grossezza dei processi, che le ricuoprano. Se dai segni osservati, che sia già principia la carie, si dovrà mettersi coi metodi ordinarj, procurando sempre per quanto è possibile, che non venga consumata la membrana pituitaria, che riveste superiormente le ossa palatine, altrimenti si forma un foro, che corrisponde nelle narici, e viene così a prodursi una comunicazione fra essa, e la cavità della bocca, per la quale, che impedisce in parte la loquela, e la nutrizione, passando i cibi, e le bevande con facilità dalla bocca nelle narici. Non mancano de-

*Tom. II.* 1

gli esempj, ne' quali questi fori si sono richiusi da se stessi riproducendosi le ossa, e le membrane, che ricuoprono le medesime, ma questi casi non sono così comuni, e rarissimi poi si rendono se siasi consumata ancora la membrana pituitaria. In tal circostanza il migliore, e forse unico rimedio si è quello di formare un palato artificiale. Questo si ottiene in vari modi. Se l'apertura sia piuttosto piccola sarà sufficiente l'introdurre nella medesima un pezzo di spugna, che impedisca l'accennato passaggio dei cibi, e bevande; ma se sia grande la quantità di palato, che manca non sarà sufficiente questo metodo, si e richiederà tutto un palato artificiale.

Si osservano alcune volte eziandio nel palato dei tumori sarcomatosi, che spesso arrivano ad un volume considerabile, e per ordinario sono più stretti nella base, che nell'estremità. La cura di essi consiste nel reciderli adoperando poi il ferro rovente, sì per fermare l'emorragia, se è necessario, come per impedire la recidiva del male.

Passando ora a parlare delle malattie che rendono male affetta la faccia ci si presenta in primo luogo lo spasmo de' nervi della medesima, ossia il così detto *Tic douloureux*. Quest' affezione consiste in un dolore fortissimo nella gota, che dura pochi momenti, ma che riprende ad intervalli brevissimi. Le affezioni dei denti, e de' nervi della faccia, particolarmente di quelli del quinto paio, e del faciale possono essere le cagioni della malattia. Gli opiatì, ed i sedativi sono in genere i rimedj, che servir del bono per la cura della medesima, qualora non esista cagione locale cognita, e segnatamente l' affezione dei denti, o la scoperta dei nervi, che vanno ai medesimi. Per ultimo rimedio si è dagli Autori di Chirurgia propo-



recisione del secondo ramo del quinto paio  
sua uscita dal forame mascellare superiore,  
questa operazione sembra, che rare volte sia se-  
da buon esito, onde al presente è quasi ge-  
mente disapprovata. Le altre malattie apparte-  
a questa classe sono il gonfiore, e lo scirro  
e parotidi, i calcoli del dotto stenoniano, e le  
le salivali.

Il gonfiore delle parotidi è ordinariamente sin-  
matico di malattie acute, come febbri di cattiva  
ole, o ancora di qualche specie di angina. In  
ere l'indicazione curativa principale sarebbe quel-  
di procurare la risoluzione del tumore, e que-  
coi medicamenti altrove da noi accennati. Per  
ro non sempre deve il Cerusico favorire questa  
oluzione, e segnatamente qualora sia critica l'in-  
umazione, o il gonfiore delle parotidi, giacchè po-  
bbe l'umore portarsi sopra le parti, ed aggra-  
e la malattia primaria, anzi in cotesti casi è stata  
omandata la cauterizzazione. Spesso si osserva,  
risolvendosi da se stesso questo gonfiore si por-  
esso ai testicoli, cosa, alla quale deve porre  
l'attenzione il Cerusico, poichè altrimenti po-  
be cadere in equivoco curando questa tumefa-  
e del testicolo come malattia dipendente da tutta  
cagione, e quindi produrre degli effetti fune-  
Allora il miglior metodo si è quello di richia-  
il gonfiore alla parotide coll' applicazione di  
qualche empiastro irritante, e se il caso lo esig-  
anche con un vescicante applicato sopra la me-  
na. Questo stesso trattamento unito ai sudori-  
deve usarsi se la malattia minaccia dai testicoli  
are al cervello. La traspirazione è uno degli  
tti, che secondo i pratici deve averi in mira  
cura delle parotidi gonfie, o nel passaggio della  
attia in altre parti, quindi si useranno come abbiamo

detto dei diaforetici internamente, e si terrà calda la parte con delle pezze di lana. Alcuni pratici sostengono di averne ricavato molto vantaggio per la risoluzione dall' uso del vescicante applicato sulla glandola stessa. Quasi sempre per altro converrà tentarne la suppurazione cogli emollienti, potendosi dare delle parotidi di natura veramente critica senza che siano state precedute da febbre, o altro sintoma per conoscerne il loro carattere. La suppurazione della parotide molte volte è benigna, ed allora non si tratterà, che secondo il metodo ordinario, avvertendo per altro di non lasciare aprire l' ascesso da se medesimo, o di aprirlo troppo tardi potendosi facilmente fare un assorbimento delle materie, ovvero farsi desse strada nell' orecchia corrispondente, e sortire per il meato uditorio esterno, e mettere in pericolo quest' organo di perdere la sua funzione, o finalmente dirigersi verso l' interno della gola con grave pericolo del paziente. Si è veduto qualche volta apparire prima dell' apertura del tumore il trismo, il delirio, il letargo, l' apoplessia, quali per altro si son dissipati appena eseguita la medesima.

Il gonfiore delle parotidi può alcune volte essere così duro da meritare il nome di scirro, che talvolta è giunto a prendere ancora un aspetto carcinomatoso. I rimedj, che si adoperano ordinariamente contro lo scirro riescono in questi casi come in molti altri di niun vantaggio eccetto il mercurio, che amministrato in frizione agisce con forza sulle parti salivali, e produce alcune volte la risoluzione della durezza, specialmente se la malattia sia sul principio. E' stato proposto da alcuni di estirpare la parotide, ma niun Cerusico arrischierà senza un' estrema necessità questa pericolosissima operazione, la quale se dovesse praticarsi per allon-

è il grave pericolo, si dovrebbe asportare solamente in parte la glandola molto più, che secondo i migliori pratici cotesta durezza della parotidicamente è un vero scirro, o essendo tale mai passa in cancro.

Nel dotto stenoniano formansi alcune fiato de' li, che impediscono il libero passaggio della saliva nel medesimo. Si osserva allora un piccolo tumore nella gota formato dalla saliva trattenuta che si va accrescendo continuamente fino alla maturità. Assicuratosi il Cirusico del luogo preciso ove resta questo calcolo dovrà farne l'estrazione incidendo i comuni integumenti, ed il dotto, questa incisione deve farsi all'interno della bocca e non all'esterno, postichè si formerebbe in questo sito una fistola salivale, ed all'opposto il calcolo, che resta facendosi il taglio all'interno serve dar passaggio alla saliva.

La fistola salivale nasce da qualunque ferita del dotto stenoniano, abbenchè non manchino de' sempj di ferite di questo canale guarite per ripulimento, senza che sia rimasta alcuna fistola. Ma ciò non è così facile ad accadere, ed allora ha luogo se la ferita del dotto sia stata fatta da strumento incidente. Nei casi, in cui il dotto non è aperto per una ferita contusa, per un ulcere o ferita con perdita di sostanza ne è la fistola la conseguenza. Se il Cirusico osservi, che esiste un ulcere nella gota, dalla quale scorra continuamente un fluido limpido come la saliva, e che aumenti ne' moti della bocca, e particolarmente nella masticazione, sarà facile il dedurre l'esistenza della fistola, che potrà divenir poi indubitata, introducendo uno specillo sottile per l'apertura dove viene a passare nella bocca.

Varj sono i metodi proposti per la cura di que-



sta malattia . Alcuni adoperano i caustici , e assicurano , che usando il fuoco replicate volte si viene a formare un escara , la quale dopo chiuso il forame esterno obbliga la saliva a passare pel condotto nella bocca , e così viensi a tenere la cicatrice . E' però al fuoco preferibile a' altri l' adoperare qualche caustico dissolvente , come la pietra infernale , benchè questa alle volte produca una perdita di sostanza , che cagiona la recidiva della fistola dopo caduta l' escara . La compressione è stata ancora da altri proposta per la cura di cotesta malattia . Essa viene fatta sulla parotide , o sul dotto stenoniano medesimo , e con l' intento di impedire il passaggio della saliva nel detto canale , ch' è la cagione , che mantiene la fistola . Si ottiene qualche volta la cicatrice desiderata . Questa compressione per altro non può continuarsi fino alla guarigione pel gonfiore che produce nella parotide . Finalmente si è ancora pensato di deostruire il canale , o formare una fistola all' interno della bocca , che tiene il luogo del dotto , da cui va naturalmente la saliva nella bocca . Questo può farsi in varj modi , o introducendo un caustico , che viene a stabilirne un' apertura permanente , o facendo passare questo per l' apertura esterna del dotto stenoniano , senza formarne una nuova nella cavità della bocca .

## CAPO II.

## DEI MALI DEL COLLO

**F**ra le principali malattie Chirurgiche , che hanno luogo nel collo , e nella gola , si annoverano principalmente il così detto *Collo torto* , le che attaccano l' uvola , le tonsille , l' esofago , la trachea , e la glandola tiroidea .

Il Collo torto detto ancora *Caput obstipum* è la malattia, in cui il capo è obbligato a rimanere piegato da una parte, e poggiare per fino alla spalla corrispondente. Conviene per altro ritenere, che non tutti i casi, ne' quali il capo è obbligato a rimanere piegato da una parte apparten- propriamente a questa malattia, come sono per più quelli dipendenti da umore artritico, o reumatico, li quali possono per qualche tempo imitare la situazione retta della testa; ma tolta la causa della malattia il capo ritorna al suo stato naturale. Nel vero collo storto il capo resta piegato da una parte, ed il paziente non può rivolger- si per vedere gli oggetti lateralmente situati, ed è obbligato a muovere tutto il tronco.

Varie possono essere le cagioni di cotesta malattia, e fra le principali di essa si annoverano la lacerazione dei comuni tegumenti del collo prodotta da qualche cicatrice deforme, come sovente accade in sequela delle scottature, quella delli muscoli della detta parte, e segnatamente del cutaneo o muscolo mioideo, dello sternocleidomastoideo, e de' scaleni. Secondo la diversa causa della malattia varia sarà ancora la prognosi della medesima. Se questa dipende da una contrazione dei comuni tegumenti cagionata da una cicatrice, la quale non ha accorciato li medesimi, ovvero da una contrazione dei muscoli di sopra accennata non ne sarà difficile la guarigione con gli adattati metodi; ma se poi l'offesa di queste parti, che ha prodotto la malattia sia accaduta in un'età tenera, e sia molto tempo, che il paziente ne è rimasto affetto, non si può non temere che la lunga durata della malattia obliqua del capo abbia potuto produrre un sviluppo irregolare alla colonna vertebrale, che essendo ancor molle, e cedevole in tal

tempo avrebbe secondato nel suo accrescimento la direzione obliqua del capo, sarà da temere, che la malattia possa essere incurabile.

Per la cura del collo torto sono stati dagli Autori proposti varj metodi, e questi sono la fasciatura gli stromenti, e l'operazione. La fasciatura si pratica col mezzo di una fascia, la quale rimanendo fissata al capo per mezzo di giri circolari venga poi raccomandata alla spalla opposta al lato al cui viene inclinato il capo stesso, e così venga a mantenere il medesimo in una posizione retta. Questo metodo conviene principalmente nei casi dipendenti dall' affezione dei tegumenti comuni. Nei casi più difficili, e che non cedano all' uso della fasciatura, si deve ricorrere a quello degli istromenti, li quali consistono in verghe di acciaio, che fissate al tronco, ed alle spalle vengono a sostenere il capo in una situazione retta, e così a poco a poco si giunge a superare il difetto naturale. Ma se poi la malattia procede da contrazione delli accennati muscoli, o da paralisi dei medesimi non vi sarà altro mezzo per la guarigione, che recidere il detti muscoli affetti nel caso di contrazione, o il recidere il muscolo opposto nel caso di paralisi. Tutta l' attenzione, che devesi avere in questa operazione consiste nell' evitare l' offesa de' nervi, e de' vasi vicini a detti muscoli, e nell' impedire, che le parti si riuniscano nel luogo stesso, dove sono state recise onde si abbia a riprodurre la deformità. Pel primo oggetto le cognizioni anatomiche serviranno per diriggere la tantola scannellata da introdursi sotto il muscolo da tagliarsi, e molti Autori credono ancora espediente il metodo di ciò fare in più volte onde non correre il rischio di offendere le parti sottoposte. Per impedire poi la riunione delle fibre muscolari sarà sufficiente un' adattati



tura, che tenga il capo nella situazione retta; moverà molto il porre delle sfilas, o delle tastre nella ferita, che ne impediscano la riunione.

L'uvola è soggetta ad un prolungamento, che fa arrivare alle volte fino alla base della lingua, e produce una sensazione incomoda. Questo prolungamento nasce dall' infiammazione di questa parte, se dessa è limitata, e semplice bastano gargarismi acidi, ma se poi estendasi ancora al pendulo, e che vi sia dell' ingorgamento linco, e la malattia non ceda a rimedj accennati altri simili, conviene passare a recidere l'estremità dell'uvola con un paio di forbici adattate, ed punta ottusa. Fra i tanti metodi proposti per questa operazione il migliore si è quello di affermare la medesima con una tenaglietta, o con un'ano recidendone poi la minore porzione possibile. L'emorragia non è di conseguenza tale da richiedere medicamento per fermarla, e se mai prende un aspetto imponente, si farà uso del cauterio, e particolarmente della pietra infernale adoperata colle dovute cautele.

Le tonsille sono molto sottoposte all' infiammazione, ed all' indurimento. La prima ha luogo in tutte le infiammazioni della gola, o angine, quali debbono essere trattate col regime antinfiammatorio da noi altrove indicato. Queste o presto, o tardi si propagano alle tonsille, che l' infiammazione ed alle volte passano in suppurazione, che obbliga ad aprire l' ascesso col ferro. Questi ascessi di raro sono di una mole straordinaria. Non per altro la suppurazione l' esito il più frequente dell' infiammazione delle tonsille, poichè esse sono piuttosto disposte all' indurimento; benchè alcuni recenti pretendono, che quest' indurimento mai si forma, e che il termine ordinario di dette infiam-

mazioni sia la suppurazione. Codesto indurimento che è ancora riunito ad un ingrossamento della glandola non è un vero scirro, come da alcuni si pretende, giacchè lo scirro, e il cancro delle tonsille ha luogo rarissime volte, e solo in quelle persone, nelle quali siavi una predisposizione a cotesta malattia, ed all'opposto l'indurimento di cui parliamo è molto frequente. Il rimedio, al quale devesi ricorrere in questi casi quando si sono provati inutili li topici risolvendi è la recisione di una parte della glandola col metodo, che da noi sarà descritto nel trattato delle operazioni. La legatura non è così facile a praticarsi, ed il fuoco, o i caustici da qualcuno proposti non sono affatto da porsi in opera. La stessa operazione è necessaria nel remoto caso di vero scirro delle tonsille, se desso sia limitato alle medesime; se per altro lo scirro sia molto più esteso, ed occupi eziandio il velo pendulo, l'uvola, e le parti vicine non rimane più alcun luogo all'operazione, ma dovrà contentarsi il Professore de' rimedj palliativi unendovi ancora una cura interna, mentre in questi casi sembra la malattia provenire in qualche parte da cagione generale, anzi in tal circostanza il tentare il taglio delle tonsille non sarebbe, che accelerare il suo passaggio in cancro.

Oltre che le tonsille sono soggette all'inflammazione, e sue conseguenze si rendono eziandio spesso la sede delle ulceri. Se queste sono anche eglino soltanto effetto dell'inflammazione cedono facilmente sotto l'applicazione dello spirito di sale acido allungato con l'acqua, se poi desse procedono da cagioni generali, come ordinariamente accade, e segnatamente dalla lue venerea richiederanno una cura diversa secondo le cagioni, che le han prodotte.



I corpi estranei arrestati nell'esofago, o nella  
 ge possono esser causa della soffocazione del  
 nte. Quelli, che restano nell'esofago, o farin-  
 possono impedire la respirazione, e produrre la  
 sul momento per la compressione, che essi  
 tano sulla laringe, o sulla trachea. L'indica-  
 principale in questi casi è quella, o di estrar-  
 corpo stesso, o di spingerlo nello stomaco.  
 n possa causare esso alcun danno in detto vi-  
 per la sua indole, o figura si dovrà spinge-  
 medesimo essendo questo molto più faci-  
 che l'estrarlo. Varj sono gli stromenti pro-  
 a tal uso, cioè un cannello di metallo, una  
 ga di gomma elastica, una candeletta, un pez-  
 osso di balena, a cui siavi ben fissata una  
 na, e simili, con i quali introdotti nella boc-  
 procurerà di spingere in basso il corpo estra-  
 Se desso per altro fosse di tal natura, che la  
 permanenza nello stomaco potesse pregiudicare  
 edesimo come spine, aghi, pezzi d'ossa ec.  
 necessario farne l'estrazione. Questo si ottie-  
 olte volte per mezzo di un emetico, posciachè  
 sotto gli sforzi, che il paziente fa per vo-  
 e viene sovente cacciato fuori il corpo stes-  
 Se il malato non possa inghiottire, mol-  
 no proposto d'iniettare della soluzione di  
 o emetico in una vena del braccio, ed assi-  
 o di avere con questo mezzo ottenuto il vo-  
 ma se sia di tal natura, che non possa così  
 ente venir spinto fuori col vomito, e la sua  
 menza porti del pregiudizio all'esofago, o  
 e si richiede un pronto soccorso, e se ne  
 a l'estrazione. I mezzi, dei quali si fa uso  
 sto oggetto sono delle tenaglie curve di varie  
 , e grandezze, che si possano facilmente adat-  
 alla curvatura della bocca, e faringe. Si è an-



mata, alle volte però resta una fistola dell'  
Alcune fiate esso dopo spinto nello stomaco  
di natura tale da non poter esser digerito  
percorrere tutto il canale intestinale senza  
re alcun pregiudizio, ma giunto poi all'  
retto si porta a forare il medesimo, ed a  
nella cellulare, che circonda l'intestino,  
seguito produce delle suppurazioni, che  
degli ascessi all'esterno, e delle fistole. A  
te accade, che se questi corpi siano acuti  
spille, aghi ec. si facciano strada a traverso  
suto cellulare, i muscoli, ed altre parti,  
riscòno indi sulla superficie del corpo a tr  
cute, come ne abbiamo degl'infiniti esempj.  
poi, che il corpo estraneo sia arrestato nell  
senza che possa venir nè estratto, nè spint  
so viene da alcuni consigliato d'incidere  
simo, ed estrarlo da questa apertura, ma  
razione viene da migliori Pratici creduta t  
ficile, e pericolosa, che si reputa impos  
esser praticata quando lo stesso corpo non  
al lato, ove l'esofago resta scoperto dalla

della laringe eccitando continuamente la tosse impedendo la voce, e la respirazione, e si forma una malattia cronica. Se poi il corpo estraneo sia passato nella trachea, i sintomi sono gravi, e pericolosi, potendo in pochi giorni o ne in pochi momenti perire soffocato il paziente. In questi casi non vi è altro mezzo, che quello di estrarre il corpo stesso incidendo la laringe, la trachea, e questa operazione deve farsi con solitudine, altrimenti se il corpo estraneo venga a cadere nei bronchi terminano è vero i sintomi di tosse, dolore, e soffocamento, ma si produce l'emottisi, a cui siegue l'infiammazione cronica del polmone, la vomica, e la tace, che porta lentamente il malato alla morte, se pure non venga il corpo estraneo espulso sotto gli sforzi di tosse, nel qual caso l'infermo viene a guarire. Si riferisce da qualche Scrittore di Chirurgia, che nata la suppurazione nel polmone si sia formato un ascesso al dorso, da apertosi sia uscito il corpo estraneo entrato per trachea.

La glandola tiroidea può essere soggetta all'infiammazione, che alle volte termina colla suppurazione, e coll'indurimento. Nel primo caso si han degli esempj, che l'ascesso siasi aperto nella parte posteriore, e la marcia abbia penetrato nella trachea. Terminando coll'indurimento può aumentarsi di volume, e formare una specie di bronchiectasia. Per la cura di questa malattia si terrà in generale lo stesso metodo da noi già indicato nelle infiammazioni avvertendo che nel caso di suppurazione è necessario aprire l'ascesso per evitare, che esso non si apra nella trachea.

L'ultima malattia di cui ci siamo proposti di parlare in questo Capitolo si è il *broncocale*, o il *carcinoma*. Esso consiste in un tumore molle, indolen-

te circoscritto del color naturale situato nella parte anteriore del collo esistente nella glandola tiroide, non che nella vicina cellulosa. In molti luoghi, e segnatamente nelle alpi si osserva questa malattia endemica, ed ereditaria, ed è generalmente parlando molto più comune ne' fanciulli, e nelle donne, che negli uomini. Dessa non produce per molto tempo, che una deformità senza cagionare altro incomodo, ma avanzandosi poi, e crescendo in volume viene a comprimere l'asperarteria, impedisce il passaggio dell'aria, ed altera la voce, alcune volte viene ancora a comprimere i vasi del collo, e produce un impedimento alla circolazione. In alcuni luoghi delle alpi sappiamo per tradizione, che qualche volta il gozzo si osserva accompagnato da una stupidità, che rende il paziente inerte a qualunque azione. Una malattia tale dicesi *Cretinismo*, che da qualcuno si è creduto molto analogo alla rachitide.

Il Broncocele non è sempre della medesima natura, lo che sembra dimostrare, che varie debbono essere le cagioni, che lo producono. Si trovano alcune volte il gozzo formato da un tumore infiammatorio della cellulare, che ricuopre la glandola tiroide senza, che questa ne sia punto affetta. Altre volte poi la glandola stessa è gonfia, scirroso, e questa specie è una delle più pericolose per la soffocazione, o l'arresto della circolazione, che può cagionare. Si osserva ancora come cagione del gozzo la glandola tiroide divisa come in tante cellule, che formano delle cisti ripiene di un fluido particolare. Ritrovasi poi spesso la tiroide molto indurita, e ciò accade ordinariamente per cagione scrofolosa, così può la medesima degenerare in un tumore della natura dell'ateroma, che poi passa in ascesso cistico, e finalmente si è ancora veduta la glandola tiroide tutta divenuta un tumore sanguigno varico



ngoso. Non di rado si osservano nel gozzo alcoli, o concrezione pietrose. Da tutte queste si vede, come abbiain detto, che molto debbono essere le cagioni del broncocale, e non ne conosciamo alcuna plausibile fra le immaginate, sia l'uso delle acque di neve, o di far pesi sulla testa, eccettone quelle, che sono il così detto gozzo *enfisematoso*, e *endemicale*, quale sembra avere origine dall'aria umidificante.

La cura del broncocale di queste due ultime consisterà per la prima nell'eseguire l'apertura del tumore, da cui sen sorte l'aria, e dissipatione, per la seconda è stato alle volte fatto il cambiamento dell'aria, l'uso dei diafani. In genere la cura di cotesta malattia è diretta secondo lo stato particolare della tiroide; ma se dessa sia molto antica, e per la grandezza la glandola sia di gran volume, e molto indurata, sarà curabile, molto più se il soggetto è adulto. In questi è stata molto raccomandata la spongia, con la quale si facciano de' bocconi immersi in qualche siroppo, e questi si tengano nella bocca. Ma alcuni giustamente sono di sentimento che la spongia brugiata adoperata internamente produce delle cattive conseguenze, e segna la consumzione, e la tabe, in quei soggetti, che soffrono debolezza nei polmoni. Molti credono necessario unire alla cura della cura l'uso di qualche purgante mercuriale. Oltremodo medicamento amministrato, come si è detto, con cautela di tenerlo per qualche tempo nella bocca prima d'inghiottirlo, si potrà far uso convenientemente di un topico risolvente. I più acuti a questo proposito sono le frequenti, e le stropicciature del tumore, l'applicazione

dell'acqua fredda, i ceroti fondenti, i cataplasmi solventi, ed anche emollienti giusta la chimica, ma si è poi ricevuto molto vantaggio dalle mercuriali sulla parte praticate con le detritelle, come ancora da quelle fatte col linimento latile. Sono stati proposti eziandio i cauterii, e questi sono molto pericolosi a motivo delle vicine, che possono esserne offese. Essendo molte volte accaduto, che il gozzo sia passato in suppurazione, ed in questo modo guarita la malattia, si è proposto di procurare la purificazione artificiale mettendo un fonticolo, e di più. Il primo per altro poche volte è riuscito, e non si è veduto che il secondo, il quale in alcune circostanze ne ha prodotto la guarigione, segnatamente quando il broncocale è recente.

Ma siccome la malattia è molte volte antica, e la glandola dura, così tutti questi riescono infruttuosi, ed allora altro scampio non rimane, che ricorrere all'operazione per quanto è facile, e pericolosa essa sia, se pure venisse salvata la vita del malato per l'impedimento che produce il gozzo nella respirazione, e deglutizione, e trimenti non si dovrà mai essa praticare per il pericolo dell'emorragia, e dell'offesa del broncocale sia molto antico, ed aderente, non potrà in verun modo estirpare, in altri casi tentarsi procurando piuttosto di lasciarne la sede vicina ai vasi, ed ai nervi, e recidendo la stessa con somma attenzione, e cautela legando i vasi, e sono recisi. Per fermare l'emorragia dopo l'operazione si è dovuta alle volte ricorrere all'operazione fatta con le mani. I casi ne quali riesce più facilmente sono quelli, in cui il broncocale ha una base stretta, e non è ade-

unto in questi l'operazione è meno necessaria, re di che essi sono i più rari.

## C A P O III.

## DELLE MALATTIE DEL PETTO.

Sebbene pochissime sono le malattie Chirurgiche, che riguardano il petto, giacchè la maggior parte de' mali del medesimo appartengono propriamente alla Medicina, ciò non ostante si possono considerare come appartenenti alla Chirurgia le lesioni delle ossa componenti la detta cavità, le ferite della medesima, gli stravasi, che in essa accadono, che o si fanno strada da se stessi all'esterno, ovvero obbligano il Cerusico ad aprirgli una strada penetrando nella cavità, e finalmente le malattie delle mammelle. Per quello che riguarda le fratture, ed altri mali delle ossa del petto, come ancora delle ferite di questa cavità ne abbiamo già suo luogo parlato, resta quindi solo a trattare brevemente degli stravasi, che accadono nella medesima, e delle malattie delle mammelle.

Le suppurazioni, che si formano nella cavità del petto possono esistere in varj luoghi, cioè o nel mediastino anteriore, o fra la pleura, ed i muscoli intercostali, o fra il polmone, e la pleura in uno spazio circoscritto, o in tutta la cavità del petto, finalmente nella sostanza stessa del polmone. Noi abbiamo già in altre occasioni parlato delle cagioni, le quali possono dare origine a queste raccolte di marcia. Se la raccolta di pus esiste nel mediastino, la quale è ordinariamente formata da malattie infiammatorie di petto, la diagnosi non è sem- molto facile, se pure dessa non facciasi strada fuori traforando anche lo sterno, lo che cagiona



alle volte l'apertura della cute . Se questa non esista , conviene al più presto farla , e raramente per se sola guarisce la malattia , ma essendo ordinariamente cariato lo sterno stesso si richiede farne la trapanazione , ed eseguirla eziandio con sollecitudine essendo l'unico mezzo per salvare , se è possibile , la vita all' infermo . L' apertura della cute , che si è fatta per dar esito al pus esistente nel mediastino , resta ordinariamente fistolosa . La cura di questa fistola è assai lunga , ma può guarire senza dilatazione del seno , contentandosi di tenerlo sempre asterso con delle adattate iniezioni , e facilitando lo scolo del pus .

Si può raccogliere la marcia ancora come abbiamo detto fra la pleura , ed i muscoli intercostali , ossia nel tessuto cellulare , che riunisce l'una agli altri , e questo nasce per solito dall' infiammazione di queste parti . L' ascesso si manifesta all' esterno , e si viene ad estendere continuamente sotto la cute , che se questo non accade , il giacere del malato più volentieri sul lato sano , la leggiera febbre terminante con un' abbondante sudore , la tosse secca , il dimagrimento di carne , il vermiglio nel viso , ed il senso doloroso se si comprime sul lato affetto del petto pongono fuori di dubbio l' esistenza del pus . In codesti casi va desso curato coi metodi ordinarij già altrove accennati . Non è raro , che resti un' apertura fistolosa sia che l' ascesso sia aperto dalla natura , o dall' arte , e questa fistola è di cura assai difficile , anzi alcune volte impossibile per la carie delle coste , che vi è unita , particolarmente se questa carie sia estesa perfino alle vertebre . Succede ancora , ma assai di rado , che il pus invece di penetrare per i muscoli intercostali , e farsi strada al di fuori corroda la p' eura , e si stravasi nel petto , ed allora dovranno adoperarsi le regole , che daremo

in appresso a questo proposito ; ma ciò potrassi facilmente evitare facendone l'apertura in tempo opportuno . Finalmente se non si apre l'ascesso , la conseguenza può esserne la tisi polmonare .

Se l'ascesso si formi fra la pleura , ed il polmone esso è ordinariamente circoscritto attesa l'aderenza di queste due parti . Il Professore deve allora assicurarsi della certa esistenza dell'ascesso per mezzo dei segni generali di una suppurazione conseguenza di quelli infiammatorj , e poi ne farà l'apertura sollecitamente , giacchè ritardandosi questa accade , che o si rompe l'aderenza del polmone con la pleura , ed il pus si stravasa sopra il diaframma , ovvero viene a penetrare nel polmone , e produce la tisi polmonare . Alcune volte si formano molti di questi ascessi , e quando il Cerusico ne ha aperto uno gli altri si fanno strada dal medesimo , e la marcia che contengono si porta in quello , che è stato aperto , ma allora per solito l'apertura di esso resta fistolosa , motivo per cui è necessario far delle contro-aperture .

Lo stravaso di marcia nella cavità del petto forma ciò , che propriamente dicesi *empiema* , ed allora il pus è stravasato sopra il diaframma . Molte volte si osserva il tumore all'esterno , ma non di raro non esiste punto . I segni di questo stravaso esterni per più sicuri sono la difficoltà di giacere dal lato opposto , la respirazione difficile , tosse secca , consunzione , polso piccolo ec. ma ognuno di questi segni isolato è poco concludente . Se lo stravaso sia nel lato sinistro accanto allo sterno il tumore presenta delle pulsazioni impressegli dal cuore , quantunque non manchino delle osservazioni , nelle quali esse non esistevano . La cura in tali casi consiste nell'aprire la cavità del torace per dar esito al pus col metodo , che verrà descritto a suo luogo .

stato proposto da qual  
in questi casi la medesi  
go nell' Empiema, onde  
re, che la vomica non  
ne la tisi, ma essa pres  
oltre l'impossibilità, c  
conoscere il luogo preci  
non si può penetrare mol  
mento tagliente per non  
monari, il taglio de' qua  
gia mortale. Si deve eziat  
si del polmone hanno s  
disposizione ereditaria,  
que operazione, poscia  
sempre la conseguenza,  
medesimi non si possa  
e quindi non vi sarà sp  
operazione, che negli as  
cause esteriori ed accid  
molto superficialmente n  
scere. Alcuni Professori  
razione ancora in molti

L' Idrotorace, non



difficile alcune volte il formare la giusta dia-  
gnosi di queste malattie. La cura interna di essa  
si riduce intieramente alla medicina, e noi ci ri-  
torneremo poi al trattato delle operazioni per quel-  
la che riguarda la manualità, che si richiede in tali ca-  
si, e ancora in quelli di stravasamento di sangue nel  
polmone, in cui n'è egualmente necessario il dargli esito.  
Occorre ordinariamente dalle ferite del polmone,  
e di altri del detto viscere, ed allora è spesso suf-  
ficiente una posizione adattata dell'infermo, per cui  
senza la stessa in questo caso produce l'egresso del  
sangue senza ricorrere a nuova apertura.

Le malattie principali delle mammelle sono gli  
ascessi, ed il cancro. Gli ascessi dipendono per lo  
più dall'ingorgamento latteo, e si osservano nelle puer-  
e, e nelle lattanti. La parte presenta tutti i  
segni d'infiammazione, la quale deve procurarsi  
col metodo antiflogistico, lo che si  
facilmente se l'infiammazione è piccola,  
allo stesso tempo si procurerà di evacuare il  
latte stagnato nella mammella, o facendo pop-  
pare il bambino, una donna, ovvero con gli  
strumenti adatti a quest'oggetto. Se per altro so-  
gna la suppurazione si potrà lasciare aprire  
il seno da se medesimo, se non è molto volumi-  
noso nel caso sia esso molto grande oppur vi-  
ce il capezzuolo deve il Cerusico essere sollecito  
a farlo, giacchè altrimenti il pus verrebbe a  
danneggiare l'organizzazione stessa della mammella,  
e soffrire il detto capezzuolo in un'altra su-  
sta. Se dopo la risoluzione di tali ascessi riman-  
ta nella mammella qualche durezza, o ingorgamen-  
to, i cataplasmi emollienti, un'unzione di  
oleo di mandorle dolci, spermaceti, ed ammoniac  
dissolti nell'acqua, ed i purganti ripetuti saranno  
utili per risolverlo.

dole linfatiche vicine,  
della mammella. Que  
rapidi, ed altre volte  
dere, che lo scirro de  
za passare in cancro;  
da qualche Scrittore d  
tura della durezza, es  
lità in quella verament

Da molte osservaz  
dedursi, che esiste b  
vizio canceroso general  
non è sempre puramente  
mella viene dopo qualc  
festo ulcerandosi, e fo  
maligna, che producen  
ste, e l'idrotorace è c  
ziente. Può il cancro d  
cora da retrocessione di  
mente dell'erpete, che  
una delle cagioni più f  
de' mestruì, ed infatti i  
quenza maggiore di can

La prognosi del can

contrario essa non è che un rimedio palliativo, e non di raro accelera la morte della paziente.

I rimedj interni o locali proposti per la cura di questa malattia sono in gran quantità, ma non abbiamo abbastanza di prove per dimostrarne l'utilità, per cui al presente la massima parte dei Professori è persuasa, che l'unico rimedio sicuro è quello di ricorrere all'estirpazione. In molti casi per altro, e segnatamente qualora la malattia dipenda piuttosto da una diatesi generale si dovrà ricorrere all'uso de' rimedj interni, e locali prima di passare all'operazione. Il primo fra essi è un fongicolo al braccio corrispondente alla mammella malata. Questo sarà utile ancora ne' casi, ne' quali si voglia istituire l'operazione, e sarà bene tenerlo continuamente aperto, giacchè viene in questo modo a impedire la recidiva della malattia in caso sia dedita stata guarita coll'estirpazione. I fondenti, le acque minerali internamente, ed in bagni serviranno ancora a procurare la risoluzione dello scirro da cui riconosce la sua origine il cancro di quest'organo. Alcuni assicurano di avere ottenuto molto vantaggio dall'uso di un setone al petto; ma ciò sembra poco plausibile. Siccome poi una delle cause più ordinarie del cancro alle mammelle si è come si è detto la cessazione de' mestruj, così la prima cura del Cergusico deve esser quella di richiamare i medesimi ogni volta, che sia ciò possibile. I rimedj proposti per la cura del cancro delle mammelle usati internamente, o localmente sono principalmente la cicuta, la belladonna, e l'arsenico, ma rare volte si è ottenuto del vantaggio anche dall'uso dei medesimi. Qualora finalmente la malattia non ammetta l'operazione, e poco siavi da sperare nell'uso de' rimedj si dovrà il Professore contentare della cura palliativa consistente principal-



mente nella diminuzione de' dolori , dai quali viene afflitta la malata . Il miglior rimedio in questi casi si è l' opio a dosi generose . Noi tralasciamo qui d' inoltrarsi su questo particolare rimettendoci a quello , che abbiamo detto parlando del cancro in generale , e riserbandoci nella parte seconda a trattare dell' operazione in esso conveniente .

## CAPO IV.

## DELLE MALATTIE DELL' ADDOME

## ARTICOLO I.

*Delle malattie degli organi inservienti alla digestione .*

**N**oi dividiamo in tre articoli le malattie dell' addome , nel primo dei quali trattiamo di quelle , che attaccano gli organi , che servono alla digestione , come lo stomaco , le intestina , l' omento , il peritoneo ec. , nel secondo quelle , che si riscontrano negli organi , e vie orinarie , riserbandoci nel terzo ad esporre le principali affezioni dell' intestino retto .

Delle ferite dell' addome , e degli ascessi di questa parte ne abbiamo già altrove trattato parlando di queste malattie in generale , riguardo alle altre di questa cavità sono la maggior parte di pertinenza della medicina eccetto alcune , le quali richiedono l' aiuto della mano Chirurgica , e di cui parleremo nel trattato delle operazioni . In questo articolo dunque tratteremo soltanto dell' ernie , degli ascessi del fegato , dell' ascite , e di alcuni tumori aderenti al peritoneo .

L' *ernia* è un tumore formato dall' esito fuori della cavità del basso ventre di un viscere , il quale deve essere contenuto dentro la medesima , e che gli antichi chiamavano *rottura* . A questa malattia

sono soggetti lo stomaco, l'omento, le intestina, l'escica, l'utero, l'ovajo ec. le quali parti nell'addome sono fornite di una specie di membrana somministrata dal peritoneo, che forma quello, che dicesi *sacco erniario*. Nel primo anno dell'età può nascere eziandio l'ernia del fegato a *Epatomfalo*.

Le specie d'ernie sono distinte fra loro o riguardo al luogo, che occupano, o rapporto al visceri, che le forma. Sotto il primo aspetto si conta l'ernia inguinale, crurale, ombelicale, e ventrale. Riguardo al secondo si distingue l'ernia dello stomaco, delle intestina, dell'omento, della vescica, dell'utero. Un'altra distinzione, che si fa comunemente dell'ernia, si è quella di *congenite*, esistono nel momento stesso della nascita, e di *accidentali*.

Sono le ernie una malattia molto frequente specialmente nell'età avanzata, ed in questa sono prodotte per lo più dall'intestina, o dall'omento, o da ambedue insieme essendo eglino i visceri più bassi nel basso ventre, ed i sintomi, che l'accompagnano sono i seguenti. Il tumore formato dall'intestina è levigato, e leggermente ineguale sotto al tatto, quello prodotto dall'omento. In genere poi descritto è molle, cede sotto le dita, aumenta dopo aver mangiato, se il paziente fa un qualche sforzo, tosto al contrario diminuisce, e sparisce intieramente per la pressione fatta sopra del medesimo, il malato sia digiuno, o conservi una posizione orizzontale. Questi segni poi alle volte sono assai oscuri, molto più se l'ernia è complicata, ed allora ne rende difficile la diagnosi. Variano poi essi ancora secondo le diverse specie d'ernie, avendo ciascuna i suoi segni propri. In generale l'ernie sono tanto più voluminose, quanto sono più antiche.



Nell' ernie si trova come si è detto una specie di membrana, che contiene i visceri, che le formano, e questa dicesi *sacco erniario*.

Le cagioni dell' ernie consistono in quelle cose, le quali, o spingono con forza le viscere fuori del loro luogo, ovvero indeboliscono, o distruggono il sostegno, che deve impedire il loro esito, quindi potrà produrre l' ernia la gravidanza, la tosse, il canto, le grida, il trattener la respirazione per molto tempo, le ferite, o contusioni dell' addome, l' equitazione, il vomito, il sollevare de' grandi pesi, i sforzi per evacuare le fecce in caso di forte costipazione del basso ventre; se esista nella macchina una debolezza del peritoneo, o delle parti, che debbono mantenere le viscere in sito, come per esempio il mesenterio, il paziente sarà più predisposto all' ernia, la quale accaderà ad ogni minima cagione delle già accennate.

L' ernie qualora siano semplici formano una malattia più incomoda, che pericolosa se il malato abbia la cura di sostenere la medesima con un cinto adattato, e si astenga da tutte quelle cagioni, che possono contribuire all' aumento dell' ernia. Non sono rari i casi di ernie guarite radicalmente con questo solo mezzo; ma ciò si osserva nei soggetti molto giovani, giacchè negli adulti non si ottiene mai la cura radicale colla compressione locale, segnatamente se l' ernia non è piccola, e molto recente, nei vecchj poi ne' quali codesta malattia come abbiain detto è frequentissima, la cura con questo semplice metodo ne è impossibile. Quando poi l' ernia è molto antica, di modo che l' apertura, da cui escono l' intestina, o altre parti sia grandemente dilatata, in tal circostanza non si può ottenere, che una cura palliativa, ed impedire che non si venga ad incarcerare, poichè allora produ-



de' sintomi mortali, e non si accresca di molto suo volume, che alcune volte arriva ad una grandezza enorme.

Per la cura dell' ernia deve il Cerusico farne riduzione, ed altresì mantenerle ridotte. Il ridurre un ernia non è cosa difficile qualora sia libera, anzi il paziente può farlo da se medesimo, per altro difficile il mantenerla ridotta, ed è necessario non solo, che desso si astenga da qualunque sforzo, o violenza, che potrebbe riprodurre la malattia, ma ancora che mantenga una compressione costante sul luogo, che ha dato esito alla parte, quale forma l' ernia, e questo per mezzo di un laccio cinto. Ordinariamente tale stromento sono obbligati i malati a portarlo per tutto il tempo della loro vita. Dagli antichi si sono proposti varj mezzi, coi quali si pretendeva di guarire radicalmente le specie d' ernia, e si praticavano a questo oggetto delle operazioni, come la castrazione, la legatura del cordone spermatico, del sacco ernario, il caustico ec. ma si è riconosciuto in seguito, che queste operazioni sono dannose, ed inutili.

Non di raro per altro accade, che l' ernia non è riducibile così facilmente, benchè non possasi ridurre, ed allora è necessario, che il Medico conosca bene quale sia la vera cagione, che impedisce il rientramento dell' ernia per rimediarvi coi mezzi adattati, che in seguito esporremo, quindi eseguire l' operazione del *taxis* così detta, lo stato dell' ernia lo permetta. Il metodo di praticarla è il seguente. Il paziente resterà coricato sopra il dorso, ed alquanto inclinato dal lato opposto a quello, in cui esiste l' ernia, acciò le viscere dell' addome non gravitino sopra l' ernia medesima, impediscano, che dessa rientri. Si procurerà di tenere in rilasciamento i muscoli dell' addome,

e questo si ottiene facendo stare il bacino più elevato del petto, la testa piegata anteriormente, e flette parimenti le gambe, e le coscie, ma in particolare si mantiene sollevata, e piegata la coscia corrispondente all'ernia coll'ajuto di un cuscino rotolato, e situato sotto il poplite. L'elevazione del bacino contribuisce molto ancora a far rientrare le parti, venendo esse ajutate dal proprio peso; anzi a tal oggetto alcuni hanno proposto di mantenere soltanto la testa, ed il petto del paziente sul letto, ed il resto del corpo sollevato in alto per mezzo di un forte ministro, che tenendo l'estremità inferiori di esso sulle sue spalle, a cui particolarmente corrispondono i popliti, venga il Professore a far l'operazione qui appresso. Situato il malato si prenderà il tumore ernario con ambe le mani, e si comprime lateralmente, onde renderlo più stretto, e quindi più facile a farne la riduzione, al quale oggetto si comprimerà indi alquanto nel senso della sua lunghezza, procurando di spingere dall'indietro all'in fuori primieramente le parti, che sono più vicine all'anello addominale. Ridotta l'ernia si deve mantenere con una fasciatura adattata, o col cinto. Alcuni si sono serviti degli astringenti topici, co' quali hanno creduto di accrescere l'effetto del cinto, e di contenere sicuramente nella cavità il viscere uscito fuori, ma si è al presente riconosciuto, che questi astringenti sono sempre inutili, e che anzi alle volte possono riuscire dannosi, e quindi se ne è prosritto l'uso dalla Chirurgia.

La descritta operazione del taxis non riesce di sovente tanto facile nell'eseguirsi, specialmente se l'ernia sia molto voluminosa ed antica, lo che nasce dall'accresciuta pinguedine nel mesenterio, o nell'omento, o dalle aderenze del viscere col sacco



erniario . Maggiore poi anche sarà la difficoltà se realmente vi sia uno strozzamento , che impedisca all' ernia di rientrare prodotto dall' arresto di materie fecali , lo che dicesi intasamento , il quale può generare un vero incarceramento . Più di frequente accade questo per l' infiammazione dell' annulo , o del viscere formante il tumore ernioso , come anche un ernia può divenire incarcerata per restringimento dell' annulo addominale , nel qual caso dicesi incarceramento spasmodico . Siccome in questi ultimi casi potrebbero nascere de' gravi accidenti , ed anche la morte del paziente , se ad onta dei rimedj locali , e generali non siasi ottenuta la riduzione dell' ernia , e dissipati per conseguenza i sintomi dell' incarceramento , così devesi per questo caso ricorrere ad un altra operazione detta della *bubonocoele* , che consiste nel ridurre l' ernia per qualunque cagione divenuta incarcerata , mediante il taglio , operazione , che noi descriveremo a suo luogo .

Per ben conoscersi dal Cerusico la diversa indole di dette ernie , che presentano delle difficoltà più o meno grandi per la loro riduzione , sembra esser sufficiente soltanto il riflettere alle poc' anzi divisate specie . L' ultimo grado di cotesta difficoltà consiste nell' essere accompagnato da dolore il tumore ernioso , e tutto il basso ventre , ed ambedue queste parti da tumefazione , a cui si associano la febbre , la nausea , il vomito , ed il singhiozzo . Questi sintomi non pongono alcun dubbio sull' esistenza di una vera infiammazione , e sull' imminaccia di una imminente suppurazione , o cangre , le quali cagionano una fistola stercoracea , o morte del paziente , se un oculato Professore non le resti in tempo opportuno quei rimedj convenuti , o infine che sollecitamente non si decida l' operazione del taglio , mezzo , che è per lo più



il solo adattato in questo caso per salvare la vita al medesimo.

I medicamenti convenienti in generale nella cura dell'ernie voluminose, ed antiche, ove la pinguedine accresciutasi in esse forma l'ostacolo per la riduzione, sono il riposo, la dieta rigorosa, i purganti, le fomentazioni locali, ed infine l'operazione del taxis. Che se poi a questa specie d'ernia vi sia unita qualche aderenza, rimessa, che sarà la parte libera, si mantiene il resto con un adattato cinto, o fasciatura. Se l'ammasso di fecce nell'intestino, che forma l'ernia sia la cagione dello strozzamento, i bagni tiepidi universali, i clisteri emollienti, i cataplasmi mollitivi, saranno i rimedi convenienti in tal caso, unendovi di quando in quando un moderato tentativo per la riduzione. Se questa non accada si può passare all'uso topico dell'acqua fredda, o neve, di cui deve prolungarsi l'applicazione per un ora incirca, ed indi passare all'operazione del taglio, se non siasi ottenuto con tal mezzo il rientramento nella cavità del viscere uscito fuori. Se l'infiammazione sia quella, che mantiene l'ernia, si deve proscrivere qualunque manualità sulla medesima, e principiare la cura con un abbondante salasso ripetendolo a seconda del bisogno, indi prescrivere un bagno universale tiepido, e di frequente ripetuto, lavativi emollienti, fomenti di tal genere sul tumore, e sopra il basso ventre, ed in questo eziandio unzioni oleose. Dopo di tuttociò si potrà tentare una leggiera pressione sull'ernia per rimetterla nella propria cavità, che se con questa non riesce, ripetiamolo di buon animo, altro non avvi da fare per salvare la vita al malato, che la sollecita operazione col taglio. Finalmente se lo spasmo sia la cagione dello strangolamento dell'ernia si da in questo caso con molto

Ogni due ore al malato mezzo grano d' opio ,  
 to di ipecacuana, si ordinano de' bagni tiepidi  
 ali , de' lavativi , e cataplasmi emollienti sul  
 , ed una unzione volatile con molta canfo-  
 udano liquido su tutto il basso ventre . Questi  
 ono per lo più bastanti a far nascere la ri-  
 e dell' ernia senza bisogno dell' operazione .  
 uesti sono li principj generali risguardanti  
 , ma siccome in ognuna di esse può avervi  
 una qualche modificazione così sarà utile il  
 alche cosa in particolare sulle specie più fre-  
 delle medesime .

L' ernia *inguinale* è quella , che si forma dall'  
 del muscolo obliquò esterno , da cui escono  
 ti , delle quali è dessa formata , queste sono  
 to , l' ileo , il digiuno , il cieco , e la sua  
 dice vermiforme , la vescica urinaria , e  
 , e secondo queste diverse parti ottiene es-  
 versi nomi , chiamandosi *buboncele* qualo-  
 si limiti all' inguine , *oscheocele* se discen-  
 lo scroto , *epiplocele* poi se è formata dall'  
 o , *enterocele* se dall' intestino , che è la più  
 losa , ed *enteroepiplocele* se da ambedue queste

segni dai quali si riconosce l' ernia inguina-  
 sistono in primo luogo nel tumore della re-  
 inguinale nato da una delle cagioni capaci  
 durre un' ernia , e senza infiammazione pre-  
 . Questo tumore diminuisce , o accresce in  
 asi , che abbiamo esposto descrivendo l' er-  
 generale , comprimendolo con le dita rien-  
 tieramente , ma con più facilità se è formato  
 intestino , che se lo è dall' omento . Si distin-  
 na tal' ernia dall' idrocele perchè in questo  
 ore dal testicolo si estende all' anello , nell'  
 è tutto all' opposto , ma la trasparenza poi del

tumore è uno de' segni più caratteristici dell'idrocele per distinguerlo dall'ernia. Quando la malattia sia antica il paziente ne è molto incomodato pel volume, per le cattive digestioni, per le coliche, e finalmente per la minaccia dell'incarceramento, che come abbiamo veduto può non di raro esigere un operazione pericolosa.

Qualora l'ernia inguinale venga ad incarcerarsi i sintomi sono i medesimi dei già accennati. Il tumore cioè diviene doloroso, ed irridutibile, si tumefà il ventre, non ha più il paziente evacuazione alcuna per secesso, ed è afflitto da singhiozzo, nausea, vomito, bilioso, e i cristieri non producono alcun vantaggio, il polso è piccolo, e contratto. Dopo qualche tempo se non si sono apprestati quegli ajuti necessarij, la malattia fa de' progressi, vale a dire il tumore diviene più molle, la cute, che lo ricuopre diventa livida, diminuisce il dolore, e indeboliscono le forze del malato, segni tutti della cancrena dell'intestino, che in poco tempo produce la morte, che può ancora accadere 24 ore dopo l'incarceramento dell'ernia.

L'ernia inguinale può venir prodotta da tutte le cagioni le già esposte per l'ernie in generale, e questa specie d'ernia è la più frequente, e molto più negli uomini, che nelle donne. Essa diventa incarcerata per due cause principali cioè o per uno stringimento dell'anello inguinale, o per una ingrossatura, o restringimento del sacco erniario. Una forza propria elastica dell'anello sembra poterne procurare il coartamento, come ancora l'estro di una nuova porzione d'intestino. Il coartamento poi del sacco nasce ordinariamente dal suo indurimento, o da quello del tessuto cellulare, che lo circonda. Il coartamento dell'anello è la causa



frequente dell' incarceramento dell' ernia in-  
le.

Cotesta ernia è una malattia incomoda , e più pericolosa , quanto più è antica , e votosa , ma il suo maggior pericolo si è quello d'incarceramento , ad impedire il quale dovranno essere dirette le indicazioni curative . Queste consistono nel ridurre l'ernia stessa , e nel mantenerla ridotta col cinto . La compressione continuata sull' ernia può spesso operarne la guarigione se fatta in tempo , e se sia in un soggetto molliore , e quindi si dovrà procurare di ridurre al più presto possibile . Nel ridurre l' ernia dovrà premere il tumore da tutte le parti diritte verso l' annulo , e procurando di lasciar fuori il testicolo per non esporlo ad una compressione ; e poi l' ernia sia incarcerata alla riduzione della stessa si dovranno premettere quegli ajuti dell' ernia che di sopra abbiamo esposti nell' ernie in generale adattandoli alla natura dell' incarceramento . Dopo cotesti rimedj riesca impossibile la riduzione , piuttosto che tormentare il paziente con sforzi inutili , e che potrebbero divenire pericolosi si ricorrere subito all' operazione , la quale non si fa mai troppo sollecitamente .

L' ernia inguinale *congenita* è quella , in cui la vaginale serve di sacco erniario , e quindi l' intestino è situato a contatto immediato del testicolo . Quest' ernia nasce allorchè il testicolo discende dall' addome nello scroto , e porta seco il peritoneo , che poi gli forma la borsa . Se una porzione d' intestino si trovi contenuta nel peritoneo viene ad escire insieme col testicolo , e forma l' ernia . Questa adunque accade nella vita , o poco dopo sebbene abbiamo degli esempj di ernie in quelli , ne' quali i testicoli sono

da un ristringimento dell' anello addom-  
L' *ernia crurale* si forma sortendo s-  
gamento del pauparzio , o per parlare anc-  
tamente del così detto *ligamento femora-*  
alle volte al di sopra di questa parte  
muscolari , e quindi è situata nella pie-  
coscia sopra i vasi crurali . Nelle donne  
te maritate è più frequente , che negli uon-  
ernia non cresce mai ad un volume così  
me l' ernia inguinale , nè si estende ta-  
so , a motivo della resistenza , che op-  
neurosi fascialata . Questa specie d' ernia  
assai difficile a riconoscersi , e così an-  
facile a ridursi , ed a contenersi in situ  
quantunque si adoperi un cinto ben fa-  
applicato , frequentemente l' ernia è sogge-  
nuovamente , ed è poi facilissima ad i-  
Il metodo curativo per quest' ernia non  
punto da quello indicato per l' ernia in-  
in caso d' ernia crurale incarcerata è non  
correre più di frequente , e più sollec-  
operazione .

L' *ernia ombelicale* detta ancora *ex-*  
mata nell' ombelico , o attorno di esso .  
cie è molto comune nei bambini , e più

tempo. Quest' ernia ha una figura oblunga etta nella base, e facile a ridursi, ma com- facilmente di nuovo, a poco a poco va do di volume, e produce degl' incomodi al di vomito, nausea, ec. L' ernia ombelica- serva ancora nelle femmine, che hanno par- molte volte. Nei bambini è dessa prodotta ida, dalla tosse, dal vomito, e simili ca- le quali possono spingere le intestina fino a e la cicatrice debole dell' ombellico. Questa de volte s' incarcera, ma spesso produce i ni sintomi come se lo fosse.

Per la cura dell' exomfalos si sono proposti va- di, cioè primieramente il taglio del sacco, ngamento della pelle, e così verrebbe a for- na cicatrice solida. Altri hanno proposto la del medesimo, altri finalmente la compres- conviene riflettere per altro, che non è l'estir- del sacco, che possa produrre la guarigio- ale dell' ernia, ma bensì la cicatrice del fo- sismo, e che questa non si ottiene facilmen- glio, o con la legatura, poichè il primo apertura all' ombelico, come appunto la se- Questa è molto dolorosa, e richiede di es- per due volte, onde ottenere la caduta gumenti, e del sacco. Se il Professore non tento può includere nella legatura porzio- estino, e produrre dei sintomi mortali. Da este ragioni persuasi gl' Autori preferisco- mpresione fatta per mezzo di una adatta- tura. Questa dovrà continuarsi per molto e si potrà unitamente far uso di qualche te. Nel mutare la compressione si atten- e l' ernia non esca nuovamente.

e le specie d' ernie accennate ve ne sono imenti necessarie a conoscersi, e che ci con-



tenteremo di accennare per brevità, e sono le qui appresso.

L'ernia *diaframmatica* è quella, in cui le intestina, o altre viscere dell'addome si portano nel petto per una ferita fatta al diaframma. Molte volte per altro quest'apertura è naturale, ed è un vizio di conformazione. Si hanno degli esempj di persone vissute molto tempo con questa malattia provando soltanto dei gravi incomodi nella digestione, dei bambini nati con questa affezione sono morti subito, o poco tempo dopo. Lo stesso può accadere se il diaframma venga ferito, e vi sia un grande stravasamento di sangue nel basso ventre.

L'ernia *ventrale* consiste in un tumore erniario formato sulla superficie dell'addome, eccetto che nei luoghi dove si forma naturalmente l'ernia, e può arrivare ad un volume molto considerabile. Le ferite delle pareti dell'addome ne sogliono essere la cagione segnatamente quella fatta nel parto cesareo. Quest'ernia deve essere mantenuta con una compressione, e se sia essa molto voluminosa, è necessario anche un sospendorio. L'ernia ventrale di rado s'incarcera; ma in caso ciò succeda si adoperano gli stessi mezzi accennati di sopra.

L'ernia della vescica viene distinta dagli Autori in 4 specie secondo che si forma nell'anello inguinale, nell'arco crurale, nel perineo, e nella vagina. Quest'ernia detta altrimenti *Cistocèle* si riconosce facilmente dalla fluttuazione. All'inguine si forma per la ritenzione d'urina, e sul principio si riduce facilmente. Quella dell'arco crurale si osserva in seguito di gravidanza, ma la più comune n'è quella per la vagina, che si forma segnatamente nel tempo del parto. L'ernia poi della vescica al perineo è rarissima segnatamente negli uomini.

L'ernia dell'ovajo ha luogo per l'annulo ingui-

essa però è molto rara . Si riportano degli esempi quest' ernia guarita coll' operazione recidivajo, e terminati molto felicemente .

L'ernia dell' intestino per la vagina ha luogo utero, e l' intestino retto . Molte volte è asuminosa, la gravidanza ne suole essere per la cagione . La cura consiste nella riduzione, nel mantenerla compressa con un pessario di cuoio, o meglio ancora elastico, ovvero con una fasciatura fatta a cilindro . Non è impossibile, che l'ernia, come le altre qui sopra accennate, si produca per l'incarceramento, ed allora convengono pressochè quei mezzi, che abbiamo indicati nell'ernia in generale . Passeremo sotto silenzio l'ernia inguinale, e quella del forame ovale come estremamente rara .

Li ascessi del fegato formano una specie delle malattie dell' addome, di cui ci siamo proposti di parlare . Questi ascessi possono essere situati in vari punti del viscere stesso, e molto interessa il conoscere il diverso luogo, portando questo molta differenza nella prognosi, e nella cura . Ordinariamente distinguono gli ascessi del fegato in quelli situati nella parte concava, ed in quelli, che si rincontrano nella parte convessa del medesimo . Deve distinguersi se essendo situato l'ascesso nella parte concava del fegato, questo sia aderente alla capsula, o no .

Non è ordinariamente difficile il riconoscere l'esistenza di questi ascessi . I sintomi, che li manifestano oltre le cagioni precedenti, che esporremo a suo seguito, la fluttuazione, il dolore, la febbre, la diarrea, e segnatamente l'edema nella parte per altro l'ascesso esista nella superficie concava del fegato molti di questi segni, ed in specie la fluttuazione restano meno chiari, come ancora so-

no essi meno manifesti se l'infiammazione preceduta sia stata cronica.

Questa malattia come tutte le suppurazioni conosce generalmente la sua origine da una epatitide, ossia infiammazione del fegato, sia essa acuta, sia cronica, che è di diagnosi assai più difficile della prima, e di cui appartiene alla Medicina il descriverne i sintomi. Qualunque per altro sia l'origine generale, o locale di tale infiammazione, e per conseguenza dell'ascesso, che ne siegue, è questo sempre una malattia assai grave, e pericolosa, sebbene alle volte si abbiano degli esempj di cura terminata felicemente. Qualora l'ascesso esista nella parte concava del fegato è chiaro, che desso è inaccessibile alla mano Chirurgica, e che termina in questo caso ordinariamente o coll' aprirsi nella cavità dell' addome, e produrre una tabe, e la morte del malato, o coll' aprirsi in un intestino con cui abbia contratto delle aderenze, nel qual caso il pus si evacua per secesso, ed il malato può alle volte scampare la morte, o finalmente farsi strada lungo il muscolo psoas, e formare un tumore nell'inguine destro, e dar ivi esito alla marcia alle volte con esito felice. Se per altro la suppurazione abbia luogo nella parte convessa del fegato, qualora sia in quel luogo, in cui è desso aderente al diaframma, la marcia si farà strada a traverso di quest'organo muscolare, e passerà nel petto, dove o formerà un empiema, o si farà strada per i bronchi, e si evacuerà per la bocca, o finalmente formerà una corrosione del polmone, e produrrà una tabe polmonare. L'unico caso in questa malattia, che possa ricevere un ajuto diretto dalla mano Chirurgica si è quello, in cui l'ascesso del fegato esista in quel luogo della parte convessa del medesimo, dove essa è a contatto colle parti esterne, e quindi formando



more in detto luogo potrà questo aprirsi , e esito alla marcia , onde non corroda le parti ne . In questo caso per altro è necessario , il fegato sia aderente al peritoneo , e questo ai polli , altrimenti l' apertura dell' ascesso produrrebbe egualmente lo stravasato del pus nella cavità minale .

Questo caso dunque è l' unico , in cui il Celo possa lusingarsi di poter apprestare un ajuto al paziente , e ciò per mezzo della sollecita apertura del tumore . In questo caso ha sempre luogo l' aderenza del peritoneo , giacchè senza la medesima non comparirebbe tumore all' esterno , e quindi potrà facilmente passare francamente all' apertura dell' ascesso . Il metodo del caustico , che era in altri tempi in uso in simili circostanze è al presente pressochè affatto escluso , e da tutti si ricorre all' apertura per mezzo del ferro . ( Noi ci siamo serviti a questo oggetto del troicart , e la malattia terminò in perfetta guarigione . ) Si procurerà di fare l' incisione più in basso , che sarà possibile onde dar esito al pus contenuto , e si adopererà la massima moderazione per non offendere le parti sottoposte . Si procurerà di tenere aperto il foro più che sia possibile , medicando più volte al giorno secondo l' intensità di marcia , che n' esce . Le semplici incisioni saranno vantaggiose ; ma non di raro sarà utile l' evitare o una fistola , o la consunzione o assorbimento , o stravasato delle materie .

L' *ascite* è una malattia consistente in una collezione di fluido nella cavità dell' addome . Si è conosciuta quest' affezione riguardo alla qualità del contenuto , e si è distinta l' *ascite linfatica* , l' *ascite purulenta* ec. e si è distinta parimenti l' *ascite* secondo il luogo , che occupa , chiamandosi *ascite epiploica* quella , in cui le acque sono contenute

nella cavità del basso ventre, e ascite *cistica*, o *incistata* quella, in cui le acque vengono rinchiusa in una cisti particolare, o in un organo qualunque come l' omento, l' ovajo. Non è poi difficile riconoscere in genere l' esistenza di un fluido nel basso ventre. L' esame delle cause precedenti, e lo stato attuale del malato ne daranno indizj sufficienti. Il paziente affetto da ascite oltre la consunzione, l' edema all' estremità inferiori, la sete, la scarsezza delle orine, ed il volume del basso ventre sono segni bastantemente manifesti, ma quello, che è il più decisivo, e che serve a distinguere quest' affezione dalla timpanitide, i di cui sintomi sono assai analoghi a quelli dell' ascite, si è la fluttuazione, che si sente quando si percuote il basso ventre. Adonta di tutti questi segni per altro si sostiene da alcuni, che può alle volte radunarsi nella vescica urinaria una quantità tale di orine, che venga a produrre una fluttuazione analoga a quella, che osservasi nell' ascite, e che quindi mentisca questa malattia. Ma oltre di che una tale raccolta urinaria è infinitamente più rara dell' ascite, si distinguera facilmente da questa se si esamineranno attentamente gli altri sintomi, e segnatamente se si farà riflessione alle cagioni.

Quelle, che sono capaci di produrre l' ascite possono essere o locali, o generali. Fra le prime hanno luogo in particolare i vizj organici, come per esempio gli aneurismi de' grossi vasi, le ostruzioni de' visceri addominali, ed altre simili. Le generali poi consistono o in una troppa attività de' vasi esalanti, o in una troppa debolezza di quelli assorbenti. Nel primo caso tutte le cause stimolanti possono produrre l' ascite compresa anche l' infiammazione del peritoneo, o di altre parti contenute nella cavità addominale. Quelle poi della se-

specie sono tutte le cagioni debilitanti la macchina in genere, ed il sistema linfatico in particolare, come l'aria umida, le malattie esantematiche, le febbri intermittenti, le perdite di sangue, i mali nervosi, ed altre simili. In tutti questi casi; ma molto più nelle cause della seconda specie, la malattia è spesso incurabile, e sovente mortale; hanno per altro degli esempj di esito felice in questa malattia.

La cura dell' ascite essendo interna appartiene propriamente alla Medicina, e quindi ai trattati di Medicina interna rimettiamo i nostri lettori per cose più ulteriori. Ci contenteremo soltanto di qualche osservazione, che secondo le cagioni della malattia determinerà il metodo curativo. Se dessa dipende da una causa locale è chiaro, che impossibile sarà la guarigione non potendosi togliere la causa; ma tutto quello potrà farsi dal Medico, sarà di dar esito alle acque per mezzo dei diuretici, ed anche colla paracentesi, e ritardare coll' uso de' corroboranti per quanto è possibile l' aumento del fluido stesso.

Se per altro l' ascite riconosca la sua origine in un vizio di tutta la macchina più attivo potrà il Medico il sistema di cura, e sperabile se non la guarigione, almeno un notevole miglioramento. Qualora l' infiammazione, o in genere una troppa attività del sistema linfatico, e segnatamente de' vasi porta sia stata la causa della malattia, è chiaro che i dissieranti, i minorativi, ed anche il salasso potranno essere assai vantaggiosi, benchè qualche moderno autore dica essere l' ascite sempre causata da debolezza de' vasi assorbenti. Ma se la troppa attività del sistema abbia prodotto l' ascite dovrà usarsi il metodo opposto, ed avranno luogo i diuretici, le preparazioni antimoniali, la china,



dirlo intieramente ,  
quantità già esistente  
sto si ottiene per m  
stituisce quella opera  
Comunemente sono c  
questa operazione si  
vo , dobbiamo per a  
te produce essa la g  
lattia segnatamente  
adattata cura interna  
to di praticare la p  
ripetuta qualora il  
qua la renda necess  
principalmente in qu  
la paracentesi sollec  
necessità di praticar  
sta in opera troppo  
dessa riesce inutile ,  
operazione delle pa  
parte , che sola spett  
te , e quindi a noi ap  
medesima , riserbanc

corpo umano meritano una particolare attenzione, quelli, i quali sono talmente vicini al peritoneo, poggiano immediatamente sul medesimo. Que-  
 tumori nascono nella cellulare de' muscoli addo-  
 li, e sono situati colla loro parte posteriore  
 eritoneo, a cui sono aderenti. La loro indo-  
 varia, e possono essere di quasi tutte le spe-  
 i tumori da noi accennate parlando de' tumori  
 nerale. Noi non parliamo quì di quei tumori  
 tura cancerosa, scrofolosa, o altra qualunque,  
 li si formano nella parte interna dell' addome,  
 tano aderenti al peritoneo. Questi dipendono  
 re da un vizio generale, e la loro esistenza re-  
 per lo più ignota al Professore nel tempo che  
 il malato, nè ammettono per conseguenza al-  
 cura locale. I tumori dei quali parliamo non  
 iscono punto da quelli, dei quali abbiamo trat-  
 to generale, e possono essere cistici, e di al-  
 tura qualunque. Essi dipendono dalle mede-  
 cagioni, hanno pressochè un eguale termina-  
 , ed offrono i medesimi sintomi, eccetto che es-  
 situati profondamente, ed essendo nella par-  
 teriore sostenuti soltanto dalla sottile mem-  
 del peritoneo sembrano comunicare colla ca-  
 ell' addome. Al metodo poi di cura già altro-  
 sto, cioè quello adattato alla natura diver-  
 tumori indicati è necessario qui aggiungere  
 e riflessione, che forma l' oggetto, per cui  
 io separatamente parlato di cotesti tumori.  
 ere il metodo di cura preferibile nei tumori  
 abbiamo detto essere l'estirpazione, ma questa  
 possiamo adottarla nei tumori cistici aderen-  
 eritoneo, onde miglior mezzo sarà quello  
 icisione, fatta per la lunghezza circa del tumo-  
 desimo, colla quale si ottiene sicuramente la  
 zione della cisti, meno quella porzione ade-

rente al peritoneo, che nulla pregiudica la sua esistenza. E' necessario anche riflettere, che l'apertura poi dovrà egualmente effettuarsi se il tumore senza produrre incomodo alcuno presenta un certo volume, poichè mediante questo solo possono cagionarsi degl' inconvenienti per la pressione sul peritoneo a seconda delle disposizioni, che ritrovansi nella macchina del malato, ovvero rompersi la cisti per la parte del medesimo, e produrre uno stravasamento nel basso ventre. Se poi il tumore consiste in un vero ascesso noi già abbiamo detto parlando della suppurazione, che vanno aperti sollecitamente quegli ascessi, i quali restino prossimi a qualche parte, che possono danneggiare colla loro apertura verso di essa, e particolarmente quelli, che corrispondono in una cavità qualunque. Ciò ha luogo segnatamente in questi prossimi al peritoneo, i quali se si lascino aprire da loro medesimi, o si aprano troppo tardi ne corre rischio, che la marcia si faccia strada a traverso il peritoneo, e produca come abbiamo detto un mortale stravasamento nella cavità addominale. Dovrà quindi il Professore in questo ultimo caso intraprendere l'apertura appena si riconosce formato il pus, e mantenerla pel tempo necessario fino alla perfetta guarigione.

## ARTICOLO II.

### *Delle Malattie delle vie Urinarie.*

**L**e malattie delle vie urinarie possono esistere o nei reni, o nella vescica. Molte di queste malattie appartengono propriamente alla medicina, e di cui noi non faremo menzione contentandoci di riportare le principali, che possono interessare il Cerasico. Le più interessanti risguardanti i reni sono



la nefritide, ed i calcoli renali, malattie quali trattasi estesamente da tutti gl' Autori, onde noi ci restringiamo soltanto a trattare gli effetti, che nascono talvolta dalla nefritide, i quali esiggon l'ajuto del Ce-

la nefritide può terminare con un ascesso, in cui qualche volta si fa strada per secesso, o per la marcia, corrodendo nel primo caso un vicino intestino, e passando nel secondo dalla pelvi del rene fino all'uretra. Coteste terminazioni della malattia sono di pertinenza medica, e di letale successo per il malato terminando colla tabe. Non è così però se la marcia si porta all'esterno del rene, e si fa strada nella regione di esso una fluttuazione, che non è fuori di dubbio, unitamente ai pregressi sintomi, l'esistenza dell'ascesso.

Se questa malattia non riconosce per sua causa un' affezione calcolare può sperarsi la perfetta guarigione come ne abbiamo degli esempj; ma l'esistenza de' calcoli ha prodotto la nefritide, e l'ascesso, in allora la cura Chirurgica libererà il malato dalla morte, ma sarà per lo più seguita da una fistola incurabile.

Se credasi dal Professore per la cura di cotesta malattia determinare più all'esterno la marcia, e se l'ascesso si potrà applicare un empiastro opportuno per qualche giorno su di esso, e passando con sollecitudine all'apertura. Il taglio con bistouri ordinario si deve fare nel punto più declive, e più fluttuante dell'ascesso. In questi casi medicherà secondo le regole generali altrove indicate. Sarà bene qui riflettere, che alle volte il Chirurgo in questo caso è obbligato dilatare l'apertura fatta per estrarre un qualche calcolo; e

tale estrazione de' calcoli dal rene si può eseguire solamente nel caso, di cui parliamo.

I calcoli nell' uretra, che impediscono l' esito dell' orina richiamano quasi sempre l' attenzione del Cernusco. Molti rimedj sono stati proposti per liberare i malati da tale incomodo, come sono il salasso, gl' emollienti, le bevande adattate, e le iniezioni oleose, segnatamente quando il calcolo sia molto avanti nell' uretra, onde possa questa venire compressa dietro il corpo estraneo acciò non venga spinto all' in sù dall' iniezione stessa. Le pinzette ordinarie in questo caso possono servir bene per l' estrazione del medesimo. Se il calcolo ritrovasi verso il bulbo dell' uretra sarà adattata quella cannula, che portatane una estremità a contatto del medesimo, sortono da essa tre branche, mediante una molla, le quali prendono il corpo estraneo, ed allora facilmente se ne fa l' estrazione. Se tutti questi mezzi per altro riescono inutili, è quindi necessario ricorrere all' estrazione col metodo del taglio, che si accennerà a suo luogo.

Una malattia però, che è di molto ostacolo all' esito libero dell' orina, sono gli ascessi dell' uretra così detti orinosi. Nascono essi dall' infiammazione di questo canale, che poi viene a rompersi, e l' orina passa dall' apertura che ivi si forma. Essa arriva ad infiltrarsi nello scroto, e nelle parti vicine, e costituisce un tumore molto elevato, che per lo più viene a terminare con la cancrena delle parti, se non si dia sollecitamente esito all' orina contenuta. Questo tumore può essere o circoscritto, o diffuso. Ordinariamente questi ascessi vengono prodotti da uno stringimento dell' uretra cagionato da causa venerea, il quale impedisce il passaggio dell' orina, e questa si fa strada come abbiàm detto a traverso l' uretra. In codesta malattia non è spe-

il riassorbimento, e la risoluzione della medesima, ma si deve ricorrere al più presto all'incisione. Questa si farà principalmente al perineo, tanto profondamente per dar esito al fluido contenuto, non si tralasceranno per altro nello stesso delle scarificazioni allo scroto, ed al pene, anche queste parti siano infiltrate. Si dovrà far uso al sito scarificato di fluidi astringenti, per esempio decozione di china, acqua venerale ec. se vi sia minaccia di cancrena si usino dei balsamici, o della china. Per procurare, che resti chiusa l'apertura dell'uretra, e impedire la recidiva della malattia, si servirà di una sciringa di gomma elastica, e delle canne, che distruggendo l'ostacolo dell'uretra, e impedire, che l'orina passi per la detta apertura, facilitano la perfetta guarigione.

Le fistole orinarie sono ordinariamente il seguito di ascessi sopranominati, poichè l'orina, che non può passare per l'apertura dei medesimi li escono per i canali fistolosi, e ne esce continuamente l'orina.

Le fistole hanno uno, o più orifici all'esterno. Sono spesso incurabili, segnatamente se esista un restringimento notabile nell'uretra, perdita di sostanza nella medesima, ed obliterazione del canale. Sono curabili, che le fistole molto piccole. Il metodo, che deve adoperarsi in questi casi, è quello di far uso di una sciringa di gomma elastica, e di farla continuamente, onde obbligare l'orina a passare per l'uretra, ed impedire, che passi per la fistola.

Sarà bene di tenere aperta l'estremità della fistola, acciò l'orina esca continuamente, e non si accumuli nella vescica, mentre allora potrebbe sortirne per la fistola, e quindi sarà bene, che il malato resti in letto nel tempo della cura. Le callosità della fistola passano da se stesse, cessando



il passaggio del fluido, ma si può ajutare la cura cogli emollienti. La compressione riesce di poco vantaggio. Il medesimo metodo di cura conviene nelle fistole, che comunicano coll' intestino retto, o colla vagina.

L' incontinenza d' orina altrimenti detta *enuresi* nasce ordinariamente dalla debolezza dello sfintere, talvolta o da un ulcere in questo, o da uno spasmo prodotto da vermi, da emorroidi, da un umore artritico, da una soppressione dei menstrui, e può finalmente dipendere ancora da lesioni locali della vescica, come da tumori nella medesima, da calcoli ec. e secondo queste diverse cause dovrà adattarsi il metodo di cura. Questa malattia se dipende da una paralisi della vescica non è di cura molto facile. Molti rimedj sono stati proposti a quest' oggetto. In primo luogo si dovrà far uso dei tonici internamente diretti contro la specie di debolezza predominante, come sarebbero la china, la tintura di cantaridi in piccola dose, l' allume crudo, e gomma arabica, e simili. In secondo luogo si dovranno fare delle frizioni sulla regione dei reni, e di tutta la spina dorsale, non che dell' osso sacro, e queste di cantaridi, di spirito di corni di cervo, di serpillio, come ancora si potranno più volte applicare dei vescicanti all' osso sacro, o al perineo, adoperare i bagni freddi localmente, e la docciatura sul pube. Si raccomanda eziandio far uso della compressione sul pene; ma questa porta seco molti inconvenienti, molto più nel tempo del sonno. Se l' incontinenza di orina dipende da un' affezione spasmodica è fuori di dubbio, che debbesi combattere la cagione, che l' ha prodotta. In genere poi in questo caso convengono le fomentazioni, i bagni, e l' oppio internamente.

Nelle donne l' incontinenza d' orina è molto più

ne negli uomini attesa la brevità, e larghezza dell' uretra, e queste stesse ragioni fanno che la malattia sia di cura molto difficilmente impossibile. I rimedj attonanti generali qui sopra accennati, inclusivamente alle fredde nella vescica, saranno i primi alla compressione dell' uretra entro l' arco pubico, non è così facile da praticarsi, e si rende spesso, che utile.

La causa all' incontinenza d' orina si è la ritenzione. Questa malattia può ammettere diverse specie, può cioè essere con semplice difficoltà di urina, che dicesi *disuria*, se l' orina esce a gocce dicesi *stranguria*, se finalmente non esce affatto dicesi *iscuria*. Varie possono essere le cause di questa ritenzione secondo le quali deve esser diretto il metodo curativo. Noi distingueremo le più comuni. La paralisi della vescica è la ritenzione dell' orina per la mancanza della forza necessaria per espellerla. Questa può provenir da molte cagioni, cioè dall' età, dalla debolezza della macchina, dal ritenere gran tempo l' orina nella vescica, dall' offesa della midolla spinale. Per rimediare a questa paralisi che per se stessa è di gran pericolo, trattone quella prodotta da contusione nella midolla spinale, oltre all' uso della sciringa per evacuare le urine, quando non si può altrimenti, si deve usare frequentemente, affinchè non si distenda l' uretra dall' abbondante accumulamento del fluido, si devono mettere eziandio in uso quelli rimedj, se la malattia sia curabile, raccomandati nell' incontinenza di orina, causata da infiammazione della vescica, o di tutta la macchina. La mancanza di forze per espellere l' orina può anche dipendere ancora da varj ostacoli che si oppongono all' azione della vescica. Essi

sono l'ingorgamento del collo della medesima, il gonfiore della prostata, un tumore fungoso, le varici, la compressione di un tumore esistente nelle parti vicine, un calcolo, gli stringimenti dell' uretra ec. Tali ostacoli si riconoscono con l' introduzione della sciringa. Il gonfiamento della prostata è una delle cause più difficili a togliersi, ed esso è ordinariamente il seguito della lue venerea. Gli stringimenti de' l' uretra, che sono assai frequenti si rimediano coll' uso delle candelette, e delle sciringhe elastiche, e molti Autori recenti hanno proposto negli stringimenti dell' uretra prodotti da gonoree invecchiate l' uso delle candelette caustiche. In generale in tutte le ritenzioni di orina deve il Cerusico primieramente procurare l' evacuazione della medesima, e questo si ottiene non di raro adattando i rimedj necessarij secondo la causa, che la produce, ed indi coll' uso della sciringa, o in un estremo caso colla punzione della vescica, se la sciringa, o le candelette le più sottili non siano state sufficienti per penetrare nella medesima. Noi parleremo a suo luogo di queste due operazioni. Per toglier la causa della malattia debbonsi adattare de' metodi diversi secondo l' indole, che presenta. Se la cagione consiste in una irritazione troppo grande, la quale forma un vero spasmo infiammatorio, a cui vi si associa la febbre, si adopererà il metodo antinfiammatorio, i salassi, i bagni, le bevande mucillaginose, e simili. Se poi sia prodotta la ritenzione di orina da una contrazione spasmodica dell' uretra, o del collo della vescica, che è la più frequente, il malato soffre quasi continuamente un prurito di urinare, ed alle volte si rende fortissimo, ed insopportabile. In questo caso non devesi tentare l' introduzione della sciringa, come ancora nell' antecedente, ma dee premettersi l' uso degli antispasmodici.



si giunge ad ottenere l'esito dell'urina. tiepidi, le fomentazioni calmanti, i suffumetti al perineo, le frizioni in questo, di volatile, canfora, e tintura tebaica, le oleose fatte nell'uretra, i clisteri opiat, e lazione del pene nell'acqua fredda, e secondari fare con questa il pediluvio, sono i più accreditati, ed efficaci, che convengono alla spasmodica. A cotesti rimedj si può amministrazione per bocca degli oleosi, e, oppure il calomelano coll'oppio. Quando dipenda in un ingorgamento del collo della, o della prostata, si richiede l'uso continuato della sciringa, e delle candelette, avvertendo di non alterare sempre il diametro delle medesime, e di non battere internamente la cagione, che l'ha prodotta. Se questo metodo di cura non sia sufficiente per impedire almeno l'aumento morboso della prostata, il quale non solo cagiona infiniti incomodi, ma eziandio infine lo priva di vita, si ricorre ad una operazione, che dicesi *Bor-*. Questo medesimo metodo di cura noi crediamo che convenga, in quei simili ingorgamenti della prostata, che fa le veci della prostata nelle donne, e che dee badare, che in queste per lo più vi sia un ingorgamento, e le scirrosità dell'utero. Il rimedio consiste in grumi di sangue dopo lazione della sciringa si potranno praticare delle frizioni tiepide per scioglierli. Se finalmente una causa sia quella, che impedisca la libera sortita dell'urina dalla vescica, come per esempio un calcolo ec. è chiaro, che la cura dee essere diretta contro la malattia primaria. I calcoli della vescica si rendono come abbiamo veduto una delle cagioni molto frequenti della ritenzione di urina. Essi sono formati secondo i

i luoghi; dicesi fistola completa. Oltre le cause della fistola dell' ano già accennate di sopra possono produrre la medesima ancora de' corpi estranei acuti inghiottiti, che si fermino all' intestino retto. Non è difficile il conoscere l'esistenza di una fistola all' ano, ma si rende alcune volte difficile il riconoscerne la penetrazione nell' intestino retto, la tantola, l'iniezione, ed altri simili mezzi sono stati proposti a quest' oggetto. Noi abbiamo già parlato delle fistole in generale, e le regole esposte possono applicarsi a quelle di cui parliamo. Riguardo al metodo di cura consistente nell' aprirle, ne parleremo trattando delle operazioni.

## CAPO V.

## MALATTIE DELLE PARTI GENITALI

## ARTICOLO I.

*Malattie delle parti genitali virili.*

**D**istingueremo con tutti i più recenti Scrittori di Chirurgia queste malattie in quelle dei testicoli, ed in quelle della verga. Le malattie principali dei testicoli sono le congestioni allo scroto, le ulcere, l'ematocoele, l'idrocele, il cirsocele, lo spermatocele, l'infiammazione dei testicoli, lo scirro, il sarcocoele, il cancro, e l'atrofia.

Le congestioni alla scroto possono confondersi alle volte col sarcocoele; ma osservando esattamente la parte si troverà libero il testicolo, lo che non ha luogo nel sarcocoele. Queste congestioni possono divenire considerabili, e la loro cura consiste unicamente nell' incisione, e nell' estirpazione della parte ingorgata.

Lo scroto può essere ancora soggetto a delle

odotte o da ferite, o infiammazione di detta  
 da un vizio particolare della macchina, non  
 contatto della fuliggine. Le prime possono  
 e delle suppurazioni molto estese, e si han-  
 degli esempj, della perdita di tutta la mem-  
 e della rigenerazione di altra simile. La re-  
 usarsi nella cura della malattia sarà quella  
 esposta parlando delle ulceri in generale.  
 do poi alle ulceri, che sopravvengono nello  
 per cagione interna le più frequenti sono quelle  
 ra carcinomatosa, le quali non si guarisco-  
 ne per mezzo dell' estirpazione della parte af-  
 e così ancora si trattano quelle ulceri dette de  
 acamini, altrimenti attaccano sovente il testi-  
 ed allora conviene ricorrere alla castrazione.  
 l' *ematocele* è propriamente secondo i migliori  
 ori una infiltrazione sanguigna nello scroto, o  
 unica vaginale del testicolo. Nel primo caso è  
 ra ecchimosi, che va curata coi metodi già al-  
 accennati per risolverla, ma siccome questo  
 o succede, così è necessario aprire il tumo-  
 lar esito al sangue contenuto. La cura ne è  
 nario breve, e senza accidenti.

altra specie di *ematocele*, ossia la raccolta  
 que nel testicolo si conosce dopo fatta l'ope-  
 dell' *idrocele*, giacchè allora si osserva, che  
 r la cannula un fluido sanguinolento, benchè  
 ecenti sostengono, che in quasto caso la ma-  
 ppartenga piuttosto all' *idrocele*. Ordinaria-  
 questa stessa operazione ne è la causa poten-  
 cilmente col troicart, e più di frequente col-  
 etta offendere qualche vaso varicoso nella va-  
 del testicolo; e lo stravasò può esistere sotto  
 sta, ed estendersi anche in quella del cor-  
 tesso. Cotesto stravasò può nascere eziandio  
 ito di una contusione, ed in allora si con-



fonde facilmente coll' idrocele , e non di raro aggrumandosi il sangue si può credere un sarcocoele. Il tumore in tal circostanza è duro , dolente , e senza fluttuazione . L'ematocoele di cui parliamo non diminuisce coll' uso dei topici , ma è necessario incidere la tunica vaginale , e dar esito al sangue contenuto . Alcune volte il testicolo stesso è ingrossato , e se si dia esito all' umore contenuto , si trova talvolta questo di color bruno , e denso , ed allora è necessario eziandio ricorrere alla castrazione .

L' *Idrocele* consiste in un tumore acquoso dello scroto , e questa malattia si distingue in molte specie secondo il luogo , che occupa il fluido , ed il modo , con cui vi è sparso . Le principali specie sono le seguenti . L' idrocele per infiltramento è quello , che ha luogo nel tessuto cellulare dello scroto , e si osserva sotto forma di un tumore molle , pellucido , si propaga alla verga , ed è per ordinario la conseguenza della leucostemazia , ma questo da molti non si riconosce per vero idrocele , ma piuttosto per edema , e secondo i migliori Scrittori lo stravasamento di acqua sotto la tunica vaginale è quello , che propriamente deve chiamarsi idrocele . Esso ha luogo o nella tunica vaginale del testicolo , o in quella del cordone spermatico . Si distinguono facilmente questi due casi , osservando il luogo , dove esiste il tumore . Quello del testicolo è più comune , esso distingue in accidentale , ed in congenito . Nel congenito la cavità , che contiene l' acqua comunica coll' addome , il tumore è trasparente , e si sente la fluttuazione . L' idrocele accidentale è parimenti trasparente , se non esiste sangue , o pus mescolato coll' acqua . Il volume del tumore cresce a poco a poco . Per distinguere l' idrocele da altre malattie del testicolo , e segnatamente dal sarcocoele si osservi , che nell' idrocele il tumore è trasparente , e più leg-

ro, che nel sarcocoele, come ancora meno duro, la fluttuazione è poi il segno il più sicuro. Alcune volte queste due malattie sono riunite, ed allora dicesi *idrosarcocoele*.

Per quello appartiene alle cause della malattia poco possiamo noi dire sulla cagione prossima della medesima. Osserviamo, che dessa è puramente locale, e che nulla ha di comune nelle cause delle tre raccolte di acqua, come le idropi, ma attacca le persone altronde sanissime. Spesso questa malattia nasce da se medesima, ma molte volte viene in conseguenza di contusione sul testicolo, d' infiammazione del medesimo, e sovente ancora è una esposizione di qualche altra malattia. Sembra, che siano capaci a produrlo tutte quelle cagioni, che possono turbare l'equilibrio fra la secrezione della linfa, ed il suo assorbimento. Il corso poi della malattia è lento, o rapido secondo le cause, e lo sta del paziente.

Per se stesso l'idrocele non può riputarsi malattia pericolosa, ma è bensì molto incomoda pel suo peso, e per lo stiramento del cordone spermatico, come ancora il continuo stropicciamento del tumore alla parte interna delle coscie forma delle escoriazioni, e questi incomodi sono tanto maggiore quanto più grande è il volume del tumore.

Per la cura della malattia si pongono in opera dei rimedj locali, e se dessi non siano sufficienti come il più delle volte accade si ricorre all'operazione. I rimedj locali, che sono stati proposti per la cura dell'idrocele consistono in tonici, e irritanti, quindi si è consigliato l'uso dell'acqua calce, della bollitura di china collo spirito di vino, l'allume, e simili. Alcuni hanno ritrovato un vantaggio dall'uso dell'aceto unito allo spirito di vino, ed al sale ammoniaco, o di una forte so-



luzione di questo sale, tartaro emetico nell'aceto; così ancora si è proposto l'etere, l'acqua vegeto minerale coll'acido vitriolico ec. ma ordinariamente questi rimedj sebbene continuati per lungo tempo restano qualche volta di niuna efficacia, ed è mestieri ricorrere all'opera della mano Chirurgica. Noi descriveremo a suo luogo il metodo da tenersi nella medesima.

Qualche analogia coll'idrocele può sotto un certo punto di vista avere il così detto *cirsocele*, che consiste in una raccolta di sangue nelle parti prossime al testicolo. Questa malattia detta ancora *varicocele*, altro non è, che un ingorgamento sanguigno dei vasi spermatici venosi. Alcuni recenti Scrittori di Chirurgia sono di sentimento, che possa in quest'affezione esservi eziandio un ingorgamento nei vasi spermatici, e perfino nella cellulare.

Sebbene il cirsocele possa in alcuni casi confondersi con altre affezioni, e segnatamente coll'epiplocele, pure sono i sintomi di esso abbastanza chiari per non confonderlo con altre affezioni di queste parti. Nel varicocele il tumore è nodoso, e si estende principalmente lungo il cordone spermatico, e si diminuisce nella posizione orizzontale del corpo, e nel freddo, mentre si accresce nella situazione retta, e nel caldo. Se sia molto voluminoso è dolente, altrimenti non reca alcun incomodo. Accrescendosi la malattia il testicolo viene a proporzione a diminuire di volume.

Il cirsocele può essere prodotto da qualunque causa, che impedisce il libero ritorno del sangue per le vene spermatiche, quindi producono sovente questa malattia le contusioni, l'indebolimento de' vasi spermatici, le affezioni emorroidali, l'uso del cinto, e finalmente l'arresto delle materie fecali



on , che comprime il cordone spermatico , per cui il varicocele , è più frequente dal sinistro .

Generalmente tale affezione è di poca conseguenza , molto più se sia di piccolo volume , ma se si accresce l'ingorgamento , cagiona essa dolore , e può anche produrre degl' incomodabili . In genere però se la malattia sia a non ammette cura radicale .

rimedj poi indicati nella medesima per diminuire almeno gl' incomodi , che seco porta sono si anche locali colle sanguisughe allo scroto ; sensorio , l'uso dei catartici onde impedire l'accumulamento delle feci ; l'uso del freddo , e stringenti , come il sal marino , il sale ammoniacale , l'allume , o gli attonanti come il vino , l'ec. e finalmente l'incisione delle vene nel punto di estremo gonfiore , o anche in ultimo caso l'asportazione .

Lo *Spermatocele* è una malattia consistente in infiammazione del testicolo prodotto da un ristagno di umori , ossia dalla mancanza di evacuazione della materia seminale . Questa malattia è molto rara , ma nel caso essa abbia luogo non dovrà lasciarsi il regime antiflogistico , come in tutte le infiammazioni , e se poi la malattia degenera in un vero sarcocoele sarà di mestieri ricorrere alla cauterizzazione del testicolo .

Le infiammazioni di quest'organo sono molto frequenti atteso , che desso è assai delicato , e molto esposto alle lesioni esterne . I segni di queste affezioni sono i soliti , che accompagnano le infiammazioni delle altre parti , cioè rossore , gonfiore , tensione in tutto il caso dello scroto , e dolore nel testicolo , che si estende ancora lungo il cordone spermatico , ed anche volte fino ai reni . La febbre accompagna que-

sta malattia con polso duro, e da alcuni disting  
questa infiammazione col nome di *Orchitide*.

Varie possono essere le cause di questa ma  
tia. Fra le più frequenti si annoverano la viol  
esterna, le irritazioni delle parti vicine, e se  
tamente dell' uretra, la retrocessione della g  
rea, ed anche la determinazione di un vizio  
nerale della macchina. Secondo queste cagioni  
è l' esito della malattia, ma ordinariamente  
essa con la risoluzione. Può per altro ancora  
di rado passare in suppurazione, o anche term  
con un scirro, e terminando ancora con la  
zione rimane sovente maggiore il volume d  
sticolo, e resta esso molto più sensibile del  
nario.

Per la cura dovrà adoperarsi il metod  
tante, avuto sempre riguardo alle cause, che  
prodotto la malattia, ed al temperamento dell  
fermo. In primo luogo sarà quindi necessario  
far uso di salassi ripetuti, e anche nella parte i  
terna della coscia, o all' inguine secondo lo sta  
del paziente, e della malattia, ad essi unirassi il  
poso, la dieta, le bibite, e localmente si appll  
ranno degli emollienti, e sarà ancora molto ut  
tenere il basso ventre libero segnatamente con d  
stieri. Se vi si scorge ingorgamento, o dures  
cipiente del testicolo si farà uso de' leggieri  
lanti adoperati per altro con somma cautela  
ridestare l' infiammazione. Nel caso poi d' in  
zioni sopraggiunte in seguito di gonorea retro  
rà necessario richiamare la medesima cogli e  
con i peniluvj, e con qualche candeletta,  
l' uretra, soltanto nel suo principio. Qu  
possa evitarsi la suppurazione spesso ac  
aprendosi l' ascesso esce porzione della s  
testi colo insieme col pus, e si dovrà gua



nel medicare la piaga di togliere i piccoli fili, osservano nel fondo di essa; alcune volte poi cade in questi casi la castrazione.

Indurimento, e lo scirro possono anche segnar l'infiammazione del testicolo. Il *sarcocele* è un indurimento scirroso del testicolo, che può passare in cancro. In questo caso accade molto, che si raduni dell'acqua nella vaginale, che viene a costituire la malattia detta *Idrosar-*

Il *sarcocele* ha molta analogia col cancro delle mammelle, essendovi anche nel *sarcocele* una disorganizzazione della parte affetta. La malattia principia con l'indurimento della parte, che poi viene a organizzarsi, ed attaccare ancora le glandole

una delle cause più frequenti del *sarcocele* si è l'infiammazione del testicolo segnatamente se sia stata mal curata, ma non è questa la sola causa, giacchè viene molte volte il *sarcocele* lentamente, ed in seguito d'ingorgamento del testicolo, come ancora può sopraggiungere senza alcuna apparenza.

Qualora il *sarcocele* dipende da causa locale non sarà impossibile la guarigione togliendo la parte affetta colla castrazione, ma se dipende esso da una causa interna, e segnatamente da vizio venereo dominante restano affette le glandole adjacenti, e si sviluppa lo scirro in altre parti rimanendo inutile in questo caso la demolizione del testicolo, e anzi rendendo inutile questa operazione se venga intrapresa troppo tardi.

Egli è necessario di principiare per tempo la cura di questa malattia, e siccome sovente essa dipende da vizio venereo, sarà molto utile il principiare la cura coll'uso del mercurio, molto più quantunque realmente non sia venerea la ma-



lattia, il mercurio può essere assai vantaggioso essendo esso uno dei rimedj più efficaci ne' casi d'ingorgamento, o durezza glandolari, oltre questo rimedio poi non si tralascierà l'uso dei ripetuti purganti, degli emollienti, e risolventi, come i cataplasmi, i bagni, il linimento volatile, il vapore dell' aceto ammoniacale, ed altri simili unitamente al riposo, vitto regolato ec. Questi medicamenti debbono continuarsi per qualche tempo, non conviene per altro insistere troppo sull'uso dei medesimi, se non se ne veda vantaggio notabile, giacchè si potrebbe perdere il momento favorevole per l'operazione, e differirla ad un tempo in cui si renderebbe inutile quando il vizio canceroso si fosse propagato a tutto il sistema, lo che si conoscerà principalmente se principi ad indurirsi ancora il cordone. Allora si comincia a stabilire il cancro del testicolo, e l'umore canceroso separato dal medesimo viene assorbito dai vasi linfatici, si porta nelle glandule vicine, produce in esse il medesimo disordine, motivo per cui l'operazione non ha alcun buon effetto, giacchè dopo la medesima si scuoprono de' vizj nella macchina, che cagionano la morte del malato.

Il cancro del testicolo è presso a poco della medesima natura di quello delle mammelle. Alcuni Autori distinguono questo cancro in scirroso, e fungoso. Nel primo precede ordinariamente lo scirro, ed a poco, a poco si manifesta un dolore, che si estende lungo il cordone spermatico, ed arriva fino ai reni. Nel cancro fungoso poi si manifesta la malattia piuttosto per una tumefazione molle del testicolo aderente allo scroto, che indi si rompe, e si forma il cancro di natura fungosa. In questa malattia l'unico rimedio è la castrazione, ma anche qui ha luogo lo stesso princi-

si è accennato parlando del cancro della , che cioè l'operazione intanto è vantaggiosa, può produrre la guarigione della malattia, che dessa viene fatta in tempo opportuno, se il cordone spermatico, o le vicine siano affette dal vizio canceroso sarà l'operazione.

L'atrofia de' testicoli può nascere dalla compressione dei medesimi, ma secondo i moderni Auteurs segnatamente aver origine dagli ascessi delle glandole, se nelle medicature non si ponga attenzione di non asportare porzioni della stessa del testicolo. Quando l'atrofia di quest'organo dipenda da perdita, o fusione della sostanza, che lo compone, la malattia sarà incurabile. Se poi essa abbia origine da compressione locale, o da debolezza generale l'allontanamento delle ragioni, ed i topici irritanti, o gli stimolanti interni ne produrranno facilmente la guarigione.

Le principali malattie della verga, che meritano l'attenzione del Cerusico prescindendo da quella di natura venerea sono il fimosi, il parafimosi, l'epispadiasi, e l'imperforazione dell'uretra, il cancro della verga, l'ingorghi della prostata, e l'ascesso della medesima.

Il *fimosi* è quella malattia, in cui l'orificio del puzio è così stretto, ch'è impossibile al glande passarvi, e di scuoprirsi, e che produce un impedimento al libero passaggio delle orine. I bambini nascono talora con un fimosi naturale, e talte volte il prepuzio è tanto ristretto, che l'orine non potendo uscire si accumula sotto il medesimo, e forma un tumore molle, che cresce continuamente, e produce l'ulcera del prepuzio, ed espone il bambino alla morte se non venga soccorso a tempo. Nel fimosi accidentale l'umore sebaceo se-

età avanzata ,

Se il fimosi venga prodotto da cause tali come da ulceri, o infiammazione del cessando la malattia principale cessa anch'essa, che ne è la conseguenza, ed in questi casi emollienti locali, ed il metodo antiflogistico sono sufficienti per la guarigione della malattia. In altri casi si richiede necessariamente l'operazione che consiste nell' incidere il prepuzio, e ricoperto il glande, come vedremo a suo luogo.

Il *parafimosi* è la malattia opposta al fimosi, cioè consiste esso nel prepuzio represso dietro il glande, onde questo si trova allungato, ed altresì insieme strozzato nella sua base. Questa malattia può essere egualmente che congenita, o accidentale, ma può darsi anche per mezzo di uno stromento viziosamente applicato alla base del glande. Nel secondo caso, cioè quando esso in conseguenza dell'apertura trota del prepuzio, giacchè allora passato il glande non può più esserne ricoperto, il prepuzio produce sul medesimo lo stesso ef-



Le cause del parafimosi sono in proporzione le medesime del fimosi, poichè se il prepuzio sia troppo stretto, venendosi a discoprire il glande con qualche violenza il prepuzio si ritira indietro, e viene a stringere la verga o sotto la base del glande, o sulla verga istessa. Siccome il glande continua in questi casi a ricevere del sangue senza, che esso possa ritornare indietro colla medesima facilità, quindi è che oltre il dolore, che porta questo stringimento, nascono delle ulceri, ed alle volte può sopraggiungere come si è detto la cancrena del glande; è per altro questo caso assai raro, giacchè le stesse ulceri producono la dilatazione del prepuzio, e guariscono la malattia distruggendo quella specie di ligamento, che forma il parafimosi.

Per la cura di questo incomodo si deve provare di ritirare il prepuzio sul glande. Alcuni per favorire questa manovra fanno tenere per qualche tempo il pene nell'acqua diacciata. Altri Autori consigliano nel parafimosi cronico, e non dolente di esercitare una compressione sulla verga, e sul glande per mezzo di una fasciatura, onde venendosi questo a diminuire di volume sia più facile ritirare il prepuzio sopra di esso. Non potendosi praticare questo metodo si procurerà di portare in avanti il prepuzio con le dita afferrando il glande con la mano sinistra, e comprimendolo nello stesso tempo per diminuire il volume, si ottiene con la destra di tirare il prepuzio nel suo luogo naturale. Siccome qualora le parti siano infiammate questa manovra resta non solo dolorosa, ma ancora difficile, così è necessario in questi casi di far uso precedentemente di qualche topico emolliente. Se poi l'infiammazione sia considerabile si potrà involgere il pene in un cataplasma emolliente non tralasciando eziandio qualche salasso, anche lo-

cale, se lo stato della malattia, e il temperamento del paziente lo richieda. Se finalmente nulla si ottenga con questi mezzi è necessario ricorrere all' operazione, di cui altrove parleremo.

L' *Ipospadia* dicesi propriamente quello stato preternaturale della verga, in cui l' orificio dell' uretra resta più in basso dell' ordinario. Si distinguono comunemente tre specie di questa viziosa conformazione, cioè quando l' uretra si apre alla base del glande, ovvero quando quest' apertura si trova vicino allo scroto, e finalmente quando lo scroto è diviso longitudinalmente, e nel fondo di esso rinviensi l' uretra. Questa malattia poco nuoce al libero esito delle orine, ma bensì è di grave ostacolo alla generazione; giacchè il più delle volte le persone soggette a cotesta mala conformazione sono impotenti alla generazione, trattone il primo caso.

L' *ipospadia* è priva di soccorsi Chirurgici, e per conseguenza è incurabile. Nella prima specie non si può formare artificialmente un pezzo d' uretra, che manca, e molto meno sarebbe possibile di chiudere il foro naturale alla base del glande. Questa prima specie è la più frequente. Nelle altre due anche meno può prestare di ajuto la mano Chirurgica.

Il cancro della verga principia con un tumoretto sul glande, e nell' apparire indolente, ma che diviene a poco a poco doloroso, e termina poi col formare un ulcera dolorosissima sanguinolenta, e che passa in una suppurazione fetidissima. Allora l' ulcera s' estende a tutto il glande, ed ai corpi cavernosi, che si gonfiano molto.

Questa malattia dipende spesso da mali venerei mal curati, e segnatamente dall' uso imprudente de' forti irritanti. Quando dessa è avanzata di molto vi si osserva sempre riunita l' affezione



le glandole inguinali . Pel cancro della verga sono stati proposti varj rimedj , ma il più sovente riescono inutili , e conviene ricorrere all' amputazione della medesima , la quale si dovrà praticare sollecitamente , affinchè se le glandole degl' inguini siano già affette il vizio canceroso diviene desso inutile .

Una frequente cagione della ritenzione di urina abbiamo veduto poter essere l' ingorgamento della prostata , ed abbiamo altresì accennati , quali siano i mezzi curativi , che convengono in tale circostanza , onde non dobbiamo altro aggiungere a quanto si è detto , che si è consigliato l' uso dell' incisione , ed il setone al perineo , se cotest' affezione non sia di origine venerea . Gli ascessi della prostata si cureranno secondo le regole da noi espone trattando degli ascessi in generale , avendo però dovuto riguardo all' uretra , onde essa dia sempre libero passaggio alle orine .

## ARTICOLO II.

### *Malattie delle parti genitali muliebri .*

Distinguonsi le malattie delle parti genitali muliebri in quelle delle parti esterne della generazione , ed in quelle delle parti interne . Noi accenniamo brevemente le principali fra di esse , che riguardano la Chirurgia . Alla prima classe appartiene in primo luogo l' unione delle grandi labbra , quale può essere per tutta la lunghezza di esse , ovvero semplicemente per una sola porzione , che è il caso più frequente . Questa malattia può essere naturale , o accidentale in seguito di ulcera di grandi labbri . La cura di questa morbosa aderenza si ottiene per mezzo dell' incisione , che si fa col bistorino . Situata pertanto la malata ori-



zontalmente s' introduce nell' apertura , che rimane fra le grandi labbra una tentola scannellata , e non essendovi si forma colla punta del bistori , e dirigendo sopra di essa l' istromento tagliente , si giunge facilmente a dividerle . Per mantenerle divise si richiede di porre fra i labbri delle stueila di stila , onde impedirne la riunione .

La lunghezza straordinaria della clitoride è ancora una malattia , che merita un' operazione Chirurgica , essendo essa d' impedimento al coito . Quando la clitoride è così lunga viene sebbene di rado a passare fuori delle grandi labbra . L' unico rimedio in questi casi è quello di ricorrere all' amputazione della clitoride . Per praticare questa operazione si reciderà essa col bistorino , e per fermare l' emorragia il miglior metodo , e più sicuro sarebbe quello di adoperare il ferro rovente , ma siccome molte malate si sottopongono mal volentieri a questo mezzo , così si potrà invece adoperare la legatura . Oltre l' eccessiva lunghezza della clitoride possono ancora altre malattie esser causa dell' estirpazione di questa parte , come sarebbero per esempio lo scirro , ed il cancro della medesima . In questi casi dovrà farsi l' amputazione prima , che il vizio canceroso estendasi in tutta la macchina , e si dovrà estirpare totalmente la parte affetta .

Le ninfe , o piccole labbra possono ancora esser lunghe più dell' ordinario , ed allora escgono fuori delle grandi labbra , esse restano irritate dal contatto delle vesti , e dal moto , onde vengono ad esulcerarsi . Questa lunghezza eccessiva può dipendere da una infiammazione di queste parti , ed allora col metodo antiflogistico si dissipa facilmente , ma ogni volta che sia un vizio di conformazione si richiede il taglio , che si eseguisce senza difficoltà colle forbici , e non porta seco alcuna conse-

guenza, non producendo ne anche considerevole emorragia.

Nelle bambine osservasi alcune volte l'uretra imperforata. In questo caso le malate sogliono render l'orina per l'ombellico giacchè questa viene a passare per l'uraco; ed allora all'ombellico si trova una screscenza fungosa da cui esce la medesima. Per la cura di questo incomodo si deve in primo luogo ristabilire il corso naturale dell'orina incidendo con la lancetta quella membrana, che chiude l'orificio dell'uretra; ed introducendo dopo nella medesima una piccola cannula elastica, che tenga continuamente aperta l'uretra, e dia libero passaggio al fluido, che ivi è destinato passare. Dopo di questo si verrà a chindere il foro fistoloso dell'ombellico, e perciò si lega l'escrescenza fungosa, la quale dopo pochi giorni cade lasciando cicatrizzata la fistola.

Alcune volte l'imperforazione è nella vagina. Questa specie d'imperforazione è d'impedimento all'esito del flusso mestruo, e può nascere o da una membrana particolare esistente dietro l'imene stesso, o da una riunione delle parti della vagina, o finalmente da un vizio congenito. In tali casi se non esista alcuna apertura, che possa dar esito al sangue mestruo, la paziente nel tempo, che principia questo a separarsi sente ogni mese accrescere gl'incomodi prodotti dalla permanenza del medesimo; cioè dolori ai reni, peso alla regione del pube, e viene alle volte ad aumentare il volume del corpo in modo, che potrebbe far supporre una gravidanza. Il rimedio allora si è quello d'incidere la membrana, che chiude la vagina, e ciò si fa praticando un'incisione cruciforme, dopo di che devono farsi delle iniezioni tiepide per sciogliere e dar esito al sangue aggrumato, che ivi ritrovasi

to, o la vesica.  
Nella vagina nascono delle escrescenze carniene ai polipi sono e no luogo si trovano a fuori delle grandi labbra migliore di essi coquenti sono le escrescenze altro conviene osservare grossamento delle escrescenze sono per di natura venerea, ed curiale. Se poi non si di guarigione più diffmigliori pratici di fare toniche, e nello stenici internamente, e meno la cura palliativa.

Può la vagina esser consiste in una speciebrana interna della medvogliono in un invaginala vagina più ristretta



onda . In ambedue queste malattie mezzo della vagina , una specie di colare , che forma una certa re-  
 prolasso della vagina si sente nel protuberanza la bocca dell' utero , e per distinguere questo caso dalla detto viscere . La difficoltà nell' or-  
 maggiore nel caso di prolasso di va-  
 sintomi sono soltanto chiari se la nte , giacchè se dessa sia molto an-  
 no facilmente le due insieme .  
 za della vagina accade ordinaria-  
 poco , e sembra prodotta da un' a parte . Se dessa sia molto inve-  
 ire assai voluminosa , ed affatto ir-  
 se sia recente , e le parti non sia-  
 estrema atonia non ne sarà impos-  
 one .

opera questo mezzo si deve si-  
 in modo , che restino in rilascia-  
 he potrebbero opporsi alla riduzio-  
 po aver posta la medesima orizzon-  
 scie elevate , e colla schiena , e ca-  
 ione analoga , si passerà a riporre  
 vagina discesa , lo che riescirà fa-  
 enza sia recente , e la paziente con-  
 sufficiente . Ridotta la parte si man-  
 mezzo delle iniezioni attonanti ,  
 ssione fatta per mezzo del pessa-  
 o corpo cilindrico , come per esem-  
 le sfilà ec. sostenuto se fa di bi-  
 se , e da una adattata fasciatura .  
 enza sia antica , tumefatta , ed in-  
 ata debole , rimane difficile il ri-  
 più il mantenerla in sito , onde da  
 igliata l'estirpazione per mezzo del

ciencia, che può essere curata in una  
malattia, a cui assicurano non solo e  
ti, ma eziandio con la continua positura  
dieta, e qualche purgante adattato di  
to rimettere nella sua situazione natu

Alla seconda classe delle malattie  
genitali muliebri appartengono il prol  
ro, l'arrovesciamento, il rivolgimento,  
medesimo, non che il cancro, i polipi  
l'idrope di questo viscere; così ancor  
e cancro dell'ovaja, e l'idrope che  
in queste si rinviene.

Fra i mali dell'utero adunque pre  
quelli appartenenti all'ostetricia abbia  
derare primieramente il prolasso del  
questa malattia l'utero discende nella  
escire fuori della medesima, e disting  
lasso completo, ed incompleto second  
ro esce totalmente fuori della vagina  
soltanto nella medesima. Si riconosce  
prolasso dell'utero colla semplice ispe  
parti, giacchè se desso è incompleto si  
ficio della matrice più in basso di que

due mestruo . Questa malattia riconosce  
ne ordinariamente da qualche sforzo vio-  
macchina , e da una debolezza delle parti ,

l' ha prodotta in un sol tempo , vi si  
sociare deliquj , emorragie ec. Per quel-  
guarda la cura si deve in primo luogo ri-  
tro nella sua posizione naturale , ed in se-  
go mantenerlo nella medesima . Prima di  
utero si dovrà adoperare il metodo anti-  
la dieta , il riposo , qualche lavativo ,  
olasso sia completo si applicheranno sul  
egli emollienti , con questi mezzi si pre-  
parte ad esser ridotta , lo che si otterrà  
la dolcemente verso il piccolo bacino senza  
molta forza , ma bensì a gradi . In questo  
donna dec ritrovarsi nel letto in situazio-  
colle natiche più elevate del dorso . Ad  
di mantenere l' utero nel suo stato natura-  
uso dei tonici astringenti , ed indi anche  
io . Fatta restare in positura orizzontale  
si dovrà introdurre nella vagina una spu-  
ra cilindrica , bagnata in un qualche li-  
quale venga a stimolare le parti stesse ,  
marne l' azione . Il cilindro va mantenu-  
con una fascia adattata , ed estrarlo al-  
giorno per pulirlo , e nuovamente ba-  
fluido astringente . Si possono eziandio usa-  
o tempo delle iniezioni fredde . Il pessario è  
ento di forma rotonda , che può essere col  
ovale senza gambo ed ambedue con un foro  
e si fa di sughero , di avorio , ma meglio  
elastica . Per applicarlo deve ungersi con  
rpo grasso , come olio , burro ec. ed al-  
lotto nella vagina si procura , se desso è  
ambo , che i suoi lati appoggino sulle tu-  
chiatiche . Sul principio questo stromento



alle cautele necessa  
costanza , segnatam

L'arrovesciamento  
cura assai più diffici  
dersi con il polipo  
presso a poco la m  
eccetto che si dovra  
in senso contrario  
superficie , che appa

Possono a ques  
deviazione dell' utero  
viscere , in cui il m  
più avanti , o più i  
aver luogo naturalm  
ficio del medesimo  
primo stato dicesi *an  
troversione* . Questo  
go principalmente n  
segnatamente nei pri  
può eziandio accader  
Il peso , che sentesi  
senso di stiramento d

# MALATTIE DELLE PARTI GENITALI.

però può essere generalmente prodotta da un  
zo violento della macchina particolarmente ne  
to di gravidanza, nel qual tempo si rend  
to pericolosa potendo cagionare aborto, lac  
ne dell' utero, ma segnatamente il parto con  
tura.

Il primo oggetto del Professore sarà  
quello di raddrizzare l' utero al più presto  
bile, e ciò non riuscirà molto difficile face  
uare la donna supina, o boccone secondo l'  
zione dell' utero, dopo evacuate le feci, e l'  
ed introducendo poi le dita nella vagina, e n  
giusta la circostanza, e così si raddrizzerà  
nente quest' organo. La quiete, i pessarij, e  
ciature saranno sufficienti a mantenerlo nel  
posizione naturale.

L'ernia dell' utero è rarissima, e cons  
tumore situato in una delle grandi labb  
to dall' utero, ch' è uscito dall' annulo ingu  
riconosce questa malattia portando il dito  
ina, e se si può arrivare a toccare la boc  
ro si conosce facilmente la sua situazione  
. Allora dovrà subito ridursi, e manten  
con una fasciatura, lo che per altro riusc  
se l'ernia sia recente, poichè in altro ca  
ha contratto delle aderenze, che rendono  
le la riduzione.

Il cancro dell' utero principia con lo scia  
lo del medesimo, e che diviene sollecita  
ulcera cancerosa. Dal collo si estende pe  
corpo stesso dell' utero, e delle ovaje.  
ni principali di questa malattia sono i dolo  
so di peso ai lombi, agl' inguini, e lanc  
intestino retto, ed alla vagina. Da quest  
fluido icoroso, e sanguinolento. Quando  
tia è in questo stato l' ulcerazione si esten

injezioni leggerment  
di fiori di malva , di  
utili ancora per togl  
uterine .

Lo *scirro* dell' o  
di quello dei testic  
difficile a riconoscer  
nifesta con un tumo  
dome nella regione  
cessivamente , e proc  
pressione , che esere  
segnatamente sulla v  
Passando gradatamen  
bre , la consunzione  
ri col vizio canceros  
ziente . Questa malat  
alcun soccorso dell' a  
tentarsi de' rimedj i  
si è proposto l' estir  
sta operazione è al  
praticabile .

Le ovaja possono  
pisia . Questa malat  
con l'ascite , ma sar



zione generale della malattia, e siasi  
la diatesi cancerosa generale.

ell' utero partecipano presso a poco del-  
ra di quelli del naso, e vengono di-  
il luogo, che occupano, e secondo  
za. I segni, che manifestano il prin-  
ipi dell' utero sono molto equivoci,  
poco si arriva a conoscere la malat-  
la paziente si lagna dei dolori nella  
strica, è soggetta a delle emorragie

Professore si assicurerà facilmente col  
stenza del polipo esaminando l' orifi-  
e. Secondo il luogo, che occupa il po-  
differenti sintomi, quando esso resta  
giona dei segni analoghi a quelli del-  
, se poi sia uscito fuori del mede-  
primere la vescica, o il retto, e di-  
ione di queste due parti. Non sono  
ne' quali il polipo esca dalla vagina,  
so per un rovesciamento dell' utero.

di questi polipi consiste nell'estirpazio-  
ottiene legando il polipo nella sua ra-  
sso venga a cadere, la legatura si fa  
lungo la parete posteriore della va-  
mento composto di due cannule d'ar-  
insieme, nelle quali si fa passare un  
sso metallo, che forma un'ansa nella  
e dello stromento, ed i due capi esco-  
mità inferiore di esso. Si deve situa-  
in quest'ansa, e tirando le due estre-  
dopo aver portato lo stromento in alto  
ringere la radice dell'escrescenza po-  
le si può poi serrare sempre più giran-  
to sopra la medesima, ma siccome è  
il portare l'ansa fino alla radice del  
esto è molto voluminoso, quindi è che

## I N D I C E

De' Capitoli contenuti in questo secondo Volum.

## SEZIONE SECONDA.

CAPO. I.	<b>D</b> ei mali della Testa.	
ART. I.	Commozione del Cervello, e sua produzione principale . . . . .	pag.
	Ernia del Cervello . . . . .	
	Idrocefalo esterno, ed interno . . . . .	
	Idrope del Cervello . . . . .	
	Spina Bifida . . . . .	
ART. II.	Fistola lagrimale . . . . .	
	Anchiloblefaro . . . . .	
	Ectropio . . . . .	
	Entropio . . . . .	
	Trichiasis . . . . .	
	Ptosi . . . . .	
	Lagofthalmo . . . . .	
	Tumori delle palpebre . . . . .	
	Orzajuolo . . . . .	
	Encantide . . . . .	
	Oftalmia . . . . .	
	— Gastrica . . . . .	
	— Angolare . . . . .	
	— Flemmonosa . . . . .	
	— Venerea . . . . .	
	— Scrofolosa . . . . .	
	— Erpetica . . . . .	
	— Vajolosa . . . . .	
	Ippion . . . . .	
	Idroftalmia . . . . .	
	Oftalmoftosi . . . . .	

abbia la superficie irregolare, o sia aderente sarà necessario ricorrere all' estrazione per mezzo di piccole tenaglie premendo nello stesso tempo sulla regione ipogastrica, e se mai l' orificio dell' utero per la sua ristrettezza non possa permettere il libero esito del corpo estraneo, sarà indispensabile dilatare l' orificio medesimo o con un adattato bisturi, o come altri hanno proposto per mezzo di forbici taglienti nella loro parte esterna, onde incidere i due lati della bocca dell' utero nel tempo stesso. La cura della ferita dopo l' operazione consisterà nel metodo antiflogistico, nelle iniezioni, nella quiete ec.

L' idrope dell' utero può molte volte essere unita alla gravidanza, e non di raro può con essa o con una mola confondersi, segnatamente se consista in idatidi, come sovente accade. Questa malattia rara è molto oscura ne' suoi segni, e non si distingue dalla gravidanza, poichè i sintomi, che l' accompagnano tanto riguardo all' utero, quanto rapporto alle mammelle, allo stomaco ec. non differiscono punto da quelli, che si associano alla gravidanza; ma l' idropisia dell' utero si distingue bene essa nel quinto, o sesto mese, o ancora più tardi, quando a tutti i sintomi, che caratterizza la gravidanza non vi è unito il moto del feto. A fine il fluido, o le idatidi vengono espulse dall' utero per una specie di parto, e la paziente rimangue guarita. Questa espulsione accade a tempi diversi, ora dopo pochi mesi, ora in seguito ad alcuni anni, e se la malata provi delle difficoltà nel mandare fuori queste idatidi, alcuni consigliano di praticare delle iniezioni un' poco irritanti, per accrescere con esse l' azione dell' utero. Qualora poi l' idrope non sia composta d' idatidi, ma consista semplicemente in una quantità d' acqua raccolta nel vi-



De' Capitoli contenuti in questa opera

## SEZION

CAP. I. **D**ei  
 ART. I. *Commu-*  
*duzio-*  
*Ern-*  
*Id-*  
*I-*

ART. II.

*Ulceri del palato*

*Tumori*

*Tic doloroso*

*Gonfiore delle parotidi*

*Scirro*

*Calcoli del dotto Stenoniano*

*Fistola*

CAP. II. Dei mali del Collo.

*Collotorto*

*Prolungamento dell'uvola*

*Infiammazione, suppurazione, ed in-*  
*rimento delle tonsille*

*Ulceri*

*Corpi estranei arrestati nell'esofa-*  
*o nella faringe*

*— nella trachea, o nella laringe*

*Infiammazione, e suppurazione*  
*glandola tiroidea*

*Broncocale*

CAP. III. Delle malattie del petto.

zione nella cavità del petto.	pag. 177
.....	179
.....	180
..... e del pericardio	ivi
..... nelle	181
.....	182
.....	184
.....	191
.....	193
.....	194
.....	ivi
..... matica	1P6
..... ale	ivi
..... della vescica	ivi
..... dell'ovaja	ivi
..... dell'intestino per la vagina	197
Ascessi nel fegato	ivi
Ascite	199
Tumori aderenti al peritoneo	202
1. Ascesso de' reni	205
Calcoli nell'uretra	206
Ascessi orinosi	ivi
Fistole orinarie	207
Incontinenza di orina	208
Ritenzione	209
Calcoli della vescica	211
1. Tumori fungosi dell'intestino retto	213
Prolasso	ivi
Ristringimento	214
Emorroidi	ivi
Ascessi nell'intestino retto	15
Fistole dell'ano	ivi
Malattie delle parti genitali	
Congestioni allo scroto	216
Ulceri	ivi

Lussazione

Aderenza

Glossitide

Ulceri dell

Esercscenza

Cancro —

Ranula .

Ulceri del

Tumori —

Tic doloros

Gonfiore de

Scirro —

Calcoli del

Fistola —

CAP. II. Dei mali d

Collotorto

Prolungame

Infiammazio

rimento a

Ulceri —

Corpi extra

o nella f



	Macchie della cornea . . . . .	pag. 65
	Ulceri ————— . . . . .	70
	Pterigion . . . . .	71
	— adiposo . . . . .	72
	Stafiloma . . . . .	76
	— racemoso . . . . .	80
	Prolasso dell' iride . . . . .	81
	Ptisi , e Sinigesi . . . . .	86
	Miopia . . . . .	89
	Presbiopia . . . . .	90
	Nictalopia . . . . .	92
	Emeralopia . . . . .	95
	Cateratta . . . . .	96
	Glaucoma . . . . .	104
	Amaurosi . . . . .	106
	Cancro dell' occhio . . . . .	115
III.	Ferite nel padiglione dell' orecchio . . . . .	116
	Tumori nel lobulo . . . . .	117
	Ostruzione del meato auditorio . . . . .	ivi
	Indurimento della membrana del timpano . . . . .	119
	Ossificazione ————— . . . . .	ivi
	Lacerazione ————— . . . . .	121
	Otitide . . . . .	122
	Suppurazione nelle parti interne dell' orecchio . . . . .	123
	Carie dell' ossa dell' organo dell' udito . . . . .	125
	Alterazione ne' nervi ————— . . . . .	ivi
IV.	Obliterazione delle narici . . . . .	126
	Epistassi . . . . .	127
	Polipo del naso . . . . .	128
	Ozena . . . . .	ivi
	Ascessi dei seni mascellari . . . . .	130
	Polipi ————— . . . . .	132
	Ascessi dei seni frontali . . . . .	134
V.	Aderenza delle labbra fra di loro . . . . .	136
	Labbro Leporino . . . . .	137

Cancro delle labbra . . . . .	pag.
Odontalgia . . . . .	
Parulide . . . . .	
Ulceri delle gengive . . . . .	
Cancrena ——— . . . . .	
Epulide . . . . .	
Dentizione difficile . . . . .	
Carie dei denti . . . . .	
Estrazione ——— . . . . .	
Lussazione ——— . . . . .	
Aderenza della lingua . . . . .	
Glossitide . . . . .	
Ulceri della lingua . . . . .	
Escrescenza ——— . . . . .	
Cancro ——— . . . . .	
Ranula . . . . .	
Ulceri del palato . . . . .	
Tumori ——— . . . . .	
Tic doloroso . . . . .	
Gonfiore delle parotidi . . . . .	
Scirro ——— . . . . .	
Calcoli del dotto Stenoniano . . . . .	
Fistola ——— . . . . .	

## CAP. II. Dei mali del Collo.

Collutorio . . . . .	
Prolungamento dell' uvola . . . . .	
Infiammazione, suppurazione, ed indurimento delle tonsille . . . . .	
Ulceri ——— . . . . .	
Corpi estranei arrestati nell' esofago, o nella faringe . . . . .	
—— nella trachea, o nella laringe . . . . .	
Infiammazione, e suppurazione della glandola tiroidea . . . . .	
Broncocale . . . . .	

## CAP. III. Delle malattie del petto.

ELEMENTI  
DI CHIRURGIA  
DI FILIPPO LEONARDI

CHIRURGO PRIMARIO, E LETTORE DI ANATOMIA,  
CHIRURGIA, ED OSTETRICIA NELL'ARCISPEDALE  
DEL SS. SALVATORE AD SANCTA SANCTORUM,  
E LETTORE SOPRANUMERO IN QUELLO  
DI S. MARIA, E GALLICANO.

TOMO TERZO  
CHIRURGIA OPERATORIA



IN ROMA MDCCCXVII.

Presso Crispino Puccinelli Stampatore in Via  
della Valle num. 53.

---

*Col permesso de' Superiori.*





100

100

III  
ALLA SANTITA' DI N. S.

**PAPA PIO VII.**

FELICEMENTE REGNANTE

**BEATISSIMO PADRE.**

**E**cco ai piè della Santità Vostra il  
-ompimento delle Istituzioni Chirur-  
giche, delle quali vi degnaste accettar-  
ne la umile non meno, che ossequio-  
isissima dedica. L'Autore nel prose-  
guire, ed ultimare un lavoro, che

di sua natura importa la più laboriosa fatica, ha avuto la massima compiacenza di assecondare le benefiche mire di Vostra Santità. Pubblicato già era il Primo Volume, quando eretta fu nel Archiginnasio Romano la pubblica Scuola di Clinica Chirurgica, che mancava in questa Università, e che segna una linea ben luminosa alla storia di Vostra Beatitudine, per il frutto ubertosissimo, che è per derivarne a sollievo della misera Umanità. Fù inondato da vero gaudio il cuore dell' Autore nel vedere, che l' intera Opera delle presenti Istituzioni tutta era analoga, ed opportuna all' oggetto delle vostre paterne sollecitudini. Quindi si confermò vieppiù nell' idea concepita dalla benigna accoglienza delle medesime, che fregiate del Vostro Augustissimo Nome, nobilita



quistano, e bellezza, onde solo  
 ostra mercè andar possono liete,  
 superbe. Degnatevi adunque Pa-  
 Santo di rivolgere dal Ponti-  
 o Soglio, (sù del quale possa  
 altissimo a lunghi anni serbarvi,)  
 o sguardo di favore, e di prote-  
 ne verso l'Autore, che si prote-  
 colla più inviolata fedeltà, sin-  
 ra riconoscenza, ed umile attac-  
 mento.

Umo, Devmo, Fedmo Suddito  
 Filippo Leonardi.

# IMPRIMATUR.

*S. Reverendissimæ Reverendissimo Patri Sacri Palatii Apostolici  
Magister.*

*Candidus Maria Frattini Archiep. Philipp. Vicar.*

## APPROVAZIONI.

**P**er ordine del Reverendissimo Padre Maestro del Sacro Palazzo Apostolico ho attentamente percorso il terzo Tomo dell'Opera intitolata *Elementi di Chirurgia*, composta dall'illustre Sig. Filippo Leonardi Chirurgo Primario, e Lettore nel Venerabile Archiospedale del Santissimo Salvatore in S. Giovanni in Laterano. In questo (come negli altri due Tomi) l'Autore ha diligentemente riunito le antiche cognizioni, con le più recenti scoperte di Chirurgia; ed in particolare in questo terzo tomo con tutta sagacità ha fatto la scelta de' migliori metodi per le diverse operazioni chirurgiche, e con tutta precisione ha descritto il manuale delle medesime, fatica utile e tutta la facoltà, ed in specie alli giovani studenti, che si dedicano allo studio di questo ramo dell'arte salutare, e però credo meritevole la pubblicazione di questo terzo tomo con la stampa, giacchè in esso non vi è cosa che sia contraria alla Santa Religione cattolica, ai buoni costumi, nè alla maestà de' Principi. In fede &c. Roma 12. Settembre 1816.

*Giovanni della Rocca Chirurgo Primario, e  
Lettore nell'Apostolico Archiospedale di  
S. Spirito in Sassia.*

**N**el percorrere il terzo Tomo delle Istituzioni Chirurgiche del celebre Sig. Filippo Leonardi, non solo niente ho ritrovato, che non sia conforme alla Religione cattolica, o che si opponga ai buoni costumi, ma altresì ho dovuto ammirare la sua perizia nell'arte salutare accompagnata da una vasta erudizione relativa alle materie, di cui tratta. Giudico pertanto sia anch'esso ben degno di esser posto alle luce colle pubbliche stampe: tanto più se si riguardino i vantaggi, che ha avuto in mira il chiarissimo Autore nel pubblicare quest'Opera, e che già ho accennati nelle rispettive Approvazioni degli altri Tomi precedenti. Tanto in esecuzione delli venerabilissimi ordini del Reverendissimo P. Maestro del Sacro Palazzo Apostolico.

Roma 21. Ottobre 1816.

*Raffaele Canonico Bonomi Lettore, e Censore  
emerito dell'Accademia Teologica nell'Ar-  
chiginnasio Romano.*

# IMPRIMATUR.

*Fr. Philippus Anfossi Ord. Præd. Sacri Palatii Apost.  
Magister.*

## INTRODUZIONE.

perazione dicesi in Chirurgia quell'azione meccanica della mano armata, o inerme del Cerusico, è diretta a conservare, risanare, o restituire proprio sito le parti del corpo umano. Secondo i oggetti, che ha in mira il Professore nel praticare un' Operazione, si sono divise le medesime in tre classi. Fino dai tempi più antichi queste classi sono state ridotte a quattro, e si sono chiamate *Sintesi*, *Dieresi*, *Exeresi*, e *Protesi*, secondo

l'operazione ha per oggetto di riunire le parti divise, o di dividere le parti riunite, o di trarre qualche corpo straniero, o di estirpare qualche cosa superflua viziata e dannosa, o finalmente aggiungendovi quello, che manca per natura o malattia. Queste diverse classi per altro non sono sempre divise fra loro; ma ci sono delle Operazioni, nelle quali si rinvencono riunite alcune di esse, o ancora tutte insieme, lo che dà luogo ad altre divisioni. *Sabatier* divide le Operazioni in due, che si fanno sulle parti dure, e sulle parti molli; ma questa divisione è meno utile per la pratica che l'altra da noi accennata.

Trattandosi di fare un'operazione dee il Professore considerare in primo luogo, quale sia la ra-



gione, che lo determina ad agire: se a fronte delle inevitabili difficoltà possa risparmiarla, e quale sia la pratica più semplice, più sicura, e meno dolorosa, che deve adottare. Deve esaminare il temperamento dell' infermo, l'età, l' indole della malattia, e le conseguenze, che sogliono venire dietro all' operazione, se essa sia d' esito incerto, se in questo caso sia meglio lasciare il malato con la sua malattia, che esporlo all' operazione col pericolo della vita, e simili altre considerazioni, le quali anderanno fatte con tanto maggiore attenzione, quanto maggior pericolo porta seco l' operazione medesima.

Dopo che il Cerusico avrà riflettuto a questi punti, deve determinare il tempo per l' operazione. Sotto questo punto di vista abbiamo due specie di operazioni, quelle cioè che si richiedono sul momento; come per esempio la trapanazione, la broncotomia, l' esofagotomia ec. Altre poi, che si possono differire molto tempo senza danno notabile dell' infermo; come per esempio la cataratta, il labbro Leporino ec. In questi casi, ne quali l' operazione si può differire, fa d' uopo aspettare, che la stagione, lo stato del malato, e le circostanze tutte sieno le più favorevoli possibili, onde sperarne un buon esito. E' bene ancora, potendosi, che si prescelga l' ora nel giorno destinato da operare l' infermo; la quale ci sembra più adattata

verso la sera, che nella mattina, per essere tanto l'operando, che l'operatore meno sensibili. Egli è necessario ancora riflettere, se deesi preparare il malato con qualche medicamento, o con qualche metodo di cura prima dell'operazione.

Stabilito finalmente il tempo dell'operazione, ed il metodo, che il Professore avrà prescelto per operare, deesi considerare ciò, che si debba fare prima dell'operazione, nel tempo della medesima, e dopo. Prima dell'operazione dee il Chirurgo esaminare attentamente il carattere morale del malato, onde poterlo persuadere all'operazione, ed indurlo ad acconsentirvi di sua spontanea volontà, procurando massimamente di non spaventarlo, molto più se desso sia di indole timida, e pusillanime. In secondo luogo sarà molto attento il Professore di preparare tutto il necessario per l'operazione, egualmente per gl'istromenti, che per l'apparecchio, e pel sito, in cui dovrà essere situato il paziente, onde resti nella miglior comoda posizione, tanto per se stesso, quanto per l'operatore. Dovrà avere il Cerusico il numero degli Assistenti, sì per tener fermo il paziente nel tempo dell'operazione, come ancora farsi somministrare gli opportuni stromenti, per essere d'aiuto alla manualità stessa, qualora sia necessario. Gli stromenti procurerà, che non in ottimo stato, e segnatamente quelli, che

debbono incidere, i quali siano bene affilati, e così pure l'apparecchio, che sia compiuto, e tutto di buona qualità, potendosi alle volte il Professore trovare in grande imbarazzo, se manchi qualch' oggetto, o sia di cattiva qualità, venendosi allora a prolungare di molto l'operazione, e facendosi soffrire molto di più il paziente, cosa che devesi, per quanto è possibile, evitare. Non si fiderà quindi l'operatore di alcuno sulla preparazione degli stromenti, e dell'apparecchio, ma dovrà egli stesso il tutto esaminare, e vedere, se è proprio, ed adattato.

Preparato quanto abbiamo detto di sopra, e disposto il paziente, sì nel fisico, che nel morale, si accingerà il Professore all'operazione. Sceglierà a questo fine il metodo il più pronto, e sicuro di tutti; procurerà, che all'operazione ci sia presente il minor numero possibile di persone, e quelle soltanto necessarie all'operazione stessa. Operando, deve egli essere preparato ad una tranquillità d'animo, che è quanto dire, ad operare col maggior sangue freddo possibile senza lasciarsi spaventare dalle grida del malato, anzi procurerà di dar coraggio al medesimo. L'operazione si praticherà colla maggior sollecitudine, senza per altro affrettare in modo, che si venga a mancare in alcuna parte essenziale della medesima, ovvero, che si venga a fare qualche cosa senza le dovute esattezze.



Fattasi l'operazione, procurerà il Professore praticare tutto ciò, che serve per coadiuvare l'antaggio, che se ne attende, o per impedirne effetti nocivi, che suole produrre la medesima.

Dovrà perciò prevedere, che non accada emorragia violenta, applicando l'apparecchio conveniente, e lasciando il paziente in custodia di Assistenti pratici, e vigilantissimi. Qualora l'apparecchio debba rimanere per molti giorni, dovrà il Professore visitarlo in diversi tempi per vedere, se il tutto resta in sito, ed in buona disposizione. Sarà cura del Cerusico di attendere al vitto del paziente, prescrivendo al medesimo una dieta moderata, che non possa produrre infiammazione violenta, o altri disordini pericolosi; l'aria dovrà essere sana, e la camera ventilata, segnatamente quando l'operazione porti seco delle abbondanti purazioni. Se l'operazione sia di qualche conseguenza, dovrà il paziente rimanere nella massima quiete possibile, e lontano da qualunque disturbo, inclusivamente dalla luce. La parte operata resterà nella situazione la più conveniente almeno per prevenire l'emorragia, che per mantenere il vantaggio prodotto dall'operazione, e non scomporre l'apparecchio, ed accrescere i danni al paziente. Se questi venga molestato assai dai dolori dopo l'operazione, sia per conseguenza della necessaria della medesima, sia pel tempe-

ramento irritabile del soggetto stesso , studierà il Professore di quietarli coi calmanti locali , o cogli oppiati dati internamente .

Noi esporremo in questo nostro Trattato le principali , e più interessanti operazioni di Chirurgia , lasciando quelle , che al presente non sono più in uso . Lo stesso faremo riguardo ai metodi , restringendoci per brevità ai più sicuri , e più scelti . Due parti della Chirurgia Operatoria verranno escluse da questo nostro trattato, cioè l' operazioni , che riguardano i denti , e quelle , che appartengono all' arte , che ajuta a ben partorire detta comunemente *Ostetricia* , giacchè queste due parti soglionsi da tutti gli Scrittori trattare separatamente . Divideremo le operazioni in cinque classi , secondo , che esse si praticano , sul capo , sul collo , sul petto , sull' addome , e sulle estremità . Nulla aggiugneremo poi sulla Natura delle malattie , che richieggono l' operazione , avendone già trattato negli altri Volumi , dove è esposta la Chirurgia Medica ,

# PARTE SECONDA CHIRURGIA OPERATORIA

## C A P O I.

OPERAZIONI, CHE SI PRATICANO SULLA TESTA.

### ARTICOLO I.

#### *Della Trapanazione.*

È già parlato nel primo volume di queste istituzioni Chirurgiche delle ferite, fratture, ed altre lesioni della testa, nelle quali gli è di necessità l'operazione del Trapano, e si è accennato che essa ha luogo in tutti quei casi, ne' quali esiste depressione di osso con frattura, ed i sintomi sono gravi, pericolosi; come ancora in quelle circostanze, in cui ancorchè non vi siano segni di frattura, ne vi si trovi ferita all' esterno, pure alle volte dalla congestione, che si rincontra, e dagl' indizj che si osservano nel paziente, come la paralisi di un lato del corpo, congiunta al dolore in una parte del cranio, si può dedurre, che esista uno stravaso l' interno di esso, onde si possa giusta il sentimento di *Percival Pott*, e *Francesco Quesnay* intraprendere la trapanazione. Noi però abbiamo posto a suo luogo le ragioni per le quali raramente si debba istituire cotesta operazione nello stravaso di sangue sotto il Cranio, ed altresì riteniamo, che sebbene per la quantità del sangue extravasato, e per i sintomi, che indicano presso a poco la situazione del medesimo, potrebbe aver luogo la trapanazione; ciò non pertanto possiamo



trodurvisi gli strom  
pressi, estrarre i pe  
ternati nelle parti se  
gue stravasato, se  
l'operazione del tra  
no frequentemente d  
so fra la dura madre  
raro caso, che lo es  
sa non convenga, ch  
d' infossamento, o c  
ferite prive di tali a

Quando secondo  
sore creduto; che fac  
pano preparerà gli stro  
ma. Questi sono varj  
che si hanno in mira  
noveriamo qui i più n  
utili per ben eseguire  
damente dividersi in  
sanno adattati per fo  
che servono per eleva  
poi della prima class

OPERAZ. CHE SI PRATICANO SULLA TESTA. 3

il quale è stato rimpiazzato dallo stromento recentemente inventato da *Heine*. Il trapano può essere di due specie, l'antico cioè, e quello proposto da *Sharp* detto *Trefine*. Il primo è composto di un albero piegato in quattro luoghi ad angoli retti, la di cui estremità superiore è fornita di un pomo, a cui si appoggia la palma della mano sinistra dell' Operatore, onde tenerlo fisso nella sua direzione; e l'altra estremità serve per fissare il perforativo, e le corone. Il trapano moderno è più picciolo, ed è composto di un albero, a cui è fissato nella parte superiore trasversalmente un manubrio, che serve per farlo girare con una mano. L'antico riesce ordinariamente più comodo, ma offre ancora maggior vantaggio, se a questo vi è la punta stabile, che fa le veci del perforativo, e della punta piramidale. Questo stromento è stato corretto da *Bichat*, e particolarmente descritto nell'opera di *Dessault*. Esso esclude dall'apparecchio componente gli stromenti necessari per la trapanazione il *meniugofilax*, il *tirafondo*, e l'*esforatore*, e lo riduce all'albero, alle corone, le quali possono elevarsi, ed abbassarsi, agli elevatori, ed aspiratori. Il perforativo è terminato in punta quadrangolare, le corone sono dentate in basso, ondeggiando a guisa di sega, e sono di varia grandezza. Quelle, che si adattano all'albero del trapano con l'estremità amovibile sono nella sommità perforate da un'apertura, per cui si rendono fissi mediante una vite all'estremità inferiore dell'albero in quel punto di questa, che richiede l'iniezione diversa nella resezione dell'osso. Le corone sono fornite nel mezzo di un perno acuto, alquanto più lungo della corona stessa, e che serve a mantenerla in sito, ma che si può togliere con una chiave fatta a tale oggetto. *Richter* preferisce

no altri stromenti  
zio per essere gen

Gli stromenti  
principalmente l'e  
b anche, e finalme

*Louis*. Il primo,  
modi, quindi pas  
quello corretto dal  
co, sopra a cui è  
la sua estremità.  
se fornita di molti  
perno, che ritrova  
fissato a cerniera.  
canismo una palla  
e che girando sull'  
sai più comodi i n

Esposti i dive  
sta operazione, ne  
no a rendere la m  
che è quanto dire  
Fà di mestieri qui  
di questo stromento  
te, che il pezzo d



CHE SI PRATICANO SULLA TESTA. 5  
chè l'estremità dell'albero non per-  
e la vite nel foro, che esiste nel  
o, che si sega prima di terminare la  
nedesimo. Il tirafondo è stato ge-  
scritto per la compressione, che fa-  
ce sopra il cervello, non che la te-  
e la leva apportando ancora questi  
enti, quindi ci sembra, che in que-  
servir bene uno stromento a guisa  
tomica terminante però con una bran-  
piccolo cono per adattarlo alla figu-  
e ritrovasi nell'osso già diviso; l'al-  
e termini quasi come l'ordinarie pin-  
e, avente per altro una sensibile in-  
terminare di essa, per renderne più  
i dell'osso stesso.

pertanto gli stromenti conviene, che  
ponga l'apparecchio per la medica-  
siste in primo luogo nella *Sindone*  
è un pezzo di tela un poco più  
rtura che si fa nel cranio; Altresì  
delle turunde di fila circa della me-  
za della corona del trapano, altre  
e, una berretta da notte, ovvero un  
ituarlo a guisa di berretta, uno scopet-  
tuzzicadenti.

ordine quanto fa d'uopo si passa all'  
raccomanda a questo proposito pri-  
ere alla parte, sulla quale essa dev'  
. Il punto da scegliersi sarà vicino  
a elevarsi, evitando per quanto si può  
capo che siamo per accennarle. I luo-  
professori di Chirurgia credono dan-  
one del trapano sono in primo luo-  
poichè verrebbe facilmente a pro-  
zione di quei vasi, che dalla dura

madre passano per le medesime al pericranio. L'offesa dei seni della dura madre rende ancora pericolosa la trapanazione sulla sutura sagittale, e sulla lambdoidea &c. I più recenti altronde sostengono, che si possa praticare la trapanazione in queste parti senza alcun pericolo, giacchè si hanno degli esempi di questa operazione praticata sulle medesime senza alcun'offesa. Sarà per altro miglior consiglio l'astenersene. Il trapanare su i seni frontali, offre non solo difficoltà nell'eseguire l'operazione per il naturale allontanamento delle due tavole ossee; ma eziandio per la facilità di produrre una fistola incurabile, e quindi deve il Professore evitarlo. Sarà bene anco ra di tener lontano l'osso temporale mentre abbiamo de' casi, ne quali l'incisione del muscolo *Crotafite* ha prodotto gravi danni. Per altro alcuni Scrittori recenti, e segnatamente *Richter*, *Copland*, *Schmucker*, ed altri sono di sentimento, che possa applicarsi il trapano non solo sull'osso temporale, ma ancora in qualunque parte del cranio, giacchè, essi dicono, se ciò si faccia con cautela nelle anzidette parti accennate resterà l'operazione solo più difficile, ma non mai di pericolo tale da doversene astenere in caso di necessità.

Prescelto il luogo dell'operazione dovrà situarsi il paziente per guisa, che la sua testa sia posta in sito comodo, e stabile, al quale fine si porrà sopra un cuscino ben sodo, si procurerà per quanto si può, che la parte da trapanarsi sia la più elevata. Ciò fatto si verrà all'incisione degli integumenti. Questa si farà in forma di lettera T o di V, che sono le migliori, e da preferirsi alla cruciforme, o alla rotonda da alcuni proposta. Si alza indi la cute col coltello, e si raschia col raspatojo il pericranio, onde lasciare l'osso allo scoperto. In seguito si applica il trapano fornito

della sua corona segante, fissata in quell'altezza adattata, affinchè l'estremità puntuta del medesimo agisca come il perforativo, che girando l'albero egualmente, e leggermente verrà a formarsi un piccolo foro, come se fosse fatto dal perforativo stesso. Allora il Professore invece di togliere dall'albero il perforativo, come solea farsi, abbasserà la corona per guisa, come se la medesima fosse guarnita della sua piramide. Il modo di adoperare la corona del trapano egli è quello di appoggiare la fronte, o il mento sopra il dorso della mano sinistra, la cui palma è situata sul pomo dell'albero, e girare il medesimo leggermente con la destra, fino che siasi ricisa la lamina esterna dell'osso, lo che si capirà dalla minore resistenza, che si sente, e dalla segatura, o polvere di color rosso, che si vede fra i denti della corona, benchè esse qualche volta manchino. Tostochè si è osservato, che la corona ha formato una traccia sufficiente, onde non possa più escir di sito, invece di togliere la piramide, e porvi la piccola vite di *Heine* come dovrebbero fare, se il Professore si servisse dell'albero del trapano a punta mobile, si abbassa soltanto la corona, e nel tempo stesso si pulisce con uno stuzzicadente il solco fatto dalla medesima, e con uno scopettino la corona istessa. Si applica quindi nuovamente l'albero con la corona, ed allora si può fare girare con maggior velocità, in maniera per altro, che resti sempre perpendicolare, affinchè l'osso venga egualmente segato da tutte le parti. In tal guisa di leggeri potrà farsi il Professore che il pezzo d'osso è vicino a cadere, e condurrà il trapano molto vicino a recidere senza la donna del malato, ed offenda il Cervello.



Quando l'osso è del tutto diviso rimane coll' ajuto della punta stabile dell'albero nella circonferenza della corona. Può per altro accadere benchè di rado, che il segato pezzo d'osso resti sopra la dura meninge; ed allora mediante il nuovo strumento introdotto con la sua branca puntuta nel foro, che esiste nel mezzo dell'osso separato dalla corona, e l'altra in un punto della circonferenza di questo, si giunge ad estrarlo con facilità dal cranio. Estratto poi che sia il pezzo d'osso dal cranio, ovvero che sia egli rimasto tra la corona, e la punta dell'albero si ripeterà la stessa operazione in altri luoghi vicini, se sia d'uopo una maggiore apertura per l'oggetto per cui si è praticata l'operazione. Se la trapanazione siasi eseguita per dar esito al sangue stravasato si procurerà per quanto è possibile, di trapanare nel luogo dove si suppone esistere lo stravasato, lo che per altro non sempre riesce, ad onta dei segni indicati, e creduti i più certi. Fatto il foro si procura l'esito del fluido segnatamente con la situazione adattata della testa. Se lo stravasato si possa supporre sotto la dura madre si aprirà essa col bistorino. Se poi l'oggetto di cotesta operazione sia stato quello di elevare uno, o più pezzi d'osso depressi, non sarà difficile conseguire l'intento facendosi uso della leva già di sopra descritta. Si starà in quest'azione molto attento particolarmente di elevare, o togliere le schioglie di osso, che potrebbero essersi internate nella dura madre, o nel cervello. Adempito in tal modo l'oggetto per cui si è fatta la trapanazione si dovrà medicare il malato. Si porrà la sindone al di fuori dell'osso, lo che sarà molto meglio, che di applicarla fra il cranio, e la dura madre come si faceva anticamente. Questo impedisce, che le fila entrino fra il cranio, ed

PERAZ. CHE SI PRATICANO SULLA TESTA. 9  
ello, o le sue membrane. Sulla sindone si  
o le fila senza bagnarle in cose irritanti,  
'alcuno si pratica, e sarà meglio far uso  
mollienti, applicandovi sopra la compressa,  
ciatura accennata. Il malato verrà posto nel-  
zione più propria, e si terrà nella dieta  
, quiete etc. non tralasciando le bevande  
istiche, l'emissioni di sangue, e tutto ciò  
esigere la qualità de'sintomi, che alle vol-  
ono sopraggiungere, che noi già abbiamo  
to parlando della cura delle offese di testa.  
, a poco si vanno in questo modo forman-  
a superficie della dura madre, e dell'osso dei  
bottoncini carnosì i quali si vengono a riu-  
a loro, e formano una nuova sostanza, che  
ce all'osso, che si è tolto, ma non essendo  
l'egual consistenza del medesimo fa di me-  
che il malato dopo la guarigione ricuopra  
te con qualche adattato corpo, che lo difen-  
le ingiurie dell'aria, ed impedisca con la sua  
essione l'ernia del cervello. Il Professore me-  
a la piaga due volte il giorno, o più spesso  
o il bisogno, e giusta la qualità della mate-  
he la suddetta fornisca. Se sia necessario  
pereranno ancora delle iniezioni di decotto  
ricon, di meliloto &c.

## ARTICOLO II.

### *Della Cateratta.*

erazione della cateratta consiste nel togliere  
te cristallina dal suo luogo, quando essa sia  
ta opaca, ed impedisce, che i raggi visuali  
o nuovamente convergersi fino alla retina.  
già da noi altrove dimostrata la natura della

malattia, ed i segni della medesima, ne altro on vi rimane, che di esporre i casi, ne quali conviene l'operazione, ed i diversi metodi di praticarla. I più recenti Scrittori consigliano di fare l'operazione quando ambedue gli occhi sono affetti da cateratta, e di aspettare, che essa sia matura, ch'è quanto il dire quel punto, in cui non si distingue più che la sola luce, giacchè potrebbe altrimenti accadere, che il paziente deteriorasse il suo stato coll'operazione. Se la cateratta sia accompagnata da amaurosi, ossia paralisia del nervo ottico si crede inutile l'operazione, benchè da qualcuno si consiglia dietro gli esempj di guarigione di codesta malattia. Il Professore *Himly* ci assicura di aver dissipata in molti individui l'amaurosi prodotta da debolezza indiretta per mezzo di raggi concentrati di luce, e diretti nell'occhio affetto, mercè una lente convessa. *Hufeland* dice di aver ottenuto in simili occasioni il medesimo successo esponendo il malato più volte al giorno a guardare il Sole. Noi abbiamo di recente guarito in questo Arcispedale un amaurosi perfetta causata da miasma venereo sotto l'uso delle unzioni mercuriali, fatte alla pianta dei piedi, unendovi un setone al collo fino alla guarigione: Dopo di questa fu stabilito un fonticolo al braccio, e fu tolto il setone. Nei malati, che hanno qualche vizio negli umori non si dovrà eseguire l'operazione della cateratta prima di averlo debellato cogli adattati rimedj, a motivo dell'inflammazione violenta, che può sopraggiungere. In genere tutt'i pratici convengono, che si debba praticare codesta operazione, della cateratta quando il colore opaco della lente è uguale per tutto, e quando i malati non veggono, che debolmente la luce, e distinguono soltanto l'ombra degli oggetti, purchè però l'iride si contragga alla luce forte. Al-



PERAZ. CHE SI PRATICANO SULLA TESTA. II

Uno di sentimento, che anche senza, questo segno possa praticarsi l'operazione con esice; altri poi credono, che non debba essersi senza che siano affetti ambedue gli occhi, stimano, che il togliere il cristallino da un, mentre l'altro sia sano, possa essere a quegrave nocumento.

E sono i metodi di fare l'operazione della ta, il primo, e più antico si è quello della sione, il secondo più recente si è quello dell'one, il quale per altro si è praticato fino dal secolo, come riporta *Sprengel* nell'istoria principali Operazioni di Chirurgia. Il terzo inventato si è quello della *reclinazione* al ti detta *Cheratonissi*, della quale si parleràresso.

Il metodo dell'estrazione ha avuto molto ap, ed è stato dalla maggior parte abbracciabandonando il primo. In seguito per altro molti, e segnatamente da *Scarpa* rimesso in quello della depressione. Se abbiamo da vero sembra, che la depressione sia meno azzante, e più semplice dell'estrazione, ma ne ancora assentire, che quelli, che vengono coll'estrazione recuperano la vista più tamente, che gl'altri, e senza timore di caa secondaria, potendosi non di rado nella tta col metodo dell'estrazione portar via la in un colle capsule.

Per praticare la depressione non sono necessari stromenti, che un ago adattato, cioè piatdoppiamente tagliente nella sua estremità, i Oculisti Inglesi, e Tedeschi, e più recente di tutti il nominato *Scarpa* nostro Italiano proposto di curvarè leggermente l'estremità, facilita molto l'operazione. Il malato verrà

situato incontro ad una sufficiente luce in modo però, che questa cada obbliquamente sull'occhio, acciò non abbia a restringersi la pupilla, e fattogli coprire l'altre'occhio si farà appoggiare il capo al petto di un ministro situato in piedi dietro il paziente. Esso potrà colle mani tener ferma la testa, e nello stesso tempo sollevare la palpebra superiore colle dita, le quali verranno appoggiate sul globo dell'occhio, onde tenerlo fisso, ovvero si potrà applicare l'ansa composta di un doppio filo d'argento, e fatta sostenere dal medesimo assistente senza servirsi del così detto *Speculum oculi* inventato da *Girolamo Fabrizio d'Acquapendente*.

Situato in codesta maniera il malato il Professore operante si porrà incontro il medesimo, e tenendo l'ago nella sua mano, come una penna da scrivere, colla destra se l'occhio da operarsi è il sinistro, e se il destro colla sinistra si atterrà al seguente metodo, che è il migliore per deprimere la cataratta. Introdurrà egli l'ago dalla parte dell'angolo esterno dell'occhio nella sclerotica una buona linea distante dalla cornea lucida corrispondendo una mezza linea circa più in basso della metà della medesima, quindi si fa penetrare nella camera posteriore così detta di quest'organo. Quando è penetrato per guisa, che si veggia dalla pupilla, si procura di fissarlo sul bordo superiore del cristallino, ed indi si viene a spingere indietro, ed in basso, tenendolo qualche momento in questa situazione, che si rende orizzontale pel cristallino depresso, nel fondo dell'occhio, e facendo nello stesso tempo alzar il medesimo al malato. Se si manca di questa precauzione è più facile, che la lente risalisca, e produca nuovamente la cecità. Questo risalimento della lente non è il solo inconveniente che possa tener dietro il metodo della depres-

AZ. CHE SI PRATICANO SULLA TESTA. 13

in che l'emoragia nell'interno dell'occhio  
 la lesione della coroidea, ovvero da quella  
 , o dei processi ciliari può impedire il  
 to dell'operazione per l'intorbidamento  
 , che produce nell'umor acqueo, e quin-  
 e indispensabile terminare la depressione  
 ersi dall'operatore la pupilla dell'infer-  
 qualche volta in questo caso per la con-  
 del'emoragia, egli è obbligato ritira-  
 ed aprire la cornea lucida per dar esito  
 'nmore acqueo ai piccoli grumi di san-  
 sì allontanare una susseguente pericolosa  
 one dell'organo stesso. Nel deprimere  
 accaduto eziandio non raramente veder-  
 nella camera anteriore, ed obbligare egual-  
 'professore ad incidere la cornea per dar-  
 uò ancora la depressione apportare l'amau-  
 i compressione esercitata nell'operazione  
 a retina. Varj per altro di questi incon-  
 o si potrebbero da mano perita non di-  
 re, o rimediarvi qualche volta se per  
 i presentano; ma noi che intendiamo  
 giovani studenti di Chirurgia, i quali  
 acquistare coll'esercizio della mano quel-  
 tanto necessaria per ben eseguire l'ope-  
 la cataratta, non sapremo mai consigliar-  
 starselo a danno neppur di uno di quei  
 , che si sottopongono per necessità ad  
 ione, colla quale di sovente cadrebbe-  
 disgrazia anche peggiore della malattia  
 quindi è, che essendoci per essa un me-  
 , e più sicuro assieme per liberarne il  
 oè l'estrazione del cristallino, dovremo  
 unza sempre questa preferire potendosi  
 sul cadavere, per poi ben eseguirla sul  
 ll'incontro non si possano dimostrare i



12  
situato incontro ad una sufficiente  
però, che questa cada obliquamente  
accid non abbia a restringersi  
coprire l'altr'occhio si farà  
petto di un ministro situat  
ziente. E esso potrà colle  
sta, e nello stesso tempo  
periore colle dita, le  
sul globo dell'occhio  
si potrà applicare  
filo d'argento, e  
sistente senza ser  
inventato da G.  
situato in

Situato in  
sore operante

sore operante  
nendo l' ag

nendo l' ag  
scrivere  
sinistro

sinistro  
seguito

seguenti  
la cate  
angoli

angole  
na V

na  
do  
de

de quali pupill

la pupill  
reciso d  
Do

reciso  
Do  
più sp

più sp  
menti  
indi co

indi co  
P esito  
del

Pesito  
ne del  
te non

te no  
sia tr  
prolu

prolu

100

SI PRATICANO SULLA TESTA. 17

essione la quale si rende sem-  
in estremo caso si com-  
qualche ora di un leg-  
ra le palpebre , e fi-  
pilla . Nel caso che  
pilla esista prima  
mente cono-  
come ef-  
o innanzi  
logie di bel-  
ma dell' opera-  
to vegetabile , la

nella cateratta un ade-  
vea che rende difficile  
questo caso vi è sempre il  
misura della pupilla prodotto  
pregressa , che ha formato l'ade-  
riportiamo su di ciò a quanto  
imperfiorazione , o restringimento

e cautele vanno usate in questa ope-  
lo stato della cateratta . Se essa  
a lattiginosa , o purulenta appena  
si vede escire il fluido bianco ,  
pupilla ; ma che uscendo solleciti-  
chio la lascia libera restando però  
ed alle volte porzione del cri-  
si è consigliato all' oggetto di  
lelle pinzette , o altro stromento  
do , che possano apportare impedi-  
ne . In questo caso *Vare* si pro-  
gran vantaggio dall' uso dell' etere  
*mpa* dice con ragione , che le reli-  
alcuni filamenti ec. si fondano

samente quello corretto da *Demours* possa permettere di tenere nel med abbassata la palpebra inferiore colla p to , cui esso è fissato . Noi per altr essere il più comodo quello di *Pam* taglio esce l'umor acqueo , e qualche ne venga ad escire dal medesimo la capsula , oppure essa soltanto , lac che la contiene . In caso , che ciò n potrà ajutare l'esito della lente con pressione sull'occhio , ma se questo stante attesa la resistenza , che presen na capsulare , ed i raggi ciliari farà di are la medesima per mezzo di uno d adattati , e questi sono l'ago da caterat mo di *La Faje* , il piccolo bistorino d coltello di *Siegierist* terminante in un a de' quali il primo è il migliore , e si la pupilla senza aver bisogno di solle reciso della cornea col cucchiajo di *L*

Dopo l'apertura della capsula a più spontaneamente l'uscita del crist menti si lascia un momento l'occhio



2. CHE SI PRATICANO SULLA TESTA. 17

giungiera pressione la quale si rende semplice, benchè in estremo caso si complica per qualche ora di un legaslama sedativo sopra le palpebre, e si dilatazione della pupilla. Nel caso che il ristringimento della pupilla esista prima il Cerasico potrà facilmente conoscere allora è stato raccomandato come efficace sul bulbo qualche giorno innanzi a un cataplasma fatto con foglie di bel- anche servirsi poco prima dell'operazione decozione di questo vegetabile, la tetta fra le palpebre.

riunire talvolta nella cateratta un adeno capsula, e l'uvea che rende difficile e; ma in questo caso vi è sempre il to, o chiusura della pupilla prodotto nazione pregressa, che ha formato l'aden- di si riportiamo su di ciò a quanto per l'imperforazione, o ristringimento a.

altre cautele vanno usate in questa operazione lo stato della cateratta. Se essa, ossia lattiginosa, o purulenta appena capsula si vede escire il fluido bianco, da la pupilla; ma che uscendo solleci- il'occhio la lascia libera restando però nenti, ed alle volte porzione del cri- quindi si è consigliato all'oggetto di uso delle pinzette, o altro stromento emendo, che possano apportare impedimento. In questo caso *VVare* si pro- tare gran vantaggio dall'uso dell'etere e *Scarpa* dice con ragione, che le reli- lente, alcuni filamenti ec. si fondano  
II. b

basi estrarre in un  
metodo , che in appa  
certo però , che le  
*dolphi* , *Federico A*  
*tens* presentano al  
estrazione della len  
bono scoraggiarci su  
guire ; ma senza en  
caso da discutersi ,  
za fra la cristalloid  
ed i processi ciliari  
stra . Negli operati c  
no ad un terzo di nu  
sua capsula ; o pri  
cristalloide , o anc  
ne si vede seguire  
che qualche volta c  
della capsola si è v  
alla lente dal taglio  
essere sufficientemen  
della capsula , quin  
stra almeno non ess  
za fra la capsula .

CHE SI PRATICANO SULLA TESTA. 19

lente stessa. Ci sembra pertanto, che per il metodo del Professore *Quadri* di sezione laterale, si possa giungere nell'arte de' casi a possedere il mezzo per la sezione della lente in un colla cristalloide. Il metodo, che siegue. Alla solita sup-aggiunge un' istromento, che serve per la separazione dell' accennate aderenze fra le capsule e i processi ciliari. Questo nuovo strumento ha la forma d' una lamina di vetro, la cui estremità superiore è piana, e la inferiore è concava, ma piuttosto leggermente concava, adattarsi alla figura della cristalloide, ed in tutto il rimanente di un sottilissimo cilindro.

Il solito taglio nella cornea lucida s' insinua, invece dell' ago da cateratta, per la capsula cristallina, il nuovo istromento, e la parte concava di questo riguarda la parte superiore del taglio della cornea, ed appena nella camera anteriore si rivolge colla parte concava in alto, affinchè possa in questa direzione penetrare nella pupilla, e da essa portarsi nei processi ciliari con la parte concava della capsula della lente, daddove diretta da destra a sinistra, e leggermente spingendo all' ingiù, si arriva a separare le accennate aderenze. Di ciò si avverte l' operatore, per lo che estraendo lo strumento, che ha servito alla separazione della lente, coi ligamenti ciliari, viene ad escire



la lente in un colle capsule. Supposto poi che lo seguito dei suddetti moti si laceri piuttosto la capsula, di quello che si distacchi la medesima interamente dai raggi ciliari, escirà subito dalla cornea lucida la sola lente, ed indi la seguirà la capsula, la quale si è del tutto separata, come si osserva talvolta nell'ordinario metodo dell'estrazione; ovvero si può dare il raro caso, che si ritardi alcun poco l'uscita della capsula; ritardo, che non offre alcuna variazione all'oggetto propostoci, cioè all'estrazione del cristallino, e cristalloide.

Per quello che si appartiene alla cura, che si richiede dopo l'estrazione della cataratta sia stata essa eseguita col nuovo stromento, oppure il caso non ne abbia richiesto l'uso per essere il cristallino escito unitamente alle capsule, oppur queste l'abbiano seguito, appena che si è fatto il taglio della cornea lucida, non differisce punto da quella, che abbiamo esposto parlando della depressione, e lo stesso intendiamo dire de' sintomi notabili, se mai essi sopraggiungono. Si dee usare eziandio quella cautela, che si prescrive in genere nel metodo dell'estrazione, cioè che l'infermo non produca la minima compressione sul globo dell'occhio operato, e faccia tenere altresì lontano qualunque stimolo, che possa generare lo starnuto, quali cose potrebbero produrre l'esito dell'umor vitreo, che essendo in quantità può apportare qualche volta del danno all'integrità della vista. In genere la situazione migliore, che dovressi permettere all'operato sarà la supina almeno per il primo giorno, e si coprirà l'occhio immediatamente dopo l'operazione con una molle, ed asciutta compressa, la quale verrà sostenuta da un semplice giro di fascia contentiva. Non si dovrà rimuovere l'apparecchio, che per cambiarlo restando esso bagnato di sover-

## 22. CHE SI PRATICANO SULLA TESTA. 21

ni due giorni dall'umor acqueo. Se l'uscio cessa in tal tempo, non si dovrà vi-  
chio, che dopo otto, e dieci giorni av-  
insensibilmente, ed a gradi alla Luce.  
No si dovrà osservare nel terzo giorno  
arne la cagione, e rimediarvi senza spa-  
operato.

zo metodo da noi indicato per operare  
si è quello, che abbiamo nominato della  
; ossia della così detta *Cheratonissi*. Que-  
so è il più recente di tutti, giacchè non  
a alcuna traccia prima dell'anno 1804.  
ta inventata dal Professore *Reil*, ed il  
o *Buchhorn* ha pubblicato questo metodo  
a opera. Il nome di *Cheratonissi* viene  
parole greche *χρᾶς cornu*, e *νύξ pun-*  
e dimostra bastantemente, che in questo  
si recide la cornea, come nell'estrazione,  
nge la sclerotica come nella depressione:  
passare l'ago per la cornea lucida col ma-  
e noi passeremo a descrivere.

to metodo a rigore non può dirsi in astrat-  
amente nuovo, poichè ne troviamo delle  
*Meyenne* nel 1690, nell'opuscolo di *Col.*  
pubblicato nel 1755., nel *Mauchart*, *Rich-*  
a questi Autori o hanno riportato de' casi  
hanno semplicemente proposto questo me-  
che poi sia stato da alcuno abbraccia-  
come si è detto è stato il primo a pro-  
*ichhorn* ha molto sviluppato le sue idee.  
, *Graffè*, ed altri si sono poi dichiarati  
del medesimo. Dalle esperienze di *Bu-*  
*trede*, che non resta sulla cornea lucida  
cicatrice, che possa essere di ostacolo  
, e che questo metodo è al sommo fa-  
tile nelle cateratte fluide, molli, lattigi-

ti offese, per l'impossibilità della procidenza dell'irride, e dell'esito dell'umor vitreo, e per la maggior sicurezza dell'Operatore, vedendo sempre il Professore la punta dell'ago, non che per la comodità del malato, il quale può restare col capo in qualunque situazione dopo di essa, ciò non pertanto *Benjamin Travers* preferisce nelle Cateratte solide l'estrazione alla reclinazione, e noi siamo di avviso, che questa sia soltanto d'anteporsi alla depressione, colla quale è in qualche modo analoga, e siccome abbiamo già veduti, quali siano gli accidenti, ai quali si può andare incontro praticando il metodo della depressione, ci sembra perciò inutile dimostrare quelli, benchè in minor numero, che possono incontrarsi nella Cheratonissi, come per esempio il risalimento del cristallino, il passaggio di questo nella camera anteriore dell'occhio, la restrizione della pupilla appena l'ago irrita la cornea lucida &c., i quali la rendono poco dissimile dalla depressione; e per conseguenza di gran lunga inferiore al metodo dell'estrazione da noi descritto. E' certo però, che generalmente parlando possono darsi alcuni pochi casi, ne quali convenga piuttosto la depressione del cristallino, che l'estrazione del medesimo, ed allora è da preferirsi esclusivamente il nuovo metodo di comprimere la cateratta, cioè la Cheratonissi.

### ARTICOLO III.

#### *Della Pupilla Artificiale.*

Qualunque cagione riconosca l'imperforazione della pupilla, o il restringimento inveterato di essa, a cui vi sia accompagnata eziandio l'opacità di una porzione della cornea lucida, alla quale qualche vol-



TERAZ. CHE SI PRATICANO SULLA TESTA: 23

della mano, che non opera, e l'unghia dell'  
servirà per appoggio all'ago, il quale si  
nell'altra mano, come una penna da scrive-  
r introdurre l'ago si terrà in alto la super-  
concava del medesimo, e si introdurrà nella  
lucida nella parte inferiore di essa; ma per  
che il foro resti alquanto più elevato del  
inferiore della pupilla acciò nell'abbassare  
za dell'ago, quando esso è giunto al cristall-  
an abbia la pupilla a restare offesa. Ciò fatto  
a sollecitamente l'ago per la pupilla, e fa-  
to penetrare nella lente si abbassa la punta,  
do il manico, e così la cateratta rimane re-  
; indi si ritrae l'ago con precauzione. Se  
ratta sia molle si procura di lacerarla por-  
i pezzi, o il fluido, che la compone nella  
anteriore. Se nel primo caso la lente risa-  
o nel secondo restino dei pezzi nella ca-  
posteriore, i quali non vengono assorbiti,  
pone di ripetere l'operazione. Fatta la me-  
si ricuopre l'occhio, e nei giorni della cu-  
ava spesso con acqua tiepida senza aprire le  
re. Il regime dev'essere antiflogistico.  
uesto metodo secondo i Pratici, che l'hanno  
to in opera sembra meritare molta prefe-  
sull'estrazione, e sulla depressione. *Buchorn*  
le preferibile nei bambini, nella cateratta  
ita, negl'Individui, ne' quali la fessura ci-  
troppo ristretta, o che hanno gli occhi  
profondi, in quelli, che attaccati dalla ca-  
in un sol'occhio desiderano di essere ope-  
n sollecitudine, in quelli affetti da spasmi,  
osti ad una infiammazione.  
obene codesto metodo si crede preferibile  
il sentimento dei suddetti Autori agli altri  
testè descritti pel minor numero delle par-

si è quello di apri  
inferiormente, con  
ed indi fare un tag  
ne eseguire questo  
forbici adattate un  
to della pupilla nat  
do verso l'angolo i  
re lo strabismo. V  
mente collo stesso  
glio, e contemporan  
si la medesima fig  
ascendere un poco  
il secondo taglio ve  
chio. La convessità  
irride si propone re  
qual cosa invero no  
contrazione naturale  
fatti *Buer* per esegu  
irride si propone ass  
trodotto dalla cornea  
bici di *Daniel*. Qua  
ver afferrare la porzi

pilla, accompagnato dall'opacità della lente, e dall'aderenza colla cristalloide, la quale può nello stesso tempo venire in parte recisa, dando luogo eziandio in seguito all'estrazione della lente caterattosa, e di altra porzione di capsula, che si rende necessario estrarre.

Finalmente si è di recente imaginato un nuovo metodo di formare la pupilla artificiale, che consiste nel distaccare l'iride dal ligamento ciliare per l'estensione di 2, o 3 linee. Di questa invenzione, sembra, che siamo debitori al Professore *Assalini*.

Il modo peraltro di praticare il nuovo metodo è vario. *Beer* dice d'introdurre l'ago come per la depressione della cateratta nella camera posteriore dell'occhio, ivi spingendo la punta dello stromento fra i processi ciliari, e traforando colla medesima la porzione esterna dell'iride, entra nella camera anteriore, nella quale dirige la punta dell'ago verso l'angolo interno dell'occhio fino alla unione fra i ligamenti ciliari, e l'iride, che portandolo allora all'indietro ne forma il distaccamento, e nel ritirare l'ago fa la depressione della lente nell'angolo esterno dell'occhio, se avviene bisogno. *Assalini* si propone diversamente separare il gran margine dell'iride facendo un taglio nella cornea lucida, in luogo ove trovasi opacata, ed introduce per esso la sua piccola pinzetta dentata a molla, colla quale dice il lodato Autore poter distaccare in luogo adattato felicemente l'iride dal ligamento ciliare senza ferire, o lacerare il tessuto, che la compone. *Scarpa* in questo caso introduce il suo ago da cateratta in un punto opaco della cornea, e porta la punta dello stromento nell'orlo marginale dell'iride corrispondente alla diafinità della cornea stessa, ed ivi spingendo di-



stacca per due, o tre linee il lembo dell'irride dai ligamenti ciliari, e forma la pupilla marginale. Il nominato Autore dice, che codesta operazione è accompagnata da dolore, e susseguita dai sintomi d'irritazione nell'intero globo dell'occhio.

Alcuni recenti Oculisti si sono proposti egualmente di separare l'irride dal suo gran margine, e dalle aderenze, che possa aver contratte, mercè l'introduzione di un'ago per la cornea lucida, e formare in tal guisa la pupilla artificiale. Questa operazione si è detta *Cheratodialissi*; ma come abbiamo veduto essa si praticava prima dell'invenzione della *Cheratonissi*, da cui ha avuto origine, e si preferisce agli antichi metodi, segnatamente dai *Scarpa*, *Flajani*, e *Rischerand*. Per eseguire cotesto metodo si perfora coll'ago la cornea lucida una linea circa in distanza del margine della sclerotica, nel luogo ove è duopo, che sia staccata l'irride, si rivolge la punta dell'ago contro la medesima, e comprimendo, ed estraendo l'ago si forma il distacco del gran margine dell'irride dal ligamento ciliare. Si avverte altresì di non spingere troppo l'ago nella camera posteriore per evitare l'offesa dei processi ciliari, della zona &c. Il Professore *Carlo Donegana* eseguisce l'accennato metodo con un'ago tagliente nella sua parte concava, e con esso però recide dal punto, che ha distaccato il gran margine dell'irride fino verso al centro della chiusura della pupilla naturale, formandosi in tal guisa l'artificiale di figura triangolare. Il medesimo Autore si propone con tutta ragione di evitare col suo metodo l'inutilità della pupilla artificiale, avendogli fatto conoscere l'esperienza, che il margine dell'irride, distaccato soltanto dal ligamento ciliare, e non reciso, si ravvicina alla propria inserzione in forza della circolazione

libera de' vasi sanguigni dell'irride medesimo, come anche è da considerarsi l'opacità, che si forma nell'età avanzata intorno il margine della cornea lucida, cui è sufficiente in codesto caso ad impedire la visione, ancorchè il gran margine distaccato dell'irride non siasi totalmente ravvicinato alla propria inserzione.

## ARTICOLO IV.

### *Della Fistola lagrimale.*

Quando la fistola lagrimale sia interna, cioè accompagnata da carie dell'osso unguis, o esterna inveterata, ovvero esista la dilatazione del sacco lagrimale, da non doversi confondere con quella intumescenza del medesimo, prodotta da contrazione spasmodica, non avvi altro mezzo sicuro, che l'operazione, onde liberare l'Infermo da una incomoda, e ribelle malattia.

I molti metodi, che generalmente per lo passato si ponevano in pratica per fare questa operazione potevano ridursi, a due, cioè a quello di deostruire, e dilatare le vie lagrimali morbosamente ristrette, oppure a quello di formare una nuova strada alle lagrime, perciò si praticava l'introduzione degli stilletti o specilli, ovvero delle cannule di oro per li punti lagrimali, o per la parte del naso, si faceva la perforazione dell'osso unguis col trojcart, o col ferro rovente, o coll'istromento di *Hunter*, ed in seguito si poneva nel foro fatto, una cannula d'argento, o una tasta di radice di Genziana all'oggetto di mantenere l'apertura.

Cotesti metodi per altro sono al presente affatto inusitati, e dai recenti pratici si sostituiscono



no ai medesimi degl'altri, con li quali si giunge a guarire la malattia, e che noi passiamo a succintamente descrivere, prescegliendo quello, che ci viene confermato il migliore dall'esperienza.

Premessa pertanto la situazione del Malato, che dev'essere a sedere, ed esposto ad una sufficiente luce con la testa appoggiata al petto di un ministro, il quale la tiene fissa, e nel medesimo tempo distende leggermente in alto, ed all'infuori la palpebra superiore, e preparato che sia il necessario apparecchio si passa all'operazione. Esso consiste per il seguente metodo in un bistorino retto, e stretto, una minugia, a cui vi sia attaccato un filo di seta da una estremità, un filo di refe a più capi, un cerotino adesivo, compresse adattate alla parte da operarsi, ed una fascia circolare stretta.

Disposto il tutto nell'anzidetta maniera il Professore si pone incontro all'Infermo, e gli fa chiudere le palpebre, quindi applica il dito indice della mano corrispondente all'occhio, che dev'essere operato, verso il naso, ed il pollice verso la gota, e coll'altra mano fa il seguente taglio.

Questo si principia sotto il tendine dell'orbicolare tagliando i tegumenti, e penetrando nel sacco lagrimale in un tempo, oppure con due incisioni giusta l'enfiagione, che accompagna la malattia. La direzione del taglio dev'essere alquanto obliqua, e l'estensione di circa tre linee. Eseguita l'incisione s'introduce secondo la pratica del celebre Vaccà nel sacco la minugia, la quale sarà poco più lunga del sacco stesso, e si dirigge poi verso la narice, in cui per il solito non passa subito; ma che facendo con cautela soffiare il naso al malato, non raramente vi si giunge. Quando sia essa penetrata totalmente nella narice



OPERAZ. CHE SI PRATICANO SULLA TESTA. 31  
na si attacca alla seta già fissa all'altra estre-  
della minugia il raddoppiato filo ben lungo,  
forma il setone, al quale si fa percorrere il  
lagrimale, ed il canal nasale fino nella nari-  
terna. Ciò eseguito si mantiene in sito po-  
la porzione superiore di esso fra li capelli,  
o in un pezzo di carta, e la porzione infe-  
con una pallottolina di filo nella narice, men-  
copre la ferita con il cerotino adesivo. Si  
in tal modo fino al giorno seguente, ed al-  
levasi il ceroto, e si tira il setone dalla na-  
il quale se mai non fosse riuscito far passa-  
il momento dell'operazione, si tira in sua  
la minugia, che si fa giungere facilmente nel-  
rice facendo soffiare il naso al malato, tenen-  
erò la bocca chiusa, e l'altra narice compres-  
Quindi si colloca il setone come abbiamo di  
indicato.

Il setone in questo caso si rende il mezzo di  
re a contatto delle vie lagrimali i medica-  
i adattati, i quali servono per distruggere gl'  
rimenti, e le callosità, che in esse ritrovansi,  
ciò è stato raccomandato non tanto di ac-  
ere gradatamente la grossezza del medesimo;  
to che esso venga imbrattato nel tratto della  
consecutiva con unguento escarotico, per cui  
tenga più sollecitamente l'intento.

Questo metodo del setone offre il vantaggio  
fistola lagrimale esterna di evitare il taglio,  
ndo riuscire d'introdurre la minugia coll'aju-  
tante di una candeletta, la quale antecedente-  
e introdotta nell'ulcera preesistente, forma la  
azione della medesima. Ma siccome cotesto  
do in qualunque modo si consideri, cioè co-  
l mezzo d'introdurre nelle vie lagrimali un  
ento escarotico, o come un corpo dilatante

rigione; esso è il seguente.

Fatto il taglio de' tegumenti , e grimalle in tutta la sua estensione senza recisione del tendine dell'orbicolare, sacco di morbide fila, mantenendo di quell'esteriore ferita, in cui si pone una piccola compressa, e si mantiene con monocolo semplice. Non si rimuove l'istesso che al secondo, o terzo giorno per ne un altro eguale con unguento ceratissimo ec. Si prosegue con tal medicazione che sia estesa la suppurazione in tutto il sacco. Allora si applica nel fondo del sacco un mezzo grano circa di pietra di saponaria si sostiene in quel punto con le saponarie, con cui esattamente si riempie il sacco. Segue che la pietra di saponaria seguente si ritrova distrutta la pietra di saponaria formata un escara, che separatasi, si applica nuovamente il caustico nel punto vicino alla guisa, dice l'autore, proseguesi l'applicazione alla totale distruzione del sacco la quale si applica esclusivamente a quella porzione di esso che sta al disopra del tendine orbicolare seguita la semplice medicatura di fila.

OPERAZ. CHE SI PRATICANO SULLA TESTA . 33

a contatto di una sola porzione del medesimo  
a pietra Infernale , colla quale si distruggono  
e callosità , che circondano i lembi della fe-  
Si seguita a medicare la parte con sole stuella  
a ase tutte , le quali gradatamente si diminui-  
in volume , che giungono poi a lasciare un  
piccolissimo , da cui vedesi sensibilmente una  
olina di fluido lagrimale uscire da esso , e che  
ssipa interamente dopo l' esito di quella por-  
to di osso unguis , che è stata a contatto dell'an-  
e da caustico . Essa è preceduta da un brucio-  
intumescenza rossastra nell' angolo inter-  
ell' occhio , che convertendosi in un piccolo  
so , coll' applicazione di un cataplasma emol-  
te , si apre , e nel foro apparisce la separata  
zione del sopranominato unguis , la quale si  
e estrarre , e quindi ne siegue in pochi giorni  
stabile cicatrice .

Non dobbiamo in questo luogo esaminare , qua-  
sia il vero mezzo con cui la guarigione si ren-  
permanente , cioè se essa dipende dalla totale  
struzione del sacco lagrimale , che non pare plau-  
bile , ovvero dal solo restringimento del medesi-  
mo accompagnato alla separazione di una porzio-  
ne dell' osso unguis , e della sottoposta membrana  
pituitaria : ci basti per ora sapere soltanto , che  
coll' esposto metodo giungiamo sicuramente a gua-  
rire l' Infermo senza pericolo di recidiva , cui non  
di raro con gli altri metodi era soggetta la ma-  
lattia in questione .

## ARTICOLO V.

### *Del Polipo del Naso .*

avendo avuto riguardo , secondo i precetti ge-  
rali alle cagioni , che possono aver prodotta un'  
Tom.III.



escrescenza poliposa, altro non rimane alla Chirurgia, che offerirci il mezzo per fare l'operazione della medesima quante volte la base non molto estesa lo permetta, e ciò particolarmente per quella escrescenza, di cui parliamo, detta *polipo del naso*. Varj metodi sono stati inventati a quest'oggetto. Nei trattati di Chirurgia ne osserviamo molti, e fino a sei ne sono riportati da *Sabatier* nella sua *Medicina Operatoria*, che sono l'essiccazione, la recisione, l'estirpazione, il setone, il caustico, e la legatura. Al presente peraltro tutti questi metodi non sono in uso, e si possono ridurre a tre soli, cui con qualche modificazione vengono adattati all'escrescenze polipose qualunque ne sia il sito, che occupano, soggetto però alla Chirurgia, e sono, la recisione, l'estirpazione, e la legatura, giacchè gli altri metodi, o sono troppo pericolosi, come il caustico, o non convengono, che in alcuni casi particolari, come il setone. Fra gli anzidetti metodi accennati, che pongonsi in pratica, la recisione non si adopera, che di raro essendo molto incomoda, ed alle volte può essere ancora dannosa rispetto all'inserzione del polipo, per la quale si potrebbe correre rischio di offendere le parti vicine, e sottostanti, abbenchè *Palletta* abbia voluto quasi generalizzarne l'uso particolarmente ne' tumori poliposi dell'utero.

Per praticare la recisione del polipo del naso è necessario, che la base di esso sia molto stretta, ed abbia la sua origine presso le narici esterne. La situazione del malato sarà a sedere incontro ad una sufficiente luce, e facendogli tenere la testa un poco rovesciata all'indietro, ed appoggiata al petto di un ministro, si prende allora il polipo con un piccolo uncino, o errina, e tirandolo in fuori si

AZ. CHE SI PRATICANO SULLA TESTA. 35  
 la base con un bistorino , cui si averà avu-  
 di involgere in una fettuccia , o striscia  
 ad alcune linee distante dalla sua pun-  
 ni casi in vece del bistorino , adopera-  
 ce , che riesce più sicura , ovvero il *Kio-*  
*essault* . Si adopera ancora il taglio , non  
 ortar via il polipo intero , ma per reci-  
 dio porzione , cioè quando esso occu-  
 narice per modo , che impedisce il far-  
 azione , o la legatura . Uno degli incon-  
 grandi di questo metodo si è quello  
 agia . Se questa sia assai abbondante ,  
 il far uso delle stuella di fila imbe-  
 uori astringenti , come una soluzione  
 di vetriolo bianco , spirito di vino &c.  
 non cedesse a questi ajuti si renderà  
 il fermarla coll' istromento di *Lafaje* ,  
 biamo già altrove parlato , e che produ-  
 ompressione alla narice interna , ed ester-  
 sta compressione si può formare ancora  
 di una corda di violino , la quale s' in-  
 dalla narice esterna nella bocca , ed ivi  
 con un pajo di pinzette vi si attacca un  
 di fila , che serve a chiudere la narice  
 portando nuovamente dalla parte del naso  
 corda ; ed in seguito si riempie la narice  
 di fila imbevute negli anzidetti fluidi , le  
 vono eziandio a mantenere in sito la mi-  
 che sostiene la compressione per la narice

estrazione del polipo del naso , che si fa  
 pinzetta di *Josephi* segnatamente nei polipi  
 oluminosi , la quale s' introduce una bran-  
 l'altra , ed indi si congiungono coll'adat-  
 ha luogo in tutti i polipi , che non solo  
 eri , o abbiano una base stretta , e non

molto dura, detti mucosi, o vescicolari; ma di più, che non abbiano origine nella parte superiore delle narici anteriori, essendo in tal caso difficile, ed anzi impossibile portarvi la pinzetta, ed eseguire con essa quel moto necessario di rotazione.

Per estirpare un polipo della indole accennata si farà situare il paziente nella maniera medesima, che abbiamo indicato, parlando della recisione, procurando di fare elevare la testa per modo, che la luce entri nella narice, allora s' introducano le pinzette fino alla radice del polipo, con le quali si afferra, si torce leggermente, ed indi si strappa ritirando lo stromento. Fa duopo ripetere più volte questa manualità, giacchè i polipi teneri, e vescicolari di rado possono strapparsi tutti interi; ma vengono sovente a pezzi. L'emorragia nell'estirpazione del polipo non è ordinariamente molto considerabile; ma in caso ciò accada si farà uso per arrestarla dei mezzi già descritti.

Estirpato il polipo dovrà esaminarsi la narice per vedere se siavi alcun residuo del medesimo, lo che non è raro, ed a quest'oggetto s' introdurrà un dito nella narice stessa. In caso, che sia rimasta qualche porzione del polipo, o si presenti altro polipo preesistente si ripeterà l'operazione. Questa diligenza sarà bene farla qualche tempo dopo eseguito il manuale, essendo difficile subito in seguito del medesimo a motivo dell'emorragia; sarà ancora necessario ripeterlo, se il polipo si riproduce, lo che accade quando la malattia dipende da un vizio generale, il quale non sia stato debellato prima dell'operazione. Se poi provenga dal prolungamento della membrana pituitaria convien più tosto tentare l'uso dei risolvendi, ed astringenti locali, che l'anzidetta estirpazione. Codesti topici vengono in qualche modo a corrispondere a



do dell' essiccazione ; ma l'apparente escrescenza parliamo , non puossi chiamare polipo del-  
 cni- sendo un semplice ingorgamento della mem-  
 ess- *eneideriana* prodotto per lo più da cagione  
 Sch- Qualora unitamente al polipo della narice an-  
 i. Q- ne sia unito un altro , che esista nella nari-  
 ve- ore , dopo estirpato il primo si dovrà svelle-  
 eri- do, e questo si farà, schiantandolo colle pin-  
 con- ve, e portate dietro il velo pendulo ,  
 cur- do però di non offendere la grossa piega-  
 and- ella profonda cavità, in cui quasi sempre è  
 ata- la sua base , altrimenti allo sbarbamento  
 feri- sce la legatura, fatta come vedremo qui  
 so.

la legatura del polipo è il metodo il più an-  
 per- la cura del medesimo, e conviene princi-  
 ente nei polipi di base molto stretta, e di fi-  
 pi- ramidale. Molti sono gli stromenti inventati  
 est- to fine. Quello di *Dessault* consistente in  
 ca- annula, un portanodo, un serranodo, così  
 ma- ti, e forse il migliore, il quale può ridur-  
 la- sola cannula, ed al serranodo; ma non ren-  
 per- questo facile un operazione, che per se  
 sa- presenta molte difficoltà risguardanti l'ade-  
 te, che possonsi esser formate tra il corpo del  
 ipo, e le parti, che lo circondano, non che la  
 rettezza della parte fin dove debbonsi portare  
 accennati stromenti. L'istromento di *Fallopio*,  
 ineato da *Leuret*, che è stato preferito prima dell'  
 ro, consiste in due cannule di argento riunite  
 ieme, ed in cui passa un filo del medesimo me-  
 lo, che forma un'ansa entro cui si fa passare  
 polipo, e che poi tirandosi, viene a stringerlo,  
 procurarne la caduta.

Determinato, che sia il Professore ad intra-  
 dere la legatura del polipo, che egli giudica

conveniente, si farà situare il malato nella posizione accennata di sopra, e si diversificherà l'esecuzione secondo il luogo ove esiste l'escrescenza, cioè nella narice anteriore, o nella posteriore. Nel primo caso s'introducano per il naso la cannula, ed il serranodo di *Dessault* muniti ambedue del filo con cui devesi eseguire la legatura, e nel foro del serranodo un secondo filo, il quale da una parte formi un'ansa, e dall'altra restino le due estremità. Portati in questo modo l'istromenti sopra del tumore poliposo fino alla sua radice, si tiene fermo il serranodo, e la cannula si gira sopra l'escrescenza per circondare la medesima col filo, che deve formare la legatura. Arrivata la cannula all'altra parte del serranodo si fa passare l'ansa intorno ad essa, indi tirando le due estremità della medesima, si fa scorrere su tutta la cannula, e si fa detta ansa cadere finalmente sull'estremità del filo, che ha circondato il polipo, per quindi trasportare il medesimo filo nell'occhiello del serranodo seguitando a tirare l'estremità dell'ansa; Ciò fatto resta il polipo circondato dal filo, ed altro non rimane, che stringerlo mercè il serranodo, avendo di già nel cader dell'ansa sul filo ritirata la cannula. Ora pertanto si tirano l'estremità di questo filo per stringere il polipo legato, e si fissano nella fenditura, che esiste nell'estremità inferiore del serranodo medesimo. Cotesta costrizione produce enfazione nell'escrescenza, e più o men dolore nella parte. Questo cede mercè le continue iniezioni, e suffumigj emollienti, e l'escrescenza cade circa il settimo, o l'ottavo giorno. Inallora devesi sostituire all'accennate iniezioni i leggeri astringenti, che anzi debbonsi portare simili fluidi col mezzo di fila in essi imbevute a contatto del punto, ove esisteva la radice del polipo, e procurare così una



ca- trice . Nel secondo caso poi , cioè se il  
esti nella narice posteriore si dovrà prin-  
operazione coll' introdurre lo stromento  
e , o una piccola sciringa elastica dalle  
ella bocca , ove si prende con una pinzet-  
i si attacca un filo , che deve formare la  
d el polipo , e due estremità di un secon-  
i quali dopo che siasi ritirato lo stromen-  
ano dalla parte della bocca , l'ansa , ed  
remità del primo filo , nel tempo che l'al-  
de dalle narici , unitamente alle due estre-  
el l'ansa . Ora s'introduce nella cannula di  
lt la sola estremità del filo , che resta fuori  
do cca , e quindi si porta la detta cannula sot-  
corpo del polipo , che ritrovasi nelle fauci ,  
ui girando intorno a questo nella sua base ,  
ova circondato dal filo . Ciò fatto si passa  
a intorno la cannula , ed in seguito si tirano  
ue estremità di essa dalla parte delle narici ,  
n tal modo si fa scorrere l'ansa su tutta la  
ula , ed in fine cade sul filo , che ha circon-  
il polipo . Allora seguitando a tirare le due  
emità dell'ansa le tien dietro il detto filo , e  
a nella narice anteriore , mentrechè resta intuti-  
a cannula , che lo conteneva , la quale si ritira  
a bocca . Le due estremità del filo , che si tro-  
fuori della narice , s'introducano nell'occhiel-  
el serranodo , che si fa scorrere sul piano  
e fosse nasali fino alla radice del polipo , e si  
a nella maniera suindicata la legatura del me-  
mo , usando in seguito le cautele di sopra  
ste .

Sebbene il metodo di estrarre il polipo del  
mercè la legatura , viene da qualche autore  
o approvato egualmente per la difficoltà , che  
senta ne' polipi assai voluminosi , che per gli



accennati inconvenienti, che produce poco dopo l'operazione, ciò non ostante la diversa situazione, e natura di alcuni polipi di cotesta parte obbliga spessamente il Cerusico a scegliere il metodo della legatura, non potendosi, nè con la recisione, nè coll'estirpazione ottenere la guarigione della malattia.

## ARTICOLO VI.

### *Del Labbro Leporino.*

**P**er la cura del Labbro Leporino, si rende necessario di far divenire cruenti i margini divisi del medesimo, di riunirli insieme, e di conservarli fino alla perfetta riunione. Varie sono le maniere di adempire a queste indicazioni: ma il metodo comunemente usato, ed il migliore si è il seguente. Gli stromenti, che vanno preparati a quest'oggetto sono il bistorino, o le forbici per recidere i lembi del labbro, alcuni aghi, o spille d'argento, o di oro colla punta di acciaio, del refe incerato, fascia, e compresse adattate. Per tagliare i lembi il bistorino à il vantaggio sulle forbici, che non produce contusione come dicesi, che queste alle volte fanno, ma esse riescano per altro assai più comode, motivo per cui in molti casi, e segnatamente nei bambini, che è difficile tener fermi, e ne' quali le parti sono più tenere vengono le suddette preferite. Per fare dunque l'operazione dee situarsi il paziente incontro la luce, col capo appoggiato al petto di un ministro, che lo sostiene colle sue mani, e nello stesso tempo tenendole sulla faccia, procura di tirare innanzi gl'integumenti, acciò si renda più facile al Professore il riunire insieme i labbri. In

RAZ. CHE SI PRATICANO SULLA TESTA. 41

ituazione il Cerusico prenderà con le di-  
te sinistra da recidersi, e con le forbici,  
istorino ne taglierà tutto il lembo, avver-  
rò, che se adoperasi questo ultimo stro-  
di porre prima fra il labbro, e la gengiva  
na sottile di legno, o di cartone per di-  
le parti sottoposte. Cotesto stromento  
preferenza nel caso, che vi sia durezza  
orli della fenditura congenita, come n'è  
o *Richerand*. In genere si deve avvertire  
ere fino alla riunione dei due lembi, acciò  
ti porzione, che non sia resa cruenta. A  
posito raccomanda *Monteggia*, che l'orlo  
suddetta fenditura prenda dopo la reci-  
la figura di un piano inclinato dall'inden-  
P infuori, tagliando minor sostanza da  
parte, che da quella della bocca, e rende-  
più solida la cicatrice per la maggior lar-  
a del piano fatto. Questa maniera di forma-  
recisione degli orli non ci sembra preferibile  
tra per le difficoltà, che s'incontrano nel far-  
ttamente, ed in particolare se si eseguisce  
forbici, e che quindi usando gli aghi per  
nzione; non vi è con essi una maggior forza  
a dalla parte della bocca, che vi si richiede;  
ma piuttosto potrebbesi ciò ottenere mercè  
nella parte esterna.

Dopo che siansi resi sanguinolenti i lembi del  
o, avendo eseguita la riunione prima del lato  
to, e poi del destro si dovranno porre a mu-  
ontatto, e questo si farà per mezzo dell' a-  
A tal oggetto s'introdurrà un ago alla distan-  
due linee circa dalli lembi del labbro, e vi-  
all'orlo del medesimo, osservando, che le due  
siano esattamente a livello. S'introduce l'a-  
lla grossezza del labbro per modo, che vada

un poco in alto trapassando circa due terzi dell'anzidetta grossezza. Ciò fatto si fa penetrare nella destra porzione del labbro, facendo il medesimo: ma però in senso opposto. Il primo ago dev'essere introdotto circa una linea sopra il margine inferiore del labbro, e dopo di esso se n'introduce con lo stesso metodo uno, o due altri secondo l'età del paziente, e la lunghezza della fenditura. Situati gli aghi necessarj vi si passa sopra ad ognuno un'ansa di refe incerato, la quale si ripassa alternativamente da una estremità dell' ago, all'altra, onde tenere i lembi della ferita a mutuo contatto. Sotto l'estremità degl' aghi si pongono delle picciole compresse, acciò non ne restino offese le parti vicine, e ponendo ancora delle compresse sulle gote per tenere continuamente in avanti le parti, onde facilitarne la riunione, si mantiene il tutto in sito con una adattata fasciatura detta comunemente la *Fionda*. La regola di cura è molto semplice consistendo il tutto nel procurare, che il paziente non muova punto la parte operata. Dopo tre giorni si visita la ferita, che ordinariamente è riunita, e lasciando per altri due, o tre giorni gli aghi per precauzione particolarmente l'inferiore, si levano dopo questo tempo ungendone l'estremità, onde renderne più facile il passaggio. Si raccomanda ancora dopo l'estrazione dell'ultimo ago di porre sulla parte un ceroto agglutinante per assicurare sempre più salda la riunione. Questo è il metodo più comune di curare il labbro leporino semplice; ma a questo proposito vi sono delle osservazioni necessarie. Qualora la fessura esista ancora nel palato, come sovente accade, l'operazione si pratica nella medesima maniera, e dopo ottenuta la riunione delle parti molli, si viene a poco, a poco da se stessa a riunire



la fessura delle ossa, e ciò accade tanto più, quanto più giovane è il soggetto. Riguardo alle cattive conformazioni degli ossi, che possono impedire la riunione delle parti molli, alcuni propongono la recisione, ma altri, e segnatamente *Dessault* credono preferibile il comprimerle qualche tempo prima dell'operazione. La sutura, che molti raccomandano temendo gli effetti della cruenta, non dee in conto alcuno esser preferirsi, sì perchè la sutura secca riesce sempre inefficace alla riunione delle parti recise, perchè i danni che seco porta la sutura cruenta sono in cotesta parte di alcuna conseguenza. Nei bambini operati del labbro leporino si attende, che con le grida non facciano muovere la sutura, ed i spilli, per lo che non si lascerà loro mancar il nutrimento necessario, e si farà ancora di qualche opiato. Convien eziandossaminare se in essi accade alcuna emorragia, osservando questa ne' suddetti molte volte difficilmente riconoscersi, atteso che, in particolare nel son-ghiottono facilmente il sangue, che esce dalla ferita.

Se il labbro leporino sia doppio ogni volta che la porzione di mezzo sia piccola, e che consistesse semplicemente in un bottone carneo si potrà recidere, e poi passare all'operazione, come si è detto trattando del labbro leporino semplice; se all'opposto questa porzione media sia molto larga, ed il labbro medesimo portasse troppa perdita di sostanza, è necessario renderla cruenta da ambi i lati, e fare l'operazione doppia. Alcuni Autori consigliano di eseguirla in due volte, e di non praticare la seconda, se non sia già riunita la prima incisione. Altri fra i quali *Richerand* sono di opinione contraria, sostenendo che sia meglio il farla in

una sola volta, cioè incidere una parte, e dopo subito l'altra, riunendole insieme col metodo esposto di sopra; molto più, che la porzione di mezzo spesso non arriva all'orlo del labbro, ed allora essa non s'infilza, che nell'ago superiore, ponendo i soli lembi del labbro a contatto nella parte inferiore. Qualche volta accade, segnatamente nel labbro leporino doppio, che vi sono alcuni denti fuori di sito, che rendono difficile il mantenere le parti recise a mutuo contatto. Se essi sono alquanto elevati debbonsi con la compressione adattata, e prolungata per più giorni, portare al loro luogo, ed in caso poi di necessità estrarli prima dell'operazione.

## C A P O II.

DELLE OPERAZIONI, CHE SI PRATICANO SUL COLLO.

## A R T I C O L O I.

*Estirpazione delle Tonsille.*

**I**l gonfiore infiammatorio delle tonsille obbliga molte volte a recidere le medesime: operazione che viene conosciuta sotto il nome d'estirpazione, sebbene realmente non possa chiamarsi tale, non estirpandosi mai esse interamente. La recisione di queste glandole può aver luogo nelle infiammazioni violente delle medesime, se per altro arrivano al punto di minacciare la soffocazione del malato; ma ordinariamente queste infiammazioni violente nelle tonsille si dissipano più sollecitamente, e facilmente di quelle croniche, le quali si succedono l'una all'altra, e spesso vi producono un ingorgamento, che non è possibile dissipare, ed obbliga quin-

PERAZ. CHE SI PRATICANO SUL COLLO. 45  
fessore a reciderne porzione, giacchè dif-  
cede ai rimedj risolvendi per quanto egli-  
attivi.

sono i metodi, che vengono proposti per  
operazione vale a dire i caustici, la lega-  
il taglio. Il caustico è poco da adottarsi  
un metodo, che oltre l'essere spesso inu-  
ficile a porsi in opera, ed inoltre riesce  
pericoloso attesa l'offesa, che possono ri-  
le parti vicine. Altri hanno al caustico  
il fuoco, e si hanno degli esempi, che  
riuscito vantaggioso; ma al presente non  
presso i migliori pratici, eccettuato al  
aso, in cui vi sieno dell'escrescenze fun-

legatura resta di molto difficile applicazio-  
orta de' gravi incomodi alla parte. Il me-  
gliore si è quello di *Dessault* consistente  
rare la tonsilla con una pinzetta uncinata,  
di passare sulla medesima un ansa di filo,  
si porta sulla glandola fin dove è necessa-  
stringe quindi essa collo stromento adatta-  
errando ogni giorno più il nodo si ottiene  
a della porzione della glandola. *Chevalier*,  
un ago, col quale passa il filo nella ton-  
nodo scorsojo, e così crede rendere più  
legatura.

alunque metodo per altro si adoperi per le-  
porzione della tonsilla da estirparsi, è sem-  
gran lunga preferibile a questo metodo il  
essendo più facile, meno doloroso, e me-  
nodo. Varj stromenti sono stati inventati  
dere la tonsilla, cioè il *Kiotomo* di *Dessault*,  
ecie di bistorini, e di forbici, come an-  
e sorta d'errine. Gli stromenti per altro, pre-  
presente, sono una errina doppia, colle



punte di acciajo , ed un coltello di lama piuttosto corta , e non tagliente , che nella sola estremità , montata sopra di un manico lungo , e fisso .

Preparati questi stromenti si farà porre il malato a sedere incontro alla luce con la testa alquanto rovesciata all' indietro , ed appoggiata al petto di un ministro , che la tiene ferma . Si farà tenere al paziente la bocca aperta situando due corpi un poco resistenti fra i denti molari , e si farà abbassare la lingua per mezzo di una larga spatola . Se il Professore sarà ambidestro si porrà avanti il malato , in caso diverso , si porrà dietro le spalle del medesimo , dovendo operare sulla tonsilla destra . In questa situazione prenderà egli l'errina doppia , con la quale fisserà la glandola colla mano sinistra , allora con la destra prenderà il coltello di sopra accennato , e principierà a recidere la tonsilla dalla parte inferiore , fino verso la metà di quella porzione della glandola , che si deve levar via ; ciò fatto porterà il tagliente dalla parte superiore verso l' inferiore , e si compie la recisione . Non si deve estirpare il tutto in un sol taglio principiando dalla parte inferiore , giacchè si correrebbe rischio di offendere i pilastri , ed il velo pendulo , e se si principiasse dalla parte superiore potrebbe la porzione di glandola separata rovesciarsi sulla laringe , e produrre il vomito , impedire la continuazione del taglio , e porre il paziente ancora in pericolo di soffocazione . Accade sovente nel tempo dell'operazione , che il paziente provi o degli sforzi di vomito , o degl' insulti di tosse ; ed in questi casi è necessario ritirare gli stromenti dalla bocca , onde lasciar passare l'irritazione . Quando siano affette ambedue le glandole , se il paziente sia in istato di sopportarne la recisione nello stesso tempo , si potrà immediatamente dopo recisa

ERAZ. CHE SI PRATICANO SUL COLLO. 47  
passare ad operare l'altra, se poi il ma-  
oppo sensibile, se l'emorragia continui ee.  
dovrà attendere, che sia guarita la pri-  
nendo molto incomodo il fare la seconda  
e prima di detto tempo, attesa l'infiam-  
che ne segue, e che oltre rendere dolo-  
arte impedisce, che la bocca possa aprir-  
è necessario.  
ntomia, che merita maggiore attenzione, do-  
ata la tonsilla, si è l'emorragia: ma questa  
suol essere d'importanza attesa la picco-  
vasi, che vanno a questa parte. E' ne-  
ino ltre una piccola effusione di sangue lo-  
evene ndosi così una forte infiammazione. Per  
re il sangue sarà molto utile il praticare de'  
ismi di ossicrato, i quali saranno sufficienti  
oggetto . L'uso della pietra infernale è da ri-  
varsi essendo essa di poco vantaggio, e mol-  
pericolosa, se viene a rompersi, o cadere nel-  
lanci. La guarigione della ferita è ordinaria-  
mente assai sollecita, e non richiede rimedio al-  
cuno. Se per altro nascano escrescenze fungose, le  
quali ritardino la cicatrice, dovranno esse venire  
scarpate, o meglio ancora si adopererà il fuoco  
alla dovuta cautela, o altri caustici locali. Se sia  
per altro di natura venerea, come sovente ac-  
cade, vi si unirà la cura interna adattata.

## ARTICOLO II.

### *Della Broncotomia.*

operazione detta della *Broncotomia* consiste nell'  
apertura delle vie aeree, distinta quindi in laringo-  
, e tracheotomia, secondo che viene aperta  
l'inghiottitoio, o la trachea. Tre sono i casi più fre-

pressione sulla trachea prodotta da  
esistenti nella faringe, in occasione  
sia gonfia in modo da chiudere le fi-  
di gonfiore eccedente delle tonsille  
poi hanno consigliato ancora questa  
casi di sommersione; ma l'esperien-  
i sommersi provano, che in questi  
morte dipende da tutt'altra cagione  
perduto passaggio dell'aria, e quin-  
deesi generalizzarne l'uso, come a-  
omettere la Broncotomia in alcuni a-  
zidetti casi. Qualora poi sia indispo-  
sta operazione debbonsi aprire le vi-  
razione quanto è necessario, per  
all'aria, onde poter continuare la re-  
desima, o richiedesi un'apertura me-  
onde estrarre da esse un corpo est-  
per altro riflettere, che in questo ca-  
te o dagl' impeti di tosse, o di vo-  
espulsi detti corpi estranei da loro  
quindi rendesi inutile l'operazione,  
non deesi essa praticare senza una e-  
tà. Negli altri casi per altro dove il



malato introducendo delle sciringhe  
astica nella trachea, e questo metodo  
ne può supplire in alcuni casi alla larin-  
come in appresso vedremo.

sono stati i metodi imaginati per far  
erazioni. Alcune volte deesi incidere l  
, che riunisce le cartillagini cricoide,

s'introduce l'aria fra le medesime,  
todo è propriamente quello, che cost  
laringotomia. Altre volte s'incidono lor

mente cinque, o sei anelli della trachea  
ma la tracheotomia, la quale sebben

pericolosa dell'altra a motivo dell'offe  
i sanguigni considerabili è tuttavia se  
cuni necessaria, qualora si tratti di tira

corpi estranei introdotti nella trachea  
poi le opinioni degl'Autori sullo stro  
da servirsi per fare l'apertura, poichè al

preferiscono il troicart, ed altri lo stromen-  
to di *Bauchot*, che in molti casi può riuscire più

vantaggioso, e più comodo particolarmente per to-  
ner fissare la trachea. Noi descriveremo brevemente

due metodi, la laringotomia cioè, e la tracheoto-  
mia, essendo la prima preferibile in alcuni casi

ed essendo la seconda in altri indispensabile.  
Per praticare la laringotomia si deve prepara

re la necessaria suppelletile di stromenti consisten-  
te in un bistorino, una cannula, due errine, un

lancetta, la quale si ricuopre di una fittuccia, on-  
de ne resti scoperta la sola punta, un pezzo d  
ceroto, compresse aperte, un pezzo di taffetà,  
di velo, ed una fascia a quattro capi, ed una spu-  
gnina per asciugare il sangue. Preparato il necessa-  
rio si farà situare l'infermo in una comoda posi-  
zione, che sia segnatamente adattata a render fa-  
cile la respirazione. Alcuni preferiscono, che si

paziente sia seduto sopra una sedia , altri che resti coricato nel letto . Il Professore dovrà regolar-  
si secondo le circostanze procurando peraltro , che  
il capo sia ben fissato , e portato alquanto in ad-  
dietro , onde possano restar tesi i tegumenti , e  
le altre parti della regione anteriore del collo .  
Restando il paziente in questa situazione il Pro-  
fessore formerà una piegatura nei tegumenti , e fa-  
rà un taglio dei medesimi fino che si arrivi a sco-  
prire il ligamento crico-tiroideo . Ciò fatto si de-  
ve asciugare il sangue , onde esso non entri nella  
trachea , quando sarà aperta la laringe . Questo  
si ottiene facilmente con una spugna , e si ado-  
pera l'acqua fredda per fermare l'emorragia , se  
essa non cessi spontaneamente da se medesima .  
Quando non esce più il sangue s'inciderà il liga-  
mento crico-tiroideo , e s'introdurrà nell'aper-  
tura una cannula , onde lasciare il passaggio all'  
aria . Fa di mestieri in questo caso la massima  
cautela per impedire , che una qualche porzione  
di sangue non entri nella laringe , e non produca  
della tosse , che renda molto difficile il continuare  
l'operazione . A quest'oggetto sarà utile il servir-  
si dello stromento di *Bauchot* . In qualunque mo-  
do peraltro siasi fissata la cannula nell'apertura  
della laringe si dovrà essa tenere in sito fissan-  
dola intorno al collo . La maggior parte degl'Au-  
tori consigliano di porre sulla cannula un pezzo  
di velo onde impedire , che entrino nella medesi-  
ma gl'insetti , o altri corpi esistenti nell'aria , i  
quali poi possano irritare la trachea . Alcuni al  
contrario credono inutile questa precauzione , an-  
zi dannosa , poichè il velo si ricuopre ben presto  
di un muco , il quale impedisce il passaggio dell'  
aria , ed a questo fine credono anzi , che sia cran-  
dio inutile la cannula . Per medicare la ferita



ERAZ. CHE SI PRATICANO SUL COLLO. 51

si riunirà essa con un pezzo di ceroto fide con delle compresse, e fascie, pariate nel mezzo, onde dar passaggio alla. Sarà ancora necessario fissare con una fap, acciò ne' varj movimenti del medesita della laringe, non si levi dalla dirella ferita esterna, da cui abbia da escire, ovvero s'insinui l'aria sotto i teguformi un enfisema. Resta quì ad avvertimolte volte la cannula, che si lascia nel può rimanere dopo qualche tempo piena il quale impedisce il passaggio dell'aria, to corra egualmente pericolo di restar

Varj sono stati i metodi proposti per a questo inconveniente; ma la difficoltà in questi casi è di pulire la cannula senza, giacchè tirandola fuori dal forame della, resterebbe impossibile l'introdurla di e potrebbe facilmente produrre un enfisemiglior metodo sembra quello raccomandamartine, e da *Picker*, cioè d'introdurre due una dentro l'altra, e lasciando sempre in l'esterna estrarre di tanto, in tanto l'interna ripulirla, la quale preferiscono di gomma elaed alquanto curva secondo il consiglio di

L'operazione accennata della laringotomia con in particolare quando si tratta di dar passaggio all'aria in occasione di angina, che rende impossibile la respirazione, ovvero nel caso, che si obba prestar soccorso ad un annegato in cui si vi depressa l'epiglottide, o che si debba esela legatura in un polipo dell'esofago. Se poi impedimento della respirazione dipenda dall'esistenza de' corpi estranei nell'esofago, da tumefazione della lingua, da tumori nelle vicinanze della



trachea, o da ingorgamento considerabile prodotto da una ferita del collo, potrassi in codesti casi preferire alla laringotomia, l' introduzione di una siringa elastica dalle narici nella trachea giusta il metodo accennato di *Desault*. Codesto stromento dev' essere più lungo, e più flessibile di quello, che ordinariamente servesi il Professore per introdurre nella vescica urinaria. Qualora però l' oggetto dell' operazione sia quello di tirar fuori un corpo estraneo caduto nella trachea sarebbe troppo piccola l' incisione anzidetta del ligamento crico-tiroideo, ed allora conviene praticare la tracheotomia, usata l' incisione degli anelli della trachea medesima.

Per fare la tracheotomia si farà porre il malato presso a poco nella medesima situazione da noi già accennata, e si forma il taglio de' comuni integumenti più lungo di quello, che praticasi nella laringotomia. Esso principierà circa un pollice sotto alla prominenza formata dalla cartilagine tiroidea, e si estenderà fino alla estremità superiore dello sterno. Con i comuni integumenti si taglieranno ancora alcune fibre del muscolo *platysma-mioideo*, e si divideranno con somma attenzione i muscoli *sterno joidei*, e *sterno tiroidei*. Devesi adoperare somma cautela per evitare l' offesa dell' arterie tiroidee, dall' offesa delle quali nasce una emorragia molto pericolosa, sia perchè il sangue può passare dentro nella trachea, sia perchè se ciò non accade l' emorragia esterna è difficilissima a rimediarsi, non potendosi legare i vasi atteso il loro gran numero, e non potendosi comprimere non essendovi punto d' appoggio, quindi è che d' alcuni pratici si consiglia di ricorrere in questi casi all' unico rimedio, cioè al ferro rovente. Ogni volta, che l' emorragia non sia molto considerabile

sufficiente un qualche liquore spiritoso, col quale si bagnerà una spugna, che si porterà sulla

Asciugato il sangue si passerà all'apertura della trachea. Per fare la medesima si scosteranno i lembi della ferita esterna, facendoli tenere allontanati col mezzo di due errine ottuse, ed indi scoprendo bene la trachea si pone il dito indice della mano sinistra nell'angolo inferiore della ferita, e con l'unghia fra due anelli cartilaginei si solleva il bistorino sul medesimo, e facendolo penetrare nella trachea s'incidono tre, o quattro anelli di questa dal basso, in alto.

Fatta l'operazione dovrassi subito procurare l'uscita del corpo estraneo passato accidentalmente nella trachea. Ordinariamente il solo sforzo della tosse, che esce dai polmoni, è bastante per cacciare fuori il detto corpo, e qualche volta il corpo è cacciato con impeto ad una certa distanza, e talvolta, se il corpo è molto grande, e se la ferita è stretta, viene esso spinto fra i lembi della ferita, e talvolta fra i lembi della medesima, ed allora sarà difficile l'estrarlo. Qualora per altro il corpo estraneo non si presenti immediatamente, sarà necessario tenerne discostati i lembi della ferita con due errine ottuse, ed estrarlo per mezzo di una pinza adattata.

Se l'anzidetto corpo esista nelli ventricoli della laringe dovrà parimenti estrarsi al più presto, e sebbene resti spesse fiate in detto luogo produce gravi accidenti, col restarvi per lungo tempo, potrebbe pure alla fine cagionare carie nelle cartilagini della laringe, e la tosse. Questa carie, o l'esistenza di un polipo nella laringe esige eziandio l'apertura della medesima, per penetrare in detta parte è necessario ta-

## ARTICOLO III.

*Della Esofagotomia.*

Di stranieri arrestati nell'esofago possono molte volte cagioni di gravi accidenti, loro volume, o per la loro figura. Il medico si trova quindi spesso obbligato a togliverli medesimi dal luogo, dove rimangono fissi, o si può fare come abbiamo esposto nel se-  
 volume pag. 171, o spingendoli nello stomaco, benchè siano corpi di rame, poichè l'esperienza di *Dronard* provano, che i medesimi non estraiendosi nelle prime vie allo stato di ossido ver-  
 straendoli dalla bocca sia cogli stromenti, pinzette curve di *Brambilla*, un pezzo di filo assicurato ad un filo incerato &c. sia per del vomito mercè un emetico, o clisteri di tabacco; o finalmente facendo un'incisione nell'esofago stesso, e tirandoli fuori dalla ferita, e questo ultimo mezzo è quello, che costituisce propriamente l'*Esofagotomia*. Operazione come abbiamo detto in altro luogo delle ferite, e pericolose, che abbiamo nella Chimica, motivo per cui uno de' migliori pratici re-  
 celebre *Lassus* non dubita d'avanzare, che non crede a motivo del pericolo in cui si espone il malato, che vi sia persona così temeraria, da ardire di fare questa operazione sull'uomo. Infatti non abbiamo esempi di operazione di questa specie praticata sul vivo. Siccome altro abbiamo presso gli Scrittori molti esempi di ferite dell'esofago guarite felicemente, conosciamo a questo proposito l'esperienza degli animali particolarmente dal celebre *Guat-*



tani con esito favorevole, così potendo essere in alcuni casi questa operazione l'unico mezzo di salvare la vita al paziente, noi passiamo a descrivere il manuale della medesima, non essendo impossibile alle volte intraprenderla con esito felice. In genere sappiamo ancora, che le ferite dell'esofago non sono assolutamente mortali, e che possono essere guarite sotto un esatto metodo di cura. I pratici più recenti credono, che si debba aprire l'esofago quando il corpo estraneo non può essere spinto nello stomaco, ne cacciato fuori per la bocca, la sua presenza eccita gravi sintomi, e quando esso resta fermo nella parte superiore dell'esofago. La circostanza per altro più favorevole sarà quando il corpo estraneo forma una prominenza all'esterno, sulla quale si può tagliare senza pericolo, poichè la prominenza stessa, che esso forma ha spinto lateralmente dai due lati i vasi, e nervi, dei quali potrebbe l'offesa essere pericolosa; molto più poi l'operazione sarà indicata, e più sicura se il corpo estraneo abbia prodotto una suppurazione, che formando un ascesso; coll'apertura di questo si dà esito al medesimo; ma ciò a parlar propriamente non può dirsi esofagotomia.

Se adunque i suindicati mezzi nulla giovino per dissipare i gravi sintomi prodotti dalla presenza del corpo estraneo, o coll'espellere il medesimo, o coll'ingerlo nello stomaco, e d'altronde il paziente sia in pericolo di vita, si dovrà prima introdurre una siringa elastica per la narice nella trachea, ed in tal modo acquistar tempo, impedendo la soffocazione, e somministrando de' calmanti per quindi nell'estremo caso passare all'operazione propriamente detta dell'Esophagotomia. Questa consiste nell'apertura dell'esofago quando ritrovasi nello stato naturale. Per praticare codesta operazione si prepa-

PERAZ. CHE SI PRATICANO SUL COLLO: 57  
necessario apparato di stromenti consistente  
storino retto, un coltellino di avorio, due  
opie ottuse, una tantola scannellata, una  
anatomica, liste di ceroto, fasce, fila,  
e cc.

parato tutto il bisognevole verrà situato il  
orizzontalmente, e se sarà possibile si farà  
ga ne' comuni tegumenti alla parte laterale  
della trachea, si farà indi un taglio de'  
si, il quale arrivi dalla parte superiore di  
allo sterno, e si procurerà in seguito di  
i muscoli *sterno-joides*, e *sterno-tiroideo* ta-  
la cellulare, che li riunisce, dopo di che  
terà il Cerusico di avere a poco a poco  
il dito, parte collo stromento ottuso, sco-  
esofago, tenendo sempre slontanati i labbri  
rita colle due errine: si deve osservare in  
manuale di non offendere il nervo ricorrente,  
ide, la giugulare interna, e l'arteria che va  
ide, Per impedire l'offesa del nervo ricor-  
che potrebbe portare l'indebolimento o alte-  
della voce, si tirerà lateralmente collo stes-  
no, che tiene dilatata la ferita. Se resti poi  
qualche ramo arterioso si legherà sul momen-  
a di passare innanzi all'operazione. Scoper-  
fago si solleverà leggermente colla anatomica  
, e si farà un piccolo taglio nel medesimo,  
si introdurrà la tenta scannellata per mezzo  
ale si condurrà la pinzetta adattata, affer-  
olla medesima il corpo estraneo, si tirerà  
ta l'operazione si deve mettere studio di  
esattamente la ferita, e questo si otterrà  
te di ceroto, e colla fasciatura unitiva, po-  
prima a contatto la ferita dell'esofago, e  
della delli tegumenti. Per ottenerne la pron-

ta riunione sarà necessario, che il paziente si astenga non solo ne' primi giorni da qualunque cibo solido, ma se sarà possibile ancora dai fluidi contentandosi di semplici clisteri nutrienti. La dieta adunque dovrà essere rigorosissima, e non si concederà il vitto che a gradi principiando con qualche cosa fluida, e passando in seguito alle più solide, e nutrienti, onde prevenire l'infiammazione della parte già irritata, la quale se accade si curerà col sistema antiflogistico.

## C A P O I I I.

DELLE OPERAZIONI, CHE SI ESEGUISCONO  
SUL PETTO.

## A R T I C O L O I.

*Dell' Estirpazione del Cancro delle Mammelle.*

**I**l Cancro delle mammelle è una malattia, la quale come abbiamo veduto, trattando delle malattie particolari, può riconoscere per sua cagione un vizio generale della macchina, cui può essersi egualmente formato per l'avanzamento della malattia medesima; e quindi contro la diatesi cancerosa nulla giova l'operazione, e si rende essa inutile, anzi per lo più dannosa, essendo necessario il contentarsi dei semplici rimedj palliativi; ma eccettuato codesto caso, nella sola operazione è riposta la speranza di guarire la paziente. Dovrà dunque il Chirurgo in primo luogo esaminare attentamente se il caso, che ad esso si presenta, richieda o no la operazione. Secondo i migliori pratici il più sicuro tempo per fare la medesima si è nel principio della malattia, affinchè si possa esser certi, che l'infezione non sia divenuta generale. Poco inco-



PERAZ, CHE SI PRATICANO SUL PETTO. 59  
che il tumore scirroso sia ulcerato o no ,  
necessario che esso sia mobile , che le glan-  
dole dell'ascella corrispondente siano libere , che  
il malato non abbia difficoltà di respirare , la  
operazione prodotta per lo più da dolore nelle  
coste , e da assorbenti situate tra le coste e lo ster-  
no , e da altri dolori vaghi pel corpo . Fuori di  
queste condizioni l'operazione sarà un semplice ri-  
lievo palliativo , mentre sotto le circostanze ac-  
cennate si potrà attendere un buon esito dalla me-  
dica , benchè la malattia non sia tanto recen-  
te , e il cancro adunque di grande estensione , in-  
ferente , ed accompagnato da indurimento  
delle glandole dell'ascella del medesimo lato ,  
dove si può operare con buon successo ,  
celebre *Soemmering* ci assicura di aver ope-  
rati i cancri delle mammelle lasciando intatte le  
glandole ascellari ingrossate del medesimo lato , le  
quali sono terminate felicemente . Abbiamo ancora  
molte storie di cancri molto estesi , ed esulcerati  
curati con felice successo , quindi ne anche que-  
sto sembra , che possa impedire al Cerusico  
di fare l'operazione se essa venga indicata da  
ragioni , che è quanto dire non esservi segni  
di malignità generale ; e lo stesso si dice dei can-  
cristi , sebbene gli antichi siano di contrario  
avviso . Resterà poi l'operazione controindica-  
ta se esistano sintomi di diatesi cancerosa ,  
allora la malattia ripullula facilmente , e con  
forza di prima . Molto a questo proposito  
dovrà riflettere il Professore alla natura ma-  
ligna o benigna del cancro , giacchè nel primo ca-  
so si può sperare riguardo all'esito felice  
dell'operazione ; quindi sarà necessario , che es-  
sagli attentamente se la malattia sia ereditaria ,  
o se di natura della medesima , le cause , poi-

chè essendo interne universali non ammettono l'operazione senza grande azzardo pel successo giusta il sentimento dei celebri *Frank*, e *Scarpa*; le malattie precedenti della stessa natura, il luogo del cancro la qualità dell'ulcera ec. Se il cancro sia aderente, e vi si possa presumere attaccato dallo stesso vizio il muscolo pettorale, ed anche le coste, sarà difficile estirpare tutta la parte affetta, e perciò difficilmente riuscirà l'operazione, molto meno sarà essa da eseguirsi se sarà attaccata ancora la Pleura. Questi difetti si possono conoscere esaminando l'aderenza del tumore, giacchè secondo il grado della medesima, e la maggiore o minore difficoltà, che accompagna la respirazione, sono essi da presumersi. Finalmente se la malattia si dimostri in altre parti, e segnatamente nelle glandole ascellari del lato opposto, o nella mammella opposta si renderà pressochè inutile l'operazione, essendo questi, per lo più, segni d'indole cancerosa nella macchina. Questa Diatesi sarà pienamente confermata prendendo il Professore attenzione particolare allo stato dell'Utero, posciachè se in esso senta la paziente dei dolori, se soffre un ostinato flusso bianco, delle emorragie ec. sarà segno che questa parte ancora è affetta, e che la malattia non è sicuramente soltanto locale. Qualora peraltro le circostanze tutte, o almeno la maggior parte di esse concorrano ad indicare l'operazione, dovrà il Chirurgo riflettere, che il principale oggetto della medesima si è quello di estirpare tutto ciò si trova di affetto, altrimenti essa riesce inutile. In primo luogo deve egli preparare la paziente coi rimedj interni, e dieta adattata, e passare indi all'operazione, al quale oggetto preparerà la suppellettile necessaria degli stromenti. Questo consiste in un bistorino convesso nel tagliente, una spatola,

na, delle pinzette anatomiche, refe incernate, liste di ceroto, fila, compresse, e circolari. La paziente verrà situata a sedere a sedia più tosto alta, terrà la testa appoggiata al petto di un ministro, e da un secondo ministro tenere disteso il braccio corrispondente; sarà situata in un piccolo letto col tronco elevato sopra un piano inclinato. Ciò posto si avvertirà gli altri assistenti, che tengono la paziente, se occorre, nella posizione accennata, che somministrino i necessarij stromenti, e che servino di ajuto al Professore, dal quale incontro l'inferma si farà una piega nei tegumenti, di cui ne terrà egli un'estremità, l'altra sarà tenuta da un ministro. Allora col bisturi indicato farà un taglio nel mezzo della piega: questo taglio sarà proporzionato alla grossezza della glandola da estirparsi tanto nella lunghezza, che dev'essere bastante a dare esito alla fistola, quanto nella direzione, che deve essere perpendicolare alla lunghezza della medesima; non potendosi seguire un' esatta regola se questa debba eseguirsi perpendicolare, o orizzontale. Si potrà anche fare il taglio sulla glandola stessa senza che sia bisogno di tendere i tegumenti per mezzo di un ministro fatta nei medesimi. Il taglio sarà rettilineo, e i tegumenti siano sani, ma se essi siano aderenti alla glandola sottoposta, sarà necessario fare due tagli semielittici lasciando separazione viziata dei tegumenti, e procurare di lasciarne la maggior quantità che sia possibile. Il celebre *Sabatier* parlando del taglio del collo, oltre le regole di sopra accennate avverte di procuri portare il tagliente del bisturi in direzione perpendicolare, giacchè portandosi in direzione obliqua si verrebbe a formare una



piaga maggiore, ed in sequela più dolorosa. Consigliava ancora saviamente il medesimo Autore, che la ferita nel caso, che si debba portar via porzione di tegumenti abbia una figura oblonga, onde renderne più sollecita la cicatrice, e perciò ottenere, dice *Richerand*, è necessario dare alla ferita una direzione orizzontale, e finalmente avverte il suddato Autore di terminare il taglio interamente prima di passare ad estirpare la glandola, poichè in caso contrario sarebbe d'uopo di ritornare a dilatare il taglio, cosa, che renderebbe più lunga, ed incomoda l'operazione. E' a questo oggetto precisamente necessario, che il bistorino recida tutta la grossezza degli'integumenti, diversamente nello staccarli si trova, che in molti luoghi il taglio non è arrivato fino alla cellulare, e quindi fa di mestieri ritornare collo stromento, onde farne totalmente la recisione. Lo stesso si dica, se si faranno due tagli semilunari nel qual caso si procurerà, che dove si incontrano i medesimi vengono un poco ad incrociarsi, altrimenti si corre di leggieri pericolo, che nel luogo dove essi si riuniscono resti qualche porzione di comuni tegumenti non recisa.

Compito il taglio della pelle con tutte le cautele accennate si verrà all'estirpazione della glandola. A questo fine si deve prendere la medesima con una errina, e si solleva per poterla distaccare col ferro, o con una spatola, da tutte le aderenze colle parti vicine. Alcuni preferiscono di sollevare la glandola colle dita della mano sinistra, ed infatti questo mezzo si rende più comodo dell'errina, molto più, che espone meno le arterie al pericolo di esser recise dal ferro tagliente. La separazione della glandola se non sia aderente è assai facile essendo essa unita per mezzo del semplice tessuto cellulare, che si separa facilmente colle

Se. Sarà bene di principiare a separare la  
dalla parte inferiore, e poi dalla superio-  
procurerà, che il muscolo pettorale con-  
esser teso, e se essa sia aderente al me-  
i reciderà ancora la porzione del muscolo,  
attaccato, quante volte non riesca di se-  
lo che non si rende molto difficile, se  
i semplice aderenza.

Patata la glandola dovrà osservare con mol-  
one il Professore se esistono delle altre  
indurite, o una qualche porzione di cel-  
arcita, poichè se rimangono queste parti  
esse nuovi germi della malattia' la qua-  
n conseguenza facilmente recidiva. Non dovrà  
Professore affrettarsi di troppo, chiude-  
ita, e terminare l'operazione; ma dovrà  
e attentamente tutte le parti, e portar via  
esso metodo tutto quello, che egli scopris-  
fetto, o che almeno sembrasse di esserlo,  
ti si corre pericolo di renderla inutile, di-  
o da quest'attenzione tutto il buon esito  
medesima. Riescirà più facile asportare i re-  
ell' affezione col mezzo delle pinzette, es-  
ordinariamente tali porzioni di cellulare, piut-  
ccole. Se poi le glandole infarcite, e scir-  
n restino nel luogo medesimo, dove è sta-  
pata la glandola principale; ma un poco la-  
nte, per esempio, siano esse le glandole  
ella, consigliasi da alcuni di prolungare il  
de' tegumenti fino alle medesime, e dopo  
estirparle collo stesso metodo. *Sabatier*,  
o temendo in questo caso il pericolo dell'  
ia, che potrebbe aver luogo estirpando tali  
per l' offesa de' grossi vasi arteriosi, che  
vicini alle medesime preferisce d' isolarle

la prima inferiore, e la seconda distacca tutto il tumore canceroso toposte recidendo non solo il tessuto ancora porzione del muscolo sotto in questa circostanza sovente nece richiede talvolta di raschiare le denti, che principiano a cariarsi caso è molto incerto il buon suc zione.

Il sintoma più grave, ed accompagna questa operazione si che il Cerasico deve impedire pe sibile. A quest' oggetto è indis gare tutte le arterie, che posso gue, e questo dee farsi appena more, poscia che se si medichi sciandone qualcuna si corre peric una emorragia, che obbliga a togli ra con molto incomodo, e dolore E' stato da qualcuno proposto il compressione; ma il primo produ tazione troppo violenta, e la seco



si sarà ben fatto di fare comprimere l'arteria sotto la clavicola, e così facendo questa compressione si potrà vedere facilmente sono i vasi, che debbono essere legati, si farà per mezzo delle pinzette, e filo in-  
Se l'emorragia non sia molto forte, come ni casi può accadere, allorchè il tumore sia piccolo, e mobile, si crede sufficiente la piaga con acqua fredda, in cui sia stato un poco di allume; ma dall'anzidetta nella legatura di ogni benchè piccolo raso-  
oso ripetono la maggior parte dei Professori pronto, e felice esito della cura. Non man-  
erò di quelli fra i quali *Teason*, che esclude questa operazione ogni sorta di allacciamento non necessaria; ma secondo *Bell*, ed i crediti, questa opinione non è la più se-  
che noi non adottiamo. E' certo del resto, perdita di sangue nel tempo dell'operazione non sarà dannosa, che anzi può riescire di vantaggio per la cura.

Arrestato il sangue è di mestieri medicare la che molte volte presenta una gran superficie deve essere medicata come le ferite, che non suppurare, e delle quali abbiamo già parlato suo luogo, fuoriche in qualche raro caso, la porzione di glandola estirpata fosse poco de-  
derabile, e non si fosse portata via porzione di gumenti. Si metteranno sulla piaga delle fila antità sufficiente, e sopra le medesime delle presse, che si terranno in sito per mezzo di fascia circolare leggermente stretta, senza in-  
odare peraltro la respirazione. Alcuni credono necessaria la sutura cruenta quando la piaga sia co-  
cola, ma allora basteranno delle liste di ceroto sivo.

Fatta l'operazione, e medicata la paziente, si porrà in letto, e sarà bene darle subito un calmante. Nei primi giorni si terrà ad una dieta rigorosa, e si lascerà la fasciatura nello stesso luogo, contentandosi di visitarla di tanto in tanto per vedere se mai venisse del sangue, il quale se fosse abbondante sarebbe necessario di togliere l'apparecchio, e legare, o cauterizzare il vaso, da cui nasce l'emorragia. Si lascerà l'apparecchio per tre, o quattro giorni, e dopo si sostituirà alla fascia circolare quella a sei capi, che resta molto più comoda. A questo tempo essendosi stabilita la suppurazione si medicherà la ferita secondo la regola in genere già data, e se ne procurerà la cicatrizzazione.

Varie osservazioni sono da farsi per la cura di questa piaga dopo l'operazione. Deve il Professore stare bene attento ai sintomi, che possono sopraggiungere nel tempo della suppurazione, ed in particolare all'affezione delle prime vie, che non è molto rara, allora dovrà egli porre in opera gli adattati minorativi, e sarà molto utile l'uso del tartaro emetico. Non di raro la febbre si sviluppa dopo cotesta operazione, e prende marcatamente il carattere di remittente, o di una intermittente perniciosa, ed in questi casi va somministrata la China, come suol darsi nelle febbri di tal carattere; adattando peraltro la dose della medesima alla sensibilità dell'inferma, perlocchè conviene unirvi di frequente l'uso degli antispasmodici, e calmanti. Tutto ciò dobbiamo all'esperienze fatte dal celebre *Dumas* nelle occasioni di grandi ferite, o di grandi operazioni. Quello a cui deve il Professore porre eziandio una particolare attenzione si è lo stato della piaga stessa. Non di raro accade,



si osservino nella medesima delle piccole escrescenze fungose, o tubercoli, i quali hanno tutti i caratteri del cancro, e minacciano la recidiva della malattia. L'unico mezzo sicuro in questi casi, è l'estirpazione sollecita, fatta col mezzo del bisturi. Altri propongono il ferro rovente, di cui possono essersi serviti con successo.

L'arsenico ancora è stato raccomandato come specifico, e difatti *Richter* assicura d'aver riportato gran vantaggio nei cancri esulcerati della mammella, unendovi un cataplasma di carote e acqua saturnina per facilitare la separazione dell'escara; ma questo terribile veleno dev'essere usato cautamente adoperato anche all'esterno.

Condotta a termine la suppurazione senz'apparenza di nuovo cancro, oppure distrutta mercé i mezzi suindicati si ottiene la cicatrice, dalla quale può ancora qualche volta il *Cerusico* probabilmente dare il suo giudizio sul pericolo della recidiva. Desso peraltro deve in ogni modo preferir la medesima col mettere l'inferma in una diligente cura, tanto nella dieta, quanto nei medicamenti. La dieta sarà esatta, l'uso del latte, e dei leggieri minorativi, segnatamente degli antispasmodici, saranno indicati. Si procurerà, che la malata non si esponga ad alcuna cagione irritante della macchina; e finalmente porrà attenzione di non agitare molto col braccio del lato affetto, e di non strofinare sulla cicatrice recente, o irritare la medesima, mentre essa potrebbe facilmente riaprirsi. Molti recenti Scrittori di Chirurgia consigliano dopo terminata la cura di aprire un piccolo al braccio del lato dell'operazione, ovvero in alcuni casi particolari, da noi già esposti nel secondo volume trattando di codesta malattia, di incidere il braccio prima dell'operazione medesima, cui egual-



mente si conserverà per tutta la vita, e che produce la derivazione dell'umore acre, la quale potrà essere ancora di sommo vantaggio per impedire la recidiva.

Ad onta per altro di tutte codeste cautele, non di raro accade, che talvolta qualche tempo dopo fatta l'operazione, e cicatrizzata la ferita, si formano delli tumoretti scirrosi, i quali sono glandole, che acquistano tal carattere. Esse vengono a poco, a poco ad accrescersi, a divenire dolenti, ed acquistare in una parola tutti i caratteri del cancro, motivo per cui non si può più dubitare della recidiva della malattia. In questo caso da alcuni si consiglia di passare di nuovo all'operazione; ma l'esito infelice, che accompagna sovente queste operazioni replicate ha determinato i Pratici più recenti ad abbandonare il pensiero della cura radicale, e contentarsi della palliativa. Per adempiere a quest'oggetto si fa conto di molti dell'opio; ma esso riesce in molti casi dannoso, anzi che utile, poichè esso aumenta il letore dei fluidi, e per conseguenza accresce la cagione della malattia, e d'altronde non evvi bisogno di sedare i dolori, i quali in questo caso poco, o nulla si fanno sentire. Il miglior metodo adunque quando siasi formata nuovamente un'ulcere carcinomatosa, è il servirsi di un digestivo composto di China, ovvero della pece, la quale mitiga i dolori, e la puzza, adoperando soltanto l'opio a dosi generose, quando lo richieda la necessità.

## ARTICOLO II.

*Dell' Operazione dell' Empiema.*

In molti casi di stravaso di un umore qualunque nella cavità del Petto, si rende indispensabile l'apertura di esso, onde dar esito al fluido ivi contenuto. Questa operazione è quella, che in Chirurgia dicesi operazione dell' *Empiema*.

Gli antichi si sono serviti del nome di Empiema per denotare uno stravaso di marcia nella cavità del Torace, e da questa denominazione è nato il nome dell'operazione stessa, per mezzo di cui si evacua almenamente il pus, che gli altri fluidi stravasati si aggiungono. Non è nostro assunto l'indicare quali sieno i segni, che dimostrano lo stravaso di un umore qualunque nella cavità del Petto, come hanno nell' Idrotorace, nell' Idrope del pericardio, o nello stravaso di marcia &c. Parlando nel primo caso delle ferite del petto, abbiamo già accennato quali sieno gl'indizj dello stravaso di sangue, e quali, quelli della suppurazione. Si è però qui d'avvertire, che codesta operazione quasi dee si istituire nello stravaso di sangue prodotto da ferita del petto, in cui la situazione dell'arma è per lo più sufficiente, ma in quello che è formato, o da una frattura all'interno del costato, che abbia lacerato il polmone, ovvero quello, che succede dopo una forte commozione del medesimo. alcune volte il fluido viene a farsi manifesto all'esterno formando un tumore, allora si deve aprire in quel luogo stesso, onde dar esito al fluido, sebbene non manchino delle osservazioni di empiema accompagnato da tumore esterno, senza che questo avesse alcuna com-

municazione con la cavità stessa. Egli è alle volte molto difficile il conoscere l'esistenza del fluido nella cavità; ma in questi avvenimenti alcuni pratici consigliano di azzardare l'operazione, essendo meglio, che essa riesca inutile, di quello, che lasciare l'infermo senza ajuto alcuno. E' necessario peraltro riflettere ancora allo stato del malato, ed in specie alle forze del medesimo, come eziandio non deve il Cerusico tralasciare nello stesso tempo quei rimedj interni, che possono assicurare il buon esito dell'operazione, anzi a questo proposito dice *Macleux*, che possasi talvolta risparmiare l'operazione nell'Idrotorace coll'amministrazione della digitale, diuretici salini, e piccola dose di calomelano. Oltre lo stravasamento di fluido nella cavità del petto, può competere codesta operazione negli ascessi della pleura, nelle raccolte di fluido nella cavità del mediastino &c. Anzi si consiglia da altri di aprire il petto, anche nel caso di ascessi dei polmoni.

Riconosciuta la necessità dell'operazione è di mestieri di disporre la suppellettile degli stromenti, e per la medicatura. Essa non consiste, che in un bistorino un poco convesso nel tagliente, un troicart secondo alcuni, poichè molti sono di sentimento, che esso sia pericoloso, potendo offendere il polmone, eccetto il caso d'idrope del pericardio, un pezzetto di tela sfilata da una parte ec. Se trattasi di Idrotorace, una cannula piatta, fascia a corpo, fila, compresse ec. Preparato tutto il bisognevole si deve scegliere il luogo dell'operazione. I Pratici distinguono comunemente due luoghi per dar esito al fluido contenuto nel petto. Il primo dicesi luogo di necessità, il secondo di elezione. Il luogo di necessità è quello, che si deve scegliere quando l'umore contenuto



nella cavità forma una specie di prominenza, ed allora deesi aprire in detto sito a preferenza di qualunque altro. Se poi ciò non accade, ne si scuopre all'esterno alcun indizio del luogo ove esiste il fluido, si aprirà il Torace fra la settima ed ottava costola; se sia dal lato destro, e fra l'ottava e la nona se sia dal lato sinistro per non offendere il fegato, o la milza, non restando il diaframma egualmente elevato in ambedue i lati. Si deve prendere lo spazio medio delle coste, dove esse sono più curve in basso, e si procura di andare dal lembo superiore della costa inferiore per non offendere l'arteria intercostale, che percorre lungo il lembo inferiore della superiore. Alcuni propongono per maggior sicurezza di servirsi di un filo, col quale misurano la distanza della cartillagine *Xifoide* fino alla spina, e dividendo poi il filo in tre parti uguali, fanno l'incisione alla distanza di una di queste parti dalla cartillagine anzidetta. Vi ha ancora chi propone di far mettere il braccio aderente al petto, e far l'incisione quattro dita sotto l'angolo della scapola. Questo metodo può essere utile ne' casi di Edema, di enfisema, o nella rara circostanza, che il malato sia pingue, lo che impedisce di contare le coste. Qualora finalmente si presenti il rarissimo caso di dovere eseguire l'operazione dell'Empiema per idrope del pericardio, il luogo dell'apertura, la quale si estenderà ad un pollice, sarà fra la quarta, e quinta costola del lato sinistro, e quindi si passa alla punzione col troicart dell'accennata membrana.

Destinato poi il sito dell'operazione si farà porre il malato seduto sopra una sedia, o sulla ponda del letto colle gambe fuori del medesimo, coi piedi appoggiati. Si farà sostenere in questa

situazione dai ministri; si farà altresì piegare dal lato opposto a quello, che deve operarsi, e ciò per rendere questo lato più elevato, e nello stesso tempo acciò le coste restino maggiormente distanti fra loro, ed il braccio resterà avvicinato al tronco. In questa situazione farà il Professore il taglio de' tegumenti. Per fare il medesimo si prenderà il bistorino colla mano destra, se debba operarsi il destro lato del petto, e con la sinistra se sia il sinistro, si farà una piegatura nella pelle, e s' incide la medesima secondo la lunghezza delle coste, per lo spazio di circa due pollici. Incisa la cute si taglia la cellulare, ed i muscoli intercostali, avvertendo di tenersi sempre vicino la costa inferiore, onde evitare, come abbiamo detto l' offesa dell' arteria intercostale. L' incisione de' muscoli si farà a strato a strato colla punta del bistorino, ed averà almeno un pollice di estensione. Aperti i comuni tegumenti, ed i muscoli, deve incidersi la pleura; ma in caso di Idrotorace prima di fendere la medesima, potrà sentirsi coll' apice di un dito, facendo respirare il malato, la sottostante fluttuazione, che se questa non iscopresi, consiglia in allora *Richter* servirsi per lungo tempo della ferita fatta come il mezzo di un' attiva derivazione, piuttosto che incidere la suddetta membrana. In caso opposto con la guida del dito portato nell' incisione s' introduce il bistorino, e dopo forata la pleura, si pone il dito dietro la punta del bistorino stesso, dilatando così l' incisione fatta. Questa precauzione di ricoprire coll' indice la punta del bistorino, è necessaria per non offendere il polmone, lo che può accadere se il fluido contenuto esca prima di poter ritirare lo strumento, come ancora se non esista stravasamento nella cavità, almeno nel luogo, ove si è fatta l' incisione. Al-



si adoperano un bistorino bottonato per dilatare l'incisione, la quale sarà più o meno lunga secondo la grandezza dell'individuo, e secondo la qualità dell'umore contenuto. Sarà esso ordinariamente sufficiente, se avrà la lunghezza di un pollice circa, meno il caso d'idrotorace, in cui potrà farsi di minore estensione.

Aperta la cavità del torace devesi dar esito alla marcia, o altro fluido contenuto nel medesimo. Se la quantità del fluido sia molto non gli si deve dar esito tutto in una volta, giacchè potrebbe produrre al paziente qualche deliquio, e questo molto più ha luogo se lo stravasato sia di sangue, e purchè sieno passate 48 ore dalla lesione del vaso, poichè mancando la pressione di esso sul medesimo, che produce l'emorragia, si potrebbe questa rinnovare, e cagionare anche la morte del malato. Per facilitare l'esito del pus si rende molte volte necessaria l'introduzione di una cannula, che deve peraltro avere un orlo rilevato, acciò non entri nella cavità del petto. Nell'idrotorace quando si possa tentare l'operazione altri costumano di dar esito all'acqua in varie volte, facendo escire ogni giorno una data quantità.

Può alle volte accadere, che il polmone sia staccato alla pleura, e dopo aperta la medesima non abbia luogo l'esito del pus. Varj sono li sentimenti degl'Autori sul partito da prendersi in questi casi. Alcuni consigliano d'introdurre il dito, e separare questa aderenza, ma la maggior parte rigettano tal metodo come inutile, e pericoloso, temendosi rischio di causare delle lacerazioni. Quando si creda necessario d'introdurre il dito nella ferita, questo potrà farsi soltanto per riconoscere l'aderenza; ma non mai per separarla. Il miglior modo in questo caso sarà quello di lasciare



in riposo il paziente facendolo giacere dal lato operato, poichè abbiamo delle osservazioni di valenti pratici, dalle quali risulta, che in questa situazione se l'aderenza è piccola, il peso stesso del fluido arriva a separarla, e viene esso ad escire dalla ferita qualche tempo dopo l'operazione. *Lassar* si è in questi casi servito di un metodo, che egli ha ritrovato molto vantaggioso, e si è quello di dilatare il taglio de' muscoli, e della pleura, finchè si arrivi a trovare la raccolta del fluido. Egli narra d'averla prolungata in un caso fino a tre pollici circa di lunghezza.

Dato esito al pus, o altro fluido qualunque contenuto nella cavità colle necessarie cautele si deve medicare la ferita. In primo luogo si farà porre il malato nella situazione anzidetta: onde procurare il continuo esito del fluido, e facendo sì, che tutti i muscoli siano in istato di rilasciamento, la quiete sarà sommamente necessaria, e la dieta dovrà regolarsi secondo l'indole della malattia, lo stato, e forze del paziente. In caso d'idrorace, escita che sia porzione del fluido, e tolta la cannula dalla ferita, vi si metterà un globetto di fila ricoperto da un pezzo di tela finissima, con cui si trattiene nella cavità il fluido ivi rimasto, che in seguito gli si dà esito, togliendo l'apparecchio: in un altro avvenimento poi s'introdurrà nella ferita un piccolo pezzetto di tela sfilata, che deve soltanto servire ad impedire l'accesso dell'aria esterna, senza per altro impedire quello del pus, o altro fluido, che deve filtrare per la medesima, altrimenti potrebbe esso degenerare, e produrre de' disordini all'interno. Questo pezzetto di tela si sosterrà con delle fila, e compresse, mantenendo il tutto in sito con una fascia a corpo.

Quando si vede cessato l'esito del fluido si

la striscia di tela sfilata, e si sostituisce al-  
 medesima un pezzo di tela sottile, che si ap-  
 sulla ferita, su di essa le fila, le compresse,  
 fascia. E' necessario di non applicare le fila  
 mediatamente sulla ferita, poichè è molto faci-  
 che esse vengano spinte dall'aria nella cavità,  
 producano ivi della tosse, ed altri sintomi parti-  
 ri. Quando poi l'esito del pus sarà affatto ces-  
 si riunirà la ferita con del ceroto unitivo,  
 formechè si creda necessario, e se ne procure-  
 la cicatrice. Accade per altro altre volte che  
 sta cicatrice non possa ottenersi in conto alcu-  
 ; ma l'apertura divenga fistolosa. Questo ha  
 go segnatamente nelle persone molto aduste, e  
 ando l'ulcere, che da origine al pus resta lontana  
 la ferita, o assai profonda, come ancora se l'ul-  
 e resti più bassa della ferita stessa. Il Cerusico  
 accorge facilmente, che la ferita va a divenire fi-  
 losa, ma in molti casi queste fistole non richie-  
 no alcun ajuto dall'arte, chiudendosi facilmente  
 loro medesime, ne si osserva generalmente, che  
 ingresso dell'aria in esse, porti danno notabile al-  
 parti sottoposte. Se per altro la fistola venga  
 dotta dalla situazione dell'ulcere, che resti più  
 sa della ferita esterna, sarà prudente il fare una  
 tro apertura sotto la fistola, che non manca di  
 odurre l'esito del pus, e l'astensione, e cica-  
 zazione della ferita. Quando del resto la fistola  
 penda dalla carie delle coste, non è possibile  
 enerne la cicatrice, richiedendosi una operazio-  
 troppo pericolosa, che sarebbe quella d'incide-  
 i tegumenti, ed i muscoli assai profondamente,  
 to più se la carie resta vicino alla spina. In  
 questi avvenimenti nasce ordinariamente un asces-  
 , la di cui apertura resta fistolosa, ed incurabi-  
 . Egli è vero però, che gl'infermi possono



benissimo vivere molti anni con queste fistole senza risentire incomodi notabili, e quindi è meglio lasciare i medesimi con questa malattia, che sottoporli ad una cura più incomoda, e più pericolosa della malattia stessa.

### ARTICOLO III.

#### *Della Trapanazione dello sterno.*

**Q**uando lo sterno sia fratturato con depressione di una porzione del medesimo si richiede per elevarla la stessa operazione, che si pratica in occasione della depressione dell' ossa del Cranio, vale a dire la *trapanazione*. Questo per altro non è il solo caso, in cui essa abbia luogo, imperciocchè si richiede ancora in occasione di stravaso interno di sangue, cagionato da un colpo violento, che ha agito sullo sterno, o di un stravaso di pus prodotto da un ascesso, in caso di suppurazione interna, ovvero da una raccolta di marcia nella parte inferiore del collo, che siasi fatta strada sotto di codest' osso, o finalmente in caso di carie del medesimo, la quale, in un osso spongioso come lo sterno, fa de' progressi assai rapidi. Gli ascessi al mediastino sono quelli, nei quali ha maggiormente luogo codesta operazione.

Essa non è forse delle più difficili, e pericolose, ma dev' essere eseguita non troppo tardi. L'apparecchio per la medesima consiste nel trapano, fornito della sua corona ec. e sarà forse più comodo un trapano a mano, non essendo lo sterno un osso molto duro. Si preparerà ancora un bisturi convesso, e tutto ciò che si rende necessario per la trapanazione, come abbiamo già in altro luogo indicato. Secondo poi i diversi casi, ne' quali si pra-



tica l'operazione si richiederanno eziandio gli stromenti adattati come p. e. la leva per elevare i pezzi d'osso, se si trapani lo sterno per depressione dei medesimi.

Giusta i casi parimenti si dovrà scegliere il luogo da trapanare, se sia in occasione di frattura dovrà il Professore regolarsi dal luogo dell'ossa depresse, e dalla porzione dello sterno rimasta sana, sulla quale si deve porre la corona del trapano. Qualora poi si debba evacuare del sangue, o del pus contenuto nella cavità del mediastino si dovrà applicare lo stromento nella parte di mezzo dello sterno, acciò non resti offesa l'arteria mammaria. Prescelto dunque il luogo dove devesi eseguire la trapanazione si farà situare il paziente orizzontalmente, e si farà una incisione sui tegumenti che ricuoprono lo sterno, onde scoprire il medesimo. L'incisione preferiscono alcuni di farla con due tagli semielittici, che riunendosi insieme formano un'apertura ovale, portando via la pelle esistente nel mezzo dei due tagli. Scoperto l'osso, e raschiato il periostio si applica la corona del trapano non essendo necessario quasi mai di lasciare fuori della medesima la punta dell'albero, poichè attesa la sostanza spongiosa dell'osso la corona si forma da se medesima facilmente una traccia, e non esce mai da questa. Si deve soltanto usare l'attenzione, come nella trapanazione dell'ossa del Cranio di premere leggermente sul trapano, quando si è vicino a perforare la lamina interna dell'osso, per non produrre una violenta pressione sulle parti sottoposte. Perforato l'osso interamente, e portato via il pezzo del medesimo si procurerà cogli adattati stromenti di elevare i pezzi depressi, o di dar esito al fluido contenuto secondo l'indicazione diversa, a quale oggetto si è praticata l'ope-

razione. I più recenti Scrittori di Chirurgia avvertono in quest' ultimo caso di esser bene attenti dopo separato l' osso ad aprire il periostio interno, che suol' esserè assai compatto, ed impedisce l' esito del fluido contenuto, e stravasato.

Ottenuto l' intento, per cui si è istituita l' operazione si dovrà passare alla medicatura del malato, ed alla cura della ferita. Le regole, che noi abbiamo dato pel metodo da tenersi nella trapanazione del Cranio, vagliono presso a poco nel caso presente avuto riguardo alla diversità del luogo, ed alle cagioni della malattia. La medicatura si farà colla sindone, fila, compresse, e fascia a corpo, e si continuerà poi a medicare la piaga secondo l' indole della suppurazione e del fluido che n' esce. Si possono a questo proposito raccomandare nel termine della cura degl' ascessi del mediastino, le iniezioni leggermente detersive, preparate con del vino mielato, o con forte infusione di sambuco.

Se mai attesa la carie dell' osso, o la grandezza dello stravaso si richiedessero più fori nello sterno, si ripeterà l' operazione colle stesse regole, e cautele, e si procederà nella medicatura col medesimo sistema. Alla cura locale dipendente dalla natura della piaga, e delle malattie interne, che ha richiesta la trapanazione, si unirà ancora la cura interna diretta secondo i medesimi principj.

DELLE OPERAZIONI , CHE SI PRATICANO  
SULL' ADDOME .

ARTICOLO I.

*Delle Suture .*

Le ferite penetranti nella cavità dell' addome sono sovente accompagnate da offesa delle intestina . Queste intestina ferite possono restare nella cavità medesima , ovvero possonsi trovare fuori essa . Abbiamo già detto in altro luogo parlando delle ferite del basso ventre della cura , che conviene in codesti casi ; ora dobbiamo soltanto descrivere le misure da prendersi nel secondo caso , quali si raggirano su i diversi metodi prescritti dagli Autori per riunire gl' intestini feriti , che ri-ovansi fuori della cavità addominale , conosciuti sotto il nome di *Sutura* .

Conviene per altro distinguere in tale circostanza le varie specie di ferite , se cioè l' intestino è offeso secondo la sua circonferenza , ovvero se l' intestino sia reciso totalmente trovandosi descritto per questo ultimo successo un metodo ben differente . Per altro crediamo qui ripetere , che la sutura dell' intestina è una operazione assai pericolosa per le conseguenze che produce , motivo per il quale si deve rigettare ancora nella totale recisione dell' intestino , sostituendo piuttosto ad essa il metodo , che in appresso esporremo , il quale può terminare coll' ano artificiale ; ma che viene ordinariamente seguito da miglior esito .

In quest' ultima specie di ferite dell' intestina d' annoverarsi il caso della totale recisione di una



zione del Cranio , vag  
presente avuto riguar  
alle cagioni della mal  
colla sindone , fila ,  
e si continuerà poi a  
dole della suppurazio  
Si possono a questo p  
mine della cura degl  
jezioni leggermente  
vino mielato , o con

Se mai attesa la  
za dello stravaso si  
sterno , si ripeterà l  
e cautele , e si proced  
mo sistema . Alla cur  
della piaga , e delle  
chiesta la trapanazio  
terna diretta secondo

DELLE OPERAZIONI , CHE SI PRATICANO  
SULL' ADDOME .

A R T I C O L O I .

*Delle Suture .*

Le ferite penetranti nella cavità dell' addome sono sovente accompagnate da offesa delle intestine . Queste intestina ferite possono restare nella cavità medesima , ovvero possonsi trovare fuori della stessa . Abbiamo già detto in altro luogo parlando delle ferite del basso ventre della cura , che viene in codesti casi ; ora dobbiamo soltanto determinare le misure da prendersi nel secondo caso , quali si raggirano su i diversi metodi prescritti dagli Autori per riunire gl' intestini feriti , che ricadansi fuori della cavità addominale , conosciuti col nome di *Sutura* .

Convieni per altro distinguere in tale circostanza le varie specie di ferite , se cioè l' intestino offeso secondo la sua circonferenza , ovvero se l' intestino sia reciso totalmente trovandosi descritto per questo ultimo successo un metodo ben differente . Per altro crediamo qui ripetere , che la cura dell' intestina è una operazione assai pericolosa per le conseguenze che produce , motivo per cui si deve rigettare ancora nella totale recisione dell' intestino , sostituendo piuttosto ad essa il metodo , che in appresso esporremo , il quale può terminare coll' ano artificiale ; ma che viene ordinariamente seguito da miglior esito .

In quest' ultima specie di ferite dell' intestina annoverarsi il caso della totale recisione di una

porzione d'intestino, del quale parte ritrovasi nella cavità del basso ventre, e parte fuori della medesima, e siccome potendosi con fondamento supporre, essere in questo caso la prima poco distante dalla seconda porzione d'intestino reciso, così potrassi essa rinvenire senza aumentare al malato il pericolo in cui si trova. A questo proposito non sarà superfluo dire, che se un intestino ferito rimane affatto nell'addome; ma la sua apertura sia corrispondente alla ferita esterna, è necessario mantenere, per quanto si può, la situazione dell'intestino medesimo, mercè quella di tutto l'individuo, mentre in poco tempo si forma un'adesione locale, che produce la cicatrice di essa, e non è tanto da temersi lo stravasamento nella cavità.

I metodi adunque, che si descrivono dagli Autori per praticare la cucitura dell'intestina detta *Enterorafia* sono varj. Alcuni sono quelli per formare una sutura quando l'intestino sia ferito in parte, i quali si possono praticare in tre modi, e che si dicono sutura del *Pelliciajo*, sutura a *Filzetta*, e sutura ad *Ansa*, inventata da *Ledran*. Se poi l'intestino sia reciso, trasversalmente per modo che sia affatto, o quasi totalmente divisa la sua continuità si consigliano parimenti tre metodi, e sono, quello detto di *Rhamdor* consistente nel procurare d'introdurre l'estremità superiore dentro l'inferiore e così ristabilire la continuità dell'intestina: quello detto di *Littre* consistente nel fissare l'estremità superiore nella ferita esterna venendosi in tal modo a stabilire un ano artificiale, e finalmente quello di *Lapeyronie*, che consiste nel mantenere le due estremità dell'intestino al di fuori, e procurando in questa maniera d'ottenere la riunione.

Le prime tre suture indicate essendo quasi pro-



OPERAZ. CHE SI PRATICANO SULL' ADDOME. 81

itte dalla sana pratica di Chirurgia, abbenchè da alcuno si consiglia nelle ferite dell' intestina te- con perdita di sostanza, pure noi crediamo non ticarle, e per brevità ometterne la descrizione, mettendo i nostri leggitori all' opere di alcuni Au- i, i quali ne hanno trattato estesamente.

Le suture, che si descrivano generalmente da Scrittori di quest' arte salutare nel caso, che intestino sia totalmente reciso sono quelle già in- tate dei *Rhamdor*, *Littre*, e *Lapejronie*. Il primo todo consiste adunque nell' invaginazione dell' in- tino, ossia nell' introdurre l' estremità superiore esse nell' inferiore. Questo si eseguisce nel mo- seguente. Si separa in primo luogo l' intesti- dal mesenterio da ambedue le parti, e si le- no i vasi del medesimo. Allora si prende la rzione superiore dell' intestino, che si distingue ilmente dall' inferiore per la quantità delle ma- ie, che n' escano avendo fatto inghiottire al ma- o qualche cucchiajo di siroppo di viole. Quan- con tal mezzo, o con altro simile siasi ben as- urati di ciò, si prende una carta da gioco, o un zzo di cartone sottile, e se ne forma un tubo, e si deve introdurre nell' estremità superiore, la ale poi con questa guida si fa entrare nell' infe- re, si traversa indi il tutto con un filo, che rve per mantenere l' intestino riunito alla ferita erna. Allorchè l' estremità sono riunite si leva il o con facilità, e la carta da gioco viene ad esci- con gli escrementi. Questo metodo per altro esenta molte difficoltà, che lo rendono imprati- bile, e sono principalmente il difficile passaggio lle materie, essendo l' intestino ristretto dai punti lla sutura, il pericolo dell' emorragia essendo qua- impossibile il legare tutti i vasi del mesenterio, finalmente il pericolo grande dell' infiammazione

dall' altro, cui r  
la fra i bordi de  
eseguito si viene  
intestino, mentre  
materie escono d  
volontario, il ra  
all' ano artificiale  
quale dipende da  
re dell' intestina,  
citura di ambedu  
strano non solo il  
do; ma eziandio

Il metodo us  
ammesso fra le s  
di mantener fuori  
estremità dell'intes  
sato nel mesenterio  
ne per mezzo del  
metodo è molto lun  
di, e si attribuisce  
nienti, e particola  
del tubo intestinal  
so si restringe, e

ERAZ. CHE SI PRATICANO SULL'ADDOME. 83

e dopo la guarigione medesima tutti quei  
ne possono indurre stitichezza, e nello stes-  
so le si amministreranno de' leggieri pur-  
gativi clisterii emollienti, ed in tal modo si tie-  
neno eziandio il caso di dover riaprire l'in-  
te e dar luogo talvolta ad una fistola sterco-

difficoltà della riunione delle due estremità  
esterna, che si può attribuire a cotesto me-  
to non sembra per altro essere sempre tale,  
e nè esse acquistino adesione fra di loro,  
perchè questa si formi colle parti vicine, è  
che abbiamo moltissimi esempi in casi an-  
operazione di bubbonoccele, in cui sebbe-  
trovata porzione d'intestina cangrenata,  
risponde la separazione fatta di questa, ad-  
ta, che abbia totalmente recisa la circon-  
dell'intestino, ciò non pertanto col mezzo  
ere nella ferita esterna le due estremità del  
o approssimate, si è giunto per lo più ad  
la perfetta guarigione, e più raramente è  
o il caso con una fistola stercoracea: quin-  
embra preferibile ai metodi di *Rhamdor*, e  
e, quello di *Laperjonie* con qualche piccio-  
ficazione giusta il diverso caso. A tal fine  
qui riflettere, che la lesione dell'intesti-  
cui parliamo, può presentarsi con una fe-  
erna molto più ampia dell'apertura natura-  
unullo addominale, o arco crurale, e per-  
enza esser più difficile il ritenere tra le lab-  
a suddetta l'estremità recise dell'intestina;  
a tale oggetto oltre il dovere, che abbiamo  
ingere la lunghezza della ferita, che pene-  
basso ventre con la sutura secca, ed aiutare  
con la situazione del malato, e fasciatura  
ente, si dovrà etiandio passare un filo nel



mesenterio sotto ciascuna estremità d' intestino diviso, ed in questo modo rendersi sicuri della stabile situazione del medesimo in codesta parte. Il diverso luogo, che può avere nel basso ventre la ferita esige ancora molta attenzione per parte del Cerusico, affinchè le materie fecali non penetrino nella cavità addominale, escendo dall' intestino, ed a tale oggetto dovrà desso vigilare sulla posizione dell' estremità del medesimo, e di quella di tutto l' individuo, come altresì far mutare le pezze bagnate nell' acqua tiepida di malva, che debbonsi applicare sopra la ferita, appena restano imbrattate dalle materie fecali.

Codesta attenzione nella medicatura si continuerà per qualche giorno, e vi si unirà ogni altra cautela per impedire una grande infiammazione della parte offesa. A questo fine si praticheranno secondo il bisogno i salassi necessari, la dieta regolata, le bevande, i frequenti clisteri la quiete ec. La debolezza apparente del malato non deve distogliere il Cerusico dal praticare il metodo debilitante, in tutta la sua estensione, poichè nell' offesa del basso ventre si osserva spesso questa debolezza senza che il paziente sia realmente in un stato tale, e può anche sotto la medesima aver luogo una infiammazione mortale. Si deve in seguito stare molto attento su i cibi procurando di evitare l' uso di quelli, che possono agire particolarmente sulle intestina producendo delle flatulenze ec. Del rimanente per la medicatura deve il Professore adoperare un metodo semplicissimo, il quale consiste nell' applicare delle faldelle di fila asciutte, oppure imbrattate d' unguento cerato, nel tenere a freno col contatto della pietra infernale i bottoncini carnei, che facilmente di troppo si sviluppano, e nell' amministrare internamente, se il caso lo richiede

OPERAZ. CHE SI PRATICANO SULL'ADDOME. 85  
 pozione tamarindata, o altra, giusta il biso-  
 Nei casi in cui non siasi potuto evitare  
 artificiale deesi adattare alla parte uno de-  
 romenti, che si sono inventati dai pratici all'  
 o di contenere le fecce, che quasi di conti-  
 e escono; fra i quali merita la preferenza  
 di *Juville* per essere assicurato ad un cinto  
 o, avente il collo di cuojo. *Richter* però ci  
 attere, che in questo caso un cinto elastico  
 a pezzo di spugna sotto il cuscino farà le  
 i uno sfintere, impedendo il passaggio invo-  
 o de' peti, e degli escrementi, ed in tal mo-  
 procurerà un più lungo soggiorno al chilo,  
 vorirà l'assorbimento del medesimo. Se poi  
 soltanto di una fistola stercoracea serviran-  
 ne i clisteri replicati, e la compressione so-  
 essa.

## ARTICOLO II.

### *Della Paracentesi dell'Addome.*

Ono succintamente descritte nel secondo volu-  
 tali sono le cagioni principali dell'ascite, e  
 altresì nel medesimo appena accennato quale  
 essere il metodo curativo, essendo questi  
 i interamente risguardanti la Medicina, ed  
 estranei al nostro assunto, quindi è, che a  
 petta soltanto descrivere in cotesta malattia  
 manuale operativo, che si rende un rimedio  
 tivo, non che qualche volta utile per la cura  
 tiva il quale consiste nell'estrazione dell'  
 dalla cavità addominale. Sebbene per altro  
 azione di questa sia solamente per lo più un  
 amento palliativo, pure di sovente, anzi  
 sempre rendesi essa necessaria per prevenire

molti sintomi pericolosi , che possono nascere la presenza di essa , per coadiuvare l' azione rimedi interni , e della cura generale , e finalmente per ottenere una cura palliativa della malattia quando non possa conseguirsene una radicale.

Qualunque per altro sia il caso , in cui si creda necessaria l' estrazione dell' acqua del petto , si eseguisce questa per mezzo di una operazione chiamata *Paracentesi* la quale consiste in un puncto fatto nel Ventre , onde dar esito al contenuto . Lo stromento , con cui si eseguisce questa operazione si è il *Troicart* , e quello che comunemente si preferisce , si è quello detto *Barbeziano* , ch'è di forma cilindrica terminata da una punta triangolare . Alcuni vogliono , che la punta sia nell' estremità formato a modo di lancia tagliente dai lati , onde poter dilatare la cannella nel caso , che il fluido non escisse facilmente dalla cannula del medesimo . Ma questa modifica non è come ancora altre immaginate da diversi pratici , che riescono utili nella pratica , ed adoperando l' ago lanciato si corre maggior pericolo di lacerare qualche diramazione dell' arteria epatica e produrre un'emorragia , che può essere conseguenza funesta . Nello scegliere il troicartato si avrà ancora riguardo , che sia di ferro piuttosto grosso , che sottile , giacchè se la cannella è troppo stretta difficilmente seguirà l' uscita del fluido , se questo sia denso , e glutinoso , come sovente accade , mentre all' opposto esce facilmente se la cannella sia di diametro un po' grande .

Oltre il troicart adattato si preparerà ancora la fasciatura detta del *Monro* , L' oggetto di questa fasciatura si è quello di sostenere il corpo del paziente , acciò non nasca il deliquio . Nell' operazione



AZI. CHE SI PRATICANO SULL'ADDOME. 87

la paracentesi evacuandosi una quantità di  
ne siegue necessariamente, che viene a  
la pressione del medesimo sopra i vasi  
addominali, e quindi il sangue si porta  
in maggior velocità, ed in maggior quantità nel-  
inferiori, del che nasce un disquilibrio  
simo nelle parti superiori, e quindi la  
La fasciatura del *Monro* ha per oggetto  
di tenere il basso ventre gradatamente nel tem-  
perazione, onde rimanga sempre la me-  
desima pressione su i vasi addominali, e quindi  
in luogo la mancanza di equilibrio accen-  
ta, continua essa ancora a tenere dopo l'ope-  
razione onde continuare la pressione fino che le  
viscere ripreso la loro elasticità naturale,  
e così in parte ad impedire un nuovo ac-  
cumulo di fluido. Questa fascia è larga in  
modo che comprenda tutto l'addome con delle  
strisce di tela, che si possono stringere a propor-  
zione che esce l'acqua, e così la pressione rima-  
ne eguale. Per altro molti pratici sono di  
parere, che una tal fasciatura rimanga molto  
lenta pel malato, e che si ottenga lo stesso  
risultato comprimere il basso ventre nel  
l'operazione colle mani da due assisten-  
ti stringendo l'addome con una salvietta, o  
con una fascia a corpo ben lunga, la qua-  
le si fa passare sull'addome, e dopo facendo  
stringere le due estremità di essa dietro il dorso si  
fanno proporzionatamente in senso con-  
tra le due Assistenti, onde resti sempre costan-  
te la pressione sul basso ventre. Qualunque meto-  
do scelga a questo riguardo si farà situare  
il malato orizzontalmente nella sponda del letto  
a sinistra. Alcuni consigliano di farlo porre  
con i piedi a terra; ma questa posizio-

ne oltre che riesce incomoda al paziente, attesa la debolezza del medesimo, produce qualche volta il deliquio, che deve evitarsi per quanto è possibile.

Situato il malato nel modo accennato si dovrà scegliere il luogo, dove deve praticarsi la puntura. Fuori del caso di ascite cistica si farà la puntura nel lato sinistro dell'addome quattro pollici circa in distanza dell'ombellico, restando in questo modo la puntura in un sito, dove non vi è pericolo di offendere il muscolo retto, e l'arteria epigastrica, avendo per altro riguardo di non offendere la milza se sia ostrutta, e molto voluminosa, nel qual caso si potrà fare più avanti, o ancora nel lato destro. Alcuni hanno consigliato di aprire l'addome nella linea alba, ed altri di aprirlo all'ombellico, adoperando una lancetta invece del troicart. Questa loro opinione è appoggiata alle osservazioni fatte di ascitici, i quali sono guariti essendosi aperto spontaneamente l'ombellico, ed essendone uscita dal medesimo una gran quantità di fluido. Riflettendo inoltre alle poche parti, che in questo luogo si offendono sembra questo metodo plausibile, giacchè non vengono forati, che i soli tegumenti. Se per altro esaminiamo l'osservazione vedremo, che la maggior parte dei Pratici recenti riprova affatto tale metodo, poichè rare volte è seguito da un esito felice. Oltre la difficoltà maggiore, che si trova nell'esito delle acque si corre pericolo; che esca l'omento, ed ancora le intestina, la ferita cicatrizza molto difficilmente, e con somma facilità s'infiamma il peritoneo, quindi il luogo da noi accennato di sopra sembra il migliore.

Per eseguire l'operazione nel luogo testè indicato dopo situato il paziente come si è detto si prende

OPERAZ. CHE SI PRATICANO SULL' ADDOME. 89

Si cart colla mano destra appoggiando il medesimo nella palma della mano, e tenendo la cannula fra il pollice, e l'indice si fa penetrare il medesimo nella cavità in modo che l'istromento stesso, e la cannula penetri nella cavità dell'addome forando i tegumenti, i muscoli, ed il peritoneo. Si conosce facilmente quando lo stromento è penetrato nella cavità, e si conosce ancora quando esso fora il peritoneo dalla mancanza della resistenza, che si sente. Per far entrare il trojcart con facilità si terranno tesi i tegumenti colla mano sinistra. Quando siasi sicuro della penetrazione dello stromento si leverà il medesimo lasciando la cannula, ed allora si vedrà escire il fluido con velocità, e con getto uguale, giacchè non puntaruolo, e non la cannula sia entrata nella cavità si vedrà escire il fluido lentamente, ed è necessario introdurre nuovamente lo spil-spingerlo più in avanti, acciò entri la cannula nella cavità dell'addome. Molte volte accade, che si trovino nell'addome dell'idatidi, che impediscono, che l'acqua possano escire facilmente, ed allora soventi volte non è sufficiente l'introduzione di uno specillo bottonato; richiede una cannula di maggior diametro. Per tenere questo sarà molto vantaggioso l'istromento del *Masotti*, che consiste in due cannule che si introducono una dentro l'altra, delle quali sia l'interna più lunga dell'esterna, e quella che resta parimenti di fuori laterali serve a tenere fermo l'omento, e qualunque altro corpo, che si discioglie l'esito del fluido, potendosi introdurre tante volte si creda necessaria, mentre non essendo detta cannula acuta non può produrre alcuna lesione delle parti stesse. Alcuni Autori consigliano non dar esito a tutto il fluido in una sol volta



se mai essa si rendesse necessaria allora non si potrà praticare nel luogo di elezione, che abbiamo accennato di sopra; ma si dovrà bensì fare la puntura nel luogo più elevato del tumore.

L'idrope dell'ovaja è una malattia, che rarissime volte guarisce per mezzo dell'operazione, poichè per solito è congiunta alla medesima una disorganizzazione tale del viscere stesso, che l'operazione si rende inutile, e rare volte si riesce a vuotare perfettamente la cavità dal fluido, per lo che si rende piuttosto dannosa; ma se mai questo riesca, rimangono sempre dei tumori, o degli scirri, che riproducono la malattia fino che poi ne siegue la morte della paziente. Siccome ordinariamente in questi casi la densità del fluido è quella, che impedisce l'esito totale del medesimo, e produce facilmente la recidiva della malattia, così molti hanno proposto di fare una incisione maggiore di quello si faccia col troicart ordinario; ma l'esito di questa operazione quasi sempre infelice ha obbligati i migliori pratici ad allontanarsi da tale metodo.

Nell'idropisia dell'utero, se le acque sieno radunate nella cavità del medesimo, se l'orificio sia chiuso col riaprirlo, o con una sciringa, o col troicart si potrebbe procurarne l'esito; ma se questo riesca difficile si potrà aprire il ventre come in una idropisia cistica. Qualora poi l'acqua fosse nella sostanza spugnosa dell'utero, allora sarà inutile il tentare l'esito per la bocca del medesimo; ma si farà l'apertura nella parte esterna dell'addome, dove il tumore si rende più prominente.

## ARTICOLO III.

*Dell' Operazione Cesarea.*

Non è quì nostro assunto il trattare dell'operazioni spettanti all'Ostetricia, e quindi non parliamo punto di quelle, che in un trattato della medesima convengono, tanto più, che avremo forse occasione di farne parola in altra circostanza. L'operazione Cesarea è quella segnatamente delle altre, che sebbene abbia per oggetto un parto impossibile ad effettuarsi per la via naturale, tuttavia può sotto alcuni riguardi appartenere alla Chirurgia, essendo una operazione di una specie affatto diversa dall'altre, che si praticano nell'ostetricia, nelle quali si tratta di estrarre il feto all'utero per la via naturale, mentre nell'operazione cesarea si apre al medesimo una via preternaturale, e quindi sembra, che detta operazione non appartenga propriamente a quelle, che sono rettamente risguardanti l'arte ostetrica; crediamo perciò possa convenire il darne alcuni cenni in questo trattato di operazioni.

L'operazione *Cesarea* si è così chiamata dalla voce latina *Casus*, che significa tagliato, poichè in essa viene reciso l'utero materno per estrarne il feto. Questa operazione si pratica in tutti i casi, in quali il feto non può assolutamente uscire per la via naturale. Oltre questo caso si può avere occasione ancora di praticare l'operazione cesarea nell'avvenimento della morte di una donna gravida, segnatamente se dessa è arrivata presso al termine della gravidanza, poichè è provato dall'esperienza, che i feti alcun poco avanzati possono sopravvivere assai lungo tempo a questa



ed il pube per l'estensione di cinque pollici dicasi *Gastrotomia* trattandosi della semplice apertura delle pareti della cavità addominale, e non del taglio dell'utero in cui consiste l'operazione Cesaree propriamente detta. Non tutti gli altri casi suindicati richiedono necessariamente codesta operazione, giacchè non di raro la natura stessa procura dei mezzi, coi quali espellere il feto. Ed infatti molte volte colle sole forze della medesima accade il parto per le vie naturali, altre volte i stromenti adattati sono valevoli a procurarlo. L'unico caso quindi in cui l'operazione Cesaree debba dirsi assolutamente necessaria, si è quello dell'angustia dell'ossa stessa del bacino, unitamente alla sicurezza della vita del feto.

Esiste per altro un'altra circostanza, in cui si dee assolutamente praticare questa operazione, ed è quella della morte della madre. Se una donna gravida muoja improvvisamente, o resti uccisa, onde si abbia ragione di credere, che il feto possa essere rimasto vivo nell'utero, l'unico mezzo per salvarlo sarà quello del taglio Cesareo, poichè come abbiamo detto mancando le forze della matrice, il feto non può venire espulso per la via naturale, e l'ajuto delle mani, e degli stromenti non farebbero altro, che porre a rischio maggiore la vita del medesimo, per salvare la quale altro scampo non resta che l'operazione, cui rispetto al manuale, devesi eseguire in questo caso nella maniera, come se la donna fosse viva.

Quando il Professore sia dalle ragioni accennate già deciso a praticare il taglio Cesareo preparerà gli stromenti necessari. Questi sono due bistorini, cioè un retto bottonato, e l'altro convesso nel tagliente, delle liste di ceroto, compresse, una fascia a corpo, fila, spugne ec. Si sceglie-



rà poi il tempo dei dolori del parto, come il più adattato per l'operazione.

Il luogo dove può praticarsi la medesima si è il lato sinistro dell'addome lateralmente all'ombelico quattro dita circa distante dal medesimo, lo che viene ad essere circa nel lembo esterno del muscolo retto. Questo taglio si continua in basso per l'estensione di quattro, o sei pollici, e si farà con somma diligenza procurando di non offendere le intestina sottoposte, al quale oggetto si dovranno prima incidere i comuni tegumenti, indi la cellulare, ed i muscoli, e finalmente il peritoneo adoperando una tentola, o ancora meglio semplicemente le dita, onde non offendere le viscere sottoposte. Posto l'utero allo scoperto viene ad incidersi il medesimo.

Molti hanno rigettato questo metodo per la ragione, che la ferita dell'utero rare volte corrisponde alla ferita esterna segnatamente, quando detto viscere si contrae, e quindi ne viene facilmente ad accadere stravaso di sangue, di linfa, ed altro fluido nella cavità dell'addome, stravaso che può avere delle conseguenze funeste. Oltre di che si corre rischio praticando l'operazione in questo modo di offendere dei vasi arteriosi di qualche calibro, e produrre un'emorragia pericolosa. Si è quindi da molti Autori preferito l'incidere l'addome nella linea alba stessa, e vogliono dessi, che in tal modo si renda questa operazione più facile, perchè s'impedisce l'offesa dei muscoli, delle arterie, ed inoltre il taglio dell'utero resta sempre corrispondente al taglio esterno, si divide questo viscere in modo, che se ne rende più facile la riunione, e si evita l'offesa delle tube, dei ligamenti, e dei vasi. Altri poi hanno consigliato di aprire l'utero lateralmente nella parte destra, o sini-

stra, dove esso resta più prominente, con un taglio traverso di cinque pollici di lunghezza, ma questo metodo raccomandato da *Lauverjat*, è il più pericoloso per l'offesa delle parti contigue. Il primo accennato è il più ordinario, ma il secondo abbenchè non lasci di avere degli oppositori sembra il più ragionevole. Esso si pratica nel modo seguente.

Si prepara la malata antecedentemente con una emissione di sangue, con dei clisteri emollienti, se sia necessario, ed il tempo lo permetta con qualche purgante, e con un sistema esatto di vita. Preparata la Paziente si sitnerà la medesima sopra un letto alquanto resistente, sempre, se è possibile, prima dell'evacuazione delle acque dell'amnios, e si procurerà in primo luogo di vuotare la vescica orinaria dall'orina, onde resti contratta, acciò non possa venire offesa dal coltello. Vuotata la vescica colla sciringa se sia necessario verrà situata la paziente colle gambe alquanto distese, e con la testa elevata. Un ministro sosterrà fermo l'utero appoggiando le sue mani sui lati dell'addome, se fia duopo sarà bene di far comprimere ad un altro assistente l'addome sull'ombelico, acciò l'utero resti fisso, e non si porti superiormente, o inferiormente. In questa situazione il Professore restando al lato destro della paziente col bistori convesso farà una incisione, che principi dall'ombelico, e termini circa due pollici sopra il pube. In questo primo taglio si procurerà d'incidere solamente li comuni integumenti, e la cellulare senza offendere le parti sottoposte; ma mettendo soltanto allo scoperto il peritoneo. Dopo fatto il primo taglio si sollevaranno i tegumenti recisi, e facendo una piccola incisione sul peritoneo s'introdurranno due dita nella medesima, e col mezzo di esse, e di una tenta scannellata si proseguirà il taglio del peritoneo nel-



la stessa direzione tenendolo sempre sollevato nel tempo , che viene inciso per non offendere le parti sottoposte . Quando sia recisa codesta membrana , e posto per conseguenza allo scoperto l' utero dovrà farsi l' incisione di questo , onde dar esito al feto ivi contenuto . Prima d' incidere l' utero sarà ben fatto di asciugare la ferita dal sangue , che impedirebbe di poter praticare esattamente l' incisione del medesimo . Per poter fare questa sarà necessario , che un assistente preme l' addome sull' ombellico , onde l' utero resti fermo nella sua situazione , e si presenti nello stesso tempo all' incisione de' tegumenti , e del peritoneo . I Scrittori di ostetricia non sono di accordo circa il luogo , dove debba incidersi la matrice , ma la maggior parte conven- gono , che sia migliore l' inciderla nel suo fondo , per la lunghezza di 5 o 6 pollici circa , lasciando illeso il suo collo . Molte ragioni sono per questo metodo , e segnatamente quella , che in tal modo la ferita dell' utero viene a restare a contatto con la ferita esterna , mentre incidendo il collo della matrice , e questa contraendosi la ferita viene ad essere quasi coperta , i lochi scorrono per la medesima , e si stravasano nel basso ventre , lo che non accade praticando il primo metodo , in cui resta più facile assai l' esito de lochi pel collo dell' utero .

Inciso questo viscere colle cautele accennate si dovranno aprire le membrane , che racchiudono il feto . Nell' apertura della medesima si adopera somma cautela per non offendere il feto sottoposto , come alcune volte è accaduto . Posto finalmente allo scoperto il feto , si estrarrà il medesimo per i piedi , lo che resterà molto più facile , qualora per altro non si presentasse direttamente la testa all' incisione fatta , nel qual caso sarebbe molto meglio il principiare l' estrazione del feto dalla medesima .



Un solo caso può esservi, in cui l'estrazione del feto si rende alquanto difficile, e questa si è quando la placenta resta aderente nel luogo preciso, dove si è inciso l'utero, giacchè allora non è possibile estrarre il feto senza distaccare la medesima. Questo per altro si otterrà facilmente con la mano stessa, con cui si distaccherà dall'utero. Quando poi la placenta non resti direttamente nel luogo medesimo, dove si è aperto il viscere, si rende molto più semplice l'operazione, stante che allora si presenta subito il feto, che si estrae con facilità, e dopo viene estratta la secondina. A quest'oggetto si adopereranno le mani egualmente quando si trovasse qualche difficoltà a distaccarla dalla parte dell'utero. Procurato l'esito del feto, e della seconda ne siegue necessariamente la costrizione dell'utero, la quale se non accadesse spontaneamente sarà indispensabile il procurarla per mezzo delle strofinazioni irritanti sull'addome, o ancora dell'iniezioni di simil natura per impieciolare la ferita, ed impedire così l'emorragia, e la penetrazione in essa degl'intestini.

Ciò fatto si medicerà la ferita. A tal fine il Professore procurerà in primo luogo di togliere i grumi di sangue, che potranno essere rimasti nella ferita col mezzo delle mani, ed ancora di spugne adattate. Sarà bene di fare delle iniezioni per l'utero, le quali servono per astergere il medesimo, e coadiuvare al suo corrugamento, ed alcuni consigliano di profittare di questo momento per istabilire per mezzo delle dita una comunicazione fra la cavità dell'utero, e l'orificio del medesimo, colla vagina, acciò rendasi facile lo scolo del lochj. Questo ancora si consiglia di farlo, introducendo le dita dall'interno dell'utero nell'orificio del medesimo. Per quello, che riguarda la ferita dell'

OPERAZ. CHE SI PRATICANO SULL'ADDOME. IOI  
ntero verrà la medesima lasciata alle forze della natura , non avendo il Professore mezzo alcuno adattato per procurarne la riunione . La ferita poi esterna dovrà riunirsi esattamente . Alcuni propongono a quest' oggetto la sutura secca , altri la semplice compressione , altri finalmente la sutura cruenta . Essendo la ferita nel basso ventre molto ampia si è temuto , che fuori di quest' ultimo mezzo gli altri non riuscissero di alcun vantaggio . Se per altro riflettiamo , che la sutura cruenta porta seco degl' incomodi valutabili , che essa molte volte eccita sintomi tali , che obbligano il Professore a reciderla resteremo persuasi , che la sola compressione con liste ben lunghe di ceroto adesivo , un largo piomacciolo asciutto , ed altre compresse necessarie , sostenute da una fasciatura a corpo medio-crermente stretta , sarà sufficiente a produrre la cicatrice della medesima . Infatti questo è il metodo adoperato dai migliori Pratici nel caso di ferita dell' addome , e ciò tanto più avrà luogo in questo , di cui al presente trattiamo . Qualunque metodo si adoperi per la riunione della ferita dell' addome in occasione di parto Cesareo , sarà sempre necessario di lasciare una porzione della ferita stessa aperta nella parte inferiore , onde facilitare l'esito delle materie dall' utero . Si procurerà ancora di rendere più facile l' esito delle medesime ponendo la donna in una situazione adattata , che sarà la laterale . Questa situazione oltre il procurare il libero scolo delle materie renderà anche più facile la riunione della ferita , tenendo sempre i labbri della medesima a mutuo contatto , mentre se la paziente rimanesse supina nel letto tenderebbero essi continuamente a discostarsi . Sarà poi necessario di tener sempre astersa la ferita , ed a questo oggetto verrà essa medicata spesso , e più volte il gior-



no, secondo, che saranno più o meno abbondanti i ripurghi. Le iniezioni emollienti fatte per la vagina saranno molto vevoli a procurare l'esito dei medesimi.

Siccome il pericolo maggiore, che possa aver luogo in questi casi si è l'infiammazione, così ogni cura del Professore dopo fatta l'operazione Cesare si è quella di tener lontana per quanto sia possibile la medesima. Noi non abbiamo bisogno di ripetere in questa occasione quale sia il metodo da tenersi per ciò procurare, avendo molte volte già esposto diffusamente qual regime debba tenersi nei casi di ferite dell'addome, o di operazione di questa natura. La peritonitide è una malattia, a cui sono facilmente soggette le puerpere, e può molto più aver luogo quando desse abbiano sofferta una operazione così grave, come il taglio Cesareo, e quindi dopo il medesimo si dovrà porre in opera il regime antiflogistico in tutta la sua estensione. La dieta dev'essere rigorosa all'ultimo segno, e maggiore di quella, che si pratica in qualunque malattia infiammatoria, perciò dovrà nutrirsi la paziente di soli brodi. Si daranno molto spesso delle bevande diluenti, e se la robustezza della paziente, ed il polso lo richieda non si mancherà di praticare delle emissioni di sangue adattate all'età, al temperamento, ed allo stato della medesima. Essendo la costipazione del basso ventre un sintoma molto comune in questi casi, e nello stesso tempo assai incomodo, potendo produrre dei gravi accidenti, sarà necessario di praticare ne' primi giorni segnatamente dei clisteri emollienti, sì per procurare alla paziente delle abbondanti evacuazioni alvine, come ancora per impedire, che la medesima nell'evacuazioni di esse non abbia de' sforzi tali, che impediscano la cicatrizzazione delle ferite. Qualora sia pas-



sato il pericolo dell'inflammazione sarà ben fatto il principiare a ristabilire le forze della puerpera somministrando alla medesima dei leggieri attonanti, ed un vitto alquanto generoso procurando per altro di andar sempre a gradi. Riguardo poi alla ferita dell'addome dopo formata la cicatrice della medesima essendo essa debole, e per conseguenza potendosi facilmente temere un'ernia ventrale sarà bene il tenervi per qualche tempo una compressione adattata. Circa alle altre attenzioni da aversi per la puerpera vengono queste da noi passate sotto silenzio appartenendo esse ad un trattato di Ostetricia.

#### ARTICOLO IV.

##### *Della Nefrotomia.*

**E'** molto frequente nel corpo umano la formazione dei calcoli urinarj, la quale ha luogo nelle diverse parti, che servono alla separazione di questo fluido escrementizio. Si distinguono comunemente in Chirurgia i calcoli secondo il loro sito, cioè secondo, che essi siano nei reni, negli ureteri, o nella vescica. Qualora il calcolo esista nel rene, e produca delle infiammazioni, le quali poi passano in suppurazione, che sono sovente causa di fistola, viene da alcuni proposta l'incisione del rene stesso, e l'estrazione del calcolo, e questa operazione si è quella, che dicesi comunemente *Nefrotomia*. Convien distinguere esattamente il caso, in cui il calcolo esistente nel rene abbia prodotto l'inflammazione, la suppurazione, ed una specie di fistola locale, con la di cui dilatazione si viene adstrarre facilmente il calcolo urinario; ed il caso,

in cui il calcolo esistente nel rene produce sintomi tali infiammatori da richiedere l' estrazione . Nel primo caso riesce l' operazione di molta facilità , e presso che di nessuna conseguenza , giacchè l' apertura è già formata da se medesima , ed il Cerusico altro non deve fare , che secondare gli sforzi della natura ; ma altrimenti è nel secondo caso, in cui l' operazione dicesi propriamente Nefrotomia , poichè questa operazione è molto pericolosa . Egli è in primo luogo assai difficile a riconoscere se realmente esista , o nò il calcolo nel rene stesso , potendo altra malattia di questo viscere imporre assai facilmente per un calcolo nel medesimo , ma quando anche poi si fosse realmente sicuri dell' esistenza di un calcolo nel rene stesso , egli è facile il comprendere i pericoli , che possono aver luogo , se vogliasi incidere il rene , mentre oltre l' offesa di un viscere così delicato , e sensibile , la sua situazione profonda , ed i vasi , di cui esso è fornito renderebbero l' operazione assai pericolosa , prescindendo ancora dalle sue conseguenze , e segnatamente dallo stravasamento di urina , che potrebbe accadere , essendo assai facile l' aprire il peritoneo .

Egli è dunque una verità adottata da tutti i Pratici , che sarebbe un' imprudenza massima di tentare una simile operazione conoscendosi il grave pericolo , che seco porta la medesima , l' incertezza della diagnosi , e la mancanza di esempi di Autori , che l' abbiano eseguita con successo . Qualora per altro il calcolo nel rene abbia già prodotto o un ascesso , o una fistola , tutti i Pratici ammettono , che o aprendo il primo , o dilatando la seconda si debba andare in cerca del calcolo , e procedere all' estrazione del medesimo . In questo caso l' operazione si riduce tutt' al più all' apertura di un semplice ascesso lombare , e deesi quindi in tale circo-



OPERAZ. CHE SI PRATICANO SULL'ADDOME. 105

anza procedere collo stesso metodo da noi indicato parlando della malattia di questa natura .

Vi sono per altro dei casi , nei quali l'operazione può dirsi propriamente Nefrotomia sebbene ista un' ascesso . Questo caso è quello dell' esistenza del calcolo nella sostanza del rene stesso .

In questo modo , che la suppurazione si formi dentro il rene , e sia necessario aprire il medesimo per estrarre le marce , ed il calcolo . In questa occasione però si deve convenire , che la diagnosi è molto incerta , e non ammette ordinariamente il rischio di una operazione così pericolosa . Qualora si sia sicuri , che il calcolo realmente esista nel rene , e questo abbia prodotto una suppurazione , che meriti darle esito ; si sarà poi sicuri di estrarre il calcolo , subito che non si conosce certamente il sito del medesimo ? Alcune volte il calcolo è così aderente , che il tirarlo fuori produrrebbe delle lacerazioni molto pericolose .

Ogni volta che per altro l'apertura esista naturalmente , e sia fistolosa , lo specillo potrà dar molto lume sull' esistenza del calcolo , e ne sarà più facile l' estrazione . Estratto , che sia il corpo estraneo si dovrà medicare la parte . Il metodo , che dovrà usarsi in codesti casi sarà adattato alla natura della malattia , riguardando cioè se essa consista in un ascesso , o in una fistola . Noi già abbiamo altrove accennato il metodo , che deve tenersi per la cura di tali malattie , e quindi ci steniamo di parlarne ulteriormente in questo luogo .



## A R T I C O L O V.

*Della Bubbonocèle.*

**N**ella prima parte di queste Istituzioni di Chirurgia abbiamo parlato delle varie specie di ernie, e dei mezzi, che si adoperano ordinariamente per rimediare a questa malattia; e si è ancora accennato, che nei casi, nei quali l'ernia sia incarcerata l'unico mezzo per lo più da porsi in opera si è l'operazione detta comunemente in Chirurgia della *Bubbonocèle*: Questa operazione dunque consiste propriamente nel ridurre un'ernia incarcerata, la quale non possa ridursi per mezzo de' rimedj locali, e generali, non che del *taxis*, ossia con la reposizione semplice delle mani, ed allora si eseguisce aprendo il sacco erniario, ed incidendo quelle parti, che impediscono il rientramento dell'ernia stessa. Si è già accennato nel 2. vol. cosa sia propriamente ernia incarcerata, e quali sieno gli ajuti da praticarsi giusta la specie d'incarceramento. E' necessario però qui d'aggiungere più precisamente a quanto si è detto a quest'oggetto, che in generale i diversi cataplasmi debbono essere applicati sù tutto il basso ventre, che i lavativi purgativi, e irritanti convengono in tutte l'ernie incarcerate, menò quelle per infiammazione sia questa la cagione, sia l'effetto; e finalmente che nell'ernia per intasamento i purganti unitamente agli opiatì possono eziandio essere di sommo vantaggio secondo la pratica dei celebri *Richter*, *Monteggia*, ed altri a cui possiamo solamente far riflettere per quanto noi finora abbiamo osservato, che l'amministrazione de' purganti accennati nell'ernie, in cui si consigliano, cioè per intasamento,

inferiori pel successo ai lavativi purgativi, o  
 ti. Il pediluvio freddo si commenda ancora  
 questa sorta di ernie: Siccome non di rado tut-  
 t'anzidetti rimedj riescono inutili; nell'ernia  
 erata; quindi è che altro mezzo non resta  
 salvare l'infermo che l'operazione sollecita.  
 anzi molto necessario; che il Cerusico non  
 a molto tempo su tali mezzi; giacchè è fuori  
 bbio; che la cagione forse principale; per cui  
 a sempre un esito felice l'operazione della bub-  
 cele; si è perchè viene essa istituita troppo tar-  
 el il professore troppo a lungo insiste; sull'uso  
 medj ancorchè siano adattati giusta la specie  
 rceramento. Secondo i più recenti Pratici sarà  
 tanto miglior partito quello di rendersi all'ope-  
 me troppo presto; che troppo tardi; giacchè  
 uesto ultimo caso per quanto sia fatta da ma-  
 erita difficilmente riesce; non dovrassi quindi  
 tare; che principi a stabilirsi la cancrena, lo  
 i conoscerà dalla picciolezza del polso, dalla  
 razione delle forze ec. mentre allora sarebbe  
 o più mortale l'operazione.

I metodi di fare la medesima sono varj se-  
 o che è vario l'ostacolo, che impedisce il  
 ramento del viscere; che forma l'ernia; e  
 li vi sarà qualche differenza nell'operare l'er-  
 rurale; e l'ernia inguinale; che sono le due  
 e più frequenti, e più facili ad incarcerarsi.  
 gni modo per altro l'operazione consiste ad  
 ere i tegumenti, ed il sacco, dopo di che  
 lo poste allo scoperto le viscere; che forma-  
 ernia; debbono esse venir ridotte nella cavi-  
 ncidendo ancora se è necessario l'ostacolo,  
 e impedisce la riduzione; ossia dilatando il  
 e, per cui sono escite. Alcune volte per al-  
 uesta dilatazione non è necessaria.

L'apparecchio di cui si fa uso nell'operazione dell'ernia si è un bistorino a taglio convesso, ed un bottonato stretto, e tagliente nella sua concavità detto di *Perr*, una tenta scannellata flessibile, pinzette anatomiche, fili incerati, varie perizette fine, fila, e fascia adattata a *T. Papi-*zano il bisognevole, dopo aver vuotato la vescica, onde togliere ogni impedimento possibile al rientramento dell'intestino, si farà porre il paziente in una situazione adattata, che sarà prima a poco l'orizzontale procurando, che il Professore resti situato dal lato destro del malato, la quale situazione si farà tener fermo il paziente da alcuni assistenti, e l'operante ponendo cura, che restino in rilassamento i muscoli, e segnatamente gli addominali, prenderà gl'integumenti, dopo tosi i peli, col pollice, e l'indice di ambedue le mani forma una piegatura nei medesimi, la quale resti secondo l'apertura dell'ernia stessa, e quindi si favorirà in essa la direzione obliqua dall'alto in basso, e dall'indietro all'infuori. Allora farà egli prendere la parte inferiore di questa piegatura da un ministro, e colla mano destra, che rimane libera, prenderà il bistorino convesso, ed inciderà questa stessa piegatura, ed indi facendo tenere un labbro della ferita dall'assistente medesimo, e venendo tenuto l'altro dal Cirurco s'ingrandirà la ferita, finchè abbia una grandezza sufficiente, e che sia estesa piuttosto in alto, che in basso, per porre allo scoperto l'annulo, e per evitare l'offesa della tunica vaginale, o del testicolo. In questa incisione de' tegumenti si offendono molte piccole arterie, che sarà ben fatto il legarle sul momento stesso, se per altro il ghiaccio non sia stato l'ultimo rimedio applicato alla parte prima dell'operazione, in caso diverso non avve-



ordinariamente bisogno. Questo vantaggio proviene dall'applicazione del ghiaccio sul tumore o prima dell'operazione della bubbonocèle, o il solo, che si ottenga nell'eseguire la medesima, giacchè è ancora incontrastabile in tal caso secondo l'esperienza, la minor sensibilità delle parti, quindi ci sembra, che coll'anzidetto contatto del freddo si potrebbero ottenere simili vantaggi in alcune altre grandi operazioni di Chirurgia.

Incisi i comuni tegumenti, e posto allo scoperto il sacco erniario devesi fare l'incisione del peritoneo, lo che dovrà eseguirsi con somma cautela per non offendere le parti sottoposte. Per aprir il sacco si prenderà il tessuto cellulare con una pinza, e si solleverà il sacco medesimo, tagliandole le lamine una dopo l'altra, fino che siasi pervenuto a scoprire il viscere, che forma l'ernia. In questa occasione è d'uopo adoperare somma cautela, e servirà di guida la tenta scannellata. Non più sicuro per conoscere quando si è pervenuto nella cavità del sacco, si è per lo più fatto uso di un poco d'acqua, e si sostituisce allora la tenta scannellata l'indice per terminare la sezione del sacco, giusta la natura stessa dell'ernia.

È quindi necessario di render facile il rientro delle viscere, che formano la medesima, ciò si ottiene recidendo l'annulo inguinale, o l'annulo del pauparzio, e secondo che l'ernia è inguinale, o crurale. Nell'incisione dell'annulo inguinale si dovrà attendere, che essa non sia troppo lunga, altrimenti l'annulo non si riunisce, e il malato resta soggetto ad ernie molto maggiori, e più pericolose di quella, che ha richiesto l'operazione. Fa di mestieri ancora riguardare, che il recidere l'annulo non resti tagliato l'omen-

l'arteria epigastrica, se il medesimo verso la parte esterna, o l'interno miglior metodo si è d'intaccare la parte superiore la minor porzione dell'annulo, giacchè le regole date di fare il taglio verso la parte interna non giova per evitare l'offesa di una vena nata.

Per quello poi, che appartiene al ligamento del *Pauparzio* in occasione dell'ernia crurale si deve molto non offendere il cordone spermatico epigastrica. In questo caso vagliano le medesime regole indicate di sopra, che sarebbe egualmente incerto se si facesse all'infuori, troppo all'indietro, o su, e quindi la miglior regola si è detto, di fare in più punti nel minor taglio possibile servendosi della guida del dito. In vista di ciò da alcuni proposto il dilatatore interno dell'annulo; ma ciò viene da recenti pratici atteso l'esito incerto, e le conseguenze migliori non sono ancora indicate.

OPERAZ. CHE SI PRATICANO SULL'ADDOME. III

curare di ridurre le viscere , che formano l'ernia , cioè l'intestina , o l'omento . Per ridurre l'intestina si dovrà prima esaminare lo stato delle medesime . Se esse siano cancerenate si dovrà tagliare la porzione affetta lasciando , come diremo in appresso , l'ansa intestinale nella ferita alle forze della natura , con cui raramente si stabilisce un ano artificiale ; ma se poi siano soltanto infiammate sarà ben fatto il ridurle al più presto possibile , posciachè il calore dell'addome è il miglior rimedio in codesti casi . Per ridurre l'intestina si porrà attenzione di respingerle a gradi , e senza molta violenza principiando dalle parti , che sono uscite le ultime , e separando colle dita quelle aderenze , che possono talvolta essersi formate . Quando poi l'omento sia quello , che formi l'ernia stessa , allora dee venire ridotto il medesimo nella suindicata maniera ; avvertendo però prima della riduzione , che non vi sia intromessa fra la sua sostanza porzione alcuna d'intestino , giacchè allora devesi usare ogni cautela per farne la separazione , e quindi la rispettiva reposizione o quello , che conviene allo stato de' visceri usciti fuori , altrimenti restando l'intestino fra la sostanza dell'omento , potrebbe esser cagione della morte del malato . Questa importante riflessione , la quale può salvare la vita dell'infermo , la dobbiamo al celebre Dottore *Pietro Betti* , che nelle sue giudiciose annotazioni fatte all'opera di *Sprengel* ci riporta un simile caso comunicatogli da *Andrea Vaccà* . Si trova sovente ancora , che il riporre l'omento si rende impossibile , perchè è ricoperto da molto grasso , o perchè ritrovasi tumefatto da infiammazione , o finalmente perchè porzione ne è cancerenata . Nei due primi casi è sufficiente lasciare l'omento fra i labbri della ferita , mentre sgonfiando



si rientra totalmente nel basso ventre, ovvero resta aderente alla medesima, nell'ultimo caso si deve recidere la porzione di omento, che si trova cancerenato. L'unica difficoltà, che potrebbe essere d'impedimento a questo metodo si è l'emorragia; ma questa può impedirsi coll'adopere la legatura de'vasi di maggior calibro dell'omento, e quindi ritenere la porzione rimasta di esso alla ferita, onde tenerlo fisso alla medesima, e procurarle così un aderenza. La legatura di questo viscere raccomandata da alcuni in tutti i suddetti casi, meno quello dell'inflammazione del medesimo, è rigettata dai migliori pratici come inutile, e pericolosa, ed è di gran lunga da preferirsi alla medesima il fissare, come si è detto, la porzione del viscere alla ferita, giacchè la stiratura dello stomaco temuta da molti non ha quelle conseguenze, che si pretendono. Ridotte le viscere devesi medicare il malato: A questo oggetto si porrà sulla ferita una compressa di tela sottile forata in più luoghi, e si pone la medesima procurando, che entri nell'apertura, onde servire di compressione, ed impedire il nuovo prolasso delle suddette. Per rendere più efficace questa compressione si porranno sulla compressa delle fila, e sopra dell'altre compresse, il tutto poi sostenuto dalla fascia a T. Ciò fatto si lascerà il malato nella situazione supina, che deve conservare per i primi giorni.

Il metodo di cura per quello riguarda la ferita, deve essere il medesimo di quello, che abbiamo accennato nelle ferite di questa natura. Riguardo poi la cura interna, sarà necessario, che il malato osservi sul principio una dieta rigorosa, e deve il Professore procurare, che il paziente abbia delle evacuazioni, per lo che si praticheranno

dei clisteri, i quali vengono consigliati anche un'ora sola dopo l'operazione, oppure si darà qualche leggiero minorativo, purchè non sia irritante, altrimenti si correrebbe pericolo di promuovere l'infiammazione delle intestina, alla quale esse sono disposte, e che si deve procurare di evitare per quanto è possibile. Il migliore, che possa in tale circostanza amministrarsi è quello raccomandato dal celebre *Volpi*, ed è formato di emulsione araba, olio di ricino, ed estratto di giusquiamo nero, e si ottiene codesta evacuazione è il segno più favorevole, che si possa avere in tali casi. Se si vedano segni d'infiammazione, si cercherà di combatterli con i metodi adattati.

Qualora poi si tratti dell'intestino cancrenato, il caso si rende molto più complicato, giacchè oltre l'esito incerto dell'operazione, vi è molto da temere dopo di essa, che la cancrena non faccia progressi. Ri-uardo al ridurre l'intestino cancrenato, mai ciò debbesi eseguire, come abbiám detto, poichè se ne sia cancrenata tutta una porzione, si deve tagliare la medesima, e trattare la ferita, come una ferita, che interessi tutta la circonferenza dell'intestino, e porzioni del quale si lasciano fra i labbri della ferita esterna, aggiungendo alle cautele, che abbiám già indicate parlando delle suture, la legatura di qualche ramo arterioso, che possasi esser tagliato nel separare dal mesenterio la porzione dell'intestino cancrenato. Si pongono indi al disopra pezze bagnate nell'acqua di malva, che servono ancora, col cambiarle spesso, a mantenere netta la parte dalle fecci, che continuamente escano dalla piaga. Se poi sia cancrenato solo in parte della circonferenza, s'inciderà la parte cangrenata, e si tratterà nell'egual maniera, che altrove si è

indicato, proseguendo la cura con faldelle di unguento cerato.

Debbonsi usare egualmente queste faldelle dal principio della cura fino al termine della medesima, se l'omento sia il viscere, che esiste fra le labbra della ferita esterna, a cui si deve unire in qualche medicatura sul medesimo il contatto della pietra infernale.

In tutti codesti casi sarà sempre necessario di avere riguardo allo stato del viscere per la cura interna, giacchè se siasi trovato cancerenato, il tutto si fonda nell'impedire il progresso della cancrena, lo che peraltro non sempre si ottiene, ad onta, che si sia tolta la cagione che l'ha prodotta, e la porzione del viscere, che ne era affetta.

## ARTICOLO IV.

### *Del Cateterismo.*

Quella operazione per mezzo della quale si estrae dalla vescica l'orina con l'ajuto di un istromento porta il nome di *Cateterismo*, operazione quanto semplice in apparenza, altrettanto delicata, e difficile sotto alcune circostanze, e che richiede tutta l'attenzione di un pratico, la quale talvolta non è al momento sufficiente per conseguire l'intento, e può far credere l'insufficienza del suddetto.

Sarebbe qui molto lungo il determinare i casi principali, nei quali è indispensabile il cateterismo; ma basterà l'accennare, che questa operazione ha luogo in tutti i casi, in cui si presenti una ritenzione d'orina. Questa può dipendere da molte cagioni. Le pietre esistenti nella vescica, l'in-



fiammazione di quest'organo, la paralisi del medesimo, molte lesioni del sistema nervoso, alcune malattie veneree, i gonfiori della prostata, ed i restringimenti dell'uretra sono le cagioni più frequenti della ritenzione d'urina, e nelle quali compete il cateterismo.

Questa operazione si fa con un istromento detto *Sciringa*, o *Catetere*, che consiste in un tubo d'argento col suo stiletto, o di gomma elastica, che abbia quasi la stessa curvatura, e lunghezza, che ha l'uretra giusta il diverso sesso, ed età. Nell'estremità in cui questo istromento s'introduce nella vescica è chiuso, ed ha una o due aperture laterali, per le quali possa entrare l'urina tolto che sarà lo stiletto, poichè esse devono restare otturate dalla grossezza del medesimo, fintantochè sia arrivato lo stromento nel cavo della vescica. Qual cosa rende più libero il passaggio dello stromento per l'uretra, non intromettendosi alcuna piega della medesima nell'aperture laterali della sciringa. L'altra estremità di questa è aperta, e molto più larga con due anelli per poterla adoperare, o ancora fissare intorno al pene con una fettuccia, se il caso lo richiegga, onde impedire che esca dall'uretra. Le sciringhe sono di vario diametro secondo l'età del paziente, e la cagione della malattia; ma in genere riescono di facile introduzione quelle di grosso calibro. Esse sono parimenti di varia materia, giacchè se si tratti di esplorare la vescica per riconoscere l'esistenza di una pietra sono preferibili quelle di acciaio solide; se si debba estrarre l'urina dalla vescica si adoperano quelle di argento, se poi debbasi lasciare la sciringa nella vescica dopo estratta l'urina, sia per impedire l'aumento degli ostacoli, o escrescenze dell'uretra, sia per procurare un esito

continuo all'urina, in caso di paralisia di vescica sono d'anteporsi le sciringhe così dette di gomma elastica.

Il metodo per fare il cateterismo è di due specie, il primo di essi consiste nell'introdurre la sciringa essendo il becco della medesima all'ingù, e l'altro tenendolo verso il basso ventre. Il primo metodo è forse più complicato, e difficile, e si eseguisce nella seguente maniera. Sbarazzato, che sia l'intestino retto per mezzo di un clistere emolliente, si fa coricare il malato sul dorso, elevando le natiche per mezzo di un cuscino, e facendogli semisflettere l'estremità inferiori. Allora il professore situato dalla parte destra del paziente prenderà colla mano sinistra il pene, e stirandolo inferiormente onde impedire, che si formino delle pieghe nella membrana interna dell'uretra. In tal momento prenderà colla mano destra la sciringa, la quale dee essere antecedentemente per poco riscaldata nell'acqua tiepida, ed untata d'olio, o di grasso, tenendo il pollice al di sopra degli anelli, e l'indice, ed il medio, al disotto dei medesimi, per forma che la curvatura della sciringa resti superiormente, e la concavità inferiormente. In questa direzione s'introduce il becco della sciringa nell'uretra, e si fa arrivare fino al perineo. Quando si vede, che il medesimo possa esser giunto sotto l'arco del pube, si fa fare un mezzo giro alla sciringa in modo, che l'estremità superiore della medesima cioè quella, che tiene colla destra il Professore venga sull'addome, ed intanto elevando la sciringa si fa passare il becco della medesima sotto l'arco del pube, e s'introduce nella vescica. Questo giro dicesi da *Maestro*, e molte volte non riesce trovandosi difficoltà nel scorrere sotto l'arco del pube, segnatamente se venga praticata questa ope-



azione in occasione di restringimento dell' uretra, motivo per cui viene dalla maggior parte dei Professori preferito, meno il caso di elevata tumefazione del basso ventre, o di estesa infiammazione dell' uretra, il metodo di sciringare tenendo lo stromento in senso opposto, vale a dire coll'estremità superiore della sciringa verso l' addome.

Per questa manualità il Cerusico dovrà esser situato dalla parte sinistra del paziente, e prendendolo colla mano sinistra il pene sotto il glande procurando di non comprimere l'uretra, tirerà il medesimo verso l' addome, e presa la sciringa nello stesso modo, che abbiamo accennato di sopra, introdurrà parimenti il becco della medesima nell'uretra facendolo giungere fino al perineo, ed allora allontanando l' estremità superiore della sciringa dal basso ventre, farà passare il becco sotto l' ossi del pube, e farà penetrarlo nella vescica stirando il pene sopra la sciringa, e portando questa in una direzione opposta a quella, che avea antecedentemente.

Qualunque dei due metodi venga adoperato non sarà difficile al Professore l' accorgersi, che egli ha penetrato nella vescica. I segni principali sono la mancanza di resistenza, i moti più liberi dello stromento, e l'esito delle orine. Quando la sciringa sia realmente penetrata nella vescica si deve togliere lo stiletto dalla medesima per dar esito al fluido, e ciò fatto si lascerà la sciringa nella vescica, si faranno l' iniezioni, ovvero si estrarrà, e s' introdurrà nuovamente secondo la cagione per cui si è introdotta. Molte volte accade, che sebbene la sciringa abbia penetrato nella vescica, pure non esce l'orina, perchè restano otturati i forami della sciringa dal sangue, o da altro fluido denso esistente nel viscere; allora se l'introduzione dello stiletto, o delle iniezioni tiepide non bastino a



procurar l' esito dell' orina sarà necessario estrarre la sciringa , e dopo ripulita introdurla nuovamente .

La grossezza della sciringa deve venire determinata , come abbiamo detto , dalla natura della malattia . Nel caso di restringimento dell' uretra si rende molto più difficile l' introduzione della medesima , e l' ostacolo non si supera , che adoperando una certa forza , nella quale per altro è necessario andar molto cauti per non formare delle strade false , che produrrebbero delle infiltrazioni pericolose . Il miglior metodo sarà in questi casi di principiare con delle sciringhe sottili , e crescere a poco a poco il diametro . Se debbasi lasciare la sciringa nella vescica si preferirà , come abbiamo detto , quella di gomma elastica , che si netterà , o muterà secondo le circostanze . Giusta poi le varie malattie , che richiedono il cateterismo si regolerà il Professore sul metodo di fare questa operazione , sugli ajuti , che debbono accompagnarla , sulla scelta dello stromento , e sul tempo , che deve esso tenersi nella vescica .

## A R T I C O L O VII.

### *Della Punzione della Vescica .*

**I**n molte occasioni non si può colla operazione del cateterismo penetrare nella vescica , perchè non si può introdurre il catetere nella medesima , ed estrarre l' orina . Allora fa di mestieri ricorrere ad un'altra operazione , la quale viene comunemente detta *punzione della vescica* . Questa operazione ha luogo principalmente quando dopo replicati tentativi non siasi potuto penetrare colla sciringa nella vescica , segnatamente a motivo dell' infiammazione del collo della medesima , molto più se questa in-

fiammazione minacci di estendersi alle pareti della vescica stessa; e se sia prodotta dall'irritazione della sciringa introdotta più volte senza alcun frutto. Succedono ancora dei casi, nei quali o per l'imperizia del Cerusico, o per lo stato della vescica, e dell'uretra si sianò fatte colla sciringa delle strade false nel tratto dell'uretra medesima, e sia quindi impossibile il ritrovare la vera strada per entrare nella cavità del viscere. In tutti questi casi richiedesi la punzione della vescica, onde dar esito all'orina, particolarmente se la ritenzione della medesima esiste già da molto tempo, e non cede al metodo emolliente, ed antiflogistico.

I metodi adoperati comunemente dai Chirurghi per eseguire la punzione della vescica sono tre, cioè in tre diversi luoghi, vale a dire al perineo, al pube, ed all'intestino retto. Gli stromenti necessarij sono un troicart fornito della sua cannula di varia lunghezza, e retto, o curvo secondo quale si adopererà dei tre metodi, che noi passiamo brevemente a descrivere.

Per eseguire la punzione al perineo si adopera un troicart retto, e piuttosto lungo, che si fa penetrare nel perineo fra la sutura del medesimo, e la tuberosità ischiatica sinistra, facendolo penetrare all'indentro, ed all'insù. Introdotto il troicart nella vescica si toglie lo spillo, ed esce liberamente l'orina per la cannula. A questo istromento si è aggiunta ancora un'altra cannula più sottile della prima, la quale è fornita nella sua estremità di più fori, e s'introduce nella medesima potendosi poi estrarre ad arbitrio per ripulirla, e per togliere gli ostacoli, che possono impedire il libero passaggio dell'orina nella prima, senza essere obbligati a praticare un nuovo forame. Questo metodo di operare ha per altro molti inconvenienti, giacchè si ope-



ra senza alcuna guida, e con molta incertezza, ed espone il Cerusico al pericolo di offendere le viscere contenute nella cavità dell'addome, come ancora la prostata, e l'uretra, e quindi è generalmente riprovato da tutti i pratici. Se pure ha esso qualche vantaggio si è quello della declività del luogo, in cui si punge la vescica, e quindi da alcuni si preferisce nei casi di ritenzione d'urina per cagioni di muccosità della vescica. In questi casi per altro per poter esser sicuri di penetrare nell'accennato viscere, cosa molto difficile col metodo, di cui parliamo, si costuma d'incidere antecedentemente il perineo, onde assicurarsi della sua situazione.

La punzione della vescica sopra il pube è d'anteporsi ad ogni altro metodo, come la più comoda, e sicura. Per fare la medesima si adopera un troicart curvo, e lungo circa otto pollici, che si fa penetrare nella vescica anteriormente sopra la simfisi del pube, stando il malato in piedi, o a sedere alla sponda del letto. Ciò eseguito si estrae il punteruolo, e s'introduce nella cannula, una seconda cannula, che abbia l'estremità rotonda con i consueti fori laterali, e questa serve come abbiamo accennato nel metodo precedente, a rendere meno incomodo il contatto della medesima colla vescica, ed a poterla in seguito estrarre all'occasione, lasciando in sito la prima. Dato l'esito all'urina si fissa la cannula, onde seguiti a dar passaggio alla medesima, e non venga ad infiltrarsi fra la cellulare, ed il peritoneo. Intanto non si lascerà di procurare di ristabilire il corso naturale delle urine, onde poter chiudere il forame fatto, che qualche volta resta fistoloso, se la cannula abbia lungo tempo soggiornato nel medesimo. Alcuni pretendono, che sia meglio di forare la vescica due dita sopra la sim-



si del pube , perchè ivi la vescica sporge più in fuori ; ma per altro ritirasi essa dopo vuotata , ed in allora facile , che la cannula esca dalla medesima .

Il terzo metodo , che abbiamo accennato di fare la punzione della vescica si è quello di praticarla dalla parte dell' intestino retto , metodo da molti preferito perchè la vescica resta ferita in un luogo lontano dal suo collo , ed in un luogo declive , onde si rende facile lo scolo delle orine . Un troicart curvo è l' istromento adattato per questa operazione , e dopo situato il malato supino con le ginocchia piegate , e le coscie divaricate s' introdurrà il dito indice della mano sinistra nell' intestino retto , e sentendo col medesimo il tumore formato dalla vescica ripiena , s' introdurrà sul detto dito il troicart , che si spinge nella vescica , elevandolo nella sua estremità , ed avvertendo d' introdurlo alquanto indietro , e precisamente nel mezzo onde evitare l' offesa delle vescichette seminali . Punta la vescica si dà esito all' orina estraendo il troicart dalla cannula , e dopo si fissa questa con un nastro , onde non esca dalla vescica . Questo metodo per altro presenta molti inconvenienti , e particolarmente quello del grande incomodo , che produce l' esistenza continua della cannula nell' intestino retto , motivo per cui è necessario di spesso nettarla , oltre di che resta assai difficile alcune volte l' arrivare col dito al tumore formato dalla vescica , divisatamente in caso d' infiammazione del suo collo , o di gonfiore della prostata ec. quindi ad onta di molti vantaggi , che si trovano nel metodo d' operare per l' intestino retto , si preferisce generalmente la punzione sopra il pube .

Riguardo alla cura di questa operazione qualunque sia il metodo adoperato si dovrà mantenere

in sito la cannula per dar esito all' orina, e si dovrà procurare di ristabilire la strada naturale alle medesime. Quindi facendo uso dei rimedj adattati alla cagione principale della malattia, si tenterà nello stesso tempo d'introdurre la sciringa per l'uretra nella vescica, e se questo sul principio non riesca, si farà uso anticipatamente delle Candelette. Quando poi siasi introdotta la sciringa di gomma elastica, si leverà la cannula procurando che l'orina abbia un scolo sempre libero, altrimenti o il forame non si chiuderebbe, o l'orina s'infiltrerebbe nelle parti vicine al foro fatto.

Trattandosi della punzione della vescica, che ha luogo nei casi, nei quali l'esito dell'orina è assolutamente impedito per le vie naturali, può aver luogo ancora parlar di passaggio dell'operazione così detta della *Bottoniera*. Questa operazione, diversamente eseguita, molto commendata dagli antichi Scrittori di Chirurgia è caduta al presente in tanto discredito dopo l'uso preferibile della punzione della vescica, che non si conosce, che confusamente il metodo, con cui essa veniva prima praticata, quindi noi ci contenteremo di accennarne qui soltanto ciocchè gli appartiene essenzialmente, senza occuparci a darne un esatto dettaglio.

L'operazione detta della *Bottoniera* consiste in una incisione al perineo, in cui s'introduce una cannula fin nella vescica per dar esito alle orine contenute nella medesima. Il metodo di fare questa operazione si è il seguente. Posto il malato supino colle cosce elevate, ed introdotta una sciringa scannellata nella vescica, si procura, che essa formi una prominenza nel perineo, la di cui cute dovrà essere tenuta tesa da un assistente. Il Professore sulla guida della sciringa farà un taglio perpendicolare nel mezzo del perineo, e poi con



gorgeret penetrerà nella vescica , dove per via questo stromento porterà una cannula . La me-  
 catura sarà semplicemente composta di fila , e  
 mpresse . Convieni per altro in cotesta operazio-  
 riflettere , che , o è possibile l' introdurre nella  
 scica il catetere scannellato , ed allora potendosi  
 ualmente introdurre una sciringa ordinaria si ren-  
 inutile anche la punzione della vescica , non che  
 bottoniera , o sarà impossibile il portare la sci-  
 nga scannellata nella vescica , ed allora si dovreb-  
 praticare la bottoniera senza alcuna guida , cosa  
 me ognun vede soggetta a mille accidenti peri-  
 colosi , e da non praticarsi giammai ; moltopiù  
 vendo altro metodo più sicuro ; e meno pericolo-  
 , cioè quello della punzione .

## ARTICOLO VIII.

### *Della Litotomia .*

Quando il Professore siasi assicurato dell'esisten-  
 za della pietra libera nella vescica , tanto dai  
 intomi , che accompagnano questa malattia , quan-  
 o dall' aver riconosciuto la pietra stessa colla sci-  
 inga , che è il segno più certo , ed indubitato ,  
 arà necessario passare all' operazione ; nulla essen-  
 ovi da fidarsi sui rimedj così detti *Litontrittici* ,  
 ai quali mai si ottiene alcun successo favorevole .

Prima per altro che si eseguisca codesta ope-  
 azione è indispensabile di porre attenzione allo  
 stato degli ureteri , e dei reni , e quindi creduta  
 ecessaria deesi preparare il malato secondo le for-  
 e , età , e temperamento . Se il soggetto è bambi-  
 o gli si dovranno amministrare degli antelmintici ,  
 otendo temere dopo l' operazione lo sviluppo de'  
 intomi verminosi . Se desso è adulto , e pingue si



dovrà fargli prendere qualche purgante , o emetico , e porlo per varj giorni in dieta , quale sarà vegetabile se sia il soggetto molto robusto , e gli si prescriveranno de' bagni tiepidi universali ; al contrario in un individuo debole sarà necessario l'uso dei cibi corroboranti , vino , China ec.

I metodi per fare l'operazione detta della *litotomia* si riducono a quattro , e sono il piccolo apparecchio inventato , o almeno descritto per la prima volta da *Celso* , il secondo è il grande apparecchio inventato da *Mariano Santo* , e descritto nel 1522. Il terzo è l'alto apparecchio inventato da *Franco* nel 1560 , ed il quarto finalmente , è il taglio laterale inventato da *Fr. Giacomo* nel 1697 , e poi corretto da *Raus* e da *Cheselden* , da cui fu pubblicato , e che poi ricevette moltissime variazioni da molti Professori Inglesi , Francesi , ed Italiani . Noi descriveremo brevemente questi metodi fermandoci alquanto sul taglio laterale , come il più usitato , e forse il solo nei casi ordinarij.

Il piccolo apparecchio può essere adattato soltanto per i fanciulli . Per eseguirlo si fa tenere il paziente sulle ginocchia da un assistente , il quale nel tempo stesso , che tiene unite , e ferme le mani , e li piedi tiene ancora divaricate le coscie . Allora il Professore introducendo un dito nell'ano dirigendolo sulla vescica , procura di spingere la pietra verso il perineo , e tenerla fissa in tal luogo . In questo momento mantenendo distesa col pollice la cute si fa un taglio sulla pietra medesima , e tagliando fino alla vescica senza recidere nè l'uretra , nè la prostata , colla pressione del dito nell'intestino retto , si farà uscire la pietra dalla ferita , adoperando ancora un cucchiajo , che si fa passare dietro la pietra per ispingerla dal di dentro all'infuori . Questo metodo sebbene evita

l'offesa dell'uretra, e della prostata presenta molti inconvenienti, poichè possono venire offese le vescichette seminali, o i condotti ejaculatorj, ed in seguito possono nascere delle infiltrazioni orinose, motivo per cui non riesce, che in pochissimi casi.

Il grande apparecchio fu così detto per la quantità de' stromenti, che vi si richiedono. Essi sono uno sciringone, un litotomo, due conduttori, uno maschio, e l'altro femina, ed in lor vece il gorgeret inventato da *Fabrizio Hldano*, le tanaglie, il bottone, ed il dilatatore. S'introduce in primo luogo nella vescica uno sciringone scannellato, e nello stesso tempo un ministro tiene sollevato lo scroto. Allora il Professore tenendo lo sciringone colla mano sinistra, colla destra forma un'incisione perpendicolare su i tegumenti del perineo, e dopo penetrato nella parte superiore della medesima facendo entrare la punta del litotomo nella scannellatura dello sciringone, si tira questo in avanti, e si fa scorrere il litotomo, quanto è possibile, verso il collo della vescica. In seguito si riconduce l'istromento dal basso in alto, sempre nella scannellatura dello sciringone, e facendolo tener fermo da un ministro fino che colla sua guida s'introduce la linguetta del conduttore maschio, o del gorgeret nella suddetta scannellatura, e quindi si leva lo sciringone, e si fa penetrare la tanaglia nella vescica per estrarre con essa la pietra. Questo metodo per altro è al presente rigettato per i molti inconvenienti, che seco porta, e segnatamente per l'angustia della ferita interna.

L'alto apparecchio si è imaginato per estrarre con maggior facilità le pietre grosse, che richiederebbero una ferita troppo grande. Questo metodo consiste nell'incidere al di sopra del pube



sulla linea alba, e scoprire la vescica, la quale poi viene incisa, e si estrae indi la pietra. Molte correzioni sono state fatte in questo metodo per rendere facile il taglio della vescica. Si è proposto da *Roussel* d'introdurre dell'acqua in essa, onde renderla prominente, d'introdurre uno sciringone, che possa indicare colla sua estremità il luogo da incidere la vescica; finalmente Fra Cosimo ha pensato di servirsi di uno sciringone fornito di uno stiletto, che resta nascosto in esso. Fa egli un taglio al perineo, che penetra fino nella vescica, ed introducendo la sciringa a dardo per questa ferita stessa, spinge lo stiletto contro la parte anteriore della vescica, il quale, essendo scanellato, colla sua concavità serve di guida al bistorino, che incide la vescica.

Il modo per altro da preferirsi agli accennati metodi per eseguire il taglio ipogastico si è il seguente. Rasi i peli sopra la regione del pube, e fattavi una piega trasversale de' tegumenti, s'incide la medesima, e prolungasi l'incisione per tre pollici circa verso l'ombellico, separati quindi i muscoli, vicino alla loro inserzione agli ossi del pube, si porta il sinistro dito indice a contatto della vescica, colla cautela di avere con esso antecedentemente allontanato dalla medesima il peritoneo. In questo momento lo sciringone di becco lungo già deesi trovare in vescica, e se ne fa abbassare il manico fra le coscie del malato, per cui nasce l'inalzamento della medesima, e sentesi col dito dell'Operatore il becco dello sciringone. La presenza di questo, e del dito, fa senza rischio portare al Cerusico colla mano destra un bistorino retto, col tagliente verso il pube, nella vescica, tagliando per modo di permettere al dito indice sinistro di entrare subito nella medesima, e fattone



coll' apice una specie di oncinio, s'impedisce l'esito dell' orina, e l'abbassamento della vescica. Ciò fatto si fa estrarre lo sciringone, e dall'Operatore si dilata la vescica in linea perpendicolare verso il pube, e s'introduce un' oncinio ottuso per fare con esso sostenere da un' assistente il fondo del viscere aperto, fintantochè per mezzo del dito indice sinistro introduce il professore la tanaglia nella vescica, e se crede necessario una branca per volta, con cui estrae la pietra. La medicatura dopo l'operazione consiste nel mantenere riunita la ferita esterna coi soliti mezzi altrove indicati, e di procurare il libero esito all'orine per la strada naturale, mercè una grossa sciringa elastica introdotta per l'uretra, che deesi pulire, o cambiare giusta il bisogno.

Il taglio laterale è quel metodo, che ora viene usato quasi da tutti i Professori, e che riesce col miglior successo. Il riferire tutti i processi imaginati per eseguire questo metodo sarebbe non solo troppo lungo, ed inutile; ma eziandio non adattato al sistema propostoci, e basterà quindi di esporre soltanto il migliore fra essi. Il taglio laterale fu eseguito per la prima volta da un'Eremita chiamato *Fra Giacomo*, e poi fu corretto da molti; ma precisamente da *Raus*, *Cheselden*, *Fra Cosimo*, ed *HavvKins*. Per eseguire questo taglio si fa situare il paziente sopra una macchina fatta a guisa di leggivo, in modo che resti la testa più elevata, che le natiche. Si legano poi le mani ai calcagni facendo piegare le ginocchia, e si fanno tenere da due assistenti, i quali tengono ferme le gambe appoggiando con una mano le ginocchia al loro petto, e tenendo il piede coll'altra. Un terzo assistente situato nella parte posteriore terrà ferma la testa del malato, e finalmente due assi-

stenti averanno la cura , uno di somministrare al Professore gli stromenti , e l'altro di tenere lo sciringone , mentre il Professore eseguisce il taglio , e desso resterà situato al lato destro del paziente .

Fissati in tal modo il malato , e gli assistenti , il Professore prenderà uno sciringone scannellato , che introdurrà nella vescica , e ne confiderà il manico ad un ministro ; allora questo procurando di accostarlo verso il basso ventre , ed inclinarlo alquanto verso l'inguine destro , rende dalla parte opposta prominente la porzione di esso , che resta sotto il perineo . Il Professore assicurandosi bene coll' indice della mano sinistra del luogo preciso dove esiste lo sciringone , tenendo con la destra il litotomo , e distendendo i tegumenti col pollice ed indice della mano sinistra , inciderà i medesimi sulla parte sinistra del rafe obbliquamente circa un pollice al disotto dello scroto , e continuando per la lunghezza di due pollici in circa fino allo spazio , che esiste fra l' ano , e la tuberosità ischiatica . Compiuto questo primo taglio , cioè a dire tagliati gl' integumenti , la cellulare , i muscoli bulbo , ed ischio-cavernosi , il trasverso , e porzione dell'elevatore dell' ano , si cercherà di ritrovare coll' indice della mano sinistra verso l'angolo superiore della ferita la scannellatura dello sciringone , la quale deve corrispondere al lato sinistro dell' uretra , per evitare l' offesa dell' intestino retto , e facendovi in essa entrare la punta del litotomo , si prende colla mano sinistra lo sciringone tenuto dall' assistente , e s' innalza , facendo penetrare nello stesso tempo il litotomo nella vescica , ed incidendo così la parte laterale sinistra del collo della medesima , e l' apice , e la base della prostata in quella profondità adattata all' età



del paziente, evitando il bulbo dell'uretra, e l'intestino retto.

Fatto il taglio della vescica si tirerà fuori il litotomo, colla cautela di allontanarne il tagliente, per quanto si può dalla tuberosità dell'ischio, per evitare eziandio l'offesa dell'arteria pudenda profonda, e con la guida dello sciringone s'introdurrà nella ferita l'indice della mano destra unto di olio, per riconoscere il luogo dove esiste la pietra, non che la direzione particolare del corpo della medesima, dopo di che si estrarrà lo sciringone: Allora sullo stesso dito s'introduce la tanaglia chiusa corretta da *Fra Cosimo*, ed alquanto riscaldata nell'olio tiepido, portata essa fino alla pietra, viene questa afferrata in modo, che il maggior diametro della pietra sia parallelo alla lunghezza de' cunej dell'istromento, e quindi si estrae. Codesta ultima manualità deve eseguirsi lentamente, e facendo girare la tanaglia ora da una parte, ora dall'altra, o meglio ancora portando ora in alto, ora in basso i manichi della medesima, per renderne l'estrazione più facile, e non contundere le parti della ferita. E' qui d'avvertirsi, che se la pietra rinviensi nel basso fondo della vescica, sarà da preferirsi la tanaglia curva. Alcuni hanno usato di fare l'operazione in due tempi, facendo cioè prima il taglio, ed aspettando poi qualche giorno a fare l'estrazione; ma questo metodo ha trovato pochi seguaci, e pochissimi sono i casi, nei quali esso venga creduto necessario; anzi è solo il caso in cui convenga, cioè nella pietra insaccata, dovendo aspettare le forze della natura, che ne procuri lo sprigionamento colla suppurazione, seppure non vogliasi tentare col *Kiotomo* di *Dessault* di staccarla dalle sue aderenze.



Riguardo alle pietre di gran volume *Lecat* ha inventato delle tanaglie fornite di denti molto grossi e forti, che siano sufficienti a rompere la pietra stessa: ma ciò oltre l'essere assai difficile, in molti casi è pericolosa pel paziente, potendosi di leggieri offendere la vescica medesima: Quindi fa di mestieri preferire il taglio ipogastrico, il quale sarà ben fatto eseguirlo tosto dopo la prima operazione, se si creda assolutamente necessario, giacchè col taglio laterale si estraggono ancora delle pietre di gran diametro, e se questa estrazione ha un' esito infelice dipende il più delle volte dall'aderenza della pietra, che frequentemente si rincontra in quelle di cui parliamo. Estratta la pietra si deve nuovamente introdurre il dito per esaminare se ne esistono altre, lo che potrà sospettarsi, se si veda che la pietra estratta è levigata, lo che può dipendere dal suo stropicciamento con un'altra, o più ancora. Se si ritrovi altra pietra, si dovrà farne l'estrazione collo stesso metodo. Estratte poi tutte le pietre, che si trovano nella vescica, si scioglierà il malato, si porterà nel letto, e sarà bene dargli una bibita calmante.

Il sintoma più incomodo, che possa accompagnare questa operazione si è l'emorragia, che può procedere dall'offesa dell'arteria del bulbo, della trasversale del perineo, o della pudenda interna. Il miglior rimedio in questi casi sarà quello di fare la compressione introducendo per la ferita fino nella vescica una sciringa da donna, in cui debbasi antecedentemente infilare nei fori, che ritrovasi ai lati dell'estremità rotonda dello strumento un filo, al quale si lega un piommacciolo di fila, che deve giungere nel fondo della ferita, dopo che si è introdotta la sciringa nella vescica,

OPERAZ. CHE SI PRATICANO SULL'ADDOME. 131

così evitare lo stravasamento di sangue nel cavo della medesima, in seguito si pongono degli altri piocaccioli di fila fra le due estremità del filo, che tendono fuori della ferita esterna, con le quali si legano, e si forma in tal modo una stabile compressione ancora all'esterno, cui non si dovrà toliere, che nel settimo, o nell'ottavo giorno. La ciringa introdotta nella vescica serve ancora per fare il passaggio all'orina,

Riguardo alla cura consecutiva dell'operazione poco si richiede. Per quello, che appartiene alla medicatura locale nei casi ordinarj, non se ne richiede alcuna, se non che la situazione adattata. Dopo dieci, o dodici ore si visiterà la ferita per pulirla dal sangue, e dalle orine, e si medicerà in seguito colle semplici fila, se si presenta la suppurazione. Per quello poi riguarda la cura interna si dovrà prevenire l'infiammazione della vescica, del peritoneo, e questo si otterrà col metodo debilitante, e rigorosa dieta. Se la ferita guarisce per prima intenzione saranno sufficienti due settimane per la perfetta guarigione, ed all'opposto se ne vorranno quattro, o cinque per conseguire la medesima.

Questo metodo del taglio laterale è quello, che felicemente si è eseguito sopra moltissimi individui dal mio precettore il fu celebre *Giuseppe Flajani*, e generalmente riesce il più comodo, ed è coronato dal miglior successo; per lo che attualmente si pratica eziandio dai suoi successori nell'Arcispedale di Santo Spirito dall'illustri *Giovanni Dellarocca*, e *Felice Sernicoli*, non che dal Professore di Clinica l'espertissimo *Giuseppe Sisco* nell'Arcispedale di S. Giacomo detto degli Incurabili. Si presceglie egualmente nei casi ordinarj codesto

metodo, facendone il parallelo cogl' altri indicati nell' Archiginnasio Romano, ove si fanno le fondamenta di teoria per i giovani studenti di quest' arte salutare dal Ch. Professore *Antonio Tramondì*. Ad ota di ciò, siccome resta molto difficile in una mano poco esercitata il fare detto taglio senza interessare le parti vicine, la di cui offesa porterebbe delle tristi conseguenze; così sono commendati altri stromenti per compiere il medesimo, onde renderlo più facile, e più sicuro.

Il primo è quello imaginato da *Fra Guim*, che consiste in un coltello chiamato *Litotomo* azzeato: Questo stromento è simile ad un coltello rinchiuso in una specie di astuccio, dal quale esso esce, e si allontana premendo sopra una molla. Or siccome questa molla viene a toccare il manico, e questo è formato a diverse faccette più o meno elevate, e quindi facendo appoggiare la molla dello stromento sopra le medesime, verrà il coltello a restare più, o meno distante dal suo asse, e perciò il taglio riuscirà di maggiore, o minore estensione, potendo regolare l' apertura del coltello secondo l' età dell' infermo. L' uso di questo stromento consiste nell' introdurlo chiuso nella scannellatura dello sciringone, dopo aver aperta l' uretra con un bistorino. Introdotto il litotomo nascosto nella vescica si apre al grado, che si è creduto necessario fino che la molla tocchi il manico, ed estraendolo così aperto, si viene a tagliare dall' indentro all' infuori.

Il metodo di *HavvKins* consiste nell' uso di un *Gorgeret* tagliente da un lato. Esso è stato modificato particolarmente nella sua forma dal *Cavaliere Scarpa*; il medesimo si fa entrare nella scannellatura dello sciringone dopo fatto il taglio



esteriore; e dopo aperta l'uretra membranosa coll' uretrotomo, tenendo in questo momento il catetere in linea perpendicolare al corpo del malato, e quindi spingendo lo stromento tagliente in linea parallela, più che sia possibile all'estremità orizzontale del catetere, che riguarda la vescica, si fa entrare nella medesima. Esso serve ancora di conduttore per introdurre sul medesimo le tanaglie. Codesto Gorgeret presenta il vantaggio di evitare francamente l'offesa dell'intestino retto, e dei vasi sanguigni.

Nelle donne i calcoli della vescica sono una malattia piuttosto rara, e quindi rendesi in esse meno frequente l'occasione di estrarli. Questo dipende principalmente dalla brevità, e maggior diametro dell'uretra, e dall'essere libera dai corpi cavernosi, e dalla prostata, lo che rende facile l'espulsione dei calcoli dall'uretra stessa. Se la pietra sia di volume tale, che richieda l'operazione, si è proposto di fare la medesima dilatando l'uretra con varj stromenti: per esempio, due porgeret non taglienti, o il dilattativo di *Massotti*. Ma queste violenti dilatazioni espongono all'incontinenza di urina, a cui è molto difficile il rimediare, quindi generalmente si crede d'anteporre alla suddetta, l'incisione dell'uretra; ma dai recenti pratici si preferisce quella della vescica, adoperando il taglio ipogastrico di già descritto.

L'incisione dell'uretra si pratica introducendo una sonda scannellata nell'uretra, e sopra di essa un historino, o un gorgeret tagliente, il quale incide l'uretra nella sua parte superiore, e per l'incisione s'introduce la tanaglia, e si estrae la pietra. Si è proposta ancora da alcuni l'estrazione della pietra per la vagina; ma ciò non può

aver luogo, che nei casi, in cui la pietra avesse corrosa la parete di cotesto canale, e si facesse strada nel medesimo, altrimenti resta una fistola ordinariamente incurabile.

### A R T I C O L O I X.

#### *Dell' estrazione de' Calcoli dall' Uretra.*

**I** calcoli, che si formano nella vescica sono alcune volte così piccoli, che vengono dall' orina stessa trasportati nell' uretra, ed impediscono il passaggio dell' orina. In questi casi se le bibite diluenti, ed abbondanti non riescono ad espellere tali calcoli, è indispensabile farne l' estrazione. Se il corpo estraneo resti vicino all' estremità dell' uretra, si potrà tentare di estrarlo per mezzo della pressione, ajutandone nello stesso tempo l' esito con delle iniezioni oleose. Ma se questi mezzi riescono infruttuosi, come sovente accade, allora si rende necessario afferrare il calcolo con uno stromento adattato. Quando esso esista vicino l' estremità dell' uretra se ne potrà fare l' estrazione con un paio di pinzette ordinarie, ed in caso, che esse non siano sufficienti, o il calcolo sia situato troppo indietro, si sono inventati varj stromenti, fra i quali sono preferiti un' ansa di argento, che si fa passare dietro il medesimo, e con cui si tira fuori dall' uretra, o lo stromento di *Hauter* consistente in una cannula della grossezza di una sciringa, entro a cui si trova una pinzetta elastica a tre branche, le quali si discostano fra loro spingendole fuori dalla cannula. Introdotta essa nell' uretra fino al luogo, dove esiste il calcolo si spin-



ge fuori la pinzetta , che si viene ad aprire , e lo abbraccia , e spingendo indi in avanti la cannula viene stretto dalla pinzetta in modo , che si può facilmente tirar fuori dall'uretra senza che sfugga .

Se poi ad onta di tutti questi mezzi riesca impossibile l'estrazione dei calcoli dall'uretra , altro rimedio non resta , che l'incisione della medesima . Per praticarla s'inciderà l'uretra sopra il calcolo stesso , avvertendo di distendere bene la cute , onde l'apertura esterna corrisponda esattamente a quella dell'uretra , acciò non succeda un'infiltramento d'orina nella cellulare . Per impedire in seguito il continuo esito delle orine dalla ferita , che la renderebbe fistolosa si deve introdurre nella vescica una sciringa di gomma elastica , la quale dando il passaggio all'orina , impedisce , che questa venga a passare per la ferita . Allora riunendo la ferita coi metodi , ordinarij se ne ottiene in breve tempo la cicatrice .

## ARTICOLO X.

### *Dell' Operazione dell' Idrocele .*

**T**rattando delle malattie principali delle parti genitali virili si è già accennato cosa sia *Idrocele* , ed abbiamo nello stesso tempo riportato i varj rimedj convenienti per procurare la guarigione , ne ci resta altro al presente , che dettagliare il manuale , che deesi praticare per l'operazione , che conviene per la cura sia palliativa , sia radicata di codesta malattia .

Per la cura palliativa dell' *Idrocele* si adopera un piccolo troicart ordinario , o anche una lancet-



ta, se l'acqua sia radunata in piccola quantità. Posto il malato a sedere, o meglio ancora in piedi prenda il Cerusico il tumore con la mano sinistra, e comprimendolo procura, che l'acqua si raduni nella sua parte anteriore, ed inferiore, acciò presenti una maggior resistenza allo stromento incidente. In quello istante prendendo egli il troicart colla mano destra appoggiando il dito indice sulla cannella, acciò ne entri una porzione soltanto, e non resti offeso il testicolo, l'introduce nel tumore, e levandolo lo spillo ne siegue l'esito dell'acqua. Dato esito al fluido si toglie la cannella, e si medica la ferita con un pezzo di taffetà detto d'Inghilterra, o un pezzetto di ceroto, adesivo e sopra di esso una compressa, ed il sosensorio.

Sebbene questo metodo non è, che palliativo come si è detto, giacchè col medesimo si ottiene solo l'evacuazione del fluido senza che per questo resti impedito un nuovo accumulamento del medesimo, ciò non ostante si hanno degli esempj, che tale operazione abbia alcune volte prodotta la cura radicata della malattia, e nella maggior parte dei casi per mezzo di una infiammazione, e suppurazione venuta spontaneamente. Nei bambini anche senza di ciò la semplice puntura produce spesso la guarigione radicata.

Siccome per altro codesto metodo è il più delle volte insufficiente, e conviene ripeterlo spesso senza produrre alcun vantaggio, nè impedire la recidiva della malattia, così ci troviamo nella necessità d'intraprendere la cura radicata di essa, la quale consiste nel procurare una infiammazione artificiale nella vaginale, onde venga essa ad attaccarsi all'albuginea, ed in tal modo resti im-

perdita ogni raccolta di acqua fra queste due membrane. I metodi, che si riducono tutti a produrre una irritazione alla parte sono sei, cioè, l'escisione, ossia l'estirpazione del sacco, il caustico, il setone, la tasta, l'iniezione, e l'incisione. I primi quattro metodi sono al presente posti presso che in dimenticanza attesi i gravi sintomi, che producono, e quindi ci sembra necessario dettagliare soltanto i due ultimi, ed accennare semplicemente gli altri.

L'estirpazione del sacco consiste nel portar via una porzione di tegumenti, ed indi recidere con le forbici una porzione di vaginale, riempiendo la cavità con delle fila. Per far uso del caustico si applica esso esternamente fino, che forni l'escara, caduta la quale esce il fluido contenuto, e si stabilisce la suppurazione. Per caustico, si servono comunemente della calce viva, della pietra caustica, della pietra infernale ec. Questo metodo sebbene al presente inusitato, rendesi tuttavia qualche volta praticabile ne' casi, ne' quali gl'infermi per timidezza ricusano il ferro, e si adattano più facilmente al caustico, il quale abbenchè forse più doloroso spaventa meno il malato. Il Setone inventato a quest'oggetto da *Galen* è composto di più fila di seta, che si fanno passare per mezzo del troicart crunato immaginato dal *Pott* a questo fine, e dopo se ne annodano insieme le due estremità. Finalmente la tasta consiste in una turunda di fila, che s'introduce in una apertura fatta nel tumore con una lancetta. Ma questi metodi, come si è detto, producono sintomi assai gravi, e quindi si fa uso dei due, che passiamo a descrivere.

L'iniezione si pratica facendo l'evacuazione

dell'acqua per mezzo del troicart collo stesso metodo, che si usa per la cura palliativa, dopo di che senza levare la cannula s' inietta per mezzo di essa con un piccolo sifoncino del vino semplice tiepido, o allungato con un poco di acqua, ovvero dello spirito di vino parimenti allungato, come altri preferiscono, e secondo *Gimbernant*, dopo la puntura del troicart, e l' esito del fluido, s' insuffla dell' aria, e se ne ripete più volte l' uso, da cui ne riporta egli un felice successo; come egualmente asserisce *Volpi*. Introdotto il fluido si chiude la cannula, e comprimendo leggermente la parte si procura, che il medesimo vada a toccare tutta la superficie della vaginale, lo che si riconoscerà da un senso più o meno forte di dolore, che prova il paziente, ed allora si farà escire il suddetto fluido dalla cannula. Si farà porre il paziente in letto, e si applicherà sullo scroto un empiastro emolliente, segnatamente se il dolore sia forte. Dopo poco tempo si manifesta l' infiammazione prodotta dall' irritazione di quel fluido, che si è sostituito all' acqua, e da essa poi viene prodotta l' adesione fra la vaginale, e l' albuginea, la quale accade molte volte per la semplice infiammazione, altre volte poi passa in suppurazione, e s' ottiene il medesimo effetto. Per quello riguarda il metodo da tenersi per calmare i sintomi, che sieguono questa operazione, e che di sovente sono molto considerabili, si deve porre in opera il metodo antiflogistico, e ciò secondo il grado, e forza dell' infiammazione, ed il temperamento, età ec. del paziente, quindi si praticheranno le fomentazioni, gli emollienti, le bibite, i clisteri, e se la febbre sia violenta, i salassi replicati.



Se l'introduzione del fluido, meno l'insufflazione dell'aria non sia stata bastante a produrre una infiammazione attesa la callosità della vaginale, si dovrà ricorrere ad altra iniezione di vino puro, o anche animato con qualche irritante, come allume, spirito di vino ec. Ma se poi ad onta di questi mezzi non si ottenga l'effetto bramato, farà di mestieri ricorrere al metodo seguente cioè all'incisione.

Questo metodo viene da molti scrittori di merito rigettato come pericoloso, ed insufficiente; ma l'esperienza ci dimostra, che esso non produce danni tanto gravi quando sia attentamente diretto il metodo di cura, ed inoltre si rende alcune volte necessario attesa la callosità del sacco, motivo per cui viene al presente adottato da molti Pratici. Per praticare l'incisione si tagliano i tegumenti dalla parte superiore dello scroto fino all'inferiore. Ciò eseguito, si osserva subito allo scoperto la vaginale, che s'incide egualmente col bistorino procurando, che la ferita corrisponda a quella degli integumenti. Aperta la vaginale colla cautela di non offendere il testicolo seguirà immediatamente l'esito del fluido, ed indi s'introdurranno delle fila fra essa, e l'albuginea, e altri consigliano dei pezzetti di tela. Si applicherà una lista di ceroto per tenerle in sito, e sopra un leggero emolliente con le compresse, ed il sospensoio. Dopo poco tempo non manca di sopraggiungere la febbre, ed il dolore, segni dell'infiammazione, che va curata coi metodi già noti. L'apparecchio si rinnoverà giusta il bisogno introducendo sempre minor quantità di fila. La prima volta si aspetterà, che sia stabilita la suppurazione per levarli, seppure la gravezza dei sinto-

mi non obbligasse a farlo antecedentemente. Alcune volte la vaginale può essere quasi callosa, ed allora sarà adattato un vitto eccitante, non che un topico stimolante, come il bagno di vino aromatico ec. senza ricorrere alle scarificazioni, o alla recisione di porzione della vaginale, o all'applicazione di qualche leggiero caustico per poter produrre l'inflammazione necessaria.

## A R T I C O L O X I.

### *Della Castrazione.*

**Q**uando il testicolo sia affetto da Sarcocoele, o da Cancro, che sono di loro natura incurabili, altro rimedio non presenta l'arte Chirurgica, che quello della demolizione del testicolo stesso. Questa operazione si rende necessaria per impedire, che la malattia si propaghi pel cordone spermatico, e penetrando fino nel basso ventre produca delle malattie, che pongono in pericolo certo di vita il paziente. Deve però a questo proposito ben osservare il professore, che il cordone sia realmente libero, senza però farsi spaventare dal semplice infiltramento del medesimo, come ci avverte *Siemmerring*, altrimenti poi inutile sarebbe l'intraprendere un operazione, che niun vantaggio produrrebbe all'infermo. Alcuni propongono in simili casi di tirar fuori il cordone, e reciderlo molto all'insù; ma i più recenti pratici sono di opposto sentimento sì per la facilità con cui può sopraggiungere un'emorragia nel basso ventre; se il cordone viene a ritirarsi, la quale sarebbe mortale, come ancora per la difficoltà, che si prova di giungere fino alla parte sana del cordone, giacchè può




essere affetta una porzione ben lunga del medesimo anzi in questo caso è ugualmente affetto il rene dello stesso lato, ed allora ne resterebbe sempre in parte l' affezione, che rende inutile l' operazione. Non è poi punto contraindicata codesta operazione se esistono eziandio ingorghi, aderenze, o ulceri allo scroto, ancorchè occupino gran porzione del medesimo, e formino un volume straordinario, poichè noi abbiamo degli esempi di felice successo in simili casi.

Qualora dunque, premesse tutte queste considerazioni, crede il professore, che sia indispensabile il ricorrere alla demolizione del testicolo, preparerà la suppellettile necessaria degli stromenti consistente in un bistorino convesso nel tagliente, un uncino, un pajo di forbici, una spatola, doppio filo incerato, ovvero una specie di fettuccina formata dal medesimo, fila, compresse, e fascia adattata. Si pone il paziente supino sopra il letto, e disposti gli assistenti, dopo rasi i peli del pube farà il Professore una piega nei tegumenti un poco sotto l' anello addominale, e tenendo egli colla sinistra l' estremità esterna della medesima, fa sostenere l' interna da un assistente. In quello stante colla destra prendendo il bistorino fa nel mezzo della piega un incisione, che comprende sino la cellulare, e che dall' annulo addominale si estenda fino al basso dello scroto.

Se poi vi siano in questo durezza, ulceri ecc. fatto il primo taglio fino al cordone spermatico, se ne fanno due altri semilunari, comprendendo nel mezzo la parte male affetta dello scroto, e quindi si separa il cordone dall' aderenze, che lo circondano. Il professore facendo tenere da un assistente il tumore da demolirsi, tiene la porzione superiore del cordone spermatico, e colla destra





ovvero iso-  
tura coll' a-  
cendo con-  
stringer me-  
Si può anco-  
ne anzidett-  
fatto il sen-  
dalla legatu-  
sione. Ciò  
assistente in-  
ne rimasta d-  
si applica al-  
dita , o col-  
possibile , di-  
non offender-  
recisi debbon-  
coli , qualch-  
molto sangue

Se sarà  
matiche , la  
porzione del-  
cuna emorrag-  
gere alquanto

cata, se siasi asportata porzione dello scroto, applicandovi sopra le fila, compresse, e la fasciatura a T. doppio. Dopo qualche giorno viene a stabilirsi la suppurazione, e si ottiene la cicatrice il più delle volte, senza accidenti, avendo attenzione di tenere il paziente nel sistema di cura adattato al grado dell' infiammazione, e dei sintomi, che potessero sopraggiungere.

I sintomi più pericolosi, che possono aver luogo in codesta operazione, sono l' emorragia, e le convulsioni. Riguardo l' emorragia poco dovrà temersi, poste che siano in pratica le cautele accennate; altri a questo riguardo hanno proposto la compressione fatta o colle fila, o con delle lamine di piombo, ma questi mezzi riescono quasi sempre insufficienti. Quello per altro che può venire in conseguenza della legatura di tutto il cordone spermatico sono le convulsioni prodotte dalla compressione de' nervi, e del dotto deferente, e perciò si è imaginato, come abbiain detto, di separare i vasi dai nervi; ma questo riesce molto difficile. Il miglior metodo adunque sarà quello di legare tutto il cordone, e separarlo soltanto con esattezza da tutte le sue adjacenze, e servirsi per legarlo dell' accennata fettuccina stretta, composta di pochi fili di refe cerato, avvertendo di non stringerla troppo; ma soltanto quanto basta per impedire l' emorragia. Alcuni si servono ancora di una piccola striscia di tela, che forse può produrre lo stesso effetto,

## ARTICOLO XII.

*Dell' Amputazione della Verga .*

**N**ei casi di scirro , o cancro del pene è necessario ricorrere all' amputazione del medesimo , o di una sua parte . Questa operazione non è di alcuna difficoltà , ne porta seco cattive conseguenze . Per eseguirla si tira la cute , che ricuopre la verga verso l' estremità della medesima , acciò ne rimanga meno che si può , giacchè i corpi cavernosi dopo recisi , si ritirano di molto . In quello stante con un bistorino si recide al disopra delle parte malata . Alcuni consigliano di tagliare prima circolarmente la cute , con un secondo taglio poi i corpi cavernosi , ciocchè può essere in molti casi di qualche vantaggio , e per questo oggetto sarà bene di fare prima una legatura circolare , che serva di guida , Ciò fatto si dovranno legare le arterie , che gettono sangue , e che alle volte sono assai numerose . All' oggetto poi di render più facile le legature s' introduce nell' uretra un catetere prima dell' operazione , il quale forma un punto d' appoggio nell' afferrare l' estremità arteriose , ed affrena il grande ritiramento del moncone del pene . Per impedire , che nel cicatrizzarsi della ferita non venga a chiudersi l' uretra , s' introdurrà dopo l' operazione una siringa di gomma elastica , che servirà ancora per tenere lontane dalla ferita l' orine più che sia possibile . Siebale ha sostituito ad essa una mezza siringa fornita di uoa lamina concava di rame , onde le parti restino meglio disse dall' umido . Se dopo recisa la verga rimanga l' incomodo di bagnarsi nell' orinare si potrà fare uso della cannula di piombo ricoperta di pelle in-



ventata a quest' oggetto . Noi non parliamo del metodo di estirpare la verga per mezzo della legatura , giacché oltre l' essere più lungo , è ancora molto più doloroso , e quindi da tutti i Pratici si preferisce giustamente il taglio .

### ARTICOLO XIII.

#### *Dell' Operazione del Fimosi , e Parafimosi .*

**L'** oggetto dell' operazione del Eimosi così detto si è quello di dilatare quello stringimento del prepuzio , che costituisce la malattia . Questa operazione consiste nell' incisione del prepuzio , e si pratica nel modo seguente . Posto il paziente a sedere , o sul letto , il Professore prende con una mano la verga , ed introduce una sottile sonda scanellata fra il prepuzio , ed il glande , sulla quale poi si porta il bistorino di stretta lama , facendolo penetrare fino all' unione del prepuzio col glande , allora si fa escire la punta dello stromento tagliente a traverso il prepuzio , e dopo si effettua facilmente il taglio di tutto il medesimo . Alcuni preferiscono d' introdurre il bistorino senza sonda , portandolo dentro orizzontalmente , ed armando la sua punta di una piccola palla di cera ; altri poi antepongono al bistorino una forbice ; ma il metodo dianzi descritto riesce in pratica più facile , e più sicuro .

Fatto il taglio nel modo accennato si dovrà medicare la ferita , lo che si farà introducendo delle fila nella medesima , per impedirne la riunione . Esse si tengono in sito col mezzo di una compressa , e con una fasciatura , ed indi la medicatura si riduce al metodo ordinario . Alcune volte il Fimosi è accompagnato da callosità , o anche scirrosità dell' orlo del prepuzio , di modo che l' incisione del me-

ne volte per il  
genti, che im-  
che riascano  
no del medesi-  
si mezzi non  
rio d' incidere  
stringimento,  
cancrena del gl-  
uso di un histori-  
introduce la punta  
del prepuzio, e  
alzando la punta  
re il lembo del  
to. Per rendere  
storico, e per e-  
di offendere col-  
sarà benefatto, se  
scamellata fra il  
di essa portare i-  
sione non fosse  
puzio sul glande  
stanza di qualche  
tere dalle medesi-  
minio. Dopo d

dopo l' incisione , spesso rinnovati saranno  
 di sufficienti , per conseguire in pochi giorni  
 altro manuale la riduzione del prepuzio.

## ARTICOLO XIV.

### *Dell' Operazione della Fistola dell' Ano.*

lando nel II. Vol. della fistola dell' ano abbia-  
 i detto , che spesso il Cerusico si trova nel-  
 essità di aprirla , non essendo sufficienti i me-  
 i già accennati per procurarne la guarigione .  
 verità , è stata riconosciuta fino dai più an-  
 Crittori di Chirurgia , ed *Ippocrate* stesso ha  
 to la legatura , che ancora al presente è , co-  
 iremo , uno de' metodi adattati . *Celso* , e *Ga-*  
 anno proposto l' incisione , e gli Arabi sono  
 el medesimo sentimento . I più recenti Scrit-  
 ano egualmente proposto l' incisione , ma con  
 modificazioni , che noi non esporremo , atten-  
 l' metodo soltanto approvato dai migliori Pra-

Non è necessario quì ripetere le cagioni , o le  
 zioni della fistola dell' ano avendone già par-  
 suo luogo ; è dunque solo quì nostro obbli-  
 descrivere il manuale , che si richiede per la  
 adicativa della medesima , purchè essa non sia  
 a di una malattia universale . Non ci sembra  
 tro inutile avvertire , che alcune volte una fi-  
 dell' ano inveterata ha prodotto lo sputo di  
 per essersi questo assorbito dalla medesima ;  
 cora bentosto essersi dissipato dopo la gua-  
 rie della fistola , mercè l' operazione . I meto-  
 che si descrivono per operare la fistola so-  
 i , cioè l' iniezione , la compressione , l' estir-



primi tre metodi al presente inus-  
lontanarci dal sistema compendios  
proposti, passiamo ad indicare i

Il metodo del caustico, che  
facciamo parola, consiste nell'app  
stola di un ferro rovente, o di  
precisamente sul tramezzo delle d  
la fistola, onde venga prodotta u  
pagnata da infiammazione, e quin  
zione, la quale distrugga il medes  
ne procuri perciò la cicatrizzazion  
altro, di cui si deve far uso in qu  
sono adattati a produrre il loro e  
no applicati replicate volte; di r  
todo riesce molto lungo, e dolore  
dobbiamo riflettere, che l'uso d  
sufficiente a produrre la cicatrice  
superficiali, o poco profonde; m  
in quelle, le quali penetrano molt  
comunicano coll' intestino retto;  
è presentemente poco adoperato n  
stola dell' ano. I metodi quindi  
usati sono la legatura, e l' incisi

Varie sono le opinioni dei mod  
scelta di uno di questi due meto

do poi esclusivamente ne' casi di fistole come da molti seni . All'opposto peraltro la legatura avviene alle persone deboli , o esposte a cause debilitanti , a quelle timorose ad esporsi al rischio , e quindi abbenchè in genere da tutti i più accreditati venga preferita l'incisione, non è, che in alcuni casi non venga ammessa anche la legatura , che anzi da molti non solo vengono queste due operazioni praticate vicendevolmente , e giusta le circostanze ; ma si hanno eziandogli esempi , che siano state ambedue poste in opera nello stesso tempo sullo stesso soggetto con sito felice .

Per praticare la legatura di una fistola dell'ano si fa sedere il malato sul letto coricato sopra il corrispondente alla medesima , la coscia opposta è legata , mentre che l'altra è distesa , s'introduce nella fistola un filo di piombo , che si fa passare fino nell'intestino retto , ed introducendo l'indice nel medesimo intestino , si porta fuori lo stesso filo di piombo . Allora si riuniscono insieme le due estremità del filo , e torcendolo si vi stringere la porzione intermedia alquanto cal della fistola , che viene abbracciata dal medesimo . L'irritazione del corpo estraneo vi produce la suppurazione , e stringendolo continuamente , si fa poco a poco a diminuire il tramezzo anzi- tutto , che forma la fistola , fino che si recide del tutto ; la suppurazione stabilita cagiona l'adesione delle parti , e la guarigione della malattia . Se per altro , come quasi sempre accade , resta difficile , e necessaria la separazione dell'ultima porzione formata dai soli tegumenti , sarà benfatto reciderla col bisturi tagliente . In questo stato non rimane ordinariamente , che una piccola piaga superficiale , che si

medica col metodo ordinario, essendo le parti profonde già riunite.

Codesto metodo essendosi trovato utile in alcuni casi ha ricevuto varie correzioni, che consistono principalmente nella diversità del filo, e nella maniera d'introdurlo. Il filo di piombo resta molto doloroso, e quindi si è pensato di sostituire al medesimo un filo di refe, o di seta incrociato. Per render poi più facile l'introduzione di questi cordoncini, si sono inventati varj metodi; ma quello comunemente preferito si è il metodo di *Demault*. Questo Professore adoperava una cannula, ed una specie di pinzetta. Introdotta la cannula nella fistola sopra uno specillo, s'introduce la pinzetta nell'intestino retto, con cui si afferra, e si tira fuori dall'ano il filo, che ivi si è già fatto giungere per mezzo dell'anzidetta cannula, la quale in seguito si leva via. Se la fistola era soltanto esterna, introduceva egli prima del filo un troicart nella cannula per renderla completa. Se la fistola non sia molto alta non è necessaria la pinzetta; ma si prenderà facilmente il filo dall'ano, o introducendo una sonda crunata flessibile, o facendo escire la cannola stessa per l'ano, tirandola alquanto infuori.

L'incisione poi è il metodo generalmente preferito per la cura della fistola dell'ano, tagliando tutto lo spazio esistente fra la fistola, e l'intestino. Sono stati inventati moltissimi stromenti per rendere facile questo taglio, molti de' quali per altro non hanno fatto, che rendere più complicata una operazione per se stessa molto semplice. Noi non istaremo qui ad esporre tutti questi diversi metodi, sì perchè ci porterebbe troppo a lungo, sì perchè sono al presente affatto abbandonati. Gli stromenti, che si adoperano dai Pratici recenti consistono in un bistorino, una sonda scannellata una



OPERAZ. CHE SI PRATICANO SULL'ADDOME. 151  
bijaia di ebano detta comunemente Gorgeret,  
e fila, compresse, ed una fascia formano il ri-  
ente dell'apparecchio.

Situato il paziente nel modo, che abbiamo ac-  
ato per la legatura, il Professore farà penetra-  
ell'intestino retto il conduttore di legno, in-  
roduurrà la sonda scannellata nell'apertura fi-  
sa, portandola fino a ridosso dell'estremità  
conduttore, o gorgeret, introdotto nell'intesti-  
o accostando le pareti di questo all'anzidetto  
eret, se manca il foro nell'intestino medesi-  
ed in tal guisa formerà in questa parte con-  
due gli stromenti un angolo acuto. Allora sulla  
la porterà il bistorino stretto, e lungo, che  
scorrere fino all'estremità della medesima,  
si unisce al gorgeret; e questo senza disunirlo  
a sonda, deesi estrarre, dopo che siasi esegui-  
il taglio.

Questo metodo oltre che rende sicura la reci-  
e di tutto lo spazio intermedio della fistola,  
e ancora di resistenza alla punta del bistorino  
renderla completa, se mai essa fosse così det-  
ieca esterna. Riescirà eziandio molto utile per  
stole assai alte, nelle quali senza l'aiuto del  
luttor non si potrebbe giungere fino all'estre-  
i, abbenchè in questo caso *Monteggia* preferi-  
la legatura fatta con il filo di piombo. Alcune  
accade, che l'intestino sia vastamente denu-  
al di sopra della fistola, ed allora si reci-  
con un pajo di forbici: altrimenti essendo  
lenudazione ristretta, non avvi bisogno di ese-  
e questa recisione secondo il consiglio di *Mon-*  
*ia*, e *Betti*. Se esistano molti seni insieme è  
ssario spaccarli tutti, e formarne una sola ca-

150 CAPITOLO IV.  
medica col metodo ordinario, essendo  
fonde già riunite.

Codesto metodo essendosi trovato  
in tutti i casi ha ricevuto varie correzioni  
sono principalmente nella diversità  
la maniera d'introdurlo. Il filo di  
molto doloroso, e quindi si è pen-  
sato al medesimo un filo di refe, o  
Per render poi più facile l'introdu-  
zione de' cordoncini, si sono inventati varj  
lo comunemente preferito si è il me-  
Questo Professore adoperava una  
specie di pinzetta. Introdotta la c-  
la sopra uno specillo, s'introduce l-  
testino retto, con cui si afferra  
dall'ano il filo, che ivi si è già  
mezzo dell'anzidetta cannula, l-  
si leva via. Se la fistola era soltant-  
ceva egli prima del filo un troi-  
per renderla completa. Se la fi-  
alta non è necessaria la pinzetta  
facilmente il filo dall'ano, o in-  
da crunata flessibile, o facend-  
stessa per l'ano, tirandola al-  
L'incisione poi è il meto-

ferito per la cura della fistola  
tutto lo spazio esistente fra l-  
no. Sono stati inventati mol-  
rendere facile questo taglio,  
tro non hanno fatto, che r-  
una operazione per se stessa  
non istaremo qui ad esporre  
todi, si perchè ci porterebbe  
chè sono al presente affatto  
menti

Eseguito il taglio, si passerà alla medicatura, da cui dipende l'esito della cura. Si deve a quest'oggetto introdurre fino al fondo della ferita uno stuello di fila spalmato di unguento di rose, per irritare colla sua presenza la superficie della medesima, e produrre la necessaria infiammazione, e suppurazione. Questa medicatura si sostiene colla compressa, e colla fasciatura adattata. Se l'emorragia obbligasse il Professore a prendervi riparo, s'introdurranno delle stuelle di fila più solide, e si manterranno in sito coll'adattata compressione. Egli è talvolta necessario di medicare spesso la ferita a motivo dell'evacuazione delle fecce, che la medicatura impedisce. Nelle medicature successive si andranno a poco a poco introducendo sempre meno le fila, onde non opporsi alla riunione delle parti. Con questo metodo la piaga diviene a gradi superficiale, e se ne ottiene alla fine la cicatrice.

## ARTICOLO XV.

*Dell' Operazione dell' Ano  
Imperforato.*

**U**no de'vizi di conformazione, che osservasi alcune volte nei Bambini si è quello dell'imperforazione dell'ano, difetto, a cui si può qualche volta rimediare per mezzo dell'operazione. Tre casi debbonsi distinguere a questo proposito, il primo cioè dell'imperforazione dell'ano prodotta da una membrana, che chiude l'estremità dell'intestino, ancorchè alle volte sia l'orificio esterno del medesimo nello stato naturale; il secondo dell'obliterazione di una porzione dell'intestino stesso; il terzo finalmente della sua mancanza totale. Egli è chiaro, che sicuro sarà l'esito dell'operazione nel primo caso,



incerto nel secondo, ed infelice affatto nel terzo caso, in cui rendendosi inutile l'operazione pottrassi ricorrere ad altri mezzi.

Nel primo caso sarà sufficiente un semplice taglio, che si praticherà nella seguente maniera. Situato il Bambino boccone sulle ginocchia di un Assistente, e sentendo col dito l'estremità del coccige si fa al disotto di essa penetrare un troicart, il quale arrivato nell'intestino retto, si osserverà subito l'esito del meconio. Siccome il foro fatto dal troicart rimane molto piccolo, e con difficoltà si mantiene aperto, sarà bene di premettere una piccola incisione cociforme fatta con una lancetta, o con un bistorio, e questa sola può essere ancora sufficiente a formare l'ano artificiale. La medicatura consiste nel mantenere aperto il forame fatto, lo che si otterrà introducendo in esso una turunda spalmata di unguento cerato, che si andrà mutando spesso, e si potranno ancora spalmare col medesimo i contorni della ferita.

Più complicato è il caso dell'oblitterazione di un qualche tratto d'intestino retto. Ordinariamente allora il luogo dove resta l'ano è ripieno di cellulare, a traverso la quale è difficile il ritrovare l'intestino anziletto. In questi casi dopo fatta l'incisione cociale de' tegumenti, si potrà tentare col troicart, o col bistorino stesso di penetrare nell'intestino, lo che se sarà abbastanza fortunato il Professore di ottenere, si riconoscerà subito dall'esito del meconio, e non si tratterà allora altro, che di mantenere il forame aperto collo stesso modo, che abbiamo accennato di sopra. Se per altro questo non riesce, sarà forse meglio abbandonare il paziente, che esporlo ai tentativi replicati, i quali si rendono dolorosi, ed inutili.

Quando poi manchi totalmente porzione d'intestino retto, o sia ristrettissimo per un tratto ben lungo, i mezzi sopracennati sono affatto inutili, ed allora si dovrà abbandonare il paziente. Alcuni hanno proposto di formare l'ano artificiale alla regione iliaca sinistra, aprendo in detta parte, ritirandovi fuori il colon, tagliandolo, e fissandone le due estremità all'apertura esterna. Questa operazione proposta da *Littre* è stata raccomandata ancora nel caso di sopra esposto. Vale a dire nell'obliterazione di una porzione d'intestino; ma oltre il pericolo, che s'co porta una tale operazione, l'incomodo disgustoso, che l'accompagna per tutta la vita, la rendono poco praticabile.

L'imperforazione dell'ano è sovente accompagnata dall'apertura dell'intestino retto nella vagina, o nelle vie urinarie. Nel primo caso l'evacuazione delle fecce, per la vagina si rende molto facile, e più facile resa anche l'operazione; giacchè dopo aperto l'intestino retto, si richiede con più facilità il forame corrispondente della vagina, ripotendosi portare una compressione nella medesima; ma se l'intestino corrisponde nella vescica, o nell'uretra, oltre la difficoltà, e il danno che arrecano le fecce a passare per dette parti, resta impossibile il procurare, dopo aperto l'intestino, di chiudere il forame della vescica, che conviene lasciare alla natura, la quale per altro alcune volte non lascia di operare la cicatrice, attesa l'esilità del medesimo.

## C A P O V.

DELLE OPERAZIONI, CHE SI PRATICANO  
SULL'ESTREMITA'.

## A R T I C O L O I.

*Dell' Operazione dell' Aneurisma.*

**Q**uando la compressione non sia mezzo sufficiente per produrre la cura radicale dell'Aneurisma, o perchè esso sia troppo vasto, ed inveterato, perchè l'arteria sia d'un calibro troppo grande, o perchè il luogo dove esiste l'aneurisma non ammetta un tal metodo, o perchè finalmente produca esso troppo dolore, e formi delle replicate escare cancrenose; siamo necessitati a ricorrere all'altro metodo, che è quello dell'allacciatura. Questo sebbene più doloroso, e più difficile a porsi in pratica dell'altro, ciò non pertanto è il più sicuro, ed è quello, che costituisce propriamente l'operazione dell'aneurisma così detta. E' qui d'avvertirsi, che codesto metodo dell'allacciatura non ha luogo negli aneurismi dell'arteria temporale, occipitale, e palatina, essendo nei medesimi sufficiente per la cura radicale la compressione, la quale però nell'aneurisma dell'anzidetta arteria palatina deesi eseguire, dopo che si è aperto col ferro il tumore aneurismatico.

Dobbiamo noi trattandosi di allacciatura di un'arteria esaminare attentamente lo stato dell'Aneurisma, la sua specie, ed il sito, ed adattarvi il metodo più conveniente per l'operazione. Se il volume dell'aneurisma sia piccolo, se esso sia purio con piccolo stravasamento nella cellulare, si po-



trà praticare il metodo ordinario, di fare cioè, due legature una sopra, e l'altra sotto la dilatazione, o apertura dell'arteria. Nei casi opposti si potrà adottare il metodo di *Anel* detto di *Hunter* di allacciare cioè l'arteria molto al di sopra dell'aneurisma stesso. In genere va il metodo adattato non solo allo stato, e alla specie dell'aneurisma, ma ancora al sito, che occupa; giacchè un'aneurisma della Carotide operabile, cioè che esista nella parte superiore del collo, dovrà egualmente operarsi col metodo di *Hunter* abbenchè sia piccolo, recente ec. non essendo possibile eseguire in codest'arteria l'altro detto ordinario.

L'Operazione dell'aneurisma, si pratica più frequentemente nell'aneurisma brachiale nato per lo più in conseguenza dell'offese della detta arteria in occasione di salasso, e nell'aneurisma del Poplite. Noi descriveremo in primo luogo in generale i metodi di operare l'aneurisma, ed indi passeremo soltanto ad adattarli alle due diverse specie d'aneurisma accennate, potendo facilmente essere i medesimi adattabili agli aneurismi più rari ad accadere, come per esempio nell'arterie crurale, iliaca posteriore, iliaca anteriore, assillare, carotide ec. nei quali leggiamo degli esempj di essere stati i suddetti metodi felicemente praticati.

Per operare un aneurisma il metodo ordinario si è quello di aprire il sacco aneurismatico, e di legare l'arteria al di sopra, e al disotto del tumore. A quest'oggetto si fa sul tumore stesso aneurismatico un'incisione longitudinale proporzionata alla lunghezza del medesimo. Si vuota il sacco aneurismatico dai grumi di sangue, e si separa dalle parti vicine l'arteria, dopo essersi di già resi padroni del corso del sangue per via di un

tourniquet, o di altro mezzo applicato sull'arteria al di sopra dell'aneurisma. Ciò fatto si passano due fila composte di tre fili di refe incerato al di sopra dell'apertura, o dilatazione dell'arteria, e due parimenti nella porzione inferiore; e si stringe una delle legature superiori, ed una delle inferiori, e si tengono le altre di riserva in caso, che le prime si strappassero, o venissero a consumarsi. Eseguito il descritto, si medica la ferita, lasciando le fila fuori della medesima, onde esserne padroni in qualunque caso di emorragia, la quale difficilmente comparirà eseguendo il metodo, che in appresso esporremo.

La medicatura della ferita consiste nel metodo ordinario, e con la suppurazione cadono le fila circa il ventesimo giorno, restando oblitterata l'arteria per qualche estensione dal punto, ove esisteva la prima legatura. Il sintoma il più pericoloso in questo metodo si è la mancanza della circolazione, che minaccia la cancrena della parte; se realmente questa abbia luogo, non ci è altro riparo, che ricorrere all'amputazione, la quale anzi in alcuni casi fu da qualche pratico consigliata, anche prima di tentare l'allacciatura. Per altro non devesi il Professore spaventare, se vede dopo l'operazione, ed anche nei primi giorni la parte priva di calore, e di sensibilità, e minacciante cancrena; giacchè varj sintomi possono ancora svanire sotto l'uso del calore applicato localmente, e continuato per qualche tempo, dipendendo questo dalla mancanza del passaggio della quantità di sangue necessario per l'arterie collaterali, le quali poi a poco a poco vanno a dar luogo ad una quantità sufficiente del medesimo.

Il secondo metodo è quello detto di *Hunter*, il quale consiste, nell'eseguire l'allacciatura, non al



luogo dell' aneurisma stesso ; ma bensì molto al di sopra di esso , e molto distante dal medesimo , onde l' effetto di essa sia quello d' impedire , che il sangue si porti al tumore aneurismatico con la forza ordinaria ; così si lega , per esempio , l'arteria femorale nell' aneurisma dell' arteria poplitea , e l' arteria omerale nell' aneurisma dell' arteria brachiale . Questo metodo si crede più adottabile dell' altro offrendo molti vantaggi a preferenza del primo . Si stima pertanto essere molto più facile il legare un'arteria in istato sano , ed in un punto ad arbitrio del Professore , di quello che legarla nel luogo medesimo dell' aneurisma , dove attesa la dilatazione dell' arteria stessa lo stravasamento del sangue , e la variazione , che offrono le parti vicine , resta essa molto difficile a distinguersi , e separarsi , onde farne la legatura . In questo metodo la ferita , che dee farsi è molto più piccola , che quella , che si richiede per porre allo scoperto il sacco aneurismale ; la piaga che ne risulta è molto più superficiale , la lacerazione è nulla , e la suppurazione molto minore , atteso che le parti sono sane , e si dà minor accesso all' aria . Quantunque siansi voluti trovare molti inconvenienti a questo metodo , cioè quello di rendere inutili le arterie laterali situate al di sotto della legatura , quello di non far svanire affatto il tumore , quello dei vasi collaterali , che versano il sangue nel medesimo , e possono riprodurre la malattia , quello di rendere più difficile a passare i fili sotto l' arteria , non essendo essa aperta ; pure è il metodo da molti adottato , presentando secondo loro , molti vantaggi al di sopra del metodo antico ; ma noi siamo di sentimento , che non debbasi generalmente a questo preferire .

le non « ristretto » a stringere « l'arteria »



Un terzo metodo possiamo chiamare quello di *Mauvoir di Ginevra* già proposto anteccedentemente da *Orazio Murraj*. Esso avea osservato, che nell'operazione dell'aneurisma, uno dei sistemi, che la rendeva sovente inutile si è l'emorragia, la quale nasce alcuni giorni dopo allacciata l'arteria, e che essendo sovente irreparabile, porta seco la morte del paziente. Questa emorragia si crede dipendere dalla lacerazione dell'arteria, prodotta dalla retrazione del vaso, o contrazione delle fibre longitudinali del medesimo, in cui viene causata da una certa irritazione e per il restringimento, che formano i fili intorno all'arteria. Per impedire codesta emorragia, gli accennati Professori propongono di recidere l'arteria stessa nel mezzo fra le due legature, e così sopprimere queste producano dell'irritazione, e contrazione in essa, pure non verrassi a cagionare l'anzidetto spaventevole avvenimento; ed assicurano, che al cadere dei fili si trovano abolite le due estremità dell'arteria. I medesimi dicono di aver spesso spesso in opera questo metodo con esito felice.

Esposti i tre metodi principali adoperati per l'allacciatura delle arterie, passiamo ora a farne l'applicazione alle due principali specie di aneurisma, il brachiale cioè, ed il popliteo. Per fare operazione dell'aneurisma brachiale, si dovrà sgarare l'infermo sul letto, orizzontalmente sulla sonda di esso, per guisa che il Professore possa operare liberamente sul braccio affetto. Avrà egli anteccedentemente disposto l'apparecchio consistente in un tourniquet, un bistorino retto, una spatola, tre, o quattro aghi curvi, non taglianti, e crunati in punta, nei quali sia infilato del filo incerato, formato a guisa di cordoncino piatto.

to, una tenta scannellata, una sciringa da donna, delle fila, compresse, e fascie adattate. Il primo oggetto del Professore dev'esser quello d'impedire il corso del sangue verso l'aneurisma, e quindi dovrà egli primieramente adattare il tourniquet nel braccio, vicino all'ascella, onde resti compressa l'arteria brachiale. Un'Assistente avrà in custodia questo stromento per allentarlo, e stringerlo secondo il bisogno. Questo medesimo Assistente potrà tener fermo il braccio, mentre altri terrianno ferma la mano, e l'antibraccio. Ben situato l'infermo, ed applicato il tourniquet, dovrà il Professore mettere allo scoperto l'arteria ferita, o l'aneurisma. A quest'oggetto farà col bistorino un'incisione sopra il tumore, che sarà più lungo del medesimo due pollici circa; e tenuti divaricati i labbri della ferita, dopo avere asciugato l'interno della medesima dal sangue, si aprirà coll'anzidetto stromento il tumore aneurismatico, ed indi s'introdurrà il dito indice sinistro nel medesimo, colla guida di cui si apre tutto il tumore. Ciò fatto, si pulisce esattamente con una spugna dai grumi di sangue, e si distingue con facilità la parete opposta dell'arteria tagliata, la quale, se si crede necessario, si reciderà immediatamente. Ciò eseguito, s'introduce la tenta, o la sciringa da donna, nell'apertura superiore del vaso, e si dà nelle mani di un'assistente. Ora si prende dal Professore coll'indice, e pollice della mano sinistra il vaso medesimo, entro cui ci è lo stromento, e si separa per quanto è possibile dall'aderenze colle parti vicine, segnatamente coi nervi; e colla destra l'ago menito del filo, la punta del quale si fa scorrere sull'unghia del dito indice, e quindi si circonda

collo stromento il detto vaso, e poca cellulare, facendolo passare dal lato opposto di questo. Ritirato l'ago, e lasciato il filo, che ha circondato il vaso, si leva la tenta, e si osserva se è stato ben situato il filo. S'introduce nuovamente la tenta nel vaso, e si porta nella stessa maniera indicata un secondo filo doppio alla distanza di sei linee circa dal primo; ma in maggior profondità di questo, che dovrà formare la legatura di aspettativa. Adempito ciò, si leva nuovamente la tenta, e si fa la legatura del primo filo con semplice nodo, sopra di cui se ne forma un secondo, dopo che si è il Professore, accertato, essere ben fatto il primo, senza interporvi tra il filo, ed il vaso alcun corpo, come da qualcuno si consiglia. Nella medesima maniera si passa una doppia legatura nella parte inferiore del vaso, facendovi soltanto una sola allacciatura, lasciandone una di riserva.

Siccome è egualmente necessario di legare l'arteria sì al di sopra, come al di sotto della sua apertura, nel caso di aneurisma spurio, ch'è il più frequente nell'arteria brachiale, così dovrà si riconoscere attentamente il luogo, dove l'arteria stessa è aperta. A questo fine dopo il primo taglio farà il Professore slentare un poco il torcolare, e dall'esito del sangue riconoscerà facilmente il luogo, dove l'arteria è lesa. Allora si prenderanno gli aghi preparati, e muniti di filo incerato, che si passano coll'esposta cautela sotto l'arteria, prima al di sopra dell'apertura di essa, e dopo al di sotto.

Legato, che sia il filo superiore in qualunque degli accennati casi si consiglia da alcuni di slentare nuovamente il torcicchetto, per osservare se esce il sangue dall'apertura dell'arteria, giacchè questo



a'lorà sarebbe segno, che il sangue vie ne portato alle parti inferiori dell'arteria sottoposta alla legatura, per mezzo delle arterie collaterali. Per altro potendo questa emorragia dipendere ancora dall'essere stata poco stretta la legatura superiore, potrà essere questo segno assai equivoco, e quindi sarà meglio il differire di far sospendere la compressione, dopo avere stretta nella suddetta maniera la legatura inferiore, poichè se mai allora esce il sangue dall'arteria, sarà indizio sicuro, che le legature non sono bastantemente strette, e quindi si dovranno stringere nuovamente; prima di applicare l'apparecchio. Noi per altro abbiamo già indicato, che il Professore debba prima di eseguire il secondo nodo in ogni allacciatura, esser sicuro della sufficiente strettura del primo.

Assicurato il Cerusico, che le legature sono strette abbastanza, dovrà medicare la ferita. A quest'oggetto si ricoprirà la medesima di fila, che si manterranno in sito con delle compresse, ed una fasciatura, il braccio si farà restare in situazione comoda, e piegato, e si farà uso dei mezzi, che abbiamo già indicati per ottenerne una buona suppurazione. Stabilita questa, e cadute le fila si potrà levare il tourniquet, e la piaga verrà ridotta a piaga semplice, che dopo tre, o quattro settimane cicatrizza, se non si presentano dei sintomi particolari, e segnatamente l'emorragia.

Qualora si creda di operare quest'Aneurisma col metodo di *Hunter*, si farà l'allacciatura dell'arteria brachiale nella metà del braccio, avvertendo di separarla dal nervo mediano, che scorre nella sua parte interna.

L'allacciatura dell'arteria in occasione di aneurisma del poplite, è l'altra operazione di questo

genere, che trovasi il Cerusico obbligato di praticare. Riguardo a questa operazione dobbiamo per altro avvertire, che spesse volte è la medesima seguita da esito funesto, non per parte dell'operazione stessa, la quale non sia stata praticata secondo le regole dell'arte, ed abbia ottenuto realmente il suo effetto; ma bensì per il disordine, in cui trovansi le parti sottoposte. Nei casi di aneurisma inveterate, le quali restino situate sopra un'osso, si osserva frequentemente, che la pulsazione del tumore aneurismatico, produce a poco, a poco un disordine tale nelle ossa, su cui poggia, che esse vengono attaccate dalla carie. Questo si rinviene di sovente nel caso di aneurisma del poplite, ed allora, come ognun'vede, si rende inutile qualunque operazione, dovendo il malato dopo la medesima, necessariamente soccombere alla carie dell'osso. Se si arrivi in tempo non vi sarà altro scampo, che quello di ricorrere all'amputazione, anzi da alcuni si sostiene, che sia migliore scelta il preferire la medesima fin dal principio, all'allacciatura, che rare volte è seguita da esito felice.

Stabilito poi, che avrà il Professore di fare l'allacciatura dell'arteria poplitea col metodo ordinario, si farà situare l'infermo a boccone, e posti i ministri in modo, che resti fermo l'articolo, si adatterà il tourniquet, onde impedire il corso del sangue nell'arteria. Il Cerusico situato a sinistra del malato inciderà longitudinalmente sul tumore aneurismatico, e dopo aver penetrato nel medesimo, darà esito al sangue contenuto, e pulirà la cavità stessa dai grumi di sangue. Ciò eseguito, si passerà alla legatura dell'arteria, facendo piegare alquanto l'articolo; e sollevando la medesima, si faranno passare i fili al di sotto nel modo sopra indicato, e si farà in egual maniera la legatura,



continuando poi la cura fino alla totale guarigione. Per altro questo metodo è per lo più accompagnato da gravi inconvenienti, e segnatamente da quelli di allacciare l'arteria stessa, che è molto malagevole il porre allo scoperto, ed isolarla dalle parti vicine, particolarmente dal nervo ischiatico, se la situazione dell'aneurisma è alquanto in basso, e quando il volume del tumore aneurismatico sia molto considerabile. Oltre di questo, la suppurazione è spesso così abbondante attesa la grandezza necessaria dell'apertura, che produce sovente dei danni notabili, e particolarmente la carie dell'osso, a cui questo si trova, come si è detto, il più delle volte disposto. Tali riflessioni hanno determinato alcuni Pratici a preferire, anzi in qualunque specie di codest'aneurisma recente, che esiga l'operazione, il metodo dell'*Hunter*; e negli aneurismi inveterati, e diffusi hanno creduto indispensabile la dissarticolazione della gamba. Il metodo del suddetto Autore in codest'aneurisma praticasi nel modo seguente.

Situato il paziente supino nel letto, e disposti i ministri si applicherà il tourniquet nella parte superiore della coscia, o si farà tenere compressa l'arteria da un'assistente nel modo di sopra accennato. Si esaminerà in seguito esattamente il luogo, dov'esiste l'arteria, cioè nella parte interna della metà della coscia, per scansare il muscolo sartorio, indi si farà ivi un taglio dei comuni tegumenti. Questo sarà della lunghezza di circa tre pollici, e seguirà esattamente la direzione dell'arteria stessa. Incisi i comuni tegumenti, resterà facile il porre allo scoperto l'arteria, e separarla dalle parti vicine; allora si prenderà un ago curvo preparato a quest'oggetto con del refe incerato a tre doppi, e si passerà sotto l'arteria, facendone la solita al-



lacciatura. Si potrà passare un altro filo alla distanza di un pollice circa lontano dal primo, e servirsene per riserva. Compiuta l'operazione, e sospesa la compressione per vedere se la legatura sia abbastanza stretta, si applicherà la medicatura, che sarà molto semplice, e consisterà in alcune stuella di fila, aspettando la suppurazione per cambiarle. E' necessario lasciare i fili di riserva fuori della ferita, onde poterli stringere in caso di necessità. Il celebre *Boyer* consiglia in questo metodo dell' *Hunter* di eseguire nel luogo prescelto dell'arteria un incisione nella medesima, e quindi farvi due allacciature una sopra, e l'altra sotto l'incisione stessa del vaso, come si pratica nel metodo detto ordinario.

Si è consigliata ancora nell'aneurisma poplitea la legatura dell'arteria crurale, la quale viene seguita da mancanza di pulsazione del tumore aneurismatico, non che di tutto il membro, e dalla mancanza di calore nel medesimo; ma questi accidenti in seguito si dissipano, ed il metodo presenta il fondamento pel buon successo, il quale per altro ci sembra poterlo più facilmente ottenere, nel caso di cui trattiamo, colla legatura dell'arteria femorale.

Fatta l'operazione, si vede in breve tempo diminuire il volume dell'aneurisma, sopra di cui si possono usare delle compresse imbevute in qualche decozione attonante, ed astringente. A questo proposito ci riporta il celebre *Soemmering*, provando l'attività de' vasi assorbenti, che nello spazio di ventiquattrore, ritrovasi diminuito di una terza parte il tumore aneurismatico.

La cura consecutiva va diretta a seconda dei sintomi, che non variano da quelli già di sopra

descritti, e si ottiene sollecitamente la guarigione della piaga. Se l'aneurisma non sia molto voluminosa, e sia recente, onde non esista affezione alcuna nei condili dell'osso del femore, o della tibia, si ottiene con questo mezzo la cura radicale della malattia; ma se abbia luogo il contrario, ad onta dei vantaggi di codesto metodo, il malato sebbene guarito dall'aneurisma, resterà poi vittima del disordine locale, se non si ricorra all'amputazione. Questo esito funesto per altro può susseguire l'operazione più sollecitamente, operando questa specie di aneurisma col metodo di sopra accennato, vale a dire allacciando l'arteria nel luogo stesso del tumore, poichè allora la suppurazione locale necessariamente abbondante, accelera la guarigione dell'osso.

## ARTICOLO II.

### *Delle Amputazioni.*

Quando la malattia di una dell'estremità del corpo umano, è di natura incurabile, e tale, che crescendo, o comunicandosi ad altre parti, potrebbe cagionare la perdita dell'infermo, dobbiamo allora ricorrere alla separazione di essa, e questa operazione è quella, che propriamente dicesi *Amputazione*. Questa operazione è stata posta in uso fino dai tempi più antichi della Medicina, e dobbiamo confessare, che la maggior parte de' metodi di amputare attribuiti ai moderni, li troviamo negli antichi scrittori di quest'arte salutare, se non vogliamo eccettuare i mezzi di arrestare l'emorragia, che sono certamente stati molto perfezionati dai moderni, lo che rende l'amputazione al presente di un'esito molto più sicuro.



Trattandosi nell' amputazione di privare il paziente di un membro, non deesi praticare la medesima, che nei casi di estrema necessità, e solamente quando il Professore non riconosca realmente altro mezzo di conservare in parte un' articolo, o di salvare la vita del paziente. Del resto è ugualmente pericoloso l' attendere, che la malattia abbia fatto grandi progressi, onde minacci la vita dell' infermo, ed abbia tanto esaurite le forze del medesimo, che non sia più in istato di sostenere l' operazione stessa. I Pratici più celebri della nostra Professione sono stati divisi su questo argomento, ed hanno forse troppo sostenuto due proposizioni ugualmente opposte. Alcuni hanno preteso, che non si dovesse mai praticare l' amputazione, considerandola come inutile, e pericolosa. Altri hanno creduto troppo frequente la necessità di essa, fino a proporla nei casi non necessari, ed in un tempo in cui si può sperare ancora di ottenere la guarigione della malattia, e conservare l' articolo con altre risorse. Sarà molto savio quel Professore, che si terrà egualmente lontano da questi due estremi, ed eseguirà l' amputazione nei casi, nei quali essa è realmente necessaria, ed in tempo opportuno.

Non è sempre così facile il decidere in generale, quando realmente sia indispensabile cotesta operazione. Noi abbiamo già negl' altri volumi parlando delle malattie generali, e particolari, esposto i casi, nei quali l' arte Chirurgica non possiede altra risorsa, che quella di ricorrere all' amputazione. Gioverà qui soltanto il ripetere, che i principali casi nei quali essa ha luogo, sono principalmente le ferite contuse, e lacerate, le fratture parimenti complicate, come per esempio, quelle prodotte da armi da fuoco, la cancrena, il can-



cro, la carie, e lo sfacellismo, le ulcere di natura maligna, alcune esostosi, una distrazione particolare delle membra, in alcuni aneurismi, e ferite di arterie molto grosse, e finalmente nella suppurazione molto estesa. Questi sono i casi principali, ne' quali deve il Professore ricorrere all'amputazione della parte. Non si dice per altro, che in tutte queste malattie debbasi subito praticare l'amputazione; posciachè spesso molto di esse guariscono coll'uso de' medicamenti adattati, e dei metodi già indicati, ai quali deve prima ricorrere il Cerusico, anzichè determinarsi all'amputazione, che non va praticata se non che come ultimo, ed estremo rimedio, e quando il tralasciarla porterebbe o la perdita della vita del paziente, ovvero lo farebbe soffrire per lunghissimo tempo, e per sempre una malattia grave, ed incurabile.

Riconosciuta la necessità dell'operazione, si dovrà procurare di eseguirla, come si è detto, prima che il paziente abbia perduto le forze necessarie, cosa, che non tarda a sopraggiungere nelle malattie accennate, le quali indeboliscono solacemente i malati.

Alcuni Professori sono di sentimento, che si possa, anzi si debba praticare l'amputazione, quando l'infermo è ridotto in una certa debolezza, poichè allora la cura della piaga, che rimane dopo l'operazione è più facile, e semplice, e minor timore vi è di grave infiammazione, o di emorragia. Per altro quando ancora ciò realmente abbia luogo, potrà soltanto intendersi nei casi, in cui il Professore sia consultato a malattia avanzata, e nelle case particolari, o nei piccoli Ospedali; ma non sarà mai questa regola praticabile nei grandi Ospedali, dove sogliamo fare la maggior parte dell'operazioni di questo genere.

Infatti vediamo, che in essi le grandi operazioni non sono seguite da felice successo, come quelle eseguite fuori dei medesimi, e ciò accade appunto per la debolezza, in cui vengono per tante inevitabili cagioni ridotti i pazienti, la quale prolunga la suppurazione, e li rende soggetti a malattie nosocomiali, o altre malattie croniche di debolezza. Se nelle amputazioni non si procuri, che il malato conservi tuttavia un grado di forza sufficiente, resterà egli per lo più vittima dell'operazione stessa.

Determinato il Professore di eseguire l'amputazione, si dovrà destinare il luogo da praticare la medesima. Devesi avere per assioma generale in questi casi, che si dee portar via tutta la porzione affetta dell'articolo, motivo per cui alcune volte è necessario reciderlo molto al di sopra di quello apparisca il termine della malattia all'esterno, lo che ha luogo principalmente nella cancrena, che spesso si estende molto più in su nelle parti interiori, che alla superficie dell'articolo stesso. Deve ancora il Professore praticare l'operazione in modo, che il moncone, che rimane sia di qualche utilità al paziente, se è possibile, o almeno non gli serva d'impaccio, e da questo viene sovente obbligato il Cerusico ad eseguire l'amputazione al di sopra di quello, che richiederebbe la malattia.

Le regole generali, ed avvertenze d'aversi in ogni amputazione sono le seguenti. Si deve in primo luogo dal Professore fermare il corso del sangue nella parte d'amputarsi, quindi si tagliano circolarmente i comuni tegumenti, e con un secondo, e talvolta terzo taglio i muscoli sottoposti, procurando, che resti tanta quantità di questi,

onde ricoprire l'osso, e tanta dei primi, affinchè essi possano mettersi a mutuo contatto. Si deve in seguito segar l'osso, e legare indi tutte le arterie, che danno sangue, per impedire una emorragia secondaria, ed in fine riunire cautamente le parti coi muscoli, e tegumenti procurandone la cicatrice.

Queste sono le regole generali da osservarsi in ogni amputazione, per altro non sempre la circostanza esige portar via soltanto porzione dell'osso, ma spesso conviene separarlo nella rispettiva articolazione, e quindi abbiamo due specie diverse di questa operazione, la prima delle quali dicesi propriamente *Amputazione*, e la seconda *Disarticolazione*. Noi parleremo di ognuna di queste separatamente. Le amputazioni, che si praticano nell'estremità sono quelle del braccio, dell'antibraccio, della coscia, e della gamba. Le disarticolazioni più frequenti, sono quelle delle dita della mano, e del piede. A queste possiamo eziandio aggiungere quelle del braccio, della mano, di alcuni ossi del metacarpo, del femore, della gamba, quella parziale del piede, e del metatarso, le quali sebbene gravi, pure sono eseguibili, e perciò verranno da noi brevemente descritte.

Le amputazioni propriamente dette, si eseguiscono generalmente nella stessa maniera, eccetto alcune cautele principali dipendenti dalla struttura della parte. I metodi principali, di cui in esse si fa uso sono tre, cioè l'amputazione a due tempi, quella a lembo, e l'altra secondo il metodo di *Alanson*, ossia a taglio obbliquo. Questi metodi in genere possono essere adattati secondo le diverse parti, sulle quali si opera, e giusta le varie circostanze.

Per fare l'amputazione in due tempi, prepa-



la suppellettile degli stromenti necessarj, e facen-  
stirare i tegumenti più in alto, che sia possi-  
, s'inciderà la cute, e la cellulare circolar-  
te, dopo di che tirandoli in alto, con un ta-  
o circolare si recidono i muscoli sino all'osso.  
ora facendo passare una pezza spaccata nel ta-  
o stesso, per modo, che venga l'osso compre-  
nell'apertura di essa, si tireranno molto all'  
sù i muscoli per scoprir l'osso più in alto,  
e sia possibile. Si recide indi vicino alla mede-  
a il periostio, per poi con varj moti di sega,  
parar l'osso. Si passa in seguito alla legatura  
vasi, dopo di che tirando in basso i muscoli,  
ricopre comodamente l'osso segato, essendo es-  
più lunghi del medesimo, e facendo rilasciare  
omuni tegumenti, si procura porre a contatto  
essi, tutte le parti molli, che si mantengono  
ito coll'apparecchio, che esporremo.

Questo metodo benchè ottenga una sufficiente  
rità di muscoli, e di tegumenti per coprire  
estrità del moncone, ciò non ostante non so-  
essi sempre bastanti all'oggetto nella consecu-  
suppurazione, e quindi si è procurato di pre-  
ire tale inconveniente con varj mezzi. Alcuni  
no proposto di separare una quantità di tegu-  
ti, e rovesciarla all'in sù. Altri hanno con-  
ato di recidere eziandio i muscoli in due  
ti, gli esterni cioè prima, e fatti ascendere,  
di passare al taglio circolare degl'interni. Con  
si viene a formare una specie di cono voto, nel  
o di cui rimane l'estremità dell'osso. A fron-  
er altro di queste correzioni si è da molti  
auto, che il taglio circolare dei muscoli, e dei  
menti presentasse degli inconvenienti insupe-  
i, ed hanno imaginato degli altri metodi,  
quali quello così detto a lembi. Questo me-

todo consiste nel tagliare i tegumenti , ed i muscoli non circolarmente , come nel metodo sopra accennato ; ma tagliando queste parti da due lati con due tagli retti , e poi recidendo circolarmente le medesime . Allora come ognun' vede restano due lembi , i quali separati , e tirati all' in sù si viene a scoprire l' osso fino alla parte superiore delle recisioni laterali , ove colle medesime cautele si pratica la resezione dell' osso , si legano le arterie , e quindi si riaccostano fra loro i lembi , e si mantengono a mutuo contatto . Alcuni usano di formare i lembi obliqui facendo penetrare il coltello rasente l' osso nel sito , dove si deve segare il medesimo , e poi portando obliquamente all' in giù fino ai tegumenti , motivo per cui i lembi riescono obliqui .

I Chirurghi francesi fautori di questo modo di operare hanno trovati pochi seguaci , e non è stato generalmente abbracciato dall' altre nazioni . Si pretende , che il riunire i due lembi porti con se il vantaggio di prevenire una suppurazione , d' impedire la conicità del moncone , e che con tale metodo l' estremità dell' osso non resti mai allo scoperto ; ma in pratica realmente non hanno luogo codesti vantaggi . Infatti rarissime volte suole effettuarsi l' adesione immediata di due superficie così estese , come sono quelle dei due lembi , segnatamente se l' articolo d' amputarsi sarà molto grosso ; ma se anche quest' adesione si formasse non è essa mai generale , e la suppurazione , che indispensabilmente susseguirà nei luoghi , dove non sia nata l' adesione , non potrà avere libero scolo per le marce . Se poi venga a suppurare tutta la superficie dei due lembi , facilmente si può concepire quanto sarà maggiore , ed abbondante la



appurazione di quella, che siegue nel taglio circolare. L'esflogliazione dell'osso, se accade, sarà meno libera, che nel metodo di sopra accennato, essendo applicato il lembo sull'osso medesimo, per le quali ragioni questo metodo è al presente quasi posto in dimenticanza, e riservato soltanto in alcuni casi, che esso possa essere unico, ed indispensabile.

Il metodo di *Chesen*, che può sotto un certo punto di vista considerarsi come un medio fra li due accennati, è quello, che sebbene non sia totalmente privo d'inconvenienti, pure da varj pratici è stato lodato, ed adottato. Esso consiste nel recidere i muscoli obbliquamente, onde l'estremità del moncone rappresenti un cono vuoto, nella di cui parte superiore rimanga l'estremità dell'osso. Per ottenere questo si fa penetrare la punta del coltello sino all'osso rasente i tegumenti; si muove obbliquamente in modo, che resti la sua punta circa due pollici più in alto dal lembo della cute già recisa. Allora tenendo sempre la porzione tagliente del coltello aderente all'osso si conduce esso circolarmente, e obbliquamente, per lo che vengono a recidere i muscoli nella forma accennata. Ciò eseguito, si sega l'osso col metodo già indicato, e si riuniscono dopo le carni, ed i tegumenti, dei quali si sarà avuto cura di lasciarne quantità sufficiente, onde ricuoprire la piaga.

Se noi giungessimo ad allontanare alcuni inconvenienti, che seco porta il metodo di *Chesen*, dovremmo in allora convenire, che esso sarebbe d'anteporsi ad ogni altro. E' stato pertanto rimproverato a questo metodo di non lasciare una proporzionata quantità di pelle, onde ricoprire la ferita; a ciò si potrebbe forse prevenire tirandola molto



accade la necrosi dell'osso, e la sua esfoliazione, cosa che richiede alle volte moltissimo tempo; quando poi succede sovente se ne separa soltanto una porzione di esso, e ne resta sempre un altro allo scoperto. Sono stati proposti varj metodi per prevenire questo inconveniente. Se mai avesse luogo, ad onta delle precauzioni adoperate nel lasciar una quantità sufficiente di muscoli ec. si è immaginato di segare nuovamente l'osso ad una maggior altezza, recidendo nuovamente i muscoli; ma oltre la difficoltà, che si trova nel praticare questa seconda amputazione, essa riesce molto pericolosa. Altri hanno preferito l'uso del caustico, con cui ottiene la separazione dell'osso con molta facilità; ma questo metodo ancora è sottoposto a non minori inconvenienti. Il miglior modo in codesti casi sarà sicuramente quello proposto dal rinomato *Leveille*, e praticato poi dal cel. *Volpi* con felice successo; e consiste nel distruggere tanto il perostio della porzione dell'osso esuberante, quanto il midollo interno colla sua membrana; si riempie tale oggetto la cavità dell'osso con delle fila intese nello spirito di vino, ed allora si forma una suppurazione, che viene seguita dalla caduta della porzione di osso, che rimane priva di nutrimento.

Esposte le regole principali da tenersi nelle amputazioni, passiamo ora ad esporre alcune riflessioni particolari riguardanti le cautele convenienti ad ognuna delle varie specie di amputazione, a cui addatteremo le regole generali dianzi divisate, e quindi poco avremo bisogno di fermarsi nelle medesime. Le amputazioni propriamente dette si praticano nell'osso del braccio, nell'antibraccio, nella coscia, e nella gamba. Le altre ossa sono troppo piccole per sottoporle ad essere amputate, e nelle falangi, che forse alcune sarebbero le spa-

capaci di essere recise con sega, in cui dagli antichi realmente si costumava questa operazione, si pratica al presente la disarticolazione, giacchè la medesima è meno difficile, e meno pericolosa, ed inoltre la piccola porzione di falange, che rimarrebbe, si renderebbe piuttosto d'incomodo, che di utile alcuno.

Si è già di sopra esposto, quali siano i casi, ne' quali possa aver luogo l'amputazione del braccio, che si richiede principalmente in quelle malattie, che attaccano l'articolazione del cubito. Il metodo migliore per questa operazione è quello di già prescelto, cioè a due tempi. Per quello poi riguarda il luogo da eseguirsi, questo dipende dalla malattia stessa, che l'esige. Si può dunque praticare nella metà dell'omero, nella sua parte inferiore, o nella sua parte superiore. In quest'ultimo luogo per altro riesce sempre più difficile, e pericolosa, e quando resti la scelta ad arbitrio del professore, sarà meglio amputare il braccio poco sopra i condili dell'omero, o almeno verso la metà di quest'osso, molto più per l'utilità, che può offrire un moncone più esteso.

L'apparecchio necessario si è il medesimo, che abbiamo indicato parlando delle amputazioni in generale, escludendo il piccolo coltello tagliente da ambi i lati, e la doppia compressa spaccata. Pel manuale poi si osserveranno le regole seguenti. Il paziente resterà seduto, se le forze lo permetteranno, altrimenti resterà nel letto. Il braccio sarà disteso, e sostenuto da due ministri, uno de' quali terrà fermo l'antibraccio, e l'altro il braccio nella sua parte superiore. Se l'amputazione si eseguisca nella porzione inferiore dell'Omero sopra i condili, questo stesso ministro potrà col suo pollice comprimere l'arteria brachiale alla parte interna

del braccio, circa ad un terzo della lunghezza del medesimo, in distanza dell' articolazione. Ivi l'arteria restando immediatamente sull' osso, trovasi un punto fisso per la compressione; ma se debbesi amputare il braccio alla sua metà, o anche più in alto, è necessario lasciare maggiore spazio all'operatore, e quindi dovrassi applicare il tornichetto più in alto, che sarà possibile, situando la pallotta del medesimo sotto l'ascella, ed allora dal ministro, che sostiene la parte superiore del braccio, facendo tirare i regumenti molto in alto, farà il professore il taglio circolare dei medesimi, e questo sarà nel punto di già destinato. Fatto il taglio, ordinerà egli nuovamente di tirare in alto i regumenti, e per ottenerne una quantità sufficiente, si possono separare per lo spazio di circa un pollice. La poca quantità di carni, che si ritrova nel braccio previene da per se stessa la suppurazione troppo abbondante, ed il difetto di lasciar l' osso allo scoperto; per lo che non è di necessità ricorrere ad altro metodo, che a quello del taglio circolare a due tempi, che si rende sufficiente. A quest' oggetto il professore inciderà primieramente il muscolo bicipite, e dopo il tricipite, ed il brachiale anteriore, a livello delle fibre del primo muscolo inciso. Si tirano quindi all' insù le porzioni di muscoli recise per mezzo della pezza spaccata, e si sega in seguito l' osso, avvertendo di andare con somma cautela nel fine, e facendo sempre sostenere la porzione inferiore del braccio, affinchè dal peso del medesimo non venga rotto l' omero prima, che termini di esserè segato, e non resti qualche scheggia; lo che se mai accadesse, si farà uso della tanaglietta incisiva per portarla via.

Segato l' osso, si deve passare alla legatura de' vasi; in primo luogo si dovrà legare l' arteria bra-



chiale, questa si trova facilmente nel lato interno, e si prenderà con uno degli stromenti già indicati, tirandola alquanto infuori, per non comprendere nell'allacciatura il nervo mediano unito alla medesima. Si slenterà indi il torcolare per vedere se vi sono altre arterie, che meritino di esser legate, cioè le collaterali, lasciando i fili delle legature nell'angolo inferiore della ferita. Quando il Professore sia sicuro, che non esista altro vaso arterioso, che getti sangue, comprimerà leggermente colle mani scorrendo all'ingiù dal Deltoide fino al sito ove si è fatta l'amputazione, ed in seguito congiungerà i margini della ferita, i quali saranno così mantenuti a contatto da alcune liste adesive lunghe. Si coprirà indi la ferita con una faldella di unguento cerato, e tutto il moncone con fila asciutte, sulle quali si metterà la croce di malta, due lunghette, ed il tutto si sosterrà senza comprimere dai primi giri di fascia a spica ascendente, che servirà col restante ad impedire la contrazione dei muscoli in parte recisi. Si dovrà in seguito regolare nel modo da noi già altrove descritto la cura della piaga, e dei sintomi, che potessero sopraggiungere.

L'amputazione dell'antibraccio merita alcune riflessioni particolari, per essere il membro composto di due ossa, e per la gran quantità di parti tendinose, e ligamentose, delle quali è composto, lo che può produrre dei gravi sintomi. Qualora dunque sia conosciuta la necessità dell'operazione, si potrà essa eseguire col metodo detto a due tempi, che è egualmente sufficiente in quest'amputazione, come in quella del braccio. L'apparecchio sarà il medesimo, eccetto che si può aggiungere il coltello, per tagliare il ligamento interosseo, che sarà stretto, e tagliente da ambi i lati. Al presen-



buona supput  
eziandio de' g  
sì sensibili; e  
na al carpo fo  
menti: onde  
gliersi potrà  
ticolazione. Da  
ne troppo vici  
tre la difficoltà  
la vicinanza de  
potrebbe estenc  
zione, resterebl  
colo, che sareb  
dunque il profe  
detta parte, vie  
amputare piutto  
quello che l'an  
la prima amputa  
ed essendo press  
sulta al paziente  
articolo.

Per manuale  
tuare il paziente  
rà sostenere il

mano . Per arrestare il corso del sangue si farà comprimere colle dita dell'anzidetto Assistente l'arteria brachiale , o si applicherà il tornichetto circa la metà del braccio . Riguardo alle posizioni dell'antibraccio sono diversi i pareri dei pratici . I Francesi sostengono , che sia migliore di farlo tenere nella massima pronazione , acciò le due ossa restino parallele , e si possano segare nello stesso tempo . All'opposto i professori Italiani sono di sentimento , che nell' amputazione dell' antibraccio si debba far tenere il medesimo nella massima supinazione . Quest' apparente contradizione di due mezzi affatto opposti per ottenere lo stesso oggetto viene spiegata dal professore *Monteggia* , il quale dice , che la supinazione, dell'antibraccio conviene allorquando il professore è situato nella parte esterna . Infatti tanto il *Bertrandi* , quanto il *Monteggia* , i quali stabiliscono , che l'antibraccio debba porsi nella massima supinazione consigliano l'operatore di restare nella parte esterna dell'antibraccio , mentre all'opposto *Sabatier* , *Richerand* , e *Volpi* , quali consigliano di far restare l'antibraccio nella massima pronazione possibile , consigliano altresì il professore a rimanere situato nel lato interno dell'articolo . *Dessault* faceva tenere l'antibraccio in una situazione media fra la pronazione , e la supinazione .

In qualunque pertanto di queste situazioni venga posto il membro , farà il professore il taglio dei tegumenti . Si farà esso circolare , e si procurerà che sia più in basso , che sia possibile , cioè circa due dita almeno al disotto del luogo , dove si debba segar l'osso . Incisi i tegumenti , e la cellulare si dovranno questi tirare più in alto , che si può , separandoli dalla sottoposta aponeurosi , e si passerà indi al taglio dei muscoli . Questo dovrà egual-



mente farsi circolare, e dopo si passerà alla esatta recisione trasversale delle parti interossee. Codesta recisione si farà per mezzo del medesimo coltello, o di quello detto interosseo, che si fa penetrare dall'alto in basso fra l'ulna, ed il radio. Per mezzo della pezza spaccata doppia si tireranno all'insù i muscoli, e dopo aver inciso il periostio, si passerà a segare le ossa. Nell'applicare la sega orizzontalmente si deve attendere, che ambe le ossa vengano separate nello stesso tempo, giacchè, se una venisse ad essere segata prima dell'altra, quella, che resterebbe ancora da recidersi interamente, si potrebbe rompere, e formare delle punte, o scheggie, le quali debbonsi nel caso tagliare sul momento, mercè la tanaglietta incisiva.

Compiuta la resezione dell'osso, e tolta la pezza spaccata doppia, si debbono legare i vasi principali, quelli, che si presentano in questa operazione sono la radiale, la cubitale, e le due interossee, l'anteriore cioè, e la posteriore. La cognizione anatomica della parte farà ritrovare facilmente questi vasi senza aver bisogno di far sospendere la compressione sopra l'arteria brachiale; ma sarà indispensabile il porre attenzione nell'allacciatura delle due principali arterie nominate, cioè radiale, e cubitale per non comprendervi i nervi corrispondenti alle medesime. Sarà benfatto per altro di far sospendere in seguito la compressione per riconoscere se mai ci fosse alcun altro ramo arterioso, che si rendesse necessario allacciare, come qualche volta accade. Se questo avesse luogo, se ne farà la legatura, e si ricoprirà indi il moncone con i muscoli, ed i tegumenti. Si applicano in allora due piccole compresse, una nel lato interno, e l'altra sul lato esterno in poca distanza del moncone.

PERAZ.CHE SI PRATICANO SULL'ESTREMITA'. 183

uali saranno circondate da una lunghetta, che avrà tenere fissa dalle mani di un Assistente, e tirerà a sostenere l'estremità delle liste adesive, e quali si mantengono i lembi degl'integumenti in contatto. Il rimanente dell'apparecchio è quello già esposto, che verrà sostenuto da una fascia tentiva. Il moncone si lascia semiflessso, ed un po' più elevato di tutto l'articolo, e si fissa al ginocchio, che lo sostiene; ed in seguito il metodo curativo verrà diretto giusta quanto di sopra si è detto.

L'amputazione della coscia richiede presso a poco le medesime cautele, che abbiamo già descritte parlando dell'amputazione del braccio. L'anatomia di struttura, che passa fra queste parti, ne ha analogo il metodo. Siccome per altro la coscia è composta di una quantità di muscoli molto maggiore di quella del braccio, e siccome questi sono di maggior grossezza; così è più da temersi il tiramento dei medesimi, e conviene quindi far uso di maggiori cautele, che nell'amputazione dell'arto per impedire, che accada la scopertura dell'osso. Il taglio circolare, o a due tempi si crede pratici non essere sufficiente il più delle volte per impedire questo inconveniente, e quindi vari Autori consigliano servirsi nell'amputazione della coscia, del metodo detto a lembi, e di quello di *Warton*; ma in ultim'analisi dovrà preferirsi, quello che risulta dai metodi di *Gooch* proposto da *Wissen*, e felicemente praticato dal *Volpi*.

Il luogo, dove devesi amputare la coscia dev'essere più in basso che sia possibile, per avere una ferita di minor superficie, per lasciare l'articolo di lunghezza sufficiente, e per essere meno imbarazzato dalla quantità di carni, che vanno sempre



crescendo, quanto più si avvicinano all'articolazione superiore. Preparato poi il necessario apparecchio, si passerà all'operazione, facendo situare il paziente supino col tronco sopra l'estremità di un letto ben fermo, il cui arto sano penderà dal medesimo, ma fisso; e quello affetto sarà mantenuto tra la flessione; e l'estensione da due pratici Assistenti, uno de quali tenga ferma la coscia nella sua parte superiore, e l'altro tenga fissa la gamba. Situato il paziente, ed i ministri, si dovrà fermare il corso del sangue, che attesa la grandezza de' vasi della coscia potrebbe essere di molto imbarazzo nel tempo dell'operazione. A quest'oggetto alcuni costumano di applicare il tornichetto sull'arteria crurale; ma i più recenti pratici si contentano di far comprimere la stessa arteria dalla mano di un ministro. Questa compressione dev'essere alquanto forte, e perciò si adopera il dito pollice, o meglio un pezzo di legno adattato a guisa di manubrio di un sigillo ricoperto di pelle; la compressione esercitata in questo modo è un mezzo sufficiente per fermare il corso del sangue, trovandosi la crurale, compressa fra il corpo applicato, e l'osso innominato; ad onta, che si attribuisca a codesto metodo l'inconveniente, che andando l'operazione alquanto in lungo, l'assistente, il quale comprime l'arteria, possa facilmente esser soggetto a stancarsi.

Fermato il corso del sangue, si passa al taglio dei tegumenti, che si farà circolare, e più in basso che si può, avvertendo di fare l'incisione due, o tre pollici almeno al disotto del luogo, dove si deve segar l'osso, acciò ne resti quantità conveniente per coprire la piaga. Si consiglia di segnare coll'inchiestro il luogo da incidersi, onde formare un taglio circolare esatto; e da altri di applicare



PERAZ. CHE SI PRATICANO SULL'ESTREMITA'. 183

fottuccie, una al disopra, e l'altra al disotto sito destinato per l'incisione. La prima di coteste cautele è inutile; e la seconda è anche dannosa. Incisi i comuni tegumenti, si distaccheranno le parti sottoposte, e particolarmente dall'apofisi del fascia lata, e si arrovescieranno all'insù, che si può, facendoli tenere dall'Assistente che mantiene ferma la coscia nella parte superiore.

Il taglio dei muscoli della coscia non è dei più li, attesa la loro quantità, e grossèzza, ed attesa la necessità, che vi è di lasciare una quantità di carni sufficiente per ricoprir l'osso; quindi deesi scegliere un metodo, col quale si giunga all'oggetto, passando sotto silenzio gli altri di già esposti, benchè siano stati ancora raccomandati in cotest' amputazione. Il metodo, che in questo caso è veramente il migliore, e che deesi esclusivamente tenere, è quello descritto dal cel. Volpi, il quale consiste nel taglio circolare e perpendicolare dei muscoli eseguito in più volte, e giunto che sia al femore, separare questo per l'altezza di un pollice dai muscoli profondi, cioè tricipite, vasto esterno, ed interno con il medesimo coltello, portando il taglio rasente il femore stesso. Recisi tal modo i muscoli, si porrà quindi la pezza recata, nella cui fessura si farà entrare l'osso, ed incrociando poi le due estremità divise della stessa pezza, si formerà un altro capo della medesima, e tanto questo, quanto il capo intero si darà in mano all'Assistente, che tiene la coscia superiormente, acciò egli tirandoli all'insù, venga a unir l'osso a tutta l'altezza, in cui si sono separate l'aderenze dei muscoli profondi col testè menato taglio. Allora si dovrà prima di ogni altra cosa denudar l'osso dal periostio, e questo

si farà per mezzo di un semplice taglio circolare nel luogo, dove deesi segare il medesimo. Ciò adempito, si prenderà la sega, e si principierà la resezione nel punto destinato, e per meglio dirigere la sega finchè non abbia fatto nell'osso una traccia sufficiente, si appoggerà l'unghia del pollice della mano sinistra sull'osso, e sulla medesima s'appoggerà lo stromento. Sarà molto attento l'Assistente, che sostiene la gamba, di tenerla bene ferma; acciò un qualche movimento, o il peso stesso dell'articolo non faccia rompere l'osso; quando è prossimo ad essere segato interamente, e così ancora il Professore andrà colla massima cautela, segnatamente in quel tempo, che è vicino a terminare la resezione, facendo agire soltanto la sega, e non fare su di essa la minima compressione.

Separata la parte d'amputarsi, il primo oggetto si è quello d'allacciare i vasi. Nella coscia essendo l'arterie molte, e di grosso calibro, si userà grande diligenza per non ometterne alcuna, la quale sebbene fosse in apparenza piccola, pure essendo impedito il corso del sangue nelle maggiori per mezzo delle legature, potrebbe in seguito produrre un'emorragia grave, e pericolosa.

La prima arteria da legarsi sarà la crurale, che si troverà facilmente nella parte interna del moncone. Il metodo più comodo per legare questa arteria si è di prenderla con una pinzetta, intorno a cui sia stato già precedentemente fatto il nodo col triplo refe incerato. Si fa entrare una branca della pinzetta nel cavo dell'arteria, e coll'altra di fuori si viene a stringere l'arteria stessa tirandola indi a se, si fa passare sulla medesima il nodo, eh' esisteva sullo stromento, e si stringe sull'arteria. Questo metodo oltre l'essere il più



le, e meno doloroso, ha il vantaggio di separare con minor fatica l'arteria dal nervo. A quest'oggetto potrà essere ancora molto vantaggioso nell'operare l'uso dell'uncino descritto dal sullodato *Volpi*. Sarà bene legare ancora la vena crurale, quale se sarà unita all'arteria, si leggerà insieme alla medesima, introducendo una branca della zetta nell'arteria, e l'altra nella vena, o legandola separatamente dall'arteria, se sia da essa un po' lontana, o se siasi il Professore servito dell'uncino. Legata l'arteria principale, si farà diminuire la compressione, e si vedrà facilmente quali sieno i vasi, che meritano di essere legati, e questi allacceranno nello stesso modo, che abbiamo accennato. Quando il professore sarà bene sicuro, che sono stati legati tutti i vasi, che possano produrre dell'emorragia, per quanto piccoli esser si vogliono, passerà alla medicatura della piaga; ma prima si deve con una spugna imbevuta d'acqua lavare bene la superficie della medesima, stendola, ed assicurandosi così d'avere legati tutti i vasi, che possono dar sangue, altrimenti si farne l'allacciatura. Si appressano quindi le labbra in modo, che resti come una ferita longitudinale, ed in un angolo della medesima si lascino i fili della legatura dell'arteria, sostenuti da una piccola lista adesiva, onde poterli ben riconoscere per non correr pericolo di tirarli nel rivare la medicatura. Si mantengono a contatto i margini della ferita nell'egual maniera indicata nell'amputazione del braccio, ed egualmente si tiene tutto l'apparecchio, il quale sarà sostenuto dalla fascia a spica discendente, che si principerà a due giri intorno alla pelvi. E' qui d'avvertir, che codesta fasciatura dev'essere alquanto com-



pressiva nella parte superiore del femore; e soltanto contentiva nella parte inferiore, ossia vicino il moncone. Si pone la coscia amputata in situazione orizzontale, e si mantiene ferma mercè una striscia di tela passata sopra la parte operata, e fissata co' spilli al sottoposto lenzuolo, si garantisce finalmente dalle coperte ec. con un archetto. Se mai dopo l'operazione apparisse una inquietante emorragia, dovrà il Cerusico contenersi nel modo, che abbiamo accennato, parlando delle amputazioni in generale.

La piaga, essendo molto estesa, non è possibile, che si riunisca per prima intenzione, ma deve necessariamente suppurare, lo che accade ordinariamente nel terzo, o quarto giorno. Allora il Professore leverà l'apparecchio con molta cautela, bagnandolo ancora, se sia necessario, con l'acqua tiepida, e continuerà a medicare la piaga, come si è già nel primo Volume accennato, trattando delle ulcere. Nel tempo della cura si dovrà prestare attenzione ai principali sintomi, che possono sopraggiungere; particolarmente alla scoperta dell'osso, se mai avesse luogo, cosa non molto facile ad accadere, purchè siasi eseguito con esattezza il metodo descritto del taglio in tre tempi.

Una cosa resta d'avvertirsi in seguito di questa operazione; ed è, che mancando al paziente un articolo dei maggiori, segnatamente se l'amputazione venga fatta nel terzo superiore della coscia, viene a mancare al corpo una parte notabile da nutrirsi, e quindi la massa del sangue è a proporzione troppo abbondante fino che non siasi rimesso il giusto equilibrio. Per conseguenza non sarà, che bene il fare al paziente un salasso

verso il termine della cura, particolarmente se nel tempo dell'operazione non siavi stata emorragia notevole, e se il malato sia giovane, e robusto. Per le medesime ragioni si procurerà di tenere il paziente in una dieta regolata, ed in una astinenza de' cibi sostanziosi, e nutrienti; ma piuttosto gli si permetteranno de' vegetabili, affinché non venga a soffrire coliche, e tutto ciò, che può generare una pletora. Formata la cicatrice, lo che accade dopo quattro, o cinque settimane, si applicherà alla parte una gamba artificiale, la quale in questo caso sarà da preferirsi quella proposta da *Starh*, col cui ajuto potrà il malato sostenersi, e camminare.

L'amputazione della gamba, attesa la struttura dell'articolo, ha molto di analogo con quella dell'antibraccio. I casi, nei quali ha luogo quest'operazione sono i medesimi di quelli già accennati, e si adopera in essa lo stesso metodo, e lo stesso apparecchio. Varie sono state le opinioni de' Pratici sul luogo, dove devesi praticare l'amputazione della gamba. Alcuni sono di sentimento, che sia miglior partito di fare questa operazione quattro dita circa sotto il ginocchio, ed altri all'opposto quattro pollici in circa sopra i malleoli; ed ognuno sostiene con delle ragioni la sua opinione. L'amputazione fatta sopra il ginocchio ha di vantaggio, che il moncone resta più fornito di muscoli, e tanto più facile riesce la cicatrice, e meno soggetta alla scoperta dell'osso, mentre all'opposto questi vantaggi sono minori nella parte inferiore, dove l'articolo è composto di tendini, e il taglio di questo, secondo i suddetti, porta ancora de' gravi inconvenienti. Inoltre dicono, che amputando la gamba nella parte inferiore, si ave-



che restano fra la tibia, e la fibola, e che non si sono potuti recidere nel taglio circolare. Adopererà egli a quest'oggetto il coltello a due tagli, che farà penetrare fra le ossa, procurando, che venga a strisciare esattamente sulla superficie delle medesime, acciò non resti alcuna porzione di parti molli non recisa, e che verrebbe poi lacerata dai denti della sega. Sarà ben fatto dopo di avere introdotto il coltello nella parte anteriore, portarlo nuovamente nella posteriore, onde esser sicuri, che il taglio sia completo.

Incisi i muscoli, ed il periostio, si potrà la pezza fessa, uno dei cui capi si farà passare nello spazio interosseo, e per mezzo della medesima si tireranno allo in sù le parti molli, onde segare le ossa. Si farà ciò nello stesso modo, che si è detto parlando dell'amputazione della coscia; ma essendo nella gamba due ossi, si dovrà porre attenzione, che uno di essi, segnatamente la fibola, che è più sottile, non si rompa. Si principierà quindi a segare la tibia, e si passerà indi in un con essa alla resezione della fibola, onde questa venga separata prima dell'altra, o almeno ambedue le ossa insieme. Le arterie da legarsi sono ordinariamente le due tibiali, e la peronea. Se l'amputazione sia fatta molto in alto, basta per solito il legare due soli tronchi. Stentando il torichetto, o diminuendo la compressione fatta dall'Assistente, come nell'amputazione della coscia si vedrà, se vi siano altri rami, che meritano la legatura, e se in caso fosse l'arteria nutritizia, si tura con un poco di molle cera.

Lavata la ferita con acqua tiepida dai grumi di sangue, si riuniscono le carni, ed i comuni tegumenti, e si fissano le compresse, come si è detto nell'amputazione dell'antibraccio, poche li-



nee distante dal contorno del moncone, per ivi collocare sopra le liste di ceroto adesivo, ed il resto dell'apparecchio, mantenendo il tutto in sito per mezzo della fasciatura spirale, che dalla metà della coscia, si estenderà a tutta la porzione dell'articolo rimasto, e che deve essere semplicemente contentiva. Per quello che riguarda la cura del malato, ed i sintomi, che possono sopraggiungere dovrà il Professore contenersi nella stessa maniera, che abbiamo accennato parlando delle altre amputazioni. Seguita la perfetta guarigione si adatta all'articolo amputato una gamba artificiale, la quale sarà da prescegliersi quella proposta da *Brunninghausen*.

### ARTICOLO III.

#### *Delle Disarticolazioni.*

**P**er terminare questo trattato delle amputazioni resta, che noi esponiamo brevemente il metodo di praticare le amputazioni nell'articolazione stessa, che propriamente dicesi *disarticolazione*. La disarticolazione nei primi tempi era quasi l'unico mezzo su cui si praticava l'amputazione poichè gli antichi credevano assai più facile l'eseguire l'amputazione in un luogo dove era stata già fatta dalla natura la soluzione di continuità dell'ossa stesse, di quello che praticarla nella continuità delle medesime. Si è trovato in seguito, che la disarticolazione era in altri casi più difficile, e più pericolosa dell'amputazione propriamente detta, e quindi si è quasi totalmente rigettata, facendone soltanto uso per le articolazioni delle dita, nelle quali l'amputazione è impraticabile, come si è

detto di sopra. Ambedue questi estremi sono da biasimarsi, e le disarticolazioni fatte ne' casi imponenti, e quelle fatte ne' luoghi dove sono praticabili sono molte volte di anteporsi all' amputazione stessa.

Le disarticolazioni hanno l' inconveniente, che spesso manca la quantità sufficiente di carni per ricoprire il moncone, e che l' osso presenta una maggior superficie, e quindi è più soggetto all' esfoliazione della cartilagine; ma in pratica si riconosce spesso il contrario, giacchè le ossa rimangono meno soggette a rimanere scoperte, e ad esfoliarsi essendo ricoperte dalla cartilagine, ed i tegumenti bastano sovente per formare la cicatrice. Spesse fiate poi la disarticolazione si rende assai facile quando essa è stata già principata dalla natura stessa, per esempio, quando la suppurazione, la carie, una ferita lacerata, o pure d' arma da fuoco ec. abbia distrutto in porzione le parti, che formano l' articolazione, e che quindi poco resti al Professore per separarla totalmente, onde in questi casi la disarticolazione è da preferirsi all' amputazione ordinaria.

Tutte le articolazioni sono in generale suscettibili della disarticolazione, e sebbene abbiamo già accennato quali siano le più frequenti ad eseguirsi, ciò non pertanto noi descriveremo ancora le altre accennate cioè quelle del braccio ec. come operazioni che si sono praticate, e vi è speranza di praticarle con successo.

Le varietà degne di osservazione in codesta specie di amputazioni sono, che il piede non può essere interamente disarticolato, tra l' astragalo, e l' estremità della tibia, e fibola; ma deesi l' astragalo, ed il calcagno lasciare in sito, disar-



OPERAZ. CHE SI PRATICANO SULL'ESTREMITÀ. 195  
ticolando dai medesimi il cuboide, e lo scafoide in  
un con il resto del piede. La disarticolazione  
dell' antibraccio è stata, a dire il vero, una volta  
proposta, anzi praticata da qualcuno, ma è al pre-  
sente generalmente riprovata atteso, che è molto  
piccolo il vantaggio, che risulta da questa disar-  
ticolazione a preferenza dell' amputazione del brac-  
cio stesso, e d'altronde i danni, che possono na-  
scere in proporzione della superficie molto più  
estesa, ed ineguale, che presenta l' articolazione  
medesima sono maggiori dell' anzidetta amputa-  
zione. E' degna eziandio di essere conosciuta la  
varietà, che presenta il metodo di *Pott* in que-  
sta specie di operazione, il quale partecipa sotto  
alcuni rapporti dell' amputazione, e della disarti-  
colazione. Esso consiste nel recidere con una pic-  
cola sega l' estremità inferiore dell' osso del brac-  
cio, e quelle superiori del raggio, ed ulna portan-  
do via soltanto questi pezzi d' osso, e lasciando  
poi il rimanente dell' antibraccio, e così dicasi il  
medesimo nell' articolazione del ginocchio, onde re-  
sti ugualmenre la gamba. Questo metodo è stato  
proposto dall' Autore segnatamente per le malattie  
dell' articolazioni accennate in occasione di tumori  
bianchi nelle medesime. La maniera di eseguire  
questa operazione consiste nello scoprire l' artico-  
lazione colla differenza, che aprendo quella del cu-  
bito si principia dalla parte posteriore del medesi-  
mo, ed in quelle del ginocchio dalla parte ante-  
riore, in cui separata, che sia la rotula dal liga-  
mento proprio, e dal tendine de' muscoli estensori  
della gamba si lussa l' articolazione, e si segano le  
due estremità delle ossa dopo averle separate dallo  
parti molli. Questo metodo in alcuni casi sarebbe  
il migliore per la bella speranza, che offre di ri-



sparmiare al malato la mutilazione del membro; ma la difficoltà, che s'incontra nell' eseguire l' operazione, e l'abbondante, e prolungata suppurazione a cui si va incontro, la rende impraticabile, e molto azzardosa per il successo, per lo che merita di essere del tutto abbandonata, ed anteposta alla medesima l' amputazione.

Per praticare la disarticolazione si adopera presso a poco lo stesso metodo, che si pone in opera nella amputazione. E' necessario primieramente fermare il corso del sangue come nelle amputazioni, colla differenza, che in alcuni casi, come per esempio nella disarticolazione del braccio non si può applicare il tornichetto sull' articolazione stessa; ma è duopo servirsi d' altri mezzi per ottenere il medesimo effetto. Il taglio de' tegumenti si farà parimenti procurando, che ne resti quantità sufficiente per ricoprire il moncone, che rimane. Si recidono in seguito i muscoli, i tendini, ed i ligamenti avvertendo di non offendere la superficie cartilaginosa delle ossa che devono rimanere. Il taglio dei ligamenti produce per se stesso la separazione de' l' estremità articolate degli ossi, senza bisogno di ricorrere ad altro mezzo. Eseguita la disarticolazione, si allacciano i vasi, e si medica la ferita come si pratica nelle amputazioni; queste regole generali vengono per altro modificate secondo il caso particolare, giacchè ogni articolazione richiede delle cautele speciali, che ora con brevità passiamo ad esporre.

La disarticolazione del braccio non è d' invenzione molto antica, *Ledran*, ed altri suoi contemporanei sono stati i primi a praticarla; ma il loro metodo è stato corretto principalmente da *La Faye*, ed il suo manuale è quello, che viene al

presente comunemente adottato con qualche modificazione. Questa operazione sarebbe stata tenuta per molto più pericolosa, di quello, che è realmente, e sarebbe forse meno raccomandata dagli Scrittori di Chirurgia; se non vi fossero degli esempi di disarticolazioni del braccio accadute fortuitamente; le quali sono terminate senza pericolo di vita, e con la perfetta guarigione dell'infermo.

Tutta la difficoltà in questa operazione consiste nell'impedire il corso del sangue nel braccio, onde non essere incomodati dall'emorragia. Alcuni credono, che basti legare le arterie secondo, che si recidono, senza praticare alcuna compressione, nè legatura avanti l'operazione; altri suppongono sufficiente la compressione col dito sull'arteria fra la clavicola, e l'apofisi coracoide; altri prima di principiare l'operazione con un ago curvo legano l'arteria forando gl'integumenti; altri finalmente hanno inventato delle macchine adattate, onde comprimere l'arteria succlavia. Al presente il metodo della compressione è preferito alla legatura come difficile a praticarsi, e dolorosa pel paziente; ma per altro deesi eseguire la compressione col pollice di un pratico Assistente sull'ascellare dopo che si è principata l'operazione dal Cerusico, come appresso vedremo.

Posto che sia il paziente a sedere gli si farà tenere il braccio in una situazione orizzontale, e disteso da un Assistente, mentre un altro resterà situato dietro il malato per ajutare il Professore nel manuale dell'operazione. Un bistorino, un coltello, una forbice, una pinzetta, un uncino, refe incerato ec. formano il necessario apparecchio. Il Professore situato all'esterno del braccio principerà col fare una incisione trasversale due, o tre



dita sotto l'acromion tagliando il Deltoide fino all'osso . Si fanno indi due tagli laterali perpendicolari al primo , uno de' quali dall' apofisi coracoide viene all' in giù , e l'altro dall' estremità posteriore dell' acromion viene a riunirsi colla prima incisione orizzontale . In questo modo si forma il primo lembo , sollevato il quale si giunge a scoprire l'articolazione .

Si distacca il lembo fatto dalle parti sottoposte , e si porta in alto facendolo tenere da un Assistente . Si farà sul momento la legatura dell'arteria circonflessa posteriore , indi si farà portare verso il petto l' estremità inferiore del braccio , affinchè si distendano i tendini de' muscoli , che passano sull' articolazione scoperta , i quali si recideranno tutti . Allora si taglia il ligamento capsulare , e si fa escire la testa dell' omero dalla cavità articolare , e quindi si taglia la porzione posteriore del ligamento capsulare . Ciò fatto , si principia il secondo lembo , portando il tagliente del coltello verso l' omero per recidere l' arteria brachiale più in basso , che sia possibile ; e prima di questa recisione dell' arteria si fa da un pratico Assistente comprimere col pollice l' arteria ascellare , per terminarsi in seguito dal Professore il taglio de' muscoli , ed integumenti , che tengono ancora l'osso dell' omero unito al tronco . Il taglio di codeste parti si farà obbliquamente in modo , che ne risulti un lembo simile a quello formato di sopra all'articolazione .

Separato il braccio interamente , la prima cosa , che dovrà farsi sarà quella di allacciare i vasi , e primieramente l'arteria brachiale . Questa si trova facilmente da chi conosce la sua posizione , e si prenderà colla pinzetta , o coll' uncino facendone



la legatura. Si farà poi diminuire la compressione per esaminare se esistano altre arterie, che gettino sangue, e se ne farà l'allacciatura. Quando si veda, che non vi è altro vaso da legare, si porrà nella cavità articolare un pìomacciolo di fila, e quindi si riuniranno non molto strettamente i lembi della ferita, che si medicherà colle liste di cetoto adesivo, fila, e con una adattata fasciatura, cioè spira ascellare contentiva. La cura locale, e generale della piaga sarà la medesima, che abbiamo esposto in altre occasioni.

Si può disarticolare ancora la mano nella sua articolazione coll'ossa dell'antibraccio, e particolarmente in occasione di ferite d'arme da fuoco prodotte dallo scoppio dell'arma stessa, supposto però il caso, che siansi formate una o più frattura nell'ossa del metacarpo, con lacerazione ec. Se l'estremità inferiore dell'antibraccio è illeso, come il più delle volte accade, si preferisce codesta operazione all'amputazione del medesimo. La disarticolazione della mano non richiede altra cautela, che quella di lasciare una quantità d'integumenti nella parte posteriore di essa, ossia sul suo dorso per ricoprire la piaga giacchè nella palma della mano ciò non riesce atteso, che ritrovansi in detta parte molti tendini, e ligamenti.

L'apparecchio degli stromenti consiste in un bistorino convesso nel tagliente, ed in tutto il resto è simile a quello già di sopra accennato per le altre disarticolazioni. Siccome in questa operazione si recidono due arterie molto considerabili, così è necessario di arrestare il corso del sangue per mezzo del tornichetto, o di un assistente, che faccia la compressione sull'arteria brachiale circa l'articolazione dell'omero. Ciò fatto, e situato il malato a sedere, o nel letto si fa porre la mano in pro-

nazione , facendola reggere da un ministro , mentre un altro tiene fermo l'antibraccio , e tira allo in sù i tegumenti . Il professore farà un taglio semicircolare dei medesimi sul dorso della mano circa un pollice sotto l' articolazione , e facendo tirare in sù la pelle già recisa , ajutandone il distacco dalle parti sottoposte , principierà il taglio dei tendini e ligamenti del dorso della mano , passa quindi al lato esterno , o radiale , recidendo i tendini dei muscoli , che servono all' estensione , ed abduzione del pollice , il ligamento laterale esterno , e proseguirà il taglio obliquamente verso il lato interno , ove termina , separando il ligamento , onde evitare l' ostacolo dell' apofisi stiloide dell' ulna . In questo manuale il Professore porta in basso colla sinistra la mano d' asportarsi , e ne facilita la lussazione , e termina la disarticolazione di essa portando il tagliente obliquamente in basso , ed infuori , e forma il secondo lembo quasi della stessa figura del primo .

Disarticolata la mano il primo oggetto si è quello di legare le due arterie radiale , cioè , e cubitale . Si esamina se mai esistesse qualche altra diramazione da allacciarsi , e dopo aver ricoperto la piaga coi lembi d' integumenti lasciati a questo oggetto , si applica l' apparecchio , come si è detto parlando dell' amputazione dell' antibraccio , consistente in liste di ceroto , fila , compresse , e fasciatura contentiva . Nel resto si condurrà il Professore collo stesso metodo , che abbiamo accennato per l' altre disarticolazioni .

Alcune volte essendo la malattia limitata , si preferisce il disarticolare il metacarpo con le dita annesse , lasciando intatta porzione della mano . Si vede benissimo . che la disarticolazione del primo , ed ultimo osso di questa articolazione deve restar-



assai più facile di quella delle tre ossa di mezzo, le quali offrono delle difficoltà insuperabili, molto più che l'offesa dei nervi della palma della mano potrebbe portare delle conseguenze pericolose. Vi è per altro qualche esempio di avere disarticolato il quarto, ed il quinto osso del metacarpo con felice successo. In queste disarticolazioni si farà stare la mano in pronazione, e tenendo con la mano sinistra il dito corrispondente, se ne fa la disarticolazione dell'osso cou un semplice bistorino tagliando dal lembo cubitale del medesimo fino all'articolazione sia del primo osso del metacarpo col trapezio, sia del quarto, o quinto, o di ambedue col unciniforme, e procurando di lasciare un lembo di tegumenti sufficiente per ricoprire la ferita, altrimenti essa difficilmente cicatrizza, e si compie la disarticolazione. Se l'arteria corrispondente produce emorragia, si dovrà allacciare, segnatamente se sia la radiale. La medicatura sarà l'ordinaria, che si fa in queste sorta di operazioni.

Abbiamo indicato di sopra, che nell'amputazioni delle dita si deve preferire la disarticolazione, perchè questo metodo è meno doloroso, più facile dell'amputazione, e perchè la porzione di falange, che resta, sarebbe inutile al malato, poichè verrebbe ad unirsi alla falange vicina con un anchilosi. Varie precauzioni si richiedono nella disarticolazione delle dita, secondo il dito, o la falange, che si deve disarticolare.

Nella mano dovendosi disarticolare il pollice si disarticola ancora il primo osso del metacarpo facendo due lembi, che servono per riunire la ferita. Nelle altre dita si pratica la disarticolazione, ove si articolano col rispettivo osso del metacarpo, facendo prima un taglio perpendicolare,



e poi formando due lembi laterali con due tagli semicircolari. Nell'altre falangi si fa prima un taglio circolare, e poi si formano due lembi con due tagli laterali perpendicolari. Le arterie alcune volte hanno bisogno di esser legate, e ciò accade particolarmente quando si disarticolano le prime falangi, e si recidono i tronchi dell'arterie collaterali.

Si deve avvertire, che dovendosi disarticolare la seconda falange del medio, o anulare è meglio disarticolarli nella loro unione colle ossa del metacarpo, poichè se si lasciasse una falange questa resterebbe inutile, e la deformità sarebbe maggiore, che disarticolando tutto il dito, mentre in quest'ultimo caso si uniscono le dita vicine in modo, che appena si conosce la mancanza del dito asportato. Nella disarticolazione peraltro dell'indice, e dito minimo sarà bene lasciare la prima falange, se si può, giacchè è sempre di qualche uso.

L'apparecchio per la disarticolazione delle dita consiste in un semplice bistorino stretto, una pinzetta, filo cerato, liste di ceroto, compresse, e fascia. Posto, che sia il malato in una comoda situazione, le si fa sostenere da un'Assistente l'antibraccio, e corrispondere la mano in perfetta pronazione, allora il Professore tenendo colla sinistra il dito da disarticolarsi, lo porta in una semiflessione, e colla destra armata di bistorino farà un'incisione perpendicolare, principiando nel mezzo dell'articolazione della prima falange coll'osso del metacarpo, fino alla diafisi della medesima: indi prosegue col bistorino dalla parte interna, o esterna del dito, giusta la mano dell'infermo, a fare un taglio semicircolare, il quale dee terminare vicino alla suddet-

ta articolazione dalla parte palmare, e così formare il primo lembo, il quale si separa dalla falange, e si taglia il ligamento laterale, portando rasente alla medesima il tagliente del bistorino. Ciò eseguito, si forma in egual maniera il secondo lembo, e quindi tagliando il ligamento capsulare si lussa con facilità il dito dalla parte dorsale della mano, e si separa totalmente, mercè il taglio de' tendini flessori, i quali per lo più in questo modo di operare sono gli ultimi ad essere recisi. La medicatura, consiste nel riunire i lembi fatti, e nel rimanente è presso che simile alle già accennate di sopra.

Fra le disarticolazioni delle grandi estremità è sicuramente la più difficile, e pericolosa quella del femore. La quantità dei muscoli, che deesi recidere, la grossezza dei vasi, la robustezza, e situazione del ligamento terete, la profondità dell' articolazione medesima, rendono ragione del pericolo, e difficoltà, che incontrar si deve necessariamente in cotesta operazione. *Schmucker* crede, che essa non si debba ammettere in Chirurgia, ne si possa praticare ragionevolmente da un Cerusico. Altri hanno cercato di renderla meno difficile, segando il collo del femore, invece di disarticolare il suo capo. Altri finalmente hanno creduto, che si potesse soltanto praticare, quando la malattia, che la richiede, avesse già principata la separazione della parte, onde poco resti al Professore da recidere per compire la disarticolazione. Tuttociò sebbene dimostra la difficoltà, ed il pericolo, che si sono sempre conosciuti accompagnare questa operazione, pure dobbiamo coraggiosamente intraprendere la medesima, secondo l'asserzione dei Professori *Vetch*, *Larrey*, *Toll*, ed altri; in tutti quei casi, che passiamo

## I N D I C E

De' Capitoli contenuti in questo Terzo Volume.

CAPO I.	<b>O</b> perazioni, che si praticano sulla	
	Testa . . . . .	Pag. 1
ART. I.	Della Trapanazione . . . . .	ivi
ART. II.	Della Cateratta . . . . .	9
ART. III.	Della Pupilla Artificiale . . . . .	24
ART. IV.	Della Fistola lagrimale . . . . .	29
ART. V.	Del Polipo del Naso . . . . .	33
ART. VI.	Del Labbro Leporino . . . . .	40
CAPO II.	Delle Operazioni che si praticano sul	
	Collo . . . . .	44
ART. I.	Estirpazione delle Tonsille . . . . .	ivi
ART. II.	Della Brancotomia . . . . .	47
ART. III.	Dell' Esofagatomia . . . . .	55
CAPO III.	Delle Operazioni, che si eseguiscono sul	
	petto . . . . .	58
ART. I.	Dell' Estirpazione del Cancro delle	
	Mammelle . . . . .	ivi
ART. II.	Dell' Operazione dell' Empiema . . . . .	69
ART. III.	Della Trapanazione dello Sterno . . . . .	76
CAPO IV.	Delle Operazioni, che si praticano sull'	
	Addome . . . . .	79
ART. I.	Delle Suture . . . . .	ivi
ART. II.	Della Paracentesi dell' Addome . . . . .	85
ART. III.	Dell' Operazione Cesarea . . . . .	93
ART. IV.	Della Nefrotomia . . . . .	103
ART. V.	Della Bubbioncele . . . . .	106
ART. VI.	Del Cateterismo . . . . .	114
ART. VII.	Della Punzione della Vescica . . . . .	118



mento di *Fallogio*, e per modo, che non si senta più la pulsazione nelle parti inferiori. Ciò eseguito, si deve passare in poca distanza della legatura fatta, un secondo nastrino di filo incerato, il quale potrà servire, se il caso lo esigga. Tosto dopo il Professore prende il coltello retto, e perpendicolarmente ne porta la punta tra i tendini flessori della coscia, ed il piccolo trocantere, daddove seguitando a penetrare verso il lato interno del femore fino alla parte posteriore della coscia, taglia i detti tendini, e tutte le parti molli, che formar deggiono il primo lembo, facendo scorrere il tagliente del coltello all'ingiù, e verso l'opposta estremità, termina il taglio sopra la cellulare, cute ec. Appena, che siasi fatto il primo lembo si fa sollevare il medesimo da un' assistente, ed il professore lega i vasi arteriosi, cioè varj rami della pudenda, e l'otturatrice: indi riprende lo stromento tagliente, con cui recide il ligamento capsulare, mercè l'adduzione fatta eseguire da un ajuto all'estremità medesima, la quale spingendosi in questa direzione, si lussa all'indietro. Allora si taglia il ligamento Terete, e si prosegue a recidere totalmente il capsulare, passando col tagliente del coltello dalla parte esterna del femore, fra questo, ed i suoi tendini estensori si giunge al gran trocantere, ove si separano i medesimi, e si prosegue il taglio formando nell'egual maniera del primo il secondo lembo, nel quale colle dita di un pratico Assistente si fanno otturare le boccucce dell'arterie recise.

Separato interamente l'articolo si passa a legare l'altre arterie, che si rinvencono in questo secondo lembo, cioè, le otturatrici, l'iliaca posteriore, alcuni rami della pudenda, della gluzia, della sciatica, e tutti i più piccoli rami,

che si presentano nell'estensione delle parti recise, portandovi a contatto una spugna bagnata nell'acqua tiepida; anzi si fa slentare la legatura fatta alla crurale per accertarsi, se vi sono altri rami, che abbiano bisogno di essere legati, lo che si farà senza indugio. La legatura principale si consiglia non stringerla nuovamente, ma si lascerà in sito per stringerla in caso di emorragia. Essendo il Cerusico sicuro, che non vi sia più alcuna diramazione arteriosa d'allacciarsi, dopo aver lavato la ferita dai grumi di sangue, ne farà la riunione con qualche punta di sutura interrotta, che interessi i soli tegumenti, non che con lunghe liste di ceroto, applicherà indi fila, compresse, e sosterrà il tutto con una fasciatura a spica.

La suppurazione, che si stabilisce in questo caso è certamente molto abbondante, e pericolosa, e richiede per conseguenza tutta l'attenzione del Professore, diretta secondo le regole già in altro luogo indicate, colle quali deesi ancora prestare grande assistenza al malato dopo che siasi formata la cicatrice, se esso sia stato abbastanza fortunato nel conseguirla, fuggendo dalle fauci della morte, in grazia dell'opera della mano di un coraggioso, ed esperto Cerusico.

E' fuori di dubbio, che debbasi piuttosto disarticolare la gamba dai condili del femore, di quello, che eseguire l'amputazione di questo, quante volte però lo permetta la situazione della malattia, che richiede l'operazione. Per questa medesima ragione si deve lasciare in sito la rotula, altrimenti si dovrà asportare.

Fermato il corso del sangue in cotesto articolo, e situato, che sia il malato, non che preparato il necessario apparecchio, il quale è diverso



soltanto del pocanzi accennato negli stromenti taglianti, servendo in questo un grosso bistorino a taglio convesso, ed un altro retto, e piuttosto lungo, si fa dal Professore col primo bistorino un taglio semicircolare dei tegumenti sulla tuberosità della tibia, facendo tenere la gamba semiflessa, per cui si recide ancora facilmente il ligamento, che unisce la rotula alla tibia. Se poi si debba portar via la rotella si farà il primo taglio de' tegumenti vicino al tendine de' muscoli estensori della gamba, il quale si dee recidere, invece del suindicato ligamento. Nel primo caso in un colla rotula si rovesciano i tegumenti, quando che nel secondo caso, si fanno questi soltanto tirare all' in sù, lasciando essa attaccata alla gamba, e quindi si seguita in egual maniera la disarticolazione cioè tagliando i ligamenti laterali, e tutta la capsula per potere col bistorino retto, facendo maggiormente flettere la gamba, recidere i ligamenti crociati, ed in fine formare egualmente del primo lembo, il secondo, o posteriore. Eseguita in tal modo la disarticolazione del ginocchio si dovranno usare le medesime cautele, tanto per legare i vasi arteriosi, quanto per la medicatura, e cura consecutiva.

Il piede si disarticola parzialmente col metodo di *Chopart*, che già è stato da noi accennato di sopra, il quale offre il doppio vantaggio di fornire al malato un punto d'appoggio nel calcagno, cosa, che non si ottiene coll'intera disarticolazione del piede, e di non essere così difficile, e pericolosa come la disarticolazione dell'ossa del metatarso. Il metodo di praticarla è il seguente.

Si fa situare il malato in modo, che il piede, e la gamba sporghino fuori del letto, un ministro



sostiene la gamba, ed un secondo ministro comprime la crurale: il Professore prende il piede con la mano sinistra, e col bistorino a taglio convesso incide li tegumenti sul dorso del piede due pollici sotto l'articolazione dell'ossa del tarso con quelle della gamba, e con questo taglio dividesi ancora il muscolo estensor breve delle dita, ed i tendini estensori fino all'osso. Posto ciò, si fanno due tagli laterali, che dal di sotto ai malleoli terminino al taglio già fatto, e formasi in tal guisa un lembo superiore. Sollevato il medesimo, si penetra col coltello fra l'astragalo, e lo scafoide, e dopo fra il calcagno, ed il cuboide, tagliando i ligamenti, che uniscono quest'ossa fra loro. Divise le ossa con un coltello più lungo si forma un lembo sotto il piede, che basti a ricoprire la superficie delle ossa scoperte, ed in questa maniera si viene a separare la porzione anteriore del piede, de a formare un lembo, che serve a ricoprire la piaga. In cotesta operazione si recidono molte arterie, le quali debbono legarsi a misura, che se ne fa la recisione, acciò non incomodino nel tempo, che si opera. Ordinariamente sono tre, o quattro, che deggiono essere allacciate, e sono: la dorsale, quella del tarso, e le due plantari, interna cioè, ed esterna.


Quando si sarà sicuri, che sieno legati tutti i vasi arteriosi potrà medicarsi la ferita ricoprendo le ossa con i due lembi formati, e poi tenendo in sito i medesimi per mezzo di liste di cerotto adesivo, che si sostengono colle fila, compresse, ad una fasciatura contentiva. La suppurazione è per solito assai mite, riunendosi la maggior parte della piaga per prima intenzione.

Nelle ossa del metatarso non si può ammettere la loro disarticolazione, come in quella del

**OPERAZ. CHE SI PRATICANO SULL'ESTREMITA' . 209**  
metacarpo ; ed abbenchè si ammetta da qualcuno nel primo osso , in cui si articola il dito grosso del piede , pure dee darsi con ragione la preferenza in questo caso all' amputazione del medesimo , fattane però la resezione obbliquamente con una piccola sega , e nel rimanente si usano le medesime cautele .

Nelle dita del piede il metodo è presso che simile a quello , che si adopera nella disarticolazione delle dita della mano , colla differenza , che si procura , che il lembo inferiore sia più grande del superiore , acciò la cicatrice resti superiormente , onde il piede non abbia a posare sulla medesima .

*Fine dell' Opera .*



1000







